Kol.
116 e. 11.

Digitized by Google

<36624529170015

<36624529170015

Bayer. Staatsbibliothek

Digitized by Google

Digitized by Google

Das Thierreich

eingetheilt

nach dem Bau der Thiere

als

Grundlage ihrer Naturgeschichte

und der vergleichenden

Anatomie

von

dem Herrn Ritter von Cuvier
Staatsrath von Frankreich
und
beständiger Secretär der Academie der Wissenschaften u. s. w.

Aus dem Französischen frey übersetzt
und mit vielen Zusätzen versehen
von

H. R. Schinz, med. Dr.
Secretär der naturforschenden Gesellschaft in Zürich und Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften.

Erster Band.
Säugethiere und Vögel.

Stuttgart und Tübingen,
in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
1821.

Digitized by Google

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Digitized by Google

Vorrede des Ueberſetzers.

Cuviers Werk über die Thiere, gehört ganz gewiß unter die Schriften, welche von den neuern Syſtematikern, als eine der werthvollſten anerkannt wurden. Die Eintheilung der Thiere, welche Cuvier vorſchlägt, beruht auf Grundſätzen, welche aus der Natur ſelbſt geſchöpft ſind. Seitdem die Zootomie und die vergleichende Anatomie ſich ſo ſehr ausgebildet haben, mußten auch die zoologiſchen Syſteme auf die Grundlagen zurückgeführt werden, welche ſich aus dieſem Fortſchreiten unſerer Kenntniße ergaben. Linnes Syſtem mußte nothwendig dieſen neuern Syſtemen weichen, ohne daß um deßwillen das Verdienſt des großen ſchwediſchen Naturforſchers im geringſten geſchmälert wird. Linne brachte zuerſt Ordnung und Licht in das Chaos, und dieſem Lichte verdanken wir unſere bisherigen Fortſchritte allein. Ohne Linnes ſchaffenden Geiſt, hätte man noch lange herumtappen können, ehe man die Bahn gefunden hätte, welche allein weiter führen könnte; als aber einmal der Grundſtein gelegt war, ſo war es weit leichter, die Materialien zum Gebäude ſo zu ordnen, daß endlich ein haltbares Ganzes heraus kommen mußte; aber wie alles menſchliche

Digitized by Google

Thun der Verbesserung bedarf, so bedarf es auch dieses Gebäude immer und immer.

Cuvier ist wohl durch seine Stellung, als Bewahrer des ersten Museums von Europa, als ein Mann, der schon lange sich mit allen Fächern des zoologischen und zootomischen Wissens innig vertraut machen konnte, dazu berufen, mit Hilfe seiner trefflichen Mittarbeiter, und der unermeßlichen litterarischen Hilfsquellen, eine neue Ansicht über das naturgemäßeste System aufzustellen. Sein Werk enthält einen so großen Schatz von Erfahrungen, und das Resultat eines vieljährigen, mühsamen, aber belohnenden Studiums aller Reiche der Natur, daß wohl wenige es wagen dürfen, mit ihm in die Schranken zu treten. Noch ist in Deutschland kein Werk erschienen, welches, wie Cuviers, alle Theile des Thierreiches umfaßte, als Okens Zoologie, allein leider gehört dieses Werk einem Systeme an, dem immer weniger allgemein gehuldigt werden dürfte, da es auf Grundsätzen beruht, deren Unhaltbarkeit immer mehr eingesehen werden dürfte, und zwar mit außerordentlichem Fleiße und Kenntniß, aber in einer Sprache geschrieben ist, die nur wenige, ganz eingeweihete, vollkommen verstehen möchten. Herr Goldfuß hat ganz neuerlichst in gedrängter Kürze ein treffliches Handbuch der Zoologie herausgegeben, welches dem Bedürfniß der Zeit besser entspricht, aber nicht so vollkommen ist, wie das Werk Cuviers, wenn schon auf denselben Grundsätzen beruhend. Da nun bey weitem nicht alle Deutsche das

Französische so gut kennen, daß sie ein wissenschaftliches Buch ohne Anstand lesen können, so möchte eine Uebersetzung des Cuvier'schen Werkes auch jetzt noch willkommen seyn, wenn dieselbe besonders nachholt, was seit ihrer Erscheinung in der Ursprache Neues ist entdeckt und geleistet worden.

Diese Uebersetzung soll also nicht blos Uebersetzung seyn, sondern sie soll mit sehr vielen Zusätzen bereichert werden, welche die neuern Entdeckungen nöthig gemacht haben. Bey aller Bekanntschaft Cuviers, mit der deutschen Litteratur, hat er doch einige Quellen unbenutzt gelassen, und manches Neue ist seitdem erschienen, welches er noch nicht benutzen konnte. Oken, Lichtenstein, Tiedemann, Kuhl, Neuwied, Temminck, Naumann, Nilsson und andere, haben für Säugethiere und Vögel Arbeiten geliefert, welche Herr Cuvier noch nicht benutzen konnte. Oken hat versucht, ein vollständiges Verzeichniß der bis jetzt bekannten Säugethiere zu liefern, der Uebersetzer glaubt dieses gesichtet, sehr ansehnlich vermehrt und durch Benutzung aller Quellen vervollständigt, und alle diese Thiere nach Cuviers System geordnet zu haben. Da, wo die Existenz der Thiere, als Art, noch zweifelhaft ist, wurde ein Fragezeichen beygesetzt, oder in einer Note der Zweifel bemerkt, dieses geschah namentlich mit allen denjenigen Thieren, welche Molina in seiner Naturgeschichte von Chili anführt, da alle seine Beschreibungen durchaus unzureichend sind: Illiger und Oken haben darauf allzuviel Werth gelegt. Eben so ist es

Digitized by Google

mit einigen Arten, welche Schr er sogar abgebildet hat, ihre Existenz ist noch zweifel aft, wie z. B. Viverra tigrina, Viverra Vulpec ula et hermaphrodyta, welche durchaus nicht ge örig zu bestimmen sind.

So viel es möglich war, s chte der Uebersetzer passende deutsche Namen aufzufind n, was wenigstens bey den Säugethieren größtentl eils gelang: Diese Arbeit ist schwerer, als man anfa gs glaubt, Illigers deutsche Namen klingen gewöhnlich nicht gut, und sind zu gesucht, und Oken hat barbarisc e Worte, ohne allen Sinn, gleichsam aufs Geratl ewohl hingeworfen. Schon schwerer ist dieses bey den Vögeln gewesen, da die Biegsamkeit der französischen Sprache oft schwer zu übersetzende Namen angebracht hat, dennoch ist nur bey wenigen ein nicht teutsch tönender Name angebracht worden. Bey den folgenden Klassen ist es vollends unmöglich, immer deutsche Namen zu geben.

Bey den Vögeln sind nicht nur alle von Cuvier aufgestellten Gattungen angeführt, sondern auch noch die von Illiger mit Recht aufgestellten Gattungen eingeschoben, und Vieillots und Temminks neue Gattungen in den Noten wenigstens erwähnt, so daß wenige von den neuen Ornithologen aufgestellte Gattungen unbemerkt geblieben sind. Bey dieser Klasse sind alle europäischen Arten, welche bis jetzt bekannt geworden sind, vollständig aufgeführt. Freilich war es dem Uebersetzer unmöglich, alle Gattungen nach eigener Untersuchung aufzuführen, da ihm dazu die nöthige

Ansicht aller in der Natur fehlte, doch hat seine eigene Sammlung mehr als zwey Drittheile der aufgestellten Gattungen in der Natur aufzuweisen, und viele andere sah er in andern Sammlungen. In Hinsicht auf die Citate, ist allenthalben Naumanns Werk bey den deutschen Arten angeführt, da anzunehmen ist, dieses werde in den Händen aller deutschen Ornithologen seyn, nur da, wo Naumann noch keine Abbildung geliefert hat, ist auf die Daubentonschen planches enluminées und wohl gar so weit es möglich war, auf die von Lauguier und Temminк begonnene Fortsetzungen, welche jetzt planches coloriées heißen, verwiesen, so wie bey den Säugethieren entweder Schrebers Werk, oder das neue Werk der Herrn Geoffroy und Cuvier angeführt worden ist.

Auch bey den beyden folgenden Klassen der Wirbelthiere, sollen alle bekannten europäischen Arten möglichst vollständig angeführt werden, was dagegen bey den letzten Klassen der wirbellosen Thiere durchaus nicht möglich war, da das Werk dann allzu voluminos geworden wäre.

Fehler werden sich in diesem ersten Bande, aller Mühe ungeachtet, noch genug eingeschlichen haben, wofür ich vorläufig um gütige Nachsicht bitten möchte; denn noch sind manche Gattungen von Säugethieren und Vögeln noch lange nicht gehörig gesichtet, und von einigen wären Monographien höchst nothwendig, wie sie von den Affen von Audebert, Geoffroy und Kuhl, von den Flederthieren von Geoffroy, von den Mäu-

Digitized by Google

sen von Pallas, von den Antelopen von Lichtenstein bearbeitet worden sind. In den Gattungen des Bären, Stinkthiers, Wiesels, ist noch große Verwirrung, ganz unentwickelt sind die Gattungen der Robben und der Gürtelthiere, und unbestimmt mehrere Beutelthiere und viele Katzen.

Bey den Vögeln ist vielleicht, besonders von französischen Naturforschern, für einige ausländische Gattungen mehr geleistet worden, aber manche Gattungen sind so auseinander gerissen, daß man ihre ehemaligen Glieder kaum mehr findet, man denke dabey nur an die Gattungen Certhia, Gracula, Pipra, Lanius, Todus, Turdus, Muscicapa und andere mehr, welche gänzlich umgewandelt worden sind. Zur Entwirrung helfen die trefflichen Monographien der Franzosen, eines Levaillant, Vieillot, Audebert, Desmarest, in ihren Prachtwerken über die Colibris, Baumlaufer, Manakins, Plattschnäbel, Racker, Paradiesvögel, Papageien; allein wo ist der Privatmann, der diese kostbaren Werke anschaffen kann! so wie auch Temminks Prachtwerk über die Hühner und Tauben, für einen Privatmann zu kostbar ist. Die Deutschen haben wenig von der Art aufzuweisen, doch dürfen Meyer und Wolfs deutsche Ornithologie, die Darmstädter deutsche Ornithologie, welche aber beyde allzulangsam fortschreiten, und Naumanns neues Werk kek mit jenen in die Schranken treten. Die englischen Werke von Shaw, Wilson und andere, sind auf dem festen

Digitized by Google

Lande nur in wenig Bibliotheken anzutreffen, und können nur selten benutzt werden.

Neue Gattungen sind von mir keine aufgestellt worden, etwa zwey oder drey ausgenommen, welche durchaus nothwendig schienen, da ich kein Freund der jetzigen Mode bin, fast aus jeder Art eine neue Gattung zu bilden, wir haben wahrlich schon mehr als genug, und viele sind gewiß überflüßig, und nicht genug charakterisirt, wie z. B. vielleicht einige Gattungen der Händeflügler, und die unendlichen Gattungen der Raubvögel und Würger nach Vieillots. Wer kann alle neuen Gattungen, auch nur einer Abtheilung des Thierreichs, in seinem Kopfe behalten, und sich die Hauptcharaktere einprägen. Unser Zeitalter ist an Entdeckungen so reich, daß es die ganze Lebenszeit eines Menschen erfordert, sich nur in einem dieser Fächer alles bekannt zu machen, und daß die Menge der Namen fast den Kopf schwindeln macht.

Cuviers Thierreich ist mit einigen Kupfern geziert, aber so wenig, daß es räthlicher gefunden wurde, dieselben ganz auszulassen, um das Werk nicht unnöthig zu vertheuern; entweder gebe man synoptische Tafeln, wie Oken, aber nicht auf Kalenderpapier, wie jener, und besser gewählt, oder man gebe bey der Menge guter Werke, die wir jetzt haben, lieber gar keine Abbildungen. Es ist wirklich schade, daß aus deutscher Knikerey, wahrscheinlich des Buchhändlers, Okens Tafeln auf so schlechte Art ausgeführt worden sind; wenn der Wunsch des Publikums sich für etwas ähn-

Digitized by Google

liches aber besseres ausspricht, so soll bald entsprochen werden. Auch hier geben die Franzosen treffliche Muster, in den schönen Abbildungen, welche zu der neuen Ausgabe des Wörterbuches der Naturwissenschaften, in Straßburg 1820 erscheinen, Stich und Papier sind vortrefflich und jede Gattung soll eine Abbildung erhalten.

Um aber dieses Chaos von neuen Namen dem Gedächtniße besser einzuprägen, sollen solche synoptische Tafeln mit der ältern und neuern Benennung der Gattungen, doch ohne Abbildungen zu diesem Buche geliefert werden, damit auch der weniger Geübte sich finden kann.

Da die Säugethiere vollständig und die europäischen Vögel alle angeführt werden sollen, und die Entdeckungen fortschreiten, so soll von Zeit zu Zeit ein Nachtrag für die Käufer dieses Buchs nachgeliefert werden, damit das Verzeichniß immer vollständig bleibe; neue Entdeckungen während dem Drucke des Werkes, haben schon einen Anhang nothwendig gemacht.

So sey dieses Werk der gütigen Nachsicht der Naturforscher empfohlen, jede billige Kritik wird dankbar angenommen und möglichst benutzt werden, der Uebersetzer kennt seine Schwäche selbst zu gut, als daß er glauben könnte, etwas tadelloses geliefert zu haben.

Die am Ende vorkommende Litteratur, wird möglichst vervollständigt, so daß auch die seit der Herausgabe des Originalwerks erschienenen neuen Schriften hinzukommen werden.

Digitized by Google

Vorrede
von Herrn Cuvier.

Da ich mich von früher Jugend an mit Vorliebe dem Studium der vergleichenden Anatomie widmete, also die Geſetze zu erforſchen ſuchte, nach welchen die Thiere gebildet wurden, und nach welchen die verſchiedenen Thiere von einander abweichen, ſo glaubte ich dem wiſſenſchaftlichen Publikum die Frucht meiner dreißigjährigen Arbeit, der ich alle meine Muße widmete, mittheilen zu dürfen. Der Geſichtspunkt, welchen ich nie aus dem Geſichte verlor, war, gewiſſe allgemeine Geſetze für die Organiſation aufzuſuchen, und ſie ſo deutlich, als es nur immer möglich iſt zu enthüllen. Mein erſter Verſuch zeigte, daß ich vorerſt die Thiere nach ihrem Baue ordnen müſſe, daß ich vorerſt mit einem Worte die Klaſſe, die Ordnung, die Gattung bezeichnen müſſe, welche jede Art nach den Aehnlichkeiten, welche ſie unter ſich, in ihrer äußern und innern Bildung haben, und nach den allgemeinen oder beſondern Beziehungen, einnehmen muß. Ein ſolches Syſtem beſtund bis dahin nicht, und ſehr wenige Naturforſcher konnten im Fall ſeyn ein ſolches aufzuſtellen, wenn ſie auch ſchon wollten, da eine ſolche Eintheilung eine ſehr tiefe Kenntniß des thieriſchen Baues erfordert, den ſie zu bezeichnen beſtimmt iſt.

Digitized by Google

Zwar haben allerdings Daubenton und Camper, mehreres darin geleistet und Materialien gesammelt; Pallas hat allgemeine Ansichten aufgestellt, allein die trefflichen Ideen dieser gelehrten Männer, fanden bey ihren Zeitgenossen nicht den Eingang, den sie verdienten. Das einzige Namenregister der Thiere, welches man bisher besaß, war das Linneische; aber das System dieses großen Mannes, fiel in die Hände eines Mannes, der sich nicht einmal die Mühe nahm, die Grundsätze des tiefen Denkers näher zu prüfen, er entstellte dasselbe, und wenn er auf Fehler stieß, so machte er sie, statt zu verbessern, schlimmer.

Allerdings erschienen über einzelne Klassen Werke, welche auf mühsamer Arbeit beruheten und eine große Menge neuer Arten bekannt machten, aber die Verfasser nahmen zu sehr Rücksicht auf den äußern Bau allein, und niemand beschäftigte sich ernstlich damit, die Klassen und Ordnungen mehr nach dem ganzen Bau, als nach einzelnen Theilen zu ordnen. Die Hauptcharaktere mehrerer Klassen waren unrichtig angegeben oder mangelhaft, selbst in berühmten anatomischen Werken: Viele Ordnungen waren willkührlich, und fast in keiner einzigen Klasse folgten die Gattungen in naturgemäßer Ordnung aufeinander. Ich mußte daher mit großem Zeitaufwand zuerst die Anatomie und die Zootomie zu Hilfe nehmen, um die Abtheilungen der Klassen darnach zu ordnen, meine früheren Arbeiten benutzen, um bestimmte Charaktere aufzufinden, und diese Charaktere anwenden, die gemach-

Digitized by Google

ten Eintheilungen zu vervollkommnen. Aus dieſer Zuſammenſtellung und Entwicklung der einen Wiſſenſchaft aus der andern, gelang es mir, ein zoologiſches Syſtem zu bilden, welches geeignet iſt, im Felde der Anatomie zum Wegweiſer zu dienen, und umgekehrt benutzte ich die anatomiſchen Kenntniße zur Enthüllung und Aufklärung des zoologiſchen Syſtemes.

Die erſten Früchte dieſer doppelten Arbeit enthüllte ich in einem Aufſatz, welcher im Jahr 1795 erſchien, und worin eine neue Eintheilung der weißblutigen Thiere vorgeſchlagen wurde. Dieſer Entwurf der Anwendung meiner neuen Methode, zur Bildung von Gattungen und Untergattungen, machte die Grundlage der Eintheilung des Thierreichs aus, welche im Jahr 1798 gedruckt wurde; ich verbeſſerte dieſe Arbeit mit Beyhilfe des Herrn Dumeril in den Tabellen, welche dem erſten Bande meiner Vorleſungen im Jahr 1800 beygedruckt wurden. Vielleicht hätte ich mich damit begnügt, dieſe Tabellen zu verbeſſern, und wäre ſogleich zur Herausgabe meines großen Werkes über die Anatomie geſchritten, wenn ich nicht im Verfolge meiner Unterſuchungen auf andere Fehler in den General- oder Specialſyſtemen der Zoologie geſtoßen wäre; welche mir zeigten, wie groß die Verwirrung und der Mangel an kritiſcher Beurtheilung in Aufſtellung einer großen Zahl Arten oder Gattungen ſey. Nicht nur die Klaſſen und die Ordnungen fand ich mit der Natur der Thiere nicht übereinſtimmend, wenn das Syſtem die Grundlage der vergleichenden Anatomie

enthalten sollte, sondern selbst viele Gattungen, ob gleich im Allgemeinen besser bestimmt, boten in ihrer Zusammenstellung nur unzulängliche Hilfsmittel, weil die Arten nicht gehörig untergeordnet waren. So hat Gmelin, in dem er den Lamantin zur Gattung des Wallrosses, und die Sirene zur Gattung des Aales zählte, die Bildung der Gattung selbst vernichtet: eben so, da er in dieselbe Klasse, in dieselbe Ordnung und in dieselbe Reihenfolge den Dintenfisch, und den Armpolypen stellte, wodurch er außer Stand gesetzt ward, etwas allgemein passendes über eine Klasse und Ordnung aufzustellen, welche so sehr verschiedene Wesen umfaßte. Man könnte leicht noch eine Menge ähnlicher Beyspiele anführen, welche eben so große Nachtheile haben, wenn sie auch nicht so in die Augen springen sollten. Es ist nicht genug neue Klassen und Ordnungen aufzustellen, und die Gattungen zu ordnen; die Arten müssen auch selbst untersucht werden, um zu bestimmen, ob sie auch wirklich der Gattung angehören, zu welcher sie bisher gezählt wurden. Da aber fand es sich, daß viele Arten gegen die Natur zusammengestellt oder von einandergerissen wurden, ja daß die Existenz vieler sogar noch zweifelhaft sey, und daß ihnen die Eigenschaften nicht zukommen, welche man ihnen andichtet. Bald wurden unter dem Namen einer Art, Thiere zusammengestellt, welche ganz bestimmt verschiedene Arten bilden, wovon sogar das eine oder andere zu einer andern Gattung gehört; bald aber wurde im Gegentheil eine Art als zwey, wohl auch als

Digitized by Google

drey Arten bezeichnet, und kommen unter verschiedenen Unterabtheilungen und unter verschiedenen Gattungen, ja sogar unter verschiedenen Ordnungen vor. Was soll, um ein Beyspiel davon zu geben, Gmelins Trichechus manatus seyn, unter diesem Namen bezeichnet er drey verschiedene Arten und zwey Gattungen, welche weit von einander verschieden sind. Was soll Velella seyn, welche er zweymal das eine Mal unter den Meduſen, das andere Mal unter den Holothurien anführt? Die Arten der Biphora, bringt er bald unter die Gattung Dagysa, die größere Zahl aber unter Salpa, und einige unter die Gattung Holothuria. Man muß also nicht blos die Arten näher untersuchen, sondern auch die angegebene Synonymie. Auf diese Art allein kann ein neues, passendes System geschaffen werden.

Ein solches Unternehmen, nach den außerordentlichen Fortschritten, welche die Wissenschaft in den letzten Jahrhunderten gemacht hat, wäre für einen einzigen Menschen unausführbar, wenn ihm auch die Natur das längste menschliche Leben gestattet hätte, und wenn er sonst keine andere Beschäftigung hätte. Ich selbst hätte nicht einmal den Versuch wagen dürfen; wenn ich auf mich allein beschränkt gewesen wäre; allein die außerordentlichen Hilfsmittel, welche meine Stellung mir darbietet, schienen mir das zu ersetzen, was mir an Talent und Zeit mangelt. Im täglichen Umgang mit den ersten Naturforschern Frankreichs, und im Besitze der besten Werke des Auslandes, kann

ich aus den Arbeiten Belehrung schöpfen, so wie sie erscheinen; ich darf die zahlreichen Sammlungen, so gut wie meine eigene, sehr reiche, benutzen, ich durfte nur dies gehörig thun, so war meine größte Arbeit gemacht. Bey einigen Klassen blieb mir sehr wenig zu thun übrig, z. B. über die Weichthiere, welche Lamark so trefflich bearbeitet hat; über die Säugethiere, nach den trefflichen Arbeiten des Herrn Geoffroy. Die vielen neuen Gesichtspunkte, welche Lacepede aufstellte, waren eben so viele Hilfsmittel zur Anordnung der Fische. Levaillants Arbeiten und Sammlungen von so vielen herrlichen Vögeln aus allen Gegenden, gaben mir die Grundlagen an die Hand, welche ich bey Anordnung der Vögel aufzustellen hatte. Meine eigenen Erfahrungen und Untersuchungen, bereichert mit so vielen anderer Naturforscher, mußten am Ende Früchte hervorbringen, welche ich allein zu sammeln nicht im Stande gewesen wäre. Die Herren Blainville und Oppel untersuchten die anatomischen Preparate, welche ich zur Grundlage meiner Abtheilungen der Amphibien bestimmt hatte, und zogen daraus vor mir, und vielleicht besser, als ich es hätte thun können, die Resultate, welche ich nun benutzen konnte.

Diese Betrachtungen ermuthigten mich den Entschluß zu fassen, ein neues System der Thiere aufzustellen, und meinem Werke über die vergleichende Anatomie vorangehen zu lassen. In diesem wollte ich die Hauptabtheilungen und Unterabtheilungen, mit Rücksicht auf den äußern und innern Bau der Thiere aufstellen,

ſtellen, und durch alle Stufen verfolgen, welche uns die einfachere oder zuſammengeſetztere Struktur der Körper zeigt; ich wollte den Verſuch machen, jeder genau bekannten Art ihre Stelle im Syſteme anzuweiſen; zugleich war es nöthig, um die Sache weniger trocken und lehrreicher zu machen, bey denjenigen Arten, welche auch in unſerm Lande vorkommen, einige Anzeigen mit einzuflechten, über den Nutzen, den wir von ihnen ziehen, oder den Schaden, den wir von ihnen zu fürchten haben; oder von ihren Sitten, ihrem Haushalt, ihrer äußern Form, ihrer Schönheit, ihrer Größe, in gedrängter Kürze das Nöthige anzuführen.

Ich glaubte dadurch jungen Anfängern in der Naturkunde beſonders nützlich zu ſeyn, da die meiſten von ihnen nicht Beurtheilungsfähigkeit genug haben können, die vielen Fehler zu bemerken, von denen ſelbſt die beſten Werke oft voll ſind, um ſo mehr, als die meiſten zu wenig Rückſicht auf den innern Bau der Thiere genommen haben: Die Anatomiker werden aus dieſem Werke den Fingerzeig erhalten, auf welche Klaſſen oder Ordnungen ſie vorzüglich ihre Bemühungen zu richten haben, wenn ſie auch für die menſchliche Anatomie oder Phyſiologie neuen Gewinn ziehen wollen.

Dieſer doppelte Geſichtspunkt konnte indeß nicht bey allen Klaſſen gleich ſtark ins Auge gefaßt werden: Die Wirbelthiere mußten mich, als die unter allen Beziehungen merkwürdigſten, am meiſten beſchäftigen. Unter den Wirbelloſen war meine Aufmerkſamkeit

Digitized by Google

hauptsächlich auf die nackten Weichthiere und größern Zoophyten gerichtet; dagegen wurden die unzählbaren Abweichungen der Schalthiere und Korallen, die mikroscopischen Thiere und die übrigen Familien, welche eine weniger bedeutende Rolle in der Natur zu spielen scheinen, oder deren Organisation mit dem Messer nicht untersucht werden kann, weniger ausführlich behandelt, und ich bezog mich, besonders was die Schalthiere und Korallen betrift, auf die Werke von Lamark, wo man alles finden wird, was man darüber zu wünschen haben mag.

Die Insekten, so merkwürdig durch ihren Bau, durch ihr Aeußeres, durch ihre Gewohnheiten, durch ihren Einfluß auf die ganze lebende Natur, habe ich mit Beyhilfe meines Mitkollegen und Freundes Latreille, der diese Geschöpfe zum vorzüglichsten Vorwurf seiner Studien gemacht hat, bearbeitet, und dieser Beyhilfe verdankt mein Werk die Vorzüge und Vollkommenheit, welches es darin haben mag. Latreille hat beynahe in derselben Ordnung und nach denselben Grundsätzen, welche im übrigen Theil dieses Werkes befolgt wurden, das Resultat seiner mühsamen Arbeit, und die Aufzählung der unzähligen Gattungen, welche die Entomologen immerfort aufstellen, in einem einzigen Bande zusammengestellt.

Wenn auch an einigen Orten die Aufstellung der Untergattungen und Arten weniger vollständig seyn mag, so bezieht sich diese Ungleichheit nie auf die obern höhern Ordnungen und auf die Hinweisungen von

Digitized by Google

Aehnlichkeiten, welche auf sichern Fundamenten, die als die Frucht meiner Arbeit zu betrachten sind, gebaut wurden. Ich untersuchte eine Art nach der andern, so wie ich sie mir verschaffen konnte, ich stellte diejenigen zusammen, welche blos in Hinsicht der Größe oder der Farbe, oder der Zahl einiger, weniger wichtigen Theile, abweichen, und bildete daraus eine sogenannte Untergattung. So oft es möglich war, untersuchte ich wenigstens eine Art einer Untergattung anatomisch, und so kommen in meinem Buche sehr wenige Gattungen vor, die mikroscopischen ausgenommen, von denen ich nicht wenigstens einige Organe vorweisen könnte.

Nach dem ich die Namen der Arten angeführt, welche ich selbst beobachtete, oder welche gut beschrieben oder abgebildet wurden, so wurden dann diejenigen geordnet, welche ich zwar nicht selbst sah, von denen ich aber gute Abbildungen oder Beschreibungen vorfand, welche keinen Zweifel über ihre Stellung übrig ließen. Dagegen wurden die räthselhaftesten Wesen übergangen, aus welchen man so leichtsinnig Arten gemacht hat, deren Annahme und Aufstellung im Verzeichniße der Thiere, eine große Verwirrung angerichtet hat. Allenthalben hätte ich neue Arten beyfügen können, allein, wo ich nicht auf Abbildungen hinweisen konnte, hätten die Beschreibungen zu weitläufig werden müssen, wodurch das Werk selbst eine zu große Ausdehnung erhalten hätte, daher wurden immer nur einzelne Arten angezeigt, welche als Vorbilder von Untergat-

Digitized by Google

tungen dienen konnten. Sobald einmal die Untergattungen bestimmt waren, so war es nun erst möglich, daraus die Hauptabtheilungen der Gattungen, Familien, Ordnungen und Klassen zu bilden, welche das Thierreich zu einem Ganzen verbinden. Um dahin zu gelangen, schlug ich zum Theil den Weg ein, von den einfachern Thieren zu den zusammengesetztern heraufzugehen, und durch Vergleichung die Verwandtschaft zu bestimmen; oft aber auch wurde der entgegengesetzte Weg eingeschlagen, und das Resultat war, daß die eine Methode die andere gegenseitig fester begründete, und so entstund ein Ganzes, wobey die äußern Formen eben so wohl, als die innere Organisation berücksichtigt wurden, welche jedes Thier bezeichnen.

So handelte ich jedesmal, wenn es mir nöthig oder möglich schien, neue Ordnungen zu begründen. Oft aber auch war durch frühere Arbeiten anderer verdienter Forscher, die Bahn so geebnet, daß ich nur ihren Vorarbeiten folgen durfte. Aber auch in diesen Fällen, suchte ich neue Thatsachen auf, um die ältern Sätze zu prüfen, die ich nur dann als richtig annahm, wenn sie die Probe bestanden hatten.

Das Publikum kann sich von dieser Arbeit eine Idee machen, wenn es meine Bemühungen betrachtet, die Anatomie der Weichthiere besser zu begründen, deren Resultat in den Memoiren des Museums enthalten, seitdem aber besonders vermehrt und verbessert erschienen ist. Ich darf versichern, vorerst auf ähnliche Art die Wirbelthiere, die Ringelwürmer, die Zoophy-

Digitized by Google

ten und viele Insekten und Krustenthiere behandelt und bearbeitet zu haben; das Resultat ist zwar nicht besonders gedruckt, aber die Präparate sind in der Sammlung zur vergleichenden Anatomie, im Pflanzengarten aufgestellt, und dienten zur Grundlage meiner Studien.

Eine andere mühvolle Arbeit, war die Untersuchung der wirklichen Existenz zweifelhafter Arten; ich suchte jeder ihre Stelle anzuweisen, erst wann ich von der Wahrheit ihres Daseyns überzeugt war, führte ich sie an. Nur nach dieser Sichtung, und niemals ohne Prüfung vorhergehender Systematiker, ordnete ich die Arten in ihre Untergattungen. So wird es begreiflich, daß eine Gattung, welche Gmelin aufstellte, jetzt zerrissen in ihren einzelnen Gliedern sogar in verschiedenen Klassen vorkommt; daß viele vermeinte Arten, nun nur eine einzige bilden, und daß ganz bekannte Namen anders gebraucht werden mußten. Alle diese Veränderungen kann ich rechtfertigen, und der Leser kann ihre Ursache in den Quellen auffinden.

Um verständlicher zu seyn, mußte bey jeder Klasse ein Hauptschriftsteller angeführt werden, welcher die besten Abbildungen geliefert hat, nur da, wo jener Schriftsteller keine Abbildung lieferte, mußte ein anderes Werk citirt werden.

Meine ganze Arbeit hätte leicht eine weitere Ausdehnung erhalten können, allein ich wollte dies nicht, und wiederholte niemals bey einer Art, was im Allgemeinen von der Gattung gesagt, noch bey einer Gattung

Digitized by Google

das, was schon bey der Ordnung bemerkt worden, so konnte ich mich kurz fassen. Ich vermied es, wo immer möglich technische Ausdrücke zu brauchen, ob schon ich genöthigt war, viele neue Namen, für die zahlreichen Untergattungen, welche ich aufstellte zu wählen, und diese suchte ich theils auf den Charakter des Thiers anzupassen, theils dem Ohr so angenehm als möglich zu machen; nach Linneus Muster, wurden gewohnte Namen entweder lateinisirt oder neue aus der Götterlehre gewählt. Linnes Nomenclatur wurde indeß allenthalben da beybehalten, wo es möglich war, ich glaubte dieses dem großen Manne schuldig zu seyn.

Die Gewohnheit, welche der Naturforscher annimmt, alle Gegenstände in systematische Ordnung zu bringen, pflanzt sich bey ihm auch auf andere Ideen fort, und hat überhaupt auf die Geschäfte des Lebens mehr Einfluß als man nicht denkt, und sie wäre sehr würdig in der Erziehung überhaupt angewendet zu werden. Wer einmal alles methodisch zu ordnen versteht, wendet diese Kunst auch mit Vortheil auf das Studium von Gegenständen an, welche mit der Naturgeschichte nichts gemein haben. Jede Untersuchung, welche eine Anordnung von Thatsachen erfordert, muß nach den nehmlichen Gesetzen betrieben werden, und ein junger Mann, welcher sich mit dem Studium der Naturgeschichte beschäftigt, wird selbst erstaunen, wenn er findet, wie sehr dieses methodische Studium ihm auch so viele andere Geschäfte sehr erleichtert. Die Naturgeschichte ist so anziehend, so umfassend, daß sie auch dem

Digitized by Google

größten Geiste genug Stoff zum Nachdenken darbietet, und mit ihren Annehmlichkeiten in jeder Lage des Lebens tröstend einzuwirken vermag. Mit Bewunderung sieht der Naturforscher die Ordnung und Harmonie, welche der gütige Schöpfer in alle seine Werke gelegt hat, und findet dagegen die Werke der Menschen nur kleinlich. Diese hohen Ideen muß man nie aus den Augen verlieren, sie geben diesem Studium einen ausserordentlichen Reitz, wie kein anderes gewähren kann.

Noch muß ich mich über die vorzüglichsten Veränderungen erklären, welche dieses Buch auszeichnen, und damit ich nicht mit fremden Federn prange, angeben, was von andern entlehnt sey.

Zuerst muß ich bemerken, daß ich gar nicht beabsichtigte, die Thiere so zu classificiren, daß sie eine ununterbrochene Stufenleiter bilden sollten. Ich sehe alle Bemühungen der Art als unausführbar an, und bin gar nicht der Meinung, daß diejenigen Säugethiere und Vögel, welche zuletzt im System stehen, weniger vollkommen als die übrigen seyen; eben so wenig, daß die letzten Säugethiere vollkommener als die ersten Vögel; oder die letzten Weichthiere vollkommener als die ersten Ringelwürmer oder Zoophyten seyen; ja selbst das Wort vollkommener, hat keinen logisch richtigen Sinn, und man sollte es nicht brauchen. Ich betrachte meine Abtheilungen und Unterabtheilungen gar nicht als eine Stufenfolge der Wesen, denn wenn man auch unläugbar eine solche Stufenfolge der Wesen, einen Uebergang vom einfachern zum zusammengesetztern wahr-

Digitized by Google

das, was schon bey der Ordnung bemerkt worden, so konnte ich mich kurz fassen. Ich vermied es, wo immer möglich technische Ausdrücke zu brauchen, ob schon ich genöthigt war, viele neue Namen, für die zahlreichen Untergattungen, welche ich aufstellte zu wählen, und diese suchte ich theils auf den Charakter des Thiers anzupassen, theils dem Ohr so angenehm als möglich zu machen; nach Linneus Muster, wurden gewohnte Namen entweder latinisirt oder neue aus der Götterlehre gewählt. Linnes Nomenclatur wurde indeß allenthalben da beybehalten, wo es möglich war, ich glaubte dieses dem großen Manne schuldig zu seyn.

Die Gewohnheit, welche der Naturforscher annimmt, alle Gegenstände in systematische Ordnung zu bringen, pflanzt sich bey ihm auch auf andere Ideen fort, und hat überhaupt auf die Geschäfte des Lebens mehr Einfluß als man nicht denkt, und sie wäre sehr würdig in der Erziehung überhaupt angewendet zu werden. Wer einmal alles methodisch zu ordnen versteht, wendet diese Kunst auch mit Vortheil auf das Studium von Gegenständen an, welche mit der Naturgeschichte nichts gemein haben. Jede Untersuchung, welche eine Anordnung von Thatsachen erfordert, muß nach den nehmlichen Gesetzen betrieben werden, und ein junger Mann, welcher sich mit dem Studium der Naturgeschichte beschäftigt, wird selbst erstaunen, wenn er findet, wie sehr dieses methodische Studium ihm auch so viele andere Geschäfte sehr erleichtert. Die Naturgeschichte ist so anziehend, so umfassend, daß sie auch dem

Digitized by Google

größten Geiſte genug Stoff zum Nachdenken darbietet, und mit ihren Annehmlichkeiten in jeder Lage des Lebens tröſtend einzuwirken vermag. Mit Bewunderung ſieht der Naturforſcher die Ordnung und Harmonie, welche der gütige Schöpfer in alle ſeine Werke gelegt hat, und findet dagegen die Werke der Menſchen nur kleinlich. Dieſe hohen Ideen muß man nie aus den Augen verlieren, ſie geben dieſem Studium einen auſſerordentlichen Reitz, wie kein anderes gewähren kann.

Noch muß ich mich über die vorzüglichſten Veränderungen erklären, welche dieſes Buch auszeichnen, und damit ich nicht mit fremden Federn prange, angeben, was von andern entlehnt ſey.

Zuerſt muß ich bemerken, daß ich gar nicht beabſichtigte, die Thiere ſo zu claſſificiren, daß ſie eine ununterbrochene Stufenleiter bilden ſollten. Ich ſehe alle Bemühungen der Art als unausführbar an, und bin gar nicht der Meinung, daß diejenigen Säugethiere und Vögel, welche zuletzt im Syſtem ſtehen, weniger vollkommen als die übrigen ſeyen; eben ſo wenig, daß die letzten Säugethiere vollkommener als die erſten Vögel; oder die letzten Weichthiere vollkommener als die erſten Ringelwürmer oder Zoophyten ſeyen; ja ſelbſt das Wort vollkommener, hat keinen logiſch richtigen Sinn, und man ſollte es nicht brauchen. Ich betrachte meine Abtheilungen und Unterabtheilungen gar nicht als eine Stufenfolge der Weſen, denn wenn man auch unläugbar eine ſolche Stufenfolge der Weſen, einen Uebergang vom einfachern zum zuſammengeſetztern wahr-

Digitized by Google

das, was schon bey der Ordnung bemerkt worden, so konnte ich mich kurz fassen. Ich vermied es, wo immer möglich technische Ausdrücke zu brauchen, ob schon ich genöthigt war, viele neue Namen, für die zahlreichen Untergattungen, welche ich aufstellte zu wählen, und diese suchte ich theils auf den Charakter des Thiers anzupassen, theils dem Ohr so angenehm als möglich zu machen; nach Linneus Muster, wurden gewohnte Namen entweder latinisirt oder neue aus der Götterlehre gewählt. Linnes Nomenclatur wurde indeß allenthalben da beybehalten, wo es möglich war, ich glaubte dieses dem großen Manne schuldig zu seyn.

Die Gewohnheit, welche der Naturforscher annimmt, alle Gegenstände in systematische Ordnung zu bringen, pflanzt sich bey ihm auch auf andere Ideen fort, und hat überhaupt auf die Geschäfte des Lebens mehr Einfluß als man nicht denkt, und sie wäre sehr würdig in der Erziehung überhaupt angewendet zu werden. Wer einmal alles methodisch zu ordnen versteht, wendet diese Kunst auch mit Vortheil auf das Studium von Gegenständen an, welche mit der Naturgeschichte nichts gemein haben. Jede Untersuchung, welche eine Anordnung von Thatsachen erfordert, muß nach den nehmlichen Gesetzen betrieben werden, und ein junger Mann, welcher sich mit dem Studium der Naturgeschichte beschäftigt, wird selbst erstaunen, wenn er findet, wie sehr dieses methodische Studium ihm auch so viele andere Geschäfte sehr erleichtert. Die Naturgeschichte ist so anziehend, so umfassend, daß sie auch dem

Digitized by Google

größten Geiſte genug Stoff zum Nachdenken darbietet, und mit ihren Annehmlichkeiten in jeder Lage des Lebens tröſtend einzuwirken vermag. Mit Bewunderung ſieht der Naturforſcher die Ordnung und Harmonie, welche der gütige Schöpfer in alle ſeine Werke gelegt hat, und findet dagegen die Werke der Menſchen nur kleinlich. Dieſe hohen Ideen muß man nie aus den Augen verlieren, ſie geben dieſem Studium einen auſſerordentlichen Reitz, wie kein anderes gewähren kann.

Noch muß ich mich über die vorzüglichſten Veränderungen erklären, welche dieſes Buch auszeichnen, und damit ich nicht mit fremden Federn prange, angeben, was von andern entlehnt ſey.

Zuerſt muß ich bemerken, daß ich gar nicht beabſichtigte, die Thiere ſo zu claſſificiren, daß ſie eine ununterbrochene Stufenleiter bilden ſollten. Ich ſehe alle Bemühungen der Art als unausführbar an, und bin gar nicht der Meinung, daß diejenigen Säugethiere und Vögel, welche zuletzt im Syſtem ſtehen, weniger vollkommen als die übrigen ſeyen; eben ſo wenig, daß die letzten Säugethiere vollkommener als die erſten Vögel; oder die letzten Weichthiere vollkommener als die erſten Ringelwürmer oder Zoophyten ſeyen; ja ſelbſt das Wort vollkommener, hat keinen logiſch richtigen Sinn, und man ſollte es nicht brauchen. Ich betrachte meine Abtheilungen und Unterabtheilungen gar nicht als eine Stufenfolge der Weſen, denn wenn man auch unläugbar eine ſolche Stufenfolge der Weſen, einen Uebergang vom einfachern zum zuſammengeſetztern wahr-

Digitized by Google

das, was schon bey der Ordnung bemerkt worden, so konnte ich mich kurz fassen. Ich vermied es, wo immer möglich technische Ausdrücke zu brauchen, ob schon ich genöthigt war, viele neue Namen, für die zahlreichen Untergattungen, welche ich aufstellte zu wählen, und diese suchte ich theils auf den Charakter des Thiers anzupassen, theils dem Ohr so angenehm als möglich zu machen; nach Linneus Muster, wurden gewohnte Namen entweder lateinisirt oder neue aus der Götterlehre gewählt. Linnes Nomenclatur wurde indeß allenthalben da beybehalten, wo es möglich war, ich glaubte dieses dem großen Manne schuldig zu seyn.

Die Gewohnheit, welche der Naturforscher annimmt, alle Gegenstände in systematische Ordnung zu bringen, pflanzt sich bey ihm auch auf andere Ideen fort, und hat überhaupt auf die Geschäfte des Lebens mehr Einfluß als man nicht denkt, und sie wäre sehr würdig in der Erziehung überhaupt angewendet zu werden. Wer einmal alles methodisch zu ordnen versteht, wendet diese Kunst auch mit Vortheil auf das Studium von Gegenständen an, welche mit der Naturgeschichte nichts gemein haben. Jede Untersuchung, welche eine Anordnung von Thatsachen erfordert, muß nach den nehmlichen Gesetzen betrieben werden, und ein junger Mann, welcher sich mit dem Studium der Naturgeschichte beschäftigt, wird selbst erstaunen, wenn er findet, wie sehr dieses methodische Studium ihm auch so viele andere Geschäfte sehr erleichtert. Die Naturgeschichte ist so anziehend, so umfassend, daß sie auch dem

Digitized by Google

größten Geiſte genug Stoff zum Nachdenken darbietet, und mit ihren Annehmlichkeiten in jeder Lage des Lebens tröſtend einzuwirken vermag. Mit Bewunderung ſieht der Naturforſcher die Ordnung und Harmonie, welche der gütige Schöpfer in alle ſeine Werke gelegt hat, und findet dagegen die Werke der Menſchen nur kleinlich. Dieſe hohen Ideen muß man nie aus den Augen verlieren, ſie geben dieſem Studium einen auſſerordentlichen Reitz, wie kein anderes gewähren kann.

Noch muß ich mich über die vorzüglichſten Veränderungen erklären, welche dieſes Buch auszeichnen, und damit ich nicht mit fremden Federn prange, angeben, was von andern entlehnt ſey.

Zuerſt muß ich bemerken, daß ich gar nicht beabſichtigte, die Thiere ſo zu claſſificiren, daß ſie eine ununterbrochene Stufenleiter bilden ſollten. Ich ſehe alle Bemühungen der Art als unausführbar an, und bin gar nicht der Meinung, daß diejenigen Säugethiere und Vögel, welche zuletzt im Syſtem ſtehen, weniger vollkommen als die übrigen ſeyen; eben ſo wenig, daß die letzten Säugethiere vollkommener als die erſten Vögel; oder die letzten Weichthiere vollkommener als die erſten Ringelwürmer oder Zoophyten ſeyen; ja ſelbſt das Wort vollkommener, hat keinen logiſch richtigen Sinn, und man ſollte es nicht brauchen. Ich betrachte meine Abtheilungen und Unterabtheilungen gar nicht als eine Stufenfolge der Weſen, denn wenn man auch unläugbar eine ſolche Stufenfolge der Weſen, einen Uebergang vom einfachern zum zuſammengeſetztern wahr-

Digitized by Google

das, was schon bey der Ordnung bemerkt worden, so konnte ich mich kurz fassen. Ich vermied es, wo immer möglich technische Ausdrücke zu brauchen, ob schon ich genöthigt war, viele neue Namen, für die zahlreichen Untergattungen, welche ich aufstellte zu wählen, und diese suchte ich theils auf den Charakter des Thiers anzupassen, theils dem Ohr so angenehm als möglich zu machen; nach Linneus Muster, wurden gewohnte Namen entweder lateinisirt oder neue aus der Götterlehre gewählt. Linnes Nomenclatur wurde indeß allenthalben da beybehalten, wo es möglich war, ich glaubte dieses dem großen Manne schuldig zu seyn.

Die Gewohnheit, welche der Naturforscher annimmt, alle Gegenstände in systematische Ordnung zu bringen, pflanzt sich bey ihm auch auf andere Ideen fort, und hat überhaupt auf die Geschäfte des Lebens mehr Einfluß als man nicht denkt, und sie wäre sehr würdig in der Erziehung überhaupt angewendet zu werden. Wer einmal alles methodisch zu ordnen versteht, wendet diese Kunst auch mit Vortheil auf das Studium von Gegenständen an, welche mit der Naturgeschichte nichts gemein haben. Jede Untersuchung, welche eine Anordnung von Thatsachen erfordert, muß nach den nehmlichen Gesetzen betrieben werden, und ein junger Mann, welcher sich mit dem Studium der Naturgeschichte beschäftigt, wird selbst erstaunen, wenn er findet, wie sehr dieses methodische Studium ihm auch so viele andere Geschäfte sehr erleichtert. Die Naturgeschichte ist so anziehend, so umfassend, daß sie auch dem

Digitized by Google

größten Geiste genug Stoff zum Nachdenken darbietet, und mit ihren Annehmlichkeiten in jeder Lage des Lebens tröstend einzuwirken vermag. Mit Bewunderung sieht der Naturforscher die Ordnung und Harmonie, welche der gütige Schöpfer in alle seine Werke gelegt hat, und findet dagegen die Werke der Menschen nur kleinlich. Diese hohen Ideen muß man nie aus den Augen verlieren, sie geben diesem Studium einen ausserordentlichen Reitz, wie kein anderes gewähren kann.

Noch muß ich mich über die vorzüglichsten Veränderungen erklären, welche dieses Buch auszeichnen, und damit ich nicht mit fremden Federn prange, angeben, was von andern entlehnt sey.

Zuerst muß ich bemerken, daß ich gar nicht beabsichtigte, die Thiere so zu classificiren, daß sie eine ununterbrochene Stufenleiter bilden sollten. Ich sehe alle Bemühungen der Art als unausführbar an, und bin gar nicht der Meinung, daß diejenigen Säugethiere und Vögel, welche zuletzt im System stehen, weniger vollkommen als die übrigen seyen; eben so wenig, daß die letzten Säugethiere vollkommener als die ersten Vögel; oder die letzten Weichthiere vollkommener als die ersten Ringelwürmer oder Zoophyten seyen; ja selbst das Wort vollkommener, hat keinen logisch richtigen Sinn, und man sollte es nicht brauchen. Ich betrachte meine Abtheilungen und Unterabtheilungen gar nicht als eine Stufenfolge der Wesen, denn wenn man auch unläugbar eine solche Stufenfolge der Wesen, einen Uebergang vom einfachern zum zusammengesetztern wahr-

Digitized by Google

das, was schon bey der Ordnung bemerkt worden, so konnte ich mich kurz fassen. Ich vermied es, wo immer möglich technische Ausdrücke zu brauchen, ob schon ich genöthigt war, viele neue Namen, für die zahlreichen Untergattungen, welche ich aufstellte zu wählen, und diese suchte ich theils auf den Charakter des Thiers anzupassen, theils dem Ohr so angenehm als möglich zu machen; nach Linneus Muster, wurden gewohnte Namen entweder latinisirt oder neue aus der Götterlehre gewählt. Linnes Nomenclatur wurde indeß allenthalben da beybehalten, wo es möglich war, ich glaubte dieses dem großen Manne schuldig zu seyn.

Die Gewohnheit, welche der Naturforscher annimmt, alle Gegenstände in systematische Ordnung zu bringen, pflanzt sich bey ihm auch auf andere Ideen fort, und hat überhaupt auf die Geschäfte des Lebens mehr Einfluß als man nicht denkt, und sie wäre sehr würdig in der Erziehung überhaupt angewendet zu werden. Wer einmal alles methodisch zu ordnen versteht, wendet diese Kunst auch mit Vortheil auf das Studium von Gegenständen an, welche mit der Naturgeschichte nichts gemein haben. Jede Untersuchung, welche eine Anordnung von Thatsachen erfordert, muß nach den nehmlichen Gesetzen betrieben werden, und ein junger Mann, welcher sich mit dem Studium der Naturgeschichte beschäftigt, wird selbst erstaunen, wenn er findet, wie sehr dieses methodische Studium ihm auch so viele andere Geschäfte sehr erleichtert. Die Naturgeschichte ist so anziehend, so umfassend, daß sie auch dem

Digitized by Google

größten Geiste genug Stoff zum Nachdenken darbietet, und mit ihren Annehmlichkeiten in jeder Lage des Lebens tröstend einzuwirken vermag. Mit Bewunderung sieht der Naturforscher die Ordnung und Harmonie, welche der gütige Schöpfer in alle seine Werke gelegt hat, und findet dagegen die Werke der Menschen nur kleinlich. Diese hohen Ideen muß man nie aus den Augen verlieren, sie geben diesem Studium einen ausserordentlichen Reiz, wie kein anderes gewähren kann.

Noch muß ich mich über die vorzüglichsten Veränderungen erklären, welche dieses Buch auszeichnen, und damit ich nicht mit fremden Federn prange, angeben, was von andern entlehnt sey.

Zuerst muß ich bemerken, daß ich gar nicht beabsichtigte, die Thiere so zu classificiren, daß sie eine ununterbrochene Stufenleiter bilden sollten. Ich sehe alle Bemühungen der Art als unausführbar an, und bin gar nicht der Meinung, daß diejenigen Säugethiere und Vögel, welche zuletzt im System stehen, weniger vollkommen als die übrigen seyen; eben so wenig, daß die letzten Säugethiere vollkommener als die ersten Vögel; oder die letzten Weichthiere vollkommener als die ersten Ringelwürmer oder Zoophyten seyen; ja selbst das Wort vollkommener, hat keinen logisch richtigen Sinn, und man sollte es nicht brauchen. Ich betrachte meine Abtheilungen und Unterabtheilungen gar nicht als eine Stufenfolge der Wesen, denn wenn man auch unläugbar eine solche Stufenfolge der Wesen, einen Uebergang vom einfachern zum zusammengesetztern wahr-

Digitized by Google

das, was schon bey der Ordnung bemerkt worden, so konnte ich mich kurz fassen. Ich vermied es, wo immer möglich technische Ausdrücke zu brauchen, ob schon ich genöthigt war, viele neue Namen, für die zahlreichen Untergattungen, welche ich aufstellte zu wählen, und diese suchte ich theils auf den Charakter des Thiers anzupassen, theils dem Ohr so angenehm als möglich zu machen; nach Linneus Muster, wurden gewohnte Namen entweder lateinisirt oder neue aus der Götterlehre gewählt. Linnes Nomenclatur wurde indeß allenthalben da beybehalten, wo es möglich war, ich glaubte dieses dem großen Manne schuldig zu seyn.

Die Gewohnheit, welche der Naturforscher annimmt, alle Gegenstände in systematische Ordnung zu bringen, pflanzt sich bey ihm auch auf andere Ideen fort, und hat überhaupt auf die Geschäfte des Lebens mehr Einfluß als man nicht denkt, und sie wäre sehr würdig in der Erziehung überhaupt angewendet zu werden. Wer einmal alles methodisch zu ordnen versteht, wendet diese Kunst auch mit Vortheil auf das Studium von Gegenständen an, welche mit der Naturgeschichte nichts gemein haben. Jede Untersuchung, welche eine Anordnung von Thatsachen erfordert, muß nach den nehmlichen Gesetzen betrieben werden, und ein junger Mann, welcher sich mit dem Studium der Naturgeschichte beschäftigt, wird selbst erstaunen, wenn er findet, wie sehr dieses methodische Studium ihm auch so viele andere Geschäfte sehr erleichtert. Die Naturgeschichte ist so anziehend, so umfassend, daß sie auch dem

Digitized by Google

größten Geiste genug Stoff zum Nachdenken darbietet, und mit ihren Annehmlichkeiten in jeder Lage des Lebens tröstend einzuwirken vermag. Mit Bewunderung sieht der Naturforscher die Ordnung und Harmonie, welche der gütige Schöpfer in alle seine Werke gelegt hat, und findet dagegen die Werke der Menschen nur kleinlich. Diese hohen Ideen muß man nie aus den Augen verlieren, sie geben diesem Studium einen ausserordentlichen Reitz, wie kein anderes gewähren kann.

Noch muß ich mich über die vorzüglichsten Veränderungen erklären, welche dieses Buch auszeichnen, und damit ich nicht mit fremden Federn prange, angeben, was von andern entlehnt sey.

Zuerst muß ich bemerken, daß ich gar nicht beabsichtigte, die Thiere so zu classificiren, daß sie eine ununterbrochene Stufenleiter bilden sollten. Ich sehe alle Bemühungen der Art als unausführbar an, und bin gar nicht der Meinung, daß diejenigen Säugethiere und Vögel, welche zuletzt im System stehen, weniger vollkommen als die übrigen seyen; eben so wenig, daß die letzten Säugethiere vollkommener als die ersten Vögel; oder die letzten Weichthiere vollkommener als die ersten Ringelwürmer oder Zoophyten seyen; ja selbst das Wort vollkommener, hat keinen logisch richtigen Sinn, und man sollte es nicht brauchen. Ich betrachte meine Abtheilungen und Unterabtheilungen gar nicht als eine Stufenfolge der Wesen, denn wenn man auch unläugbar eine solche Stufenfolge der Wesen, einen Uebergang vom einfachern zum zusammengesetztern wahr-

Digitized by Google

das, was schon bey der Ordnung bemerkt worden, so konnte ich mich kurz fassen. Ich vermied es, wo immer möglich technische Ausdrücke zu brauchen, ob schon ich genöthigt war, viele neue Namen, für die zahlreichen Untergattungen, welche ich aufstellte zu wählen, und diese suchte ich theils auf den Charakter des Thiers anzupassen, theils dem Ohr so angenehm als möglich zu machen; nach Linneus Muster, wurden gewohnte Namen entweder lateinisirt oder neue aus der Götterlehre gewählt. Linnes Nomenclatur wurde indeß allenthalben da beybehalten, wo es möglich war, ich glaubte dieses dem großen Manne schuldig zu seyn.

Die Gewohnheit, welche der Naturforscher annimmt, alle Gegenstände in systematische Ordnung zu bringen, pflanzt sich bey ihm auch auf andere Ideen fort, und hat überhaupt auf die Geschäfte des Lebens mehr Einfluß als man nicht denkt, und sie wäre sehr würdig in der Erziehung überhaupt angewendet zu werden. Wer einmal alles methodisch zu ordnen versteht, wendet diese Kunst auch mit Vortheil auf das Studium von Gegenständen an, welche mit der Naturgeschichte nichts gemein haben. Jede Untersuchung, welche eine Anordnung von Thatsachen erfordert, muß nach den nehmlichen Gesetzen betrieben werden, und ein junger Mann, welcher sich mit dem Studium der Naturgeschichte beschäftigt, wird selbst erstaunen, wenn er findet, wie sehr dieses methodische Studium ihm auch so viele andere Geschäfte sehr erleichtert. Die Naturgeschichte ist so anziehend, so umfassend, daß sie auch dem

Digitized by Google

größten Geiste genug Stoff zum Nachdenken darbietet, und mit ihren Annehmlichkeiten in jeder Lage des Lebens tröstend einzuwirken vermag. Mit Bewunderung sieht der Naturforscher die Ordnung und Harmonie, welche der gütige Schöpfer in alle seine Werke gelegt hat, und findet dagegen die Werke der Menschen nur kleinlich. Diese hohen Ideen muß man nie aus den Augen verlieren, sie geben diesem Studium einen ausserordentlichen Reitz, wie kein anderes gewähren kann.

Noch muß ich mich über die vorzüglichsten Veränderungen erklären, welche dieses Buch auszeichnen, und damit ich nicht mit fremden Federn prange, angeben, was von andern entlehnt sey.

Zuerst muß ich bemerken, daß ich gar nicht beabsichtigte, die Thiere so zu classificiren, daß sie eine ununterbrochene Stufenleiter bilden sollten. Ich sehe alle Bemühungen der Art als unausführbar an, und bin gar nicht der Meinung, daß diejenigen Säugethiere und Vögel, welche zuletzt im System stehen, weniger vollkommen als die übrigen seyen; eben so wenig, daß die letzten Säugethiere vollkommener als die ersten Vögel; oder die letzten Weichthiere vollkommener als die ersten Ringelwürmer oder Zoophyten seyen; ja selbst das Wort vollkommener, hat keinen logisch richtigen Sinn, und man sollte es nicht brauchen. Ich betrachte meine Abtheilungen und Unterabtheilungen gar nicht als eine Stufenfolge der Wesen, denn wenn man auch unläugbar eine solche Stufenfolge der Wesen, einen Uebergang vom einfachern zum zusammengesetztern wahr-

Zool.
116 e. 11.

Digitized by Google

<36624529170015

<36624529170015

Bayer. Staatsbibliothek

Digitized by Google

Digitized by Google

Das Thierreich

eingetheilt

nach dem Bau der Thiere

als

Grundlage ihrer Naturgeschichte

und der vergleichenden

Anatomie

von

dem Herrn Ritter von Cuvier
Staatsrath von Frankreich
und
beständiger Secretär der Academie der Wissenschaften u. s. w.

Aus dem Französischen frey übersetzt
und mit vielen Zusätzen versehen
von

H. R. Schinz, med. Dr.
Secretär der naturforschenden Gesellschaft in Zürich und Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften.

Erster Band.
Säugethiere und Vögel.

Stuttgart und Tübingen,
in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
1821.

Digitized by Google

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Digitized by Google

Vorrede des Ueberſetzers.

Cuviers Werk über die Thiere, gehört ganz gewiß unter die Schriften, welche von den neuern Syſtematikern, als eine der werthvollſten anerkannt wurden. Die Eintheilung der Thiere, welche Cuvier vorſchlägt, beruht auf Grundſätzen, welche aus der Natur ſelbſt geſchöpft ſind. Seitdem die Zootomie und die vergleichende Anatomie ſich ſo ſehr ausgebildet haben, mußten auch die zoologiſchen Syſteme auf die Grundlagen zurückgeführt werden, welche ſich aus dieſem Fortſchreiten unſerer Kenntniße ergaben. Linnes Syſtem mußte nothwendig dieſen neuern Syſtemen weichen, ohne daß um deßwillen das Verdienſt des großen ſchwediſchen Naturforſchers im geringſten geſchmälert wird. Linne brachte zuerſt Ordnung und Licht in das Chaos, und dieſem Lichte verdanken wir unſere bisherigen Fortſchritte allein. Ohne Linnes ſchaffenden Geiſt, hätte man noch lange herumtappen können, ehe man die Bahn gefunden hätte, welche allein weiter führen konnte; als aber einmal der Grundſtein gelegt war, ſo war es weit leichter, die Materialien zum Gebäude ſo zu ordnen, daß endlich ein haltbares Ganzes heraus kommen mußte; aber wie alles menſchliche

Digitized by Google

Thun der Verbeſſerung bedarf, ſo bedarf es auch dieſes Gebäude immer und immer.

Cuvier iſt wohl durch ſeine Stellung, als Bewahrer des erſten Muſeums von Europa, als ein Mann, der ſchon lange ſich mit allen Fächern des zoologiſchen und zootomiſchen Wiſſens innig vertraut machen konnte, dazu berufen, mit Hilfe ſeiner trefflichen Mittarbeiter, und der unermeßlichen litterariſchen Hilfsquellen, eine neue Anſicht über das naturgemäßeſte Syſtem aufzuſtellen. Sein Werk enthält einen ſo großen Schatz von Erfahrungen, und das Reſultat eines vieljährigen, mühſamen, aber belohnenden Studiums aller Reiche der Natur, daß wohl wenige es wagen dürfen, mit ihm in die Schranken zu treten. Noch iſt in Deutſchland kein Werk erſchienen, welches, wie Cuviers, alle Theile des Thierreiches umfaßte, als Okens Zoologie, allein leider gehört dieſes Werk einem Syſteme an, dem immer weniger allgemein gehuldigt werden dürfte, da es auf Grundſätzen beruht, deren Unhaltbarkeit immer mehr eingeſehen werden dürfte, und zwar mit außerordentlichem Fleiße und Kenntniß, aber in einer Sprache geſchrieben iſt, die nur wenige, ganz eingeweihete, vollkommen verſtehen möchten. Herr Goldfuß hat ganz neuerlichſt in gedrängter Kürze ein treffliches Handbuch der Zoologie herausgegeben, welches dem Bedürfniß der Zeit beſſer entſpricht, aber nicht ſo vollkommen iſt, wie das Werk Cuviers, wenn ſchon auf denſelben Grundſätzen beruhend. Da nun bey weitem nicht alle Deutſche das

Digitized by Google

Französische so gut kennen, daß sie ein wissenschaftliches Buch ohne Anstand lesen können, so möchte eine Uebersetzung des Cuvier'schen Werkes auch jetzt noch willkommen seyn, wenn dieselbe besonders nachholt, was seit ihrer Erscheinung in der Ursprache Neues ist entdeckt und geleistet worden.

Diese Uebersetzung soll also nicht blos Uebersetzung seyn, sondern sie soll mit sehr vielen Zusätzen bereichert werden, welche die neuern Entdeckungen nöthig gemacht haben. Bey aller Bekanntschaft Cuviers, mit der deutschen Litteratur, hat er doch einige Quellen unbenutzt gelassen, und manches Neue ist seitdem erschienen, welches er noch nicht benutzen konnte. Oken, Lichtenstein, Tiedemann, Kuhl, Neuwied, Temmink, Naumann, Nilßon und andere, haben für Säugethiere und Vögel Arbeiten geliefert, welche Herr Cuvier noch nicht benutzen konnte. Oken hat versucht, ein vollständiges Verzeichniß der bis jetzt bekannten Säugethiere zu liefern, der Uebersetzer glaubt dieses gesichtet, sehr ansehnlich vermehrt und durch Benutzung aller Quellen vervollständigt, und alle diese Thiere nach Cuviers System geordnet zu haben. Da, wo die Existenz der Thiere, als Art, noch zweifelhaft ist, wurde ein Fragezeichen beygesetzt, oder in einer Note der Zweifel bemerkt, dieses geschah namentlich mit allen denjenigen Thieren, welche Molina in seiner Naturgeschichte von Chili anführt, da alle seine Beschreibungen durchaus unzureichend sind: Illiger und Oken haben darauf allzuviel Werth gelegt. Eben so ist es

Digitized by Google

mit einigen Arten, welche Schreber sogar abgebildet hat, ihre Existenz ist noch zweifelhaft, wie z. B. Viverra tigrina, Viverra Vulpecula et hermaphrodyta, welche durchaus nicht gehörig zu bestimmen sind.

So viel es möglich war, suchte der Uebersetzer passende deutsche Namen aufzufinden, was wenigstens bey den Säugethieren größtentheils gelang: Diese Arbeit ist schwerer, als man anfangs glaubt, Illigers deutsche Namen klingen gewöhnlich nicht gut, und sind zu gesucht, und Oken hat barbarische Worte, ohne allen Sinn, gleichsam aufs Gerathewohl hingeworfen. Schon schwerer ist dieses bey den Vögeln gewesen, da die Biegsamkeit der französischen Sprache oft schwer zu übersetzende Namen angebracht hat, dennoch ist nur bey wenigen ein nicht teutsch tönender Name angebracht worden. Bey den folgenden Klassen ist es vollends unmöglich, immer deutsche Namen zu geben.

Bey den Vögeln sind nicht nur alle von Cuvier aufgestellten Gattungen angeführt, sondern auch noch die von Illiger mit Recht aufgestellten Gattungen eingeschoben, und Vieillots und Temminks neue Gattungen in den Noten wenigstens erwähnt, so daß wenige von den neuen Ornithologen aufgestellte Gattungen unbemerkt geblieben sind. Bey dieser Klasse sind alle europäischen Arten, welche bis jetzt bekannt geworden sind, vollständig aufgeführt. Freilich war es dem Uebersetzer unmöglich, alle Gattungen nach eigener Untersuchung aufzuführen, da ihm dazu die nöthige

Digitized by Google

Ansicht aller in der Natur fehlte, doch hat seine eigene Sammlung mehr als zwey Drittheile der aufgestellten Gattungen in der Natur aufzuweisen, und viele andere sah er in andern Sammlungen. In Hinsicht auf die Citate, ist allenthalben Naumanns Werk bey den deutschen Arten angeführt, da anzunehmen ist, dieses werde in den Händen aller deutschen Ornithologen seyn, nur da, wo Naumann noch keine Abbildung geliefert hat, ist auf die Daubentonschen planches enluminées und wohl gar so weit es möglich war, auf die von Lauguier und Temmink begonnene Fortsetzungen, welche jetzt planches coloriées heißen, verwiesen, so wie bey den Säugethieren entweder Schrebers Werk, oder das neue Werk der Herrn Geoffroy und Cuvier angeführt worden ist.

Auch bey den beyden folgenden Klassen der Wirbelthiere, sollen alle bekannten europäischen Arten möglichst vollständig angeführt werden, was dagegen bey den letzten Klassen der wirbellosen Thiere durchaus nicht möglich war, da das Werk dann allzu voluminos geworden wäre.

Fehler werden sich in diesem ersten Bande, aller Mühe ungeachtet, noch genug eingeschlichen haben, wofür ich vorläufig um gütige Nachsicht bitten möchte; denn noch sind manche Gattungen von Säugethieren und Vögeln noch lange nicht gehörig gesichtet, und von einigen wären Monographien höchst nothwendig, wie sie von den Affen von Audebert, Geoffroy und Kuhl, von den Flederthieren von Geoffroy, von den Mäu-

Digitized by Google

ſen von Pallas, von den Antelopen von Lichtenſtein bearbeitet worden ſind. In den Gattungen des Bären, Stinkthiers, Wieſels, iſt noch große Verwirrung, ganz unentwickelt ſind die Gattungen der Robben und der Gürtelthiere, und unbeſtimmt mehrere Beutelthiere und viele Katzen.

Bey den Vögeln iſt vielleicht, beſonders von franzöſiſchen Naturforſchern, für einige ausländiſche Gattungen mehr geleiſtet worden, aber manche Gattungen ſind ſo auseinander geriſſen, daß man ihre ehemaligen Glieder kaum mehr findet, man denke dabey nur an die Gattungen Certhia, Gracula, Pipra, Lanius, Todus, Turdus, Muscicapa und andere mehr, welche gänzlich umgewandelt worden ſind. Zur Entwirrung helfen die trefflichen Monographien der Franzoſen, eines Levaillant, Vieillot, Audebert, Desmareſt, in ihren Prachtwerken über die Colibris, Baumlaufer, Manakins, Plattſchnäbel, Racker, Paradiesvögel, Papageien; allein wo iſt der Privatmann, der dieſe koſtbaren Werke anſchaffen kann! ſo wie auch Temminks Prachtwerk über die Hühner und Tauben, für einen Privatmann zu koſtbar iſt. Die Deutſchen haben wenig von der Art aufzuweiſen, doch dürfen Meyer und Wolfs deutſche Ornithologie, die Darmſtädter deutſche Ornithologie, welche aber beyde allzulangſam fortſchreiten, und Naumanns neues Werk kek mit jenen in die Schranken treten. Die engliſchen Werke von Shaw, Wilſon und andere, ſind auf dem feſten

Digitized by Google

Lande nur in wenig Bibliotheken anzutreffen, und können nur selten benutzt werden.

Neue Gattungen sind von mir keine aufgestellt worden, etwa zwey oder drey ausgenommen, welche durchaus nothwendig schienen, da ich kein Freund der jetzigen Mode bin, fast aus jeder Art eine neue Gattung zu bilden, wir haben wahrlich schon mehr als genug, und viele sind gewiß überflüßig, und nicht genug charakterisirt, wie z. B. vielleicht einige Gattungen der Händeflügler, und die unendlichen Gattungen der Raubvögel und Würger nach Vieillots. Wer kann alle neuen Gattungen, auch nur einer Abtheilung des Thierreichs, in seinem Kopfe behalten, und sich die Hauptcharaktere einprägen. Unser Zeitalter ist an Entdeckungen so reich, daß es die ganze Lebenszeit eines Menschen erfordert, sich nur in einem dieser Fächer alles bekannt zu machen, und daß die Menge der Namen fast den Kopf schwindeln macht.

Cuviers Thierreich ist mit einigen Kupfern geziert, aber so wenig, daß es räthlicher gefunden wurde, dieselben ganz auszulassen, um das Werk nicht unnöthig zu vertheuern; entweder gebe man synoptische Tafeln, wie Oken, aber nicht auf Kalenderpapier, wie jener, und besser gewählt, oder man gebe bey der Menge guter Werke, die wir jetzt haben, lieber gar keine Abbildungen. Es ist wirklich schade, daß aus deutscher Knikerey, wahrscheinlich des Buchhändlers, Okens Tafeln auf so schlechte Art ausgeführt worden sind; wenn der Wunsch des Publikums sich für etwas ähn-

Digitized by Google

liches aber beſſeres ausſpricht, ſo ſoll bald entſprochen werden. Auch hier geben die Franzoſen treffliche Muſter, in den ſchönen Abbildungen, welche zu der neuen Ausgabe des Wörterbuches der Naturwiſſenſchaften, in Straßburg 1820 erſcheinen, Stich und Papier ſind vortrefflich und jede Gattung ſoll eine Abbildung erhalten.

Um aber dieſes Chaos von neuen Namen dem Gedächtniße beſſer einzuprägen, ſollen ſolche ſynoptiſche Tafeln mit der ältern und neuern Benennung der Gattungen, doch ohne Abbildungen zu dieſem Buche geliefert werden, damit auch der weniger Geübte ſich finden kann.

Da die Säugethiere vollſtändig und die europäiſchen Vögel alle angeführt werden ſollen, und die Entdeckungen fortſchreiten, ſo ſoll von Zeit zu Zeit ein Nachtrag für die Käufer dieſes Buchs nachgeliefert werden, damit das Verzeichniß immer vollſtändig bleibe; neue Entdeckungen während dem Drucke des Werkes, haben ſchon einen Anhang nothwendig gemacht.

So ſey dieſes Werk der gütigen Nachſicht der Naturforſcher empfohlen, jede billige Kritik wird dankbar angenommen und möglichſt benutzt werden, der Ueberſetzer kennt ſeine Schwäche ſelbſt zu gut, als daß er glauben könnte, etwas tadelloſes geliefert zu haben.

Die am Ende vorkommende Litteratur, wird möglichſt vervollſtändigt, ſo daß auch die ſeit der Herausgabe des Originalwerks erſchienenen neuen Schriften hinzukommen werden.

Digitized by Google

Vorrede
von Herrn Cuvier.

Da ich mich von früher Jugend an mit Vorliebe dem Studium der vergleichenden Anatomie widmete, also die Geſetze zu erforſchen ſuchte, nach welchen die Thiere gebildet wurden, und nach welchen die verſchiedenen Thiere von einander abweichen, ſo glaubte ich dem wiſſenſchaftlichen Publikum die Frucht meiner dreißigjährigen Arbeit, der ich alle meine Muße widmete, mittheilen zu dürfen. Der Geſichtspunkt, welchen ich nie aus dem Geſichte verlor, war, gewiſſe allgemeine Geſetze für die Organiſation aufzuſuchen, und ſie ſo deutlich, als es nur immer möglich iſt zu enthüllen. Mein erſter Verſuch zeigte, daß ich vorerſt die Thiere nach ihrem Baue ordnen müſſe, daß ich vorerſt mit einem Worte die Klaſſe, die Ordnung, die Gattung bezeichnen müſſe, welche jede Art nach den Aehnlichkeiten, welche ſie unter ſich, in ihrer äußern und innern Bildung haben, und nach den allgemeinen oder beſondern Beziehungen, einnehmen muß. Ein ſolches Syſtem beſtund bis dahin nicht, und ſehr wenige Naturforſcher konnten im Fall ſeyn ein ſolches aufzuſtellen, wenn ſie auch ſchon wollten, da eine ſolche Eintheilung eine ſehr tiefe Kenntniß des thieriſchen Baues erfordert, den ſie zu bezeichnen beſtimmt iſt.

Digitized by Google

Zwar haben allerdings Daubenton und Camper, mehreres darin geleiſtet und Materialien geſammelt; Pallas hat allgemeine Anſichten aufgeſtellt, allein die trefflichen Ideen dieſer gelehrten Männer, fanden bey ihren Zeitgenoſſen nicht den Eingang, den ſie verdienten. Das einzige Namenregiſter der Thiere, welches man bisher beſaß, war das Linneiſche; aber das Syſtem dieſes großen Mannes, fiel in die Hände eines Mannes, der ſich nicht einmal die Mühe nahm, die Grundſätze des tiefen Denkers näher zu prüfen, er entſtellte daſſelbe, und wenn er auf Fehler ſtieß, ſo machte er ſie, ſtatt zu verbeſſern, ſchlimmer.

Allerdings erſchienen über einzelne Klaſſen Werke, welche auf mühſamer Arbeit beruheten und eine große Menge neuer Arten bekannt machten, aber die Verfaſſer nahmen zu ſehr Rückſicht auf den äußern Bau allein, und niemand beſchäftigte ſich ernſtlich damit, die Klaſſen und Ordnungen mehr nach dem ganzen Bau, als nach einzelnen Theilen zu ordnen. Die Hauptcharaktere mehrerer Klaſſen waren unrichtig angegeben oder mangelhaft, ſelbſt in berühmten anatomiſchen Werken: Viele Ordnungen waren willkührlich, und faſt in keiner einzigen Klaſſe folgten die Gattungen in naturgemäßer Ordnung aufeinander. Ich mußte daher mit großem Zeitaufwand zuerſt die Anatomie und die Zootomie zu Hilfe nehmen, um die Abtheilungen der Klaſſen darnach zu ordnen, meine früheren Arbeiten benutzen, um beſtimmte Charaktere aufzufinden, und dieſe Charaktere anwenden, die gemach-

Digitized by Google

ten Eintheilungen zu vervollkommnen. Aus dieſer Zuſammenſtellung und Entwicklung der einen Wiſſenſchaft aus der andern, gelang es mir, ein zoologiſches Syſtem zu bilden, welches geeignet iſt, im Felde der Anatomie zum Wegweiſer zu dienen, und umgekehrt benutzte ich die anatomiſchen Kenntniße zur Enthüllung und Aufklärung des zoologiſchen Syſtemes.

Die erſten Früchte dieſer doppelten Arbeit enthüllte ich in einem Aufſatz, welcher im Jahr 1795 erſchien, und worin eine neue Eintheilung der weißblutigen Thiere vorgeſchlagen wurde. Dieſer Entwurf der Anwendung meiner neuen Methode, zur Bildung von Gattungen und Untergattungen, machte die Grundlage der Eintheilung des Thierreichs aus, welche im Jahr 1798 gedruckt wurde; ich verbeſſerte dieſe Arbeit mit Beyhilfe des Herrn Dumeril in den Tabellen, welche dem erſten Bande meiner Vorleſungen im Jahr 1800 beygedruckt wurden. Vielleicht hätte ich mich damit begnügt, dieſe Tabellen zu verbeſſern, und wäre ſogleich zur Herausgabe meines großen Werkes über die Anatomie geſchritten, wenn ich nicht im Verfolge meiner Unterſuchungen auf andere Fehler in den General- oder Specialſyſtemen der Zoologie geſtoßen wäre; welche mir zeigten, wie groß die Verwirrung und der Mangel an kritiſcher Beurtheilung in Aufſtellung einer großen Zahl Arten oder Gattungen ſey. Nicht nur die Klaſſen und die Ordnungen fand ich mit der Natur der Thiere nicht übereinſtimmend, wenn das Syſtem die Grundlage der vergleichenden Anatomie

enthalten sollte, sondern selbst viele Gattungen, ob gleich im Allgemeinen besser bestimmt, boten in ihrer Zusammenstellung nur unzulängliche Hilfsmittel, weil die Arten nicht gehörig untergeordnet waren. So hat Gmelin, in dem er den Lamantin zur Gattung des Wallrosses, und die Sirene zur Gattung des Aales zählte, die Bildung der Gattung selbst vernichtet: eben so, da er in dieselbe Klasse, in dieselbe Ordnung und in dieselbe Reihenfolge den Dintenfisch, und den Armpolypen stellte, wodurch er außer Stand gesetzt ward, etwas allgemein passendes über eine Klasse und Ordnung aufzustellen, welche so sehr verschiedene Wesen umfaßte. Man könnte leicht noch eine Menge ähnlicher Beyspiele anführen, welche eben so große Nachtheile haben, wenn sie auch nicht so in die Augen springen sollten. Es ist nicht genug neue Klassen und Ordnungen aufzustellen, und die Gattungen zu ordnen; die Arten müssen auch selbst untersucht werden, um zu bestimmen, ob sie auch wirklich der Gattung angehören, zu welcher sie bisher gezählt wurden. Da aber fand es sich, daß viele Arten gegen die Natur zusammengestellt oder von einandergerissen wurden, ja daß die Existenz vieler sogar noch zweifelhaft sey, und daß ihnen die Eigenschaften nicht zukommen, welche man ihnen andichtet. Bald wurden unter dem Namen einer Art, Thiere zusammengestellt, welche ganz bestimmt verschiedene Arten bilden, wovon sogar das eine oder andere zu einer andern Gattung gehört; bald aber wurde im Gegentheil eine Art als zwey, wohl auch als

Digitized by Google

drey Arten bezeichnet, und kommen unter verschiedenen Unterabtheilungen und unter verschiedenen Gattungen, ja sogar unter verschiedenen Ordnungen vor. Was soll, um ein Beyspiel davon zu geben, Gmelins Trichechus manatus seyn, unter diesem Namen bezeichnet er drey verschiedene Arten und zwey Gattungen, welche weit von einander verschieden sind. Was soll Velella seyn, welche er zweymal das eine Mal unter den Medusen, das andere Mal unter den Holothurien anführt? Die Arten der Biphora, bringt er bald unter die Gattung Dagysa, die größere Zahl aber unter Salpa, und einige unter die Gattung Holothuria. Man muß also nicht blos die Arten näher untersuchen, sondern auch die angegebene Synonymie. Auf diese Art allein kann ein neues, passendes System geschaffen werden.

Ein solches Unternehmen, nach den außerordentlichen Fortschritten, welche die Wissenschaft in den letzten Jahrhunderten gemacht hat, wäre für einen einzigen Menschen unausführbar, wenn ihm auch die Natur das längste menschliche Leben gestattet hätte, und wenn er sonst keine andere Beschäftigung hätte. Ich selbst hätte nicht einmal den Versuch wagen dürfen; wenn ich auf mich allein beschränkt gewesen wäre; allein die außerordentlichen Hilfsmittel, welche meine Stellung mir darbietet, schienen mir das zu ersetzen, was mir an Talent und Zeit mangelt. Im täglichen Umgang mit den ersten Naturforschern Frankreichs, und im Besitze der besten Werke des Auslandes, kann

Digitized by Google

ich aus den Arbeiten Belehrung schöpfen, so wie sie erscheinen; ich darf die zahlreichen Sammlungen, so gut wie meine eigene, sehr reiche, benutzen, ich durfte nur dies gehörig thun, so war meine größte Arbeit gemacht. Bey einigen Klassen blieb mir sehr wenig zu thun übrig, z. B. über die Weichthiere, welche Lamark so trefflich bearbeitet hat; über die Säugethiere, nach den trefflichen Arbeiten des Herrn Geoffroy. Die vielen neuen Gesichtspunkte, welche Lacepede aufstellte, waren eben so viele Hilfsmittel zur Anordnung der Fische. Levaillants Arbeiten und Sammlungen von so vielen herrlichen Vögeln aus allen Gegenden, gaben mir die Grundlagen an die Hand, welche ich bey Anordnung der Vögel aufzustellen hatte. Meine eigenen Erfahrungen und Untersuchungen, bereichert mit so vielen anderer Naturforscher, mußten am Ende Früchte hervorbringen, welche ich allein zu sammeln nicht im Stande gewesen wäre. Die Herren Blainville und Oppel untersuchten die anatomischen Preparate, welche ich zur Grundlage meiner Abtheilungen der Amphibien bestimmt hatte, und zogen daraus vor mir, und vielleicht besser, als ich es hätte thun können, die Resultate, welche ich nun benutzen konnte.

Diese Betrachtungen ermuthigten mich den Entschluß zu fassen, ein neues System der Thiere aufzustellen, und meinem Werke über die vergleichende Anatomie vorangehen zu lassen. In diesem wollte ich die Hauptabtheilungen und Unterabtheilungen, mit Rücksicht auf den äußern und innern Bau der Thiere aufstellen,

ſtellen, und durch alle Stufen verfolgen, welche uns die einfachere oder zuſammengeſetztere Struktur der Körper zeigt; ich wollte den Verſuch machen, jeder genau bekannten Art ihre Stelle im Syſteme anzuweiſen; zugleich war es nöthig, um die Sache weniger trocken und lehrreicher zu machen, bey denjenigen Arten, welche auch in unſerm Lande vorkommen, einige Anzeigen mit einzuflechten, über den Nutzen, den wir von ihnen ziehen, oder den Schaden, den wir von ihnen zu fürchten haben; oder von ihren Sitten, ihrem Haushalt, ihrer äußern Form, ihrer Schönheit, ihrer Größe, in gedrängter Kürze das Nöthige anzuführen.

Ich glaubte dadurch jungen Anfängern in der Naturkunde beſonders nützlich zu ſeyn, da die meiſten von ihnen nicht Beurtheilungsfähigkeit genug haben können, die vielen Fehler zu bemerken, von denen ſelbſt die beſten Werke oft voll ſind, um ſo mehr, als die meiſten zu wenig Rückſicht auf den innern Bau der Thiere genommen haben: Die Anatomiker werden aus dieſem Werke den Fingerzeig erhalten, auf welche Klaſſen oder Ordnungen ſie vorzüglich ihre Bemühungen zu richten haben, wenn ſie auch für die menſchliche Anatomie oder Phyſiologie neuen Gewinn ziehen wollen.

Dieſer doppelte Geſichtspunkt konnte indeß nicht bey allen Klaſſen gleich ſtark ins Auge gefaßt werden: Die Wirbelthiere mußten mich, als die unter allen Beziehungen merkwürdigſten, am meiſten beſchäftigen. Unter den Wirbelloſen war meine Aufmerkſamkeit

Digitized by Google

hauptsächlich auf die nackten Weichthiere und größern Zoophyten gerichtet; dagegen wurden die unzählbaren Abweichungen der Schalthiere und Korallen, die mikroscopischen Thiere und die übrigen Familien, welche eine weniger bedeutende Rolle in der Natur zu spielen scheinen, oder deren Organisation mit dem Messer nicht untersucht werden kann, weniger ausführlich behandelt, und ich bezog mich, besonders was die Schalthiere und Korallen betrift, auf die Werke von Lamark, wo man alles finden wird, was man darüber zu wünschen haben mag.

Die Insekten, so merkwürdig durch ihren Bau, durch ihr Aeußeres, durch ihre Gewohnheiten, durch ihren Einfluß auf die ganze lebende Natur, habe ich mit Beyhilfe meines Mitkollegen und Freundes Latreille, der diese Geschöpfe zum vorzüglichsten Vorwurf seiner Studien gemacht hat, bearbeitet, und dieser Beyhilfe verdankt mein Werk die Vorzüge und Vollkommenheit, welches es darin haben mag. Latreille hat beynahe in derselben Ordnung und nach denselben Grundsätzen, welche im übrigen Theil dieses Werkes befolgt wurden, das Resultat seiner mühsamen Arbeit, und die Aufzählung der unzähligen Gattungen, welche die Entomologen immerfort aufstellen, in einem einzigen Bande zusammengestellt.

Wenn auch an einigen Orten die Aufstellung der Untergattungen und Arten weniger vollständig seyn mag, so bezieht sich diese Ungleichheit nie auf die obern höhern Ordnungen und auf die Hinweisungen von

Digitized by Google

Aehnlichkeiten, welche auf ſichern Fundamenten, die als die Frucht meiner Arbeit zu betrachten ſind, gebaut wurden. Ich unterſuchte eine Art nach der andern, ſo wie ich ſie mir verſchaffen konnte, ich ſtellte diejenigen zuſammen, welche blos in Hinſicht der Größe oder der Farbe, oder der Zahl einiger, weniger wichtigen Theile, abweichen, und bildete daraus eine ſogenannte Untergattung. So oft es möglich war, unterſuchte ich wenigſtens eine Art einer Untergattung anatomiſch, und ſo kommen in meinem Buche ſehr wenige Gattungen vor, die mikroſcopiſchen ausgenommen, von denen ich nicht wenigſtens einige Organe vorweiſen könnte.

Nach dem ich die Namen der Arten angeführt, welche ich ſelbſt beobachtete, oder welche gut beſchrieben oder abgebildet wurden, ſo wurden dann diejenigen geordnet, welche ich zwar nicht ſelbſt ſah, von denen ich aber gute Abbildungen oder Beſchreibungen vorfand, welche keinen Zweifel über ihre Stellung übrig ließen. Dagegen wurden die räthſelhafteſten Weſen übergangen, aus welchen man ſo leichtſinnig Arten gemacht hat, deren Annahme und Aufſtellung im Verzeichniße der Thiere, eine große Verwirrung angerichtet hat. Allenthalben hätte ich neue Arten beyfügen können, allein, wo ich nicht auf Abbildungen hinweiſen konnte, hätten die Beſchreibungen zu weitläufig werden müſſen, wodurch das Werk ſelbſt eine zu große Ausdehnung erhalten hätte, daher wurden immer nur einzelne Arten angezeigt, welche als Vorbilder von Untergat-

Digitized by Google

tungen dienen konnten. Sobald einmal die Untergattungen bestimmt waren, so war es nun erst möglich, daraus die Hauptabtheilungen der Gattungen, Familien, Ordnungen und Klassen zu bilden, welche das Thierreich zu einem Ganzen verbinden. Um dahin zu gelangen, schlug ich zum Theil den Weg ein, von den einfachern Thieren zu den zusammengesetztern heraufzugehen, und durch Vergleichung die Verwandtschaft zu bestimmen; oft aber auch wurde der entgegengesetzte Weg eingeschlagen, und das Resultat war, daß die eine Methode die andere gegenseitig fester begründete, und so entstund ein Ganzes, wobey die äußern Formen eben so wohl, als die innere Organisation berücksichtigt wurden, welche jedes Thier bezeichnen.

So handelte ich jedesmal, wenn es mir nöthig oder möglich schien, neue Ordnungen zu begründen. Oft aber auch war durch frühere Arbeiten anderer verdienter Forscher, die Bahn so geebnet, daß ich nur ihren Vorarbeiten folgen durfte. Aber auch in diesen Fällen, suchte ich neue Thatsachen auf, um die ältern Sätze zu prüfen, die ich nur dann als richtig annahm, wenn sie die Probe bestanden hatten.

Das Publikum kann sich von dieser Arbeit eine Idee machen, wenn es meine Bemühungen betrachtet, die Anatomie der Weichthiere besser zu begründen, deren Resultat in den Memoiren des Museums enthalten, seitdem aber besonders vermehrt und verbessert erschienen ist. Ich darf versichern, vorerst auf ähnliche Art die Wirbelthiere, die Ringelwürmer, die Zoophy-

Digitized by Google

ten und viele Insekten und Krustenthiere behandelt und bearbeitet zu haben; das Resultat ist zwar nicht besonders gedruckt, aber die Präparate sind in der Sammlung zur vergleichenden Anatomie, im Pflanzengarten aufgestellt, und dienten zur Grundlage meiner Studien.

Eine andere mühvolle Arbeit, war die Untersuchung der wirklichen Existenz zweifelhafter Arten; ich suchte jeder ihre Stelle anzuweisen, erst wann ich von der Wahrheit ihres Daseyns überzeugt war, führte ich sie an. Nur nach dieser Sichtung, und niemals ohne Prüfung vorhergehender Systematiker, ordnete ich die Arten in ihre Untergattungen. So wird es begreiflich, daß eine Gattung, welche Gmelin aufstellte, jetzt zerrissen in ihren einzelnen Gliedern sogar in verschiedenen Klassen vorkommt; daß viele vermeinte Arten, nun nur eine einzige bilden, und daß ganz bekannte Namen anders gebraucht werden mußten. Alle diese Veränderungen kann ich rechtfertigen, und der Leser kann ihre Ursache in den Quellen auffinden.

Um verständlicher zu seyn, mußte bey jeder Klasse ein Hauptschriftsteller angeführt werden, welcher die besten Abbildungen geliefert hat, nur da, wo jener Schriftsteller keine Abbildung lieferte, mußte ein anderes Werk citirt werden.

Meine ganze Arbeit hätte leicht eine weitere Ausdehnung erhalten können, allein ich wollte dies nicht, und wiederholte niemals bey einer Art, was im Allgemeinen von der Gattung gesagt, noch bey einer Gattung

Digitized by Google

das, was schon bey der Ordnung bemerkt worden, so konnte ich mich kurz fassen. Ich vermied es, wo immer möglich technische Ausdrücke zu brauchen, ob schon ich genöthigt war, viele neue Namen, für die zahlreichen Untergattungen, welche ich aufstellte zu wählen, und diese suchte ich theils auf den Charakter des Thiers anzupassen, theils dem Ohr so angenehm als möglich zu machen; nach Linneus Muster, wurden gewohnte Namen entweder lateinisirt oder neue aus der Götterlehre gewählt. Linnes Nomenclatur wurde indeß allenthalben da beybehalten, wo es möglich war, ich glaubte dieses dem großen Manne schuldig zu seyn.

Die Gewohnheit, welche der Naturforscher annimmt, alle Gegenstände in systematische Ordnung zu bringen, pflanzt sich bey ihm auch auf andere Ideen fort, und hat überhaupt auf die Geschäfte des Lebens mehr Einfluß als man nicht denkt, und sie wäre sehr würdig in der Erziehung überhaupt angewendet zu werden. Wer einmal alles methodisch zu ordnen versteht, wendet diese Kunst auch mit Vortheil auf das Studium von Gegenständen an, welche mit der Naturgeschichte nichts gemein haben. Jede Untersuchung, welche eine Anordnung von Thatsachen erfordert, muß nach den nehmlichen Gesetzen betrieben werden, und ein junger Mann, welcher sich mit dem Studium der Naturgeschichte beschäftigt, wird selbst erstaunen, wenn er findet, wie sehr dieses methodische Studium ihm auch so viele andere Geschäfte sehr erleichtert. Die Naturgeschichte ist so anziehend, so umfassend, daß sie auch dem

Digitized by Google

größten Geiste genug Stoff zum Nachdenken darbietet, und mit ihren Annehmlichkeiten in jeder Lage des Lebens tröstend einzuwirken vermag. Mit Bewunderung sieht der Naturforscher die Ordnung und Harmonie, welche der gütige Schöpfer in alle seine Werke gelegt hat, und findet dagegen die Werke der Menschen nur kleinlich. Diese hohen Ideen muß man nie aus den Augen verlieren, sie geben diesem Studium einen ausserordentlichen Reitz, wie kein anderes gewähren kann.

Noch muß ich mich über die vorzüglichsten Veränderungen erklären, welche dieses Buch auszeichnen, und damit ich nicht mit fremden Federn prange, angeben, was von andern entlehnt sey.

Zuerst muß ich bemerken, daß ich gar nicht beabsichtigte, die Thiere so zu classificiren, daß sie eine ununterbrochene Stufenleiter bilden sollten. Ich sehe alle Bemühungen der Art als unausführbar an, und bin gar nicht der Meinung, daß diejenigen Säugethiere und Vögel, welche zuletzt im System stehen, weniger vollkommen als die übrigen seyen; eben so wenig, daß die letzten Säugethiere vollkommener als die ersten Vögel; oder die letzten Weichthiere vollkommener als die ersten Ringelwürmer oder Zoophyten seyen; ja selbst das Wort vollkommener, hat keinen logisch richtigen Sinn, und man sollte es nicht brauchen. Ich betrachte meine Abtheilungen und Unterabtheilungen gar nicht als eine Stufenfolge der Wesen, denn wenn man auch unläugbar eine solche Stufenfolge der Wesen, einen Uebergang vom einfachern zum zusammengesetztern wahr-

Digitized by Google

nimmt, so gilt dies mehr vom Einzeln als vom Allgemeinen. Die Annahme einer Stufenleiter der Wesen, wie man sie gewöhnlich sich denkt, ist angewendet auf das Ganze der Schöpfung, gewiß irrig, und die Anwendung dieser Meinung hat nach meinem Dafürhalten, den Fortschritten der Naturwissenschaften gar sehr geschadet. In Gemäßheit dieser Ansicht, stellte ich die Haupteintheilung der Thiere in vier Hauptzweige auf, nach Grundsätzen, welche früher von mir in einer eigenen Schrift entwickelt worden, und beweisen sollten, daß sie naturgemäßer sey, als die ältere Eintheilung in Wirbelthiere und solche ohne Wirbel, da die Wirbelthiere sich unter einander weit mehr gleichen als die Thiere ohne Wirbelsäule, welche nothwendig in mehrere Abtheilungen gebracht werden müssen. Schon früher hat Herr Virey in einem Abschnitt des Wörterbuchs der Naturwissenschaften, die Hauptgrundlagen zu dieser Eintheilung aufgestellt, und vorzüglich das Nervensystem, als Grundlagen derselben betrachtet.

Die nahe Verwandtschaft der eierlegenden Wirbelthiere unter sich, begründet sich nach Geoffroys merkwürdiger Beobachtung auf ähnlicher Zusammensetzung der Kopfknochen, und wie ich selbst entdeckte, des Sceletes und Muskelbaues überhaupt.

Bey den Säugethieren habe ich die Einhufer zu den Vielhufern gestellt, und diese nach einer neuen Ansicht in Familien getheilt; die Wiederkauer stellte ich ans Ende der Vierfüßer; und den Lamantin zählte ich den Wallfischarten zu; die Raubthiere wurden etwas

Digitized by Google

anders eingetheilt; und die Uistitis von den übrigen Affen getrennt; ich suchte eine Parallele der Beutelthiere mit den übrigen Zehengängern aufzustellen, begründet auf eigene anatomische Beobachtungen. Die mühsamen Arbeiten meines Freundes und Kollegen Geoffroy, leiteten mich in Anordnung der Affen und Flederthiere. Die Beobachtungen meines Bruders Friedrich Cuvier, über den Zahnbau der Raubthiere und Nager, waren mir sehr nützlich bey Eintheilung dieser in Untergattungen. Die Gattungen, welche der zu früh verstorbene Illiger aufstellte, sind das Resultat derselben Untersuchungen, und derjenige, einiger ausländischen Naturforscher so bald seine Gattungen mit meinen Untergattungen zusammentrafen, behielt ich seine Benennungen bey. Auch Herr Lacepede hat mehrere Namen aufgestellt, welche ich aufnahm; allein die Charaktere und die Arten selbst sind aus der Natur bestimmt, nach den Individuen, welche die anatomische Sammlung, oder die Gallerien des Museums besitzt.

Eben so ist es bey den Vögeln; ich untersuchte mit der größten Aufmerksamkeit mehr als 4000 Individuen, welche sich im Museum befinden; ich ordnete dieselben nach meinen Ansichten, und benutzte sie zu meinen Arbeiten. Die Aehnlichkeit meiner Arbeiten mit einigen andern neuen, sind von meiner Seite blos zufällig.

Ich hoffe die Naturforscher werden die zahlreichen Untergattungen billigen, welche ich bey den Raubvögeln, sperlingsartigen und Wasservögeln aufstellen zu

Digitized by Google

müſſen glaubte, um mehr Licht in dieſe Gattungen zu bringen, welche ſo ungeſchickt durch einander geworfen worden. Ich bemerkte, ſo oft es thunlich war, die Uebereinſtimmung meiner Unterabtheilungen mit den Gattungen von Lacepede, Meyer, Wolf, Temmink, Savigny, und ordnete meinen Gattungen alle die Arten unter, welche ich kannte. Dieſe mühſame Arbeit wird denjenigen ſehr willkommen ſeyn, welche ſich mit der Naturgeſchichte der Vögel befaſſen. Die trefflichen und koſtbaren Werke eines Vaillant und Vieillot waren mir ſehr nützlich, um die Arten zu beſtimmen, welche ſie abgebildet enthalten. Die Haupteintheilung iſt übrigens dieſelbe geblieben, wie ich ſie in meinem erſten Entwurf vom Jahr 1798 aufſtellte.

Für die Reptilien habe ich die Eintheilung meines Freundes Brogniart beybehalten, aber zugleich machte ich viele anatomiſche Unterſuchungen, um die Unterabtheilungen beſſer zu beſtimmen. Herr Oppel hat zum Theil dieſe Arbeiten benutzt, und wir ſtellten immer dieſelben Gattungen auf. Daubins Werk, an und für ſich ſehr mittelmäßig, war mir doch nützlich um einzelne Arten zu beſtimmen. Die beſondern Abtheilungen in den Gattungen der Erinnerer und Geckos, beruhen aber auf eigenen Beobachtungen, welche an einer großen Zahl von Reptilien angeſtellt wurden, welche Peron und Geoffroy ins Muſeum geliefert hatten.

Die Arbeiten über die Fiſche enthalten die bedeutendſten Veränderungen unter den Klaſſen der Wirbelthiere. Das Muſeum hat ſeitdem Lacepede ſein treff-

Digitized by Google

liches Werk herausgab, eine große Menge neuer Fische bekommen; ich konnte daher mehrere Unterabtheilungen, denen des verdienten Naturforschers beyfügen, andere Arten wurden anders geordnet, und neue anatomische Beobachtungen gemacht. Auch hatte ich Hilfsmittel um die von Commerson und andern Reisenden aufgestellten Arten zu prüfen, wozu Dumeril mir sehr an die Hand gieng, indem er sowohl die Abbildungen von Commerson, als auch die Fische selbst, welche noch vorhanden sind, verglich; dazu reihen sich die Fische, welche Peron aus dem Ocean und dem Indischen Archipel mitbrachte, und diejenigen, welche ich aus dem mittelländischen Meere sammelte, so wie die Sammlungen Sonnerats von den Küsten Coromandel; die von Herrn Mathieu von Isle de France, und die von Geoffroy vom Nil und rothen Meer. So konnte ich die meisten Arten, welche Bloch, Rußel und andere beschreiben, bestetigen, und die Eingeweide und Scelete fast aller Unterarten untersuchen, so daß diese Abtheilung sehr viel neues den Ichthyologen darbietet. Es ist freilich nicht zu läugnen, daß meine Eintheilung zum Gebrauch für Sammlungen, Unbequemlichkeiten hat, allein sie ist nach meiner Ueberzeugung natürlicher, als irgend eine frühere; ich will ihr Verdienst auch nicht erheben, und wenn irgend jemand eine naturgemäßere aufstellen kann, so bin ich der erste, der sie annimmt.

Alle Arbeiten über die allgemeine Eintheilung der Thiere ohne Wirbelsäule, sind Modifikationen meiner früheren Vorschläge vom Jahr 1795, der ersten Arbeit,

Digitized by Google

welche ich herausgab; und keiner andern Abtheilung widmete ich so viele Mühe und Zeit als der Untersuchung der Weichthiere überhaupt, und besonders der nackten. Die Bestimmung dieser Klassen, und ihrer Abtheilungen und Unterabtheilungen, gründen sich ganz auf meine eigenen Beobachtungen; nur das herrliche Werk von Poli, gab schon vor mir Beschreibungen und für meinen Zweck brauchbare, anatomische Anzeigen, aber blos über die zweyschaligen und vielschaligen Muscheln. Ich bestetigte die Entdeckungen dieses verdienten Anatomikers, und glaube mit noch mehr Genauigkeit, die Verrichtungen einiger Organe bestimmt zu haben. Ich bemühete mich auch die Thiere zu bestimmen, denen die verschiedenen Bildungen der Schalen angehören, und sie nach diesen Beobachtungen zu ordnen. Die letzten Abtheilungen der Schalthiere, deren Bewohner sich gleichen, beschäftigten mich nur, um im Stande zu seyn, die Gattungen der Herren Lamark und Montfort zu prüfen und nur die kleine Zahl neuer Gattungen, welche ich aufstellte, beruhen auf eigener Beobachtung. Ich beschränkte mich darauf als Beyspiele, eine gewisse Anzahl von Arten, welche Chemnitz, Lister, Martini, Soldani beschrieben haben, anzuführen, um so mehr als Lamarks Werk darüber noch nicht erschienen ist, und ich doch bestimmte Beyspiele anführen wollte; aber weder Wahl noch Kritik, ist so genau, als bey den nackten Weichthieren.

Die trefflichen Beobachtungen der Herrn Savigny, Lesueur und Desmarets über die zusammengesetzten

Ascidien, zeigen, daß dieſe Familie der Weichthiere, ſich einigen Ordnungen der Zoophyten nähert, dieſes iſt ſehr merkwürdig und ein neuer Beweis, daß die Thiere nicht eine aneinanderhängende Kette bilden.

Ich ſonderte die Ringelwürmer, deren Aufſtellung als Klaſſe ich einführte, durch beſtimmte Merkmale von den Weichthieren, Schalthieren und Zoophyten, unter welche die Syſtematiker ſie geworfen hatten; und ſelbſt die Gattungen wurden durch meine Beſtimmungen deutlicher bezeichnet.

Ich rede gar nicht von den drey Thierklaſſen, welche den Inhalt des dritten Bandes ausmachen: alles iſt das Werk von Latreille, mit Ausnahme einiger anatomiſchen Bemerkungen, welche dem Texte eingewoben ſind, dieſe ſind von mir, und von Herrn Rambohr.

Bey den Zoophyten als der letzten Klaſſe des Thierreichs, benutzte ich für die Stachelhäute die neuen Arbeiten von Lamark; für die Eingeweide-Würmer, die Entozoa des Herrn Rudolphi; dabey aber machte ich bey allen Gattungen eigene anatomiſche Unterſuchungen, und ſtellte nach dieſen einige neue auf. Ueber die Anatomie der Stachelhäute, läßt das treffliche Werk von Tiedemann, welches vom Inſtitut als Preisfrage gekrönt worden, nichts zu wünſchen übrig. Die Koralien und Infuſionsthiere, bieten den anatomiſchen Unterſuchungen beynahe keinen Stoff dar, und die Werke von Lamark und Lamouroux ſind darüber ſehr vollſtändig.

Digitized by Google

Ich führe hier nicht alle Schriftsteller an, welche mir neue Ideen oder Thatsachen zeigten. Bey jedem Thiere, werden solche besonders angeführt, und wenn auch einige nicht angeführt wurden, so geschah es ohne meinen Willen, und ich bitte zum Voraus dafür bey ihnen ab, denn es ist heilige Pflicht, die Verdienste Aller zu würdigen, und fremde Entdeckungen nicht für eigene auszugeben.

Diese ganze Arbeit verbunden mit derjenigen über vergleichende Anatomie, werden zusammen ein Ganzes ausmachen, auf welches diejenigen sich prüfen dürfen, welche in diesen Wissenschaften späterhin Werke zu liefern gedenken.

Geschrieben im Pflanzengarten,
im Oktober 1816.

Digitized by Google

Inhaltsanzeige.

Einleitung. Seite 1.
Von den belebten Wesen, und von der Organisation im Allgemeinen. S. 11.
Unterscheidung der organischen Körper, in Thiere und Pflanzen. S. 19.
Eigenthümliche Formen der organischen Elemente im thierischen Körper, und Hauptverhältniße der chemischen Elemente. S. 22.
Von den Kräften, welchen der thierische Körper untergeordnet ist. S. 26.
Allgemeiner Begriff über die Verrichtungen und die Organe des thierischen Körpers, und Entwicklung der Verschiedenheit ihrer Zusammensetzung. S. 32.
Kurze Uebersicht der geistigen Verrichtungen der Thiere. S. 42.
Methode, das Thierreich einzutheilen. S. 49.
Allgemeine Eintheilung des Thierreiches in vier große Abtheilungen. S. 51.
Wirbelthiere. S. 55.
Unterabtheilung der Wirbelthiere in vier Klassen. S. 59.
Säugethiere. S. 62.
Eintheilung der Säugethiere in Unterordnungen. S. 72.
Erste Ordnung. Zweyhändige oder Menschen. S. 72.
Physische und moralische Entwicklung des Menschen. S. 80.
Abänderung der Menschengattung. S. 87.

Digitized by Google

Zweyte Ordnung. Vierhändige. Quadrumana. 94
Affen Simia – 95
Eigentliche Affen der alten Welt. –
Orangs Simia – – 97
Armaffen Hylobates 100
Meerkatzen Cercopithecus 102
Stummelaffen Colobus 110
Magots Innuus – 111
Paviane Cynocephalus 113
Pongos Pongo – 119
Amerikaniſche Affen 120
Brüllaffen Mycetes – 120
Klammeraffen Ateles 123
Wollhaaraffen Lagothrix 126
Sapous Cebus – 127
Sagoins Callithrix – 131
Nachtaffen Aotus – 134
Schweifaffen Pithecia 134
Seidenaffen Hapale 137
Tamarins Midas – 139
Halbaffen Prosimii 141
Makis Lemur – 141
Indris Lichanotus – 144
Loris Stenops – – 145
Galagos Otolicnus – 147
Tarſier Tarsius – 148
Rollſchwanzthiere Chirogaleus – – – 149
Dritte Ordnung. Fleiſchfreſſende Thiere. 150
Erſte Familie Handflügler. Chiroptera. 152
Flatterthier Pteropus 153
Greyfkopf Cephalotes 156
Hundsmaul Molossus 157
Spaltnaſe Nictinomus 159
Schmalhäutler Stenoderma 160
Kantenleſzer Noctilio 160
Blattnaſe Phyllostoma 160
Großhäutler Megaderma 164
Kammnaſe Rhinolophus 165
Nachtflieger Nycteris 168
Faltennaſe Rhinopoma 169
Grabflieger Taphozous 170
Klappenſchwanz Dielidurus 170
Fledermaus Vespertilio 172
Fliegende Makis Galeopithecus – – 181
Zweyte Familie. Inſektenfreſſer Insectivora. – – 182
Igel Erinaceus – 182
Spitzmaus Sorex – 183
Desman Mygale – 186
Waſſermaulwurf Scalops 187
Goldmaulwurf Chrysochloris – – – 188
Borſtenigel Centetes 189
Maulwurf Talpa – 190
Spitzwurf Talpasorex 191
Dritte Familie. Eigentliche Fleiſchfreſſer. Carnivora. 192
Sohlengänger Plantigrada – – 193
Bär Ursus – – 194
Waſchbär Procyon – 198
Coati Nasua – – 199
Kinkajou Cercoleptes. 199
Dachs Meles – – 200
Vielfraß Gulo – 201
Zehengänger Digitigrada – – 204
Wieſel Mustela – 204
Stinkthier Mephitis 210

Digitized by Google

Otter Lutra – – 211
Hund Canis – – 214
Großohr Megalotis – 222
Zibethkhier Viverra – 223
Ichneumon Herpestes 225
Schnarrthier Rhyzaena 227
Hyäne Hyaena – 228
Katze Felis – – 229
Amphibien Säugethiere. Amphibia 240
Seehund Phola – 240
Wallroß Trichechus 245
Beutelthiere Marsupialia – – 247
Beutelratte Didelphis 250
Schwimmhänder Chironectes – – – 253
Schweifbeutler Dasyurus 253
Beutelhachs Perameles 255
Phalanger Phalangista 257
Fliegender Phalanger Petaurus – – 259
Kenguruh, Ratte Hypsiprimnus – – 261
Kenguruh Halmaturus 263
Koala Lipurus – 265
Wombat Phascalomys 265
Vierte Ordnung. Nager Glires, – 267
Bieber Castor – – 270
Undatra Fiber – – 273
Feldmaus Hypudaeus 273
Scharrmaus Georhychus 278
Stachelratte Ecchimys 279
Schlafmaus Myoxus 281
Schwimmmaus Hydromys 282
Maus Mus – – 284
Hamstermaus Cricetus 289
Springmaus Dipus – 292
Schenkelthier Meriones 294
Blindmaus Spalax – 295
Sandgräber Bathyergus 296
Hüpfer Helamys – 397
Murmelthier Arctomys 298
Eichhorn Sciurus – 301
Backenhorn Tamias – 307
Flughörnchen Pteromys 308
Aye: Aye Cheiromys 310
Stachelthier Hystrix – 311
Haſe Lepus – 313
Haſenmaus Lagomys 319
Capivara Hydrochoerus 320
Meerſchweinchen Cavia 321
Aguti Dasyprocta – 323
Paka Coelogenus – 324
Fünfte Ordnung. Zahnloſe Thiere. Edentata. – – – 327
Faulthier Bradypus – 326
Großthier Megatherium 329
Gürtelthier Dasypus 329
Ameiſenſcharrer Orycteropus – – – 333
Ameiſenfreſſer Myrmecophaga – – – 334
Schuppenthier Manis 336
Monotremes Monotremata – – 337
Ameiſenigel Echidna 338
Schnabelthier Ornithorhynchus – – 339
Sechste Ordnung. Vielhufer. Pachydermata – – – 341
Elephant Elephas – 343

Digitized by Google

Mastodon Mastodon 347
Flußpferd Hippopotamus 349
Schwein Sus - - 350
Pecari Dicotyles - 353
Anaplotherium Anaplotherium - - - 355
Nasborn Rhinoceros 356
Klippschliefer Hyrax 358
Paläotherium Palaeotherium - - - 359
Tapir Tapirus - 360
Einhufer Solipeda 361
Pferd Equus - - 361
Siebente Ordnung. Wiederkauer. Ruminantia - - 365
Kameel Camelus - 367
Schafkameele Auchenia 370
Bisamthier Moschus 373
Hirsch Cervus - 375
Giraffe Camelopardalis 384
Ziege Capra - - 400
Schaf Ovis - - 403
Ochse Bos - - 407
Achte Ordnung. Fischartige Säugethiere. Cetacea - - 412
Manati Manatus - 414
Dugong Halicore - 415
Delphin Delphinus - 418
Buckwall Hyperoodon. 423
Einhornfisch Monodon 424
Hackenwall Ancylodon 425
Pottwall Physeter - 426
Wallfisch Balaena - 431
Eierlegende Wirbelthiere im Allgemeinen - - - 436
Vögel - - - 438
Erste Ordnung. Raubvögel. - - 449
Geyer Vultur - - 450
Kammgeyer Sarcoramphus - - - 452
Aasvogel Cathartes - 453
Geyeradler Gypaetos 455
Falke Falco - - 456
Kranichgeyer Cypogeranus 479
Eule Strix - - 482
Zweyte Ordnung. Sperlingsartige Vögel. Zahnschnäbel. Dentirostres. Insectivores 493
Würger Lanius - 494
Batara Tamnophilus 497
Würgerschwalben Cypselus - - - 499
Haartrager Criniger 500
Casikans Barita - 500
Bekarden Psaris - 501
Grauvögel Graucalus 502
Würgelstern Bethylus 503
Merlen Tanagra - 503
Tyrannen Tyrannus 506
Fliegenschnäpper Muscipeta - - - 507
Fliegenfänger Muscicapa 509
Nacktköpfe Gymnocephalus - - - 512
Schopfvogel Cephalopterus 512
Schmuckvogel Ampelis 513
Raupenfreßer Ceblepyris 516
Seidenschwänze Bombycivora - - - 516
Schnapper Procnias - 518
Fettvogel Steatornis 519

Digitized by Google

Nackthälſe Gymnoderus 520
Drongos Edolius – 521
Zahnſchnabel Sparactes 521
Droſſeln Turdus – 522
Doblendroßeln Pyrrhocorax – – – 529
Pirole Oriolus – 530
Ameiſenfreſſer Myothera 531
Waſſerſchwätzer Cinclus 534
Faltenvogel Philedon 535
Atzel Gracula – – 539
Leierſchwanz Maenura 540
Felſenhahn Rupicola 541
Manakin Pipra – 542
Steinſchmätzer Saxicola 543
Sänger Sylvia – 546
Flüevogel Accentor 559
Bachſtelzen Motacilla 561
Pieper Anthus – 563
Schwalbenartige Vögel Fissirostres 566
Segler Cypselus – 567
Schwalbe Hirundo – 569
Nachtſchwalbe Caprimulgus – – – 570
Kegelſchnäbler Conirestres – – 572
Lerchen Alauda – 573
Meiſen Parus – – 576
Ammer Emberiza – 580
Weber Ploceus – 584
Sperlinge Pyrgita – 586
Finken Fringilla – 588
Wittwen Vidua – 594
Kernbeißer Coccothraustes 595
Gimpel Pyrrhula – 598
Kreutzſchnäbel Loxia 599
Hackenkernbeißer Corythus 600
Kegelſchnabel Colius 601
Larvenvogel Glaucopis 602
Ochſenbacker Buphaga 602
Caziken Cassicus – 604
Haufenvögel Icterus 604
Herdenvögel Xanthornus 604
Pitpits Dacnis – 605
Staare Sturnus – 605
Spechtmeiſe Sitta – 608
Rabe Corvus – – 609
Elſtern Pica – – 611
Heher Garrulus – 612
Nußheher Caryocatactes 615
Rollen Colaris – 616
Minos Eulabes – 617
Paradiesvogel Paradisea 618
Dünnſchnäbel Tenuirostres – – 622
Wiedehopfe Upupa – 623
Promerops Promerops 625
Struphopfe Epimachus 626
Baumlaufer Certhia 627
Holzhauer Dendrocaleptes – – – 628
Mauerklette Tichodroma 630
Honigvögel Nectarinia 631
Scharlachvögel Dicaeum 633
Bogenſchnäbel Melithreptus – – – 634
Zuckerfreſſer Cynnyris 635
Colibris Trochilus – 636
Mit verbundenen Zehen Syndactyll 642
Bienenfreſſer Merops 642
Motmots Prionites – 644
Eisvogel Alcedo – 644
Jäger Dacelo – – 646

Digitized by Google

Dreizehige Eisvögel Ceyx 646
Plattschnäbel Todus 647
Hornvogel Buceros – 648
Dritte Ordnung. Kletervögel. Scansores 650
Glanzvogel Galbula 651
Specht Picus – – 653
Wendehals Yunx – 656
Kukuk Cuculus – 658
Cua Coua – – 661
Spornfuß Centropus 662
Corrol Leptosomus 663
Anzeiger Indicator – 663
Bartkukuk Monasa – 664
Malcoha Malcoha – 665
Rinnenschnabel Scythrops 665
Schnurrvogel Pogonias 666
Bartvogel Bucco – 667
Tamatia Tamatia – 668
Nagevögel. Kurrukus Trogon – – 669
Madenfresser Crotophaga 670
Pfefferfresser Rhamphastos 672
Arakaris Pteroglossus 673
Papagei Psittacus – 673
Trägvogel Corythaix 685
Musafresser Musophaga 686
Vierte Ordnung. Hühner. Gallinaceae 686
Pfau Pavo – – 688
Puter Meleagris – 690
Hokko Crax – – 691
Pauris Ourax – 693
Jakn Penelope – 694
Parraqua Ortalida – 696
Hoazin Opistocomus 696
Hahn Gallus – – 697
Fasan Phasianus – 702
Federbuschträger Lophophorus – – 705
Rurul Cryptonyx – 706
Perlhuhn Numida – 707
Waldhuhn Tetrao – 708
Ganga Pterocles – 713
Rebhuhn Perdix – 714
Wachtel Coturnix – 717
Laufhuhn Turnix – 719
Fausthuhn Syrphactes 720
Tinamus Crypturus 720
Hühnertauben Lophyrus 722
Tauben Columba – 724
Fünfte Ordnung. Laufvögel. Grallae. 727
Kurzflügel. Brevipennes – – 728
Strauß Struthio – 729
Casuar Casuarius – 734
Dudu Didus – – 738
Brachvögel. Feldläufer. Presbirostres 740
Trappe Otis – – 740
Dickfuß Oedicnemus 742
Kiebitz Vanellus – 745
Regenlaufer Pluvianus 747
Austernfischer Haematopus 748
Laufer Cursorius – 749
Schreivogel Dicholophus 749
Messerschnäbel Cultrirostres – 750
Trompetenvogel Psophia 751
Kranich Grus – – 752
Schnepfenreiher Aramus 754
Sonnenreiher Euripyga 755
Kahnschnabel Cancroma 755
Reiher Ardea – – 756
Storch Ciconia – 761

Digitized by Google

Jabiru Mycteria – 763
Schattenvogel Scopus 764
Klaffschnabel Anastomus 764
Nimmersatt Tantalus 765
Löffler Platalea – 766
Langschnäbler Longirostres – – 767
Ibis Ibis – – 768
Brachvogel Numenius 771
Regenvogel Phaeopus 772
Sichelschnabel Falcinellus 772
Erolia Erolia – – 773
Schnepfe Scolopax – 773
Krummschnabelschnepfe Rhynchaea – 776
Sumpflaufer Limosa 777
Strandlaufer Calidris 778
Meerlerche Pelidna 781
Senkvogel Ereunetes 782
Kampfstrandlaufer Machetes – – – 783
Sanderling Arenaria 784
Wassertretter Phalaropus 784
Lappenfuß Lobipes – 785
Steindreher Strepsilas 786
Wasserlaufer Totanus 787
Strandreuter Himantopus 791
Säbelschnabel Recurvirostra – – – 792
Spornflügel Parra – 794
Kamichi Palamedea 796
Chaia Chauna – 796
Ralle Rallus – – 798
Schnarrer Crex – 798
Rohrhuhn Gallinula 799
Sultanshuhn Porphyrio 801
Wasserhuhn Fulica – 802
Saumfuß Podoa – 803
Scheidenvogel Chionis 803
Kappenvogel Cereopsis 804
Glarol Glareola – 805
Flamingo Phoenicopterus 806
Sechste Ordnung. Vögel mit Schwimmfüßen. Palmipedes 807
Steißfuß Podiceps – 809
Seetaucher Colymbus 812
Lummen Uria – – 813
Zwerg-Taucherhuhn Cephus – – – 815
Papageitaucher Mormon 816
Alk Alca – – – 817
Floßenflügler. Impennes – – 818
Pinguin Aptenodytes 819
Fettgans Catarrhactes 819
Floßentaucher Spheniscus 820
Langflügler Longipennes – – 821
Sturmvögel Procellaria 821
Puffin Puffinus – 823
Kropftaucher Halodroma 825
Flaumtaucher Pachyptila 825
Albatroß Diomedea – 826
Raubmeve Lestris – 827
Meve Larus – – 829
Schwalbenmeve Xema 834
Meerschwalbe Sterna 834
Scheerenschnabel Rhynchops – – – 839
Pelekan Pelecanus – 841
Scharbe Carbo – 843
Fregatte Tachypetes 844
Tölpel Sula – – 845

Digitized by Google

Schlangenhalsvogel Plotus 846
Tropikvogel Phaeton 847
Mit gezähnten Schnäbeln Lamellirostres - - - 848
Schwan Cygnus - 849
Gans Anser - - 851
Ente Anas - - 854
Tauchgans Mergus - 876

Digitized by Google

Bayerische Staats-Bibliothek MÜNCHEN

Das Thierreich
geordnet nach der Organisation der Thiere.

Einleitung.

Ueber Naturgeschichte und über die verschiedenen Methoden, welche im Allgemeinen beym Studium derselben befolgt werden.

Da nur wenige Menschen das wahre Wesen der Naturgeschichte kennen, so ist es wohl nicht überflüssig, dieses Werk damit anzufangen, zu bestimmen, was eigentlich der Zweck dieses Studiums sey, und die Grenzen festzusetzen, welche dasselbe von verwandten Wissenschaften trennen.

In den meisten Sprachen bedeutet das Wort Natur: bald die Eigenschaften, welche ein Wesen gleich von seiner Geburt aus bezeichnen, im Gegensatz derjenigen, welche die Kunst ihm etwa verleihen könnte; bald versteht man darunter die allgemeine Geschichte der Wesen, welche im Universum sich vorfinden; bald endlich die Gesetze, welchen diese verschiedenen Wesen untergeordnet sind. Vorzüglich im letzten Sinne wird die Natur gewöhnlich personificirt, und ihr Name bedeutet auch wohl die Allmacht, welche ihre ewigen Gesetze geordnet hat.

Die Physik oder Naturwissenschaft betrachtet die Natur vorzüglich unter obigen drey Gesichtspunkten. Sie be-

Digitized by Google

trachtet die Körper entweder in allgemeiner oder in besonderer Hinsicht. Die allgemeine Physik untersucht auf abstrakte Weise jede Eigenschaft der beweglichen und in der ganzen Schöpfung verbreiteten Wesen, welche wir im Allgemeinen Körper nennen. Der eine Zweig davon, die Dynamik, betrachtet die Körper im Ganzen, und bestimmt mathematisch, von einer sehr kleinen Zahl von Erfahrungen ausgehend, die Gesetze des Gleichgewichts, der Bewegung und diejenigen ihrer Fortpflanzung; sie erhält in ihren verschiedenen Verzweigungen die Namen der Statik, der Mechanik, der Hydrostatik, der Hydrodynamik, der Areostatik u. s. w. nach der verschiedenen Natur der Körper, deren Bewegungen untersucht und bestimmt werden sollen. Die Optik beschäftigt sich blos mit der Fortpflanzungsart des Lichtes, und die Erscheinungen, die nur durch Erfahrungen sich erklären lassen, sind hier zahlreich.

Die Chemie ist ein anderer Zweig der allgemeinen Physik, und sucht die Gesetze zu bestimmen, nach welchen die Grundtheilchen der Körper auf einander unter verschiedenen Beziehungen einwirken; die Verbindungen und Trennungen, welche aus der allgemeinen Verwandtschaft dieser Theilchen entstehen, und die Veränderungen, welche verschiedene Umstände, auf diese Verwandtschaft und gegenseitige Anziehungskraft oder Abstoßungskraft hervorbringen. Diese Wissenschaft ist blos Erfahrungswissenschaft, die sich nicht auf Berechnungen gründen darf.

Die Theorie der Wärme und der Electricität gehören nach der Art, wie man sie gewöhnlich betrachtet, eben so gut in das Gebiet der Dynamik, als in das der Chemie.

Die beste Methode, welche bei Bearbeitung aller Theile

Digitized by Google

der allgemeinen Naturwiſſenſchaft mit Nutzen angewendet werden kann, iſt wohl die, jeden einzelnen Körper zu betrachten, ſeine einfachen Eigenſchaften aufzuſuchen, jede derſelben mit der andern durch Vernunft und Erfahrung zu vergleichen, und die Erſcheinungen, welche aus denſelben hervorgehen, zu berechnen, um dann aus der Zuſammenſtellung der einzelnen Erſcheinungen allgemeine Schlüſſe ziehen zu können, aus welchen endlich ein wiſſenſchaftliches Gebäude hervorgehen muß. Einzig auf dieſe Art kann es gelingen, vielleicht ein allgemeines Geſetz zu entdecken, welchem alle dieſe einzelnen Erſcheinungen und Geſetze untergeordnet ſind.

Die ſpecielle Phyſik, oder die Naturgeſchichte (beide Ausdrücke ſind gleichbedeutend), hat zum Hauptvorwurf und Zweck, den einzelnen verſchiedenartigen Weſen, welche in der Natur vorhanden ſind, die Geſetze anzupaſſen, welche uns die allgemeine Phyſik in ihren verſchiedenen Zweigen enthüllt hat, und ſie zu benutzen, um die Erſcheinungen zu erklären, welche jedes dieſer Weſen bezeichnen.

In dieſem weitläufigen Sinne begreift ſie auch die Sternkunde, aber dieſe Wiſſenſchaft, welche einzig der Mathematik ihr Daſeyn verdankt, iſt gänzlich ihren Geſetzen unterworfen, und bietet zu verſchiedene Geſichtspunkte dar, um von denſelben Perſonen, welche die Naturgeſchichte im Einzelnen betreiben, eben ſo leicht umfaßt werden zu können. Man ſchließt daher die Sternkunde, die blos auf ſchwierigen Rechnungen beruht, und in keinem ihrer Theile völlig erſchöpft erſcheint, von der Naturgeſchichte aus; ebenſo hat man auch die Witterungskunde und die Geſchichte der Lufterſcheinungen ins Gebiet der allgemeinen Phyſik

Digitized by Google

verwieſen; und nach dem jetzt allgemein angenommenen Begriff betrachtet die Naturgeſchichte blos die todten Organismen, die wir unter dem Namen der Mineralien kennen, und die verſchiedenen belebten Weſen, unter welchen kaum eines ſich findet, auf welches die Geſetze der Bewegung, der chemiſchen Anziehung, und alle andern durch die allgemeine Phyſik aufgeſtellten Geſetze, unverändert angewendet werden könnten.

Die Naturgeſchichte ſollte eigentlich ganz den nämlichen Weg einſchlagen, um ihr Ziel zu erreichen, welchen die allgemeine Phyſik benutzt, und ſie ſchlägt ihn auch wirklich allemal da ein, wo die Körper, deren Geſchichte ſie beobachtet, ſo einfach ſind, daß dieſe Methode anwendbar wird: dies iſt aber gerade der ſeltenere Fall. Der Hauptunterſchied zwiſchen der allgemeinen Phyſik und der Naturgeſchichte beſteht darin, daß man bey der erſten die Erſcheinungen allein unterſucht, um nach allen Momenten, welche ſie zeigen, endlich durch ihre genaue Zergliederung allgemeine Geſetze aufſtellen zu können; bey der Naturgeſchichte hingegen zeigen ſich dieſe Erſcheinungen unter Bedingungen, welche derjenige, der ſich mit ihrer Beobachtung abgiebt, nicht leiten kann, ſondern ſich blos bemühen muß, ſie einzeln aus ihrer Verbindung herauszuheben und nach den allgemeinen ſchon bekannten Geſetzen zu erklären. Es iſt ihm nicht erlaubt, ſie nach und nach verſchiedenen Bedingungen zu unterwerfen, und die Probleme auf die Elemente zurückzuführen, wie der Experimentator in der Phyſik, er muß ſie im Ganzen, mit allen ihren Bedingungen zuſammengenommen, berückſichtigen, und kann ſie nicht anders als in Gedanken einzeln darſtellen. Man verſuche

Digitized by Google

es, zum Beispiel, die einzelnen Erscheinungen, welche das Leben eines Thieres, welches auf einer der höhern Stufen der Organisation steht, abgesondert zu betrachten; wird eine einzige Bedingung aufgehoben, so wird das Leben ganz erlöschen.

So ward die Dynamik zu einer blos auf Rechnung begründeten Wissenschaft; die Chemie beruht blos auf Erfahrung; und die Naturgeschichte wird noch lange in den meisten ihrer Theile blos beobachtend seyn.

Diese drey Bestimmungen bezeichnen hinlänglich den Weg, auf welchem alle drey Zweige der Naturwissenschaften fortschreiten sollen: sie bezeichnen aber auch die verschiedenen Grade der Gewißheit, den jeder derselben ereicht hat, und zeigen das Ziel, nach welchem die beyden letzten Wissenschaften streben sollen, wenn sie je irgend einen Grad von Vollkommenheit zu erreichen hoffen dürfen.

Die Berechnungen beherrschen, so zu sagen, die Natur; sie enthüllen das Wesen der Erscheinungen bestimmter, welche die bloße Beobachtung noch dunkel läßt; die Erfahrung zwingt sie, ihre Gesetze zu enthüllen, und die Beobachtung belauscht ihre geheimsten Tiefen, und sucht sie in ihrer Werkstätte zu überraschen.

Die Naturgeschichte steht aber unter natürlichen Gesetzen, welche besonders auf sie anwendbar sind, und welche mit Vortheil in vielen Fällen angewendet werden können; es sind dieß die Gesetze, welche das Daseyn der Wesen bedingen, man kennt sie unter dem Namen der Grundursachen. Kein Körper kann bestehen, wenn nicht alle die Bedingungen vorhanden sind, welche sein Daseyn möglich machen; die verschiedenen einzelnen Theile eines jeden Kör-

Digitized by Google

pers müssen sich vereinen, um das Ganze zu bilden, und ihre Beziehungen betreffen nicht blos den Körper selbst, sondern auch die Umgebungen, mit welchen er in Verbindung steht. Die genauere Untersuchung dieser Bedingungen leitet uns oft zur Auffindung allgemeiner Gesetze, welche eben so bestimmt sind, als diejenigen, welche auf Berechnung oder Erfahrung beruhen.

Erst dann, wenn man umsonst versucht hat, alle Gesetze der allgemeinen Physik, oder diejenigen, welche das Daseyn der Körper bedingen, anzuwenden, ist man genöthigt, zu den einfachen Gesetzen, welche die Erfahrung an die Hand giebt, seine Zuflucht zu nehmen.

Der beste Weg, um diese Gesetze zu enthüllen, ist wohl die Vergleichung. Man beobachtet den nämlichen Körper in den verschiedenen Lagen, in denen er in der Natur vorkommt, oder man vergleicht gegen einander verschiedene Körper, und sucht die Punkte auf, unter denen sie sich sowohl in Hinsicht auf ihren Bau, als auch in Hinsicht der daraus entstehenden Erscheinungen, berühren. Diese verschiedenen Körper bieten eben so viele einzelne Erfahrungen dar, welche aus ihrer Natur hervorgehen, der eine Körper hat mehr, der andere weniger Organe, und diese Verminderung oder Vermehrung bestimmt das Wesen des Ganzen. So gelangt man endlich dahin, gewisse Gesetze, nach welchen die Aehnlichkeiten zu bestimmen sind, aufzustellen, und diese Gesetze ebenso auf das Ganze anzuwenden, wie diejenigen, welche die allgemeine Naturlehre aufstellt.

Die Verbindung der Gesetze, welche uns die Beobachtung als solche darstellt, mit den allgemeinen Gesetzen

Digitized by Google

der Körperwelt, werden endlich ein vollkommenes System der Naturwissenschaften begründen und uns zeigen, daß eine unauflösliche Kette alle Wesen zusammenknüpft, daß das Einzelne nur durch das Ganze besteht, daß alles nach unabänderlichen, ewigen Bedingungen geordnet ist; dieses gehörig zu würdigen und klar darzustellen, ist der Zweck, das Ziel, das Jeder zu erreichen suchen muß, der diese göttliche Wissenschaft betreiben will.

Aber um dieses Ziel zu erreichen, wird vorausgesetzt, daß wir Mittel an der Hand haben, nicht nur die einzelnen Naturkörper von einander gehörig selbst zu unterscheiden, sondern sie auch Andere zu unterscheiden lehren; ohne dieses würden wir alle Augenblicke die unzählbare Menge von Wesen, welche die Natur erschaffen hat, mit einander verwechseln. Der Naturgeschichte muß also das zum Grunde liegen, was man ein Natursystem nennt; darunter versteht man ein großes Verzeichniß, in welchem alle Naturkörper unter passenden Namen eingetragen sind, in welchem sie durch bestimmte Charaktere kenntlich gemacht werden; sie müssen dazu in Abtheilungen und Unterabtheilungen gebracht werden, die selbst wieder benennt und deutlich bezeichnet sind, damit man sie leichter aufsuchen kann. Damit aber dieses Aufsuchen nicht schwer sey, muß jeder in diesem Verzeichniß eingetragene Körper durch bestimmten Charakter bezeichnet seyn: diese bezeichnende Beschreibung darf nicht auf Eigenschaften oder Gewohnheiten beruhen, deren Ausübung blos augenblicklich ist, sondern sie muß sich auf die Bildung, die einem jeden Körper eigenthümlich bleibt, gründen. Beinahe kein einziger Körper hat eine einzige hervorstechende Eigenschaft, welche ihn deutlich

Digitized by Google

vor allen andern unterscheiden würde, fast immer muß man mehrere solcher Eigenschaften zusammenstellen, um ihn vor andern verwandten Wesen zu erkennen, die einzelne Eigenschaften mit ihm gemein haben, aber nicht alle so vereinigt, oder wieder mit andern verbunden, welche dem ersten mangeln; je zahlreicher aber die Wesen sind, welche man zu unterscheiden hat, desto mehr einzelne Züge müssen vereint herausgehoben werden, so daß, um einen Körper vom andern bestimmt unterscheiden zu können, man eine vollständige Beschreibung seiner ausgezeichneten Eigenschaften machen muß.

Um diesen Nachtheil möglichst zu vermeiden, war man genöthigt, Abtheilungen und Unterabtheilungen aufzustellen. Man vergleicht unter sich nur eine gewisse Zahl verwandter Körper, und giebt dann nur die Abweichungen an, welche in weniger wesentlichen Abänderungen der Bildung bestehen. Eine solche Vereinigung heißt eine Gattung. Man hätte aber dieselben Schwierigkeiten zu überwinden, um die einzelnen Gattungen von einander zu unterscheiden, wenn man nicht das Verfahren, welches man zur Aufstellung der Gattung anwandte, wiederholte, und die verwandten Gattungen zusammenstellte, um eine Ordnung zu bilden. Verwandte Ordnungen aber bilden endlich eine Klasse, und mehrere Klassen ein Reich. Oft müssen aber noch Zwischenabtheilungen gemacht werden. Diese Zusammenstellung von Abtheilungen, von denen immer die höhere die niederen einschließt, nennt man eine Methode. Es ist in gewisser Hinsicht eine Art von Wörterbuch, in welchem man von den Eigenschaften der Körper ausgeht, um schickliche Namen für sie aufzufinden, während umge-

Digitized by Google

kehrt in einem gewöhnlichen Wörterbuch die Namen gewählt werden, um die Eigenschaften der Dinge zu bezeichnen.

Wenn aber eine Methode gut seyn soll, muß sie sich nicht auf Namen beschränken. Wenn die Unterabtheilungen nicht blos willkührlich aufgestellt sind, sondern sich auf wahre Grundgesetze gründen, und die wesentlichen Eigenschaften zusammenstellen, so ist die Methode das sicherste Mittel, die Eigenschaften aller dieser Körper bestimmten allgemeinen Gesetzen zu unterwerfen, sie durch Worte zu bezeichnen, und so dem Gedächtnisse leichter einzuprägen. Um aber eine brauchbare Methode aufzustellen, muß die Vergleichung der Körper nach den einmal festgesetzten untergeordneten Charakteren beständig fortgesetzt werden, welche Charaktere selbst wieder von den Bedingungen der Existenz abhängen. Die einzelnen Organe eines Körpers stehen mit einander in gewissen Beziehungen; gewisse Grundeigenschaften der Organisation schließen andere nothwendig aus, während wieder andere an diese Organisation gebunden sind. Wenn man diese oder jene Grundeigenschaften eines Körpers kennt, so können wir berechnen, daß auch gewisse andere damit verbunden, andere hingegen damit unverträglich sind; diejenigen Organe oder Eigenschaften und Grundzüge der Bildung, welche einem Körper vorzüglich eigen sind, sein Daseyn, seine Verschiedenheit von andern bestimmen, nennt man wesentliche Charaktere, Grundeigenschaften; die andern hingegen sind untergeordnete Eigenschaften, welche auch wieder durch verschiedene Abstufungen sich bezeichnen lassen. Die Wichtigkeit dieser Charaktere ergiebt sich mehrentheils aus der Natur der Or-

Digitized by Google

gane selbst; ist dieses zu schwierig, so ist eine genaue Beobachtung das sicherste Mittel, die hervorspringenden und immer bezeichnenden Eigenschaften aufzufinden, und der Natur gleichsam abzulauschen; so finden wir eine lange Reihe von Wesen, die sich einander immer durch gewisse Merkmale nähern, und durch geringe, dennoch bestimmtere Abweichungen nur nach und nach sich von einander entfernen.

Von der Wichtigkeit und Beständigkeit der Charaktere müssen auch die Grundzüge hergenommen werden, welche die größere Klasseneintheilung bestimmen; während die Unterabtheilungen von weniger wesentlichen und veränderlichern Kennzeichen bedingt werden.

Es giebt nur eine vollkommne Methode, nämlich die natürliche; so nennt man diejenige, nach welcher die Körper, welche zusammen eine Gattung bilden, unter sich weit enger verbunden sind, als mit denen einer verwandten Gattung; die Gattungen derselben Ordnung in engerer Verbindung unter sich stehen, als mit denen aller andern Ordnungen und so fort. Diese Methode ist das Ideal der Vollkommenheit, nach welchem die Naturgeschichte zu streben hat; denn es ist einleuchtend, daß, wenn man es erreichen würde, man auch eine vollständige Kenntniß der ganzen Natur in allen ihren mannigfaltigen Wesen erlangen müßte. Da jeder Körper durch seine Aehnlichkeit oder Unähnlichkeit mit andern die Stelle erhält, die er im Systeme erhalten soll, so kann nur eine ganz natürliche Methode diese mit Gewißheit bestimmen. Mit einem Wort, eine natürliche Methode wäre die vollkommenste Wissen-

Digitized by Google

ſchaft, und jeder Schritt, der uns dieſem Ideal näher führt, fördert auch die Vollkommenheit der Wiſſenſchaft.

Das Leben iſt unter allen Eigenſchaften der Körper die wichtigſte, und von allen Charakteren der ausgezeichnetſte. Es iſt daher ſehr begreiflich, daß man es immer und zu allen Zeiten als das erſte Merkmal herausgehoben hat, um die Körper darnach zu beſtimmen, und daß man von der früheſten Zeit an, in welcher die Naturgeſchichte wiſſenſchaftlich aufzublühen anfing, alle Körper in zwey große Abtheilungen brachte, von welcher die eine alle belebte Körper, die andere dagegen alle unbelebte in ſich faßt.

Von den belebten Weſen, und von der Organiſation im Allgemeinen.

Wenn wir uns einen Begriff vom Weſen des Lebens machen wollen, ſo müſſen wir es in denjenigen Körpern beobachten, in welchen es ſich am einfachſten äußert. Es muß uns bald auffallen, daß das Weſen des Lebens darin beſteht, gewiſſe körperliche Verbindungen eine gewiſſe Zeit lang unter einer beſtimmten Form zu erhalten, indem dieſe Körper beſtändig von fremden Körpern Stoffe an ſich ziehen, und ſie den Elementen ihrer eigenen Körper beimiſchen.

Das Leben gleicht dem Wirbel eines Stromes, der mehr oder minder reißend, mehr oder minder zuſammengeſetzt, nach derſelben Richtung hinſtrömt, indem er immer Theilchen derſelben Art in ſich aufnimmt und wieder ausſtößt, ſo daß die Form der lebenden Körper beſtändiger iſt,

Digitized by Google

als die Materie, aus der sie bestehen. So lange diese Bewegung fortdauert, ist der Körper, in dem sie geschieht, lebend zu nennen, er lebt. Steht aber dieser Strom still, und kehrt nicht mehr in sich selbst zurück, so stirbt der Körper. Nach dem Tode lösen sich die Theile, aus denen der Körper besteht, nach den Gesetzen der chemischen Verwandtschaft in ihre Elemente auf, der vorher belebte Körper verweset, denn das Leben ist von ihm gewichen. Dieses Leben, diese Lebenskraft war es also allein, welche die Auflösung in die Elemente hinderte, welche die verschiedenen Theile zusammenhielt und band. Der Tod ist das Ende alles dessen, was lebt, aber der Zeitpunkt, wo er eintritt, ist bey jedem Körper verschieden. Der Tod ist nothwendige Folge des Lebens, welches durch sein Wirken selbst nach und nach die Organe, in denen es wirkt, vermindert, gleichsam ausbraucht, so daß sie endlich ihren Dienst nicht weiter leisten können.

Jedes belebte Wesen ist fortdauernden, nach bestimmten Gesetzen eintretenden, Veränderungen unterworfen, der belebte Körper steht nie still. Von einer kleinern Masse dehnt er zur größern sich aus, bis er die jeder Art bestimmte Größe erreicht hat; dann erst erreichen seine einzelnen Theile eine größere Festigkeit, welche endlich in Härte übergeht, welche, wenn sie allzusehr überhandnimmt, den natürlichen Tod zur Folge hat.

Man findet bey näherer Untersuchung der belebten Körper, daß sie alle in gewisser Hinsicht einen ähnlichen Bau haben, und eben diese allgemeine Aehnlichkeit zeigt auch, daß ein solcher Bau für die Lebensäußerungen durchaus nothwendig und angemessen sey. Jeder belebte Körper hat feste Theile,

Digitized by Google

welche seine Form bestimmen, und flüssige Theile, welche dieselben beweglich erhalten. Das Gewebe der festen Theile besteht aus netzförmigen Maschen und Zellchen, welche durch Fibern und Plättchen gebildet werden. Man nennt daher die Grundlage aller festen Theile Zellengewebe. In den Räumchen dieser Zellen und Maschen befinden sich allenthalben flüssige Theile, welche zum Theil als fremdartige Substanzen, das Innerste der Zellgewebe durchdringen, alle Räumchen erfüllen, aber auch in beständiger Bewegung sind, und jeden Augenblick ihre Lage verändern. Indem diese Flüssigkeiten aus dem flüssigen in den festen Zustand übergehen, bilden sie neue Theilchen, und ernähren und unterhalten so die festen Theile, von welchen auf der andern Seite sich durch dieselben Flüssigkeiten immer Theilchen auflösen, und wieder in flüssigen Zustand übergehen, dann aber als unnütz und überflüssig durch die Poren der Körper nach außen dringen und sich in flüssiger oder luftartiger Gestalt verflüchtigen. Die festen Theile, welche in ihren Räumen die flüssigen enthalten, sind einer Zusammenziehbarkeit fähig, durch deren Wirkung den enthaltenen Flüssigkeiten Bewegung mitgetheilt wird. Diese gegenseitige Einwirkung des Festen auf das Flüssige, dieser Uebergang der Theilchen von einem Zustand in den andern, ist Folge der chemischen Verwandtschaft der einzelnen Theile zu einander; da die festen Theile aus Grundstoffen bestehen, welche leicht wieder in den flüssigen oder gasartigen Zustand sich umwandeln können. Die Bewegung des Flüssigen erfordert also eine beständige Wirkung von Seite des Festen, und die festen Theile müssen ihrerseits ebenfalls biegsam und dehnbar seyn. Diese Biegsamkeit und Dehn-

Digitized by Google

barkeit iſt auch wieder ein allgemeiner Charakter organiſirter Weſen.

Organiſirt nennen wir alſo einen Körper, der aus Zellengewebe beſteht, welches aus mehr oder minder biegſamen Fibern und Plättchen gebildet iſt, und in ſeinen Räumen Flüſſigkeiten enthält. Dieſer Bau allein macht zum Leben fähig, daher ſind organiſirte Körper auch allein belebte Körper. Die Organiſation aber iſt das Reſultat einer großen Zahl von Zuſammenwirkungen, welche die Bedingungen des Lebens ausmachen. Die Lebensbewegung muß daher aufhören, wenn eine einzige dieſer Bedingungen aufhört, da nur in ihrem allgemeinen Zuſammenwirken das Leben beſtehen kann.

Jeder organiſirte Körper hat außer der allgemeinen Bildung durch Zellengewebe noch eine beſtimmte Form, die ſich nicht allein auf das Aeußere ſeiner Geſtalt bezieht, ſondern auf die Bildung jeder ſeiner Theile ſelbſt in ihrem Innerſten einwirkt. Dieſe beſtimmte Form aber bedingt wieder die allgemeine Richtung der einzelnen Bewegungen, welche jedes Organ auszuüben fähig und beſtimmt iſt, alle aber ſtehen unter der allgemeinen Herrſchaft des Lebens, welches allein die Art zu dem Standpunkt erhebt, in dem ſie ſtehen ſoll. Jedes einzelne Organ wirkt zu dieſer allgemeinen Bewegung das Seinige mit, und erleidet zugleich eine eigene Wirkung. So iſt in jedem organiſchen Weſen das Leben, die Wirkung gegenſeitiger Thätigkeit und Rückwirkung aller ſeiner einzelnen Theile. Leben im Allgemeinen ſetzt alſo immer Organiſation voraus, und das beſondere Wirken des Lebens in jedem einzelnen Weſen wird von der beſondern Organiſation deſſelben beſtimmt; ſo wie

Digitized by Google

der Gang einer Uhr durch die Zuſammenſetzung des Uhrwerks geleitet wird. Die Aeußerungen des Lebens kommen alſo nur den organiſchen Weſen zu, nur ſie genießen dieſes Vorzuges; alle Bemühungen der Naturforſcher haben aber das Weſen des Lebens noch nicht ergründen können, und wir wiſſen noch nicht, welche Kraft es iſt, welche die Materie zwingt, gewiſſe Formen anzunehmen, ob die Bedingung dazu in der Materie ſelbſt liegt, oder ihr von auſſen mitgetheilt wird. Das Leben übt über die Materie, über die Elemente, aus welchen der belebte Körper zuſammengeſetzt iſt, eine Herrſchaft aus, vermöge welcher die Geſetze der chemiſchen Verwandtſchaft ganz anders modificirt werden, als wir ſie außer dem Leben antreffen; es iſt gleichſam ein erzwungener Zuſtand bedingt durch das Wirken jener allmächtigen Kraft, die wir Lebenskraft oder Erregbarkeit nennen, an ſich unſichtbar und geſtaltlos, aber in jeder Geſtaltung ſich äußernd, welche die Eigenſchaften der Organiſation hat. Die Lebenskraft iſt in der ganzen Natur die einzig bekannte, welche im Stande iſt, vorher getrennte Theile nicht nur zu vereinigen, ſondern in dieſer Vereinigung zu erhalten. Das Entſtehen der organiſchen Weſen iſt das größte Geheimniß der Haushaltung der Natur, in welches der Geiſt der Sterblichen noch nicht hat dringen können. Nur das ſchon Gebildete ſehen wir, aber niemals die erſte Bildung ſelbſt, denn was nicht gebildet iſt, entgeht unſern Blicken. Nur das wiſſen wir, daß, ſo weit wir die Entſtehung belebter Weſen haben verfolgen können, jedes derſelben von einem ähnlichen, von derſelben Form erzeugt wird: die Entſtehung eines belebten Weſens ſetzt alſo das Daſeyn eines andern voraus. So lange wir

Digitized by Google

in dem neuen Wesen noch keine sichtbaren Lebensäußerungen bemerken, obschon es einen Theil der Mutterkörper ausmacht, nennen wir es einen Keim. Der Ort, wo der Keim am Mutterkörper festsitzt, die Ursache, wodurch er von seinem Sitze losgerissen wird, und nun selbstständiges Leben äußert, ist verschieden, aber diese frühere Verbindung mit einem ähnlichen Wesen ist eine Regel ohne Ausnahme. Die Erzeugung ist die Trennung des Keimes vom Mutterkörper.

Alle belebten Wesen haben die merkwürdige Fähigkeit ihresgleichen hervorzubringen; ohne diese Kraft würden die organischen Wesen bald zu Grunde gehen, da der Tod, die nothwendige Folge des Lebens, sie nach und nach alle zerstören würde, so aber lebt jedes Wesen in seiner Nachkommenschaft fort, und das Leben ist Folge des Lebens.

Die belebten Wesen haben auch die Fähigkeit, zwar in sehr verschiedenem Grade, erhalten, Theile, die sie verloren haben, wieder zu ersetzen; diese Ausdehnung dieser Fähigkeit ist nach dem verschiedenen Bau der organischen Körper bald größer bald geringer, und ist unter dem Namen der Wiedererzeugungs-Fähigkeit oder Reproduktion bekannt.

Die Entwicklung der organischen Körper geht mehr oder minder schnell vor sich, erhält mehr oder minder Ausdehnung, je nachdem äußere Umstände sie mehr oder minder begünstigen, oder die Bestimmung des Körpers es erfordert. Wärme, Ueberfluß und Art der Nahrungsmittel, und viele andere Ursachen haben darauf Einfluß, und dieser Einfluß kann allgemein auf den ganzen Körper wirken, oder aber nur auf einzelne seiner Theile. Aus dieser Ursache sind auch die Abkömmlinge ihren Eltern nie ganz

ähn-

Digitized by Google

ähnlich, und der Unterschied, welcher durch diesen Einfluß entsteht, bestimmt das, was wir Abart oder Varietät nennen.

Man hat keinen einzigen sichern Beweis, daß die Verschiedenheit, welche unter den organischen Wesen der jetzigen Schöpfung statt findet, je anders gewesen sey, oder daß die Wesen sich seit ihrem ersten Ursprunge durch die Fortpflanzung nach und nach verändert hätten. Alles, was uns die Erfahrung über diesen zweifelhaften Gegenstand an die Hand giebt, besteht darin, daß in dem jetzigen Zustand unserer Erdkugel die Veränderungen der Körper in gewissen nicht allzuweiten Grenzen eingeschlossen sindn und daß, so weit wir auch in die frühere Periode unserer jetzigen Schöpfung hinaufsteigen können, diese Grenzen immer dieselben, wie heut zu Tage gewesen zu seyn scheinen. Gewisse Formen, sind daher als Urformen zu betrachten, die sich vom Anfang der Dinge an gleich geblieben sind, und die bestimmten Gränzen nie überschritte, haben. Alle Wesen, welche eine dieser bestimmten Formen von der Natur empfangen haben, bilden eine Art, und die unbedeutenden Abänderungen oder Abweichungen von dieser Form machen die Varietät aus, und bilden eine zufällige Unterabtheilung der Arten.

Da die Erzeugung das einzige Mittel ist, die Grenzen zu bestimmen, innert welchen die Varietäten sich bilden können, so läßt sich das Wesen einer Art so bestimmen: Art ist Vereinigung aller Individuen, welche von gemeinschaftlichen Eltern abstammen, und diesen sowohl, als auch sich selbst unter einander ähnlich sind. Obschon aber die Erklärung bestimmt ist, so ist ihre Anwendung doch in

einzelnen Fällen oft nicht sehr leicht, und nur vielfältige Erfahrung kann uns hierüber Leichtigkeit verschaffen.

Um alles hierüber Gesagte in wenigen Worten zusammenzufassen, so sind die allgemeinen Eigenschaften der organischen Wesen folgende. Sie nehmen fremde Theile in ihren Körper auf, sie haben die Kraft, diese Theile in ihre eigene Substanz umzuwandlen; sie wachsen nach und nach von einer kleinern zu einer größern Masse; sie erzeugen sich von Neuem. Die Geburt und der Tod sind die Grenzpunkte ihres Daseyns. Sie bestehen aus Zellengewebe, welches Zusammenziehbarkeit besitzt, und in seinen Zwischenräumen, Flüßigkeiten oder Luft enthält. Beinahe alle seine festen Theile, sind fähig, sich in flüßigen oder luftartigen Zustand zu verwandeln, und so immer sich neu zu bilden, durch eine der Lebenskraft untergeordnete, chemische Wirkung. Bestimmte Formen, durch Erzeugung vervielfältigt, unterscheiden die einzelnen Arten, bestimmen die Zusammenwirkung der einzelnen Verrichtungen, und setzen den Standpunkt fest, den jede dieser Arten im Weltall einnimmt. Diese Wesen können sich durch sich selbst nicht verändern, oder sich fortpflanzen, es erfordert dazu den Einfluß der Lebenskraft. Die Lebenskraft selbst äußert sich nur durch die Organisation, sie ist unergründlich, unerforschlich, und die tiefsten Untersuchungen haben uns das Geheimniß der Entstehung der Wesen noch nicht enthüllt.

Digitized by Google

Unterscheidung der organischen Körper in Thiere und Pflanzen.

Die belebten oder organischen Körper wurden von den ältesten Zeiten her in zwey Reiche abgetheilt, von denen das eine die beseelten Wesen, oder diejenigen enthält, welche Empfindung und willkührliche Bewegung äußern; das andere hingegen die unbeseelten, welche diese beyden Eigenschaften entbehren, und blos auf die allgemeinen Eigenschaften des Lebens beschränkt sind. Obschon mehrere Pflanzen bey Berührung ihre Blätter zusammenziehen, obschon die Wurzeln sich dahin richten, wo sie Feuchtigkeit finden, und die Blätter nach der Luft und dem Lichte, obschon einige selbst in einzelnen Theilen zitternde Bewegungen äußern, von denen man keine äußere Ursache entdecken kann, so sind doch diese Bewegungen allzuverschieden von den Bewegungen der Thiere, als daß man dabey Empfindung und Wille voraussetzen könnte.

Das Vermögen der willkührlichen Bewegung der Thiere, erforderte wesentlich verschiedene Einrichtungen, von denen der Pflanzen, welche sich auch auf die der Willkühr nicht unterworfenen Organe beziehen. Der Ortsbewegung fähig, konnten die Thiere nicht durch Wurzeln aus dem Boden ihre Nahrung ziehen, sie mußten innere Organe erhalten, in welchen sie die Nahrungsmittel aufnehmen, und mit sich tragen konnten. Eine innere Höhle zur Aufbewahrung der Speisen, ein Magen ist daher ein wesentlicher Charakter des Thieres, aus diesem Magen dringen die nährenden Säfte in die übrigen Theile des Körpers, durch Poren oder Gefäße, welche daher als innere Wurzeln zu betrachten sind.

Digitized by Google

Der Bau dieser Höhle und der damit verbundenen Theile muß sich nach der Art der Nahrungsmittel richten, um damit alles das verrichten zu können, was nöthig ist, diese verschiedenen Nahrungsmittel aufzulösen, und den Nahrungssaft aufzunehmen. Die Pflanzen können dagegen aus der Luft und der Erde schon bereiteten Nahrungssaft aufnehmen.

Der thierische Körper, zu zahlreichen und mannigfaltigen Verrichtungen bestimmt, welche die Pflanze nicht nöthig hat, bedurfte dazu auch einer zusammengesetztern Organisation. Diese Organe mußten ihre Lage verändern können, da die Bewegung ihrer Flüßigkeiten nicht blos von äußern Ursachen abhängt, der thierische Körper mußte unabhängiger von der Wärme- und den athmosphärischen Verhältnissen seyn: Dazu erforderte es des zweyten Charakters des Thieres, des Systems der Circulation, welches aber weniger wesentlich ist, als das der Verdauung, und den Thieren der einfachsten Bildung mangelt.

Die thierischen Verrichtungen erforderten organische Systeme, welche den Pflanzen nicht nöthig waren. Die willkührliche Bewegung machte bey den Thieren der Muskelsystem, und die Empfindung das Nervensystem nothwendig. Da nun diese beyden Systeme, wie alle andern, nur durch Bewegungen und Umwandlungen der flüßigen Theile wirken, so mußten diese Flüßigkeiten bey den Thieren verschiedener seyn, als bey den Pflanzen, und es folgt schon daraus, daß die chemischen Elemente des thierischen Körpers ebenfalls zusammengesetzter seyn mußten. Der thierische Körper besitzt einen Stoff mehr, als die Pflanze, nemlich den Stickstoff, welcher demselben vorzugsweise ei-

Digitized by Google

gen ist, da er sich nur zufällig den drey andern Elementarstoffen der Pflanze, Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff beymischt. Die Beymischung des Stickstoff bezeichnet den dritten Hauptcharakter des Thieres.

Die Erde und die Athmosphäre geben den Pflanzen als Nahrungsstoff das Wasser, welches aus Sauerstoff und Wasserstoff besteht, die Luft, welche Sauerstoff und Stickstoff enthält; und die Kohlensäure, welche aus Sauerstoff und Kohle zusammengesetzt ist. Wenn die Pflanzen aus diesen Stoffen ihre eigenthümliche Bildung erhalten sollen, so muß der Wasserstoff mit dem Kohlenstoff in innige Verbindung treten, und der überflüßige Sauerstoff wegdunsten, dagegen wenig oder kein Stickstoff aufgenommen werden. Die Lebensäußerung der Pflanzen besteht also hauptsächlich darin, daß sie durch Hilfe des Lichtes Sauerstoff aushauchen.

Bey den Thieren treten wie bey den Pflanzen Wasserstoff und Kohlenstoff ebenfalls als wesentliche Grundbestandtheile zusammen, um aber die gehörige Mischung zu erhalten, müssen sie sich ihres Ueberflusses sowohl von Wasserstoff und Kohlenstoff entledigen, und mit dem dritten Elementarstoff, dem Stickstoff in Verbindung treten; dies geschieht durch die Respiration, durch welche der Sauerstoff der Athmosphäre mit dem Wasserstoff und Kohlenstoff des Blutes Verbindungen eingeht, und als Wasser- und Kohlensäure ausgehaucht wird. Der Stickstoff scheint dagegen im Körper zu bleiben, er mag nun in den Körper auf diesem oder jenem Wege eindringen.

Die Verbindung der Pflanzen und der Thiere mit der Luft, geschieht also auf entgegengesetzte Weise; die Pflan-

Digitized by Google

zen stoßen Wasser und Kohlensäure aus, die Thiere hingegen bilden beym Ausathmen Wasser und kohlensaure Luft. Die Respiration ist eine sehr wesentliche Verrichtung des thierischen Körpers; sie bedingt in gewisser Hinsicht das Wesen des Thieres, und wir bemerken, daß die dem Thiere eigenen Verrichtungen, um so mannigfaltiger und vollkommner sind, als ihre Respiration mehr entwickelt ist. Die Verschiedenheit von den Pflanzen bildet den vierten Charakter des Thieres.

Eigenthümliche Formen der organischen Elemente im thierischen Körper, und Hauptverhältniße der chemischen Elemente.

Ein aus Zellgewebe bestehender Bau und drey chemische Elemente sind allen belebten Körpern gemein, ein viertes Element aber ist blos dem thierischen Körper allein eigen: die Form der Zellen und Maschen ist indeß verschieden, und diese Elementar-Theilchen vereinigen sich in verschiedenen Richtungen. Man unterscheidet drey Arten dieses Gewebes, die Zellform, die Form der Muskelfieber und die der Marksubstanz. Jede dieser Formen, hat wieder ihre eigene Verbindung der chemischen Elemente, so wie ihre Eigenthümlichkeit in den obliegenden Verrichtungen.

Die Zellform besteht aus einer zahllosen Menge von kleinen Plättchen, deren Zusammenfügung zufällig scheint. Zwischen diesen Zusammenfügungen bleiben Zellchen übrig, welche alle untereinander in Verbindung stehen. Sie ist einem Schwamme zu vergleichen, der die Form des Kör-

Digitized by Google

pers bildet, und in deſſen Zellen alle flüßigen Theile enthalten ſind, und dieſelben erfüllen. Die Haupteigenſchaft des Zellgewebes iſt ſeine Zuſammenziehbarkeit, deren Gränze ſich ſchwer beſtimmen läßt, wenn die Urſachen, welche daſſelbe ausgeſpannt erhalten, nachlaſſen. Dieſe Kraft iſt es, welche die Form jedes Körpers beſtimmt und erhält.

Sind die Zellchen klein und gedrängt, ſo bilden ſie die größern oder kleinern Flächen, welche man Häute nennt. Wenn dieſe Häute in ſich ſelbſt zurückkehrend Cilinder bilden, ſo entſtehen daraus die Gefäſſe, welche eine Menge Verzweigungen haben: Die Faſern oder Fibern, bilden nebſt den Plättchen einen Theil des Zellgewebes, die einfache Fiber aber iſt nicht darſtellbar; wir kennen ihre Form und ihre Größe nicht. Knochen entſtehen, wenn die Zellen bildenden Theile, durch Anhäufung von erdigten Theilen verhärten.

Die allgemeine Materie, woraus die Zellen beſtehen iſt jene Vereinigung der Grundſtoffe, welche den Namen thieriſche Gallerte oder Leim erhält, und deren Haupteigenſchaft iſt, daß ſie im ſiedenden Waſſer ſich auflößt, beym Erkalten aber in eine zitternde Maſſe gerinnt, welche man Gallerich oder Sulz nennt.

Noch iſt man nicht dahin gelangt, die organiſchen Theilchen zu beſtimmen, woraus die Markſubſtanz entſteht: Sie zeigt ſich dem Auge als eine Art weicher Gallerte, in welcher man nichts entdeckt, als eine Menge unendlich kleiner Kügelchen. Sie iſt keiner bemerkbaren Bewegung fähig, aber in ihr liegt die wunderbare Kraft die äußern Eindrücke, welche ſie durch die Sinne empfängt, auf einen Punkt zu vereinigen, welchen man das Hirn nennt, und

Digitized by Google

von da aus den Muskeln die Befehle der Seele oder des Willens kund zu thun. Das Hirn besteht größtentheils aus dieser Markſubſtanz, und die Nerven, die vom Hirn und Rückenmark aus nach allen empfindlichen Theilen ſich verbreiten, ſind ihrem Weſen nach nichts anders als Fortſetzungen des Hirnes, welche ſich in Fadenbündeln darſtellen.

Die Fleiſch- oder Muskelfaſer, iſt eine Faſer von ganz eigenem Bau, ihr weſentlicher Charakter beſteht darin, daß ſie im Leben auf Berührung oder durch den Reiz des Willens, der ihr durch die Nerven mitgetheilt wird, ſich zuſammenzieht. Diejenigen Muskeln, welche zur Ausübung der willkührlichen Bewegung dienen, beſtehen aus zuſammengeſetzten Bündeln von Muskelfaſern; alle Häute, welche Gefäſſe bilden, oder deren Beſtimmung iſt, irgend einen Druck auszuüben, ſind mit ſolchen Muskelfaſern verſehen, welche mit Nervenfaden innig verbunden ſind, aber diejenigen, welche ſolche Verrichtungen auszuüben beſtimmt ſind, welche blos dem Pflanzenleben zukommen, ziehen ſich ohne unſer Bewußtſeyn zuſammen, der Wille hat keine Gewalt über ſie; die Kraft des Willens auf die Muskelfaſern zu wirken, erſtreckt ſich alſo nicht auf alle Muskelfaſern.

Die Grundlage der Muskelfaſer iſt ein Stoff von eigener Subſtanz, den man Faſerſtoff nennt, er iſt im ſiedenden Waſſer nicht auflöslich, und ſcheint ſeiner Natur nach dazu geeignet, von ſich ſelbſt die Faſerform anzunehmen.

Der allgemeine Nahrungsſaft oder das Blut, welches in den Gefäſſen der höhern Thierklaſſen enthalten iſt, hat nicht blos alle Elemente des thieriſchen Körpers überhaupt,

Digitized by Google

in seiner Mischung, nemlich Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff; sondern es enthält schon gebildeten Faserstoff und Gallerte in sich, welche sehr geneigt sind, in feste Form überzugehen, und die bestimmte Gestalt von Membranen oder Faden anzunehmen. Ein kurzes Aufhören der Bewegung des Blutes ist hinreichend, um es zum Gerinnen, oder zum Uebergang vom flüßigen in den festen Zustand zu bringen. Man findet ferner im Blute einen Stoff, der in den festen und flüßigen Theilen der Thiere oft vorkommt, den Eiweißstoff, dessen Haupteigenschaft ist, daß er im siedenden Wasser gerinnt. So findet man also im Blute beynahe alle Urstoffe, welche sich im Körper eines jeden Thieres vorfinden, wie die Kalkerde und den Phosphor, welche sich in den Knochen der Wirbelthiere verhärten; Eisen, welches das Blut und verschiedene andere Theile färbt; das Fett oder thierische Oel, welches sich in vielen Zellen absetzt, und sie ausfüllt. So finden sich also alle chemischen Elemente, aus welchen die flüßigen und festen Theile des thierischen Körpers bestehen im Blute und der Unterschied der Theile entsteht blos aus der Zusammensetzung von mehr oder minder Elementen, oder aus dem veränderten Verhältniß derselben, und ihre Bildung hängt ganz davon ab, ob mehr oder weniger von den Elementarstoffen des Blutes dazu verwendet werden, nur in einzelnen wenigen Fällen treten noch einige Stoffe von außen dazu.

Die Verrichtung, durch welche die nährende Flüßigkeit die festen und flüßigen Theile des thierischen Körpers bildet und erhält, kann man mit dem allgemeinen Namen der Secretion bezeichnen, da man indeß dieses Wort mehr zur

Digitized by Google

Bezeichnung der Bildung des Flüßigen braucht, so ist das Wort Ernährung bezeichnender, wenn von Absetzung der nöthigen Materien zur Unterhaltung der festen Theile aus dem Blut die Rede ist.

Jedes feste Organ, jede Flüßigkeit, hat im belebten Körper diejenige Zusammensetzung, die ihm nöthig war, um den Zweck zu erfüllen, zu welchem es bestimmt ist, und erhält diese Zusammensetzung so lange als es gesund ist, weil das Blut immer dasjenige wieder ersetzt, was sich etwa verändert und abgeht. Das Blut liefert also immer frische Nahrungssäfte zur Unterhaltung der Theile, und ändert dabey selbst seine Zusammensetzung unaufhörlich, wird aber eben so oft, als es sich zersetzt, durch den neuen Zufluß der Säfte, welche aus den Speisen kommen erneuert, und giebt durch die Respiration den Ueberfluß von Wasserstoff und Kohlenstoff ab, während zugleich durch die Ausdünstung der Oberfläche des Körpers und durch verschiedene andere Absonderungen ebenfalls überflüßige Theile abgeschieden werden.

Diese beständige Zersetzung und Wiederersetzung der chemischen Grundstoffe machen einen eben so wesentlichen Theil des Lebensstromes aus, als die sichtbaren Bewegungen und Versetzungen der Flüßigkeiten: Ja der Hauptzweck der letztern ist wohl der, die erstern herbeyzuführen.

Von den Kräften, welchen der thierische Körper untergeordnet ist.

Die Muskeln sind nicht blos die Organe der freywilligen Bewegung; sie sind überdas die mächtigsten Hebel,

Digitized by Google

welche die Natur anwendet, um den Körper für alle Ortsveränderungen und Bewegungen fähig zu machen, welche das vegetative Leben erfordert. So sind die Muskelfibern des Darmkanals die Ursache der wurmförmigen Bewegung des Darmkanals, wodurch die Speisen nach unten befördert, und ihre Auflösung begünstigt wird. Die Herzfibern und diejenigen der Pulsadern, sind Ursache der Circulation, und als Folge dieser, der Ab- und Aussonderungen. Der Wille setzt mittelst der Nerven die Muskelfiber der willkührlichen Muskeln in Bewegung; und selbst die Muskelfasern der unwillkührlichen Muskeln in denjenigen Theilen, von denen eben ist geredet worden, stehen unter dem Einfluß der Nerven, welche die wahrscheinliche Ursache ihrer Zusammenziehung sind, durch einen Einfluß, der vom Hirn aus auf dieselben zu strömen scheint.

Jede Zusammenziehung, überhaupt jede Veränderung der Ausdehnung in der Natur, ist Folge einer Veränderung der chemischen Zusammensetzung, oder hat eine solche zur Folge; immer hat ein Zufluß oder Abfluß unwägbarer Stoffe statt, wie z. B. des Wärmestoffs; durch solche chemischen Veränderungen werden selbst die heftigsten Bewegungen, welche auf der Erde bekannt sind, Entzündungen, Verpuffungen und dergleichen, hervorgebracht.

Sehr wahrscheinlich ist es ein unwägbarer Stoff, oder eine unsichtbare Flüßigkeit durch welche der Nerve auf die Faser einwirkt, wenigstens ist es deutlich, daß diese Einwirkung nicht mechanisch ist.

Die Marksubstanz des ganzen Nervensystems ist gleichartig, und muß allenthalben, wo sie sich findet, die Ver-

Digitized by Google

richtung, welche ihrem Wesen inliegt, auszuüben. Alle ihre Verzweigungen, erhalten eine Menge Blutgefässe.

Da alle Flüßigkeiten des thierischen Körpers aus dem Blute abgeschieden worden, so ist es sehr wahrscheinlich, daß wenn wirklich ein Nervensaft vorhanden ist, derselbe ebenfalls aus dem Blute abgeschieden werde, und daß die Marksubstanz das absondernde Organ dafür sey. Ebenso gewiß ist es auch, daß die Marksubstanz der einzige Leiter dieses Nervengeistes sey; alle andern organischen Elemente dienen ihm zum Leiter, oder sind Nichtleiter, und halten ihn von einigen Theilen ab, wie das Glas die Elektricität.

Die äußern Ursachen, welche Empfindungen hervorbringen oder Zusammenziehung der Fibern veranlassen, sind fast alle chemische Agentien, welche im Stande sind, Zersetzungen hervorzubringen, so das Licht; der Wärmestoff; die Salze; die riechenden Stoffe; die Erschütterung; die Zusammenpressung und andere mehr. Es ist daher sehr wahrscheinlich, daß alle diese Ursachen auf das Nervenfluidum chemisch einwirken, und seine Mischung ändern. Dies ist um so wahrscheinlicher, als die Nervenaction ermüdet, wenn sie lange anhaltend wirkt, als ob sie nöthig hätte, sich wieder zu sammeln und ihre erste Mischung wieder anzunehmen, um von neuem zersetzt werden zu können.

Die äußern Organe der Sinne sind wie eine Art von Sieb zu betrachten, da sie auf die Nerven eines Theiles nur diejenigen Einflüsse wirken lassen, welche für denselben bestimmt sind; so hat die Zunge schwammigte Wärzchen, auf welche salzigte Auflösungen wirken; so verbreitet sich der Gehörnerve in weiches Mark, welches für die Schwin-

Digitized by Google

kungen des Schalles empfänglich ist; die durchsichtigen Theile des Auges sind bloß den Lichtstrahlen durchdringbar.

Die Reitze, oder die Ursachen, welche Zusammenziehung der Muskelfaser hervorbringen, bewirken diese Thätigkeit sehr wahrscheinlich durch die Nerven auf dieselbe Art, als ob sie durch den Willen in Thätigkeit gesetzt würden; indem sie nemlich das Nervenfluidum so verändern, wie es nöthig ist, die Ausdehnung der Fiber zu verändern; der Wille selbst aber kann dazu nichts beytragen, da sie ohne alles Bewußtseyn geschehen. Muskeln, welche vom Körper getrennt sind, sind doch noch einige Zeit reitzempfänglich. Im Nerven, der zu ihnen geht, bleibt die Kraft noch einige Zeit zurück, so daß daraus bestimmt sich zeigt, daß der Wille nicht den geringsten Antheil daran haben kann. Das Nervenfluidum scheint sich also durch den auf den Muskel wirkenden Reitz, ebenso zu verändern, als durch Ausübung der Empfindlichkeit, daraus folgt, daß Reitzbarkeit und Empfindlichkeit die Wiederherstellung der ersten Zusammensetzung des Nervenfluidums nöthig machen.

Alle Bewegungen, die dem vegetativen Leben angehören, werden durch Reitze hervorgebracht, oder beruhen auf Reitzen; ohne Reitz hat keine Bewegung statt, allein diese Reitze sind in jedem Theil verschieden, z. B. Magen- und Darmkanal werden durch die Speisen gereitzt, Herz und Gefässe durch das Blut. Alle Bewegungen des vegetativen Lebens geschehen ohne Einfluß des Willens, und im gesunden Zustand, auch ohne Bewußtseyn. Die Nerven, welche sie hervorbringen, verhalten sich in ihrer Vertheilung anders, als die Nerven der Sinne, oder derjenigen Mus-

Digitized by Google

keln, deren Bewegung vom Willen abhängt, und gerade diese Verschiedenheit der Vertheilung scheint sie der Einwirkung des Willens zu entziehen.

Die eigentlichen Nervenverrichtungen der Empfindlichkeit und Muskularreitzbarkeit, zeigen sich in ihren Wirkungen um so stärker, je mehr ihre Ursache verstärkt ist, und da diese Ursache im Nervenfluidum und dessen Absonderung liegt; so ist die Wirkung um so stärker, je mehr Nervensubstanz und Blut ein Theil erhält.

In denjenigen Klassen von Thieren, welche einen Kreislauf haben, gelangt das Blut zu den Theilen durch die Pulsadern, welche es allenthalben hin durch eigene Reitzbarkeit und durch die Kraft des Herzens treiben. Wenn diese Pulsadern mehr gereitzt sind, so ist ihre Wirkung auch lebhafter, und sie führen den Theilen mehr Blut zu, folglich muß auch die Absonderung des Nervengeistes sich vermehren, und die örtliche Empfindlichkeit größer werden, dadurch wird die Reitzbarkeit der Pulsadern selbst wieder vermehrt, und diese gegenseitige Einwirkung geht sehr weit. Man nennt dies thierischen Orgasmus, und wenn er schmerzhaft und daurend wird, Entzündung. Die Reitzung kann auch durch die Nerven hervorgebracht werden, wenn sie lebhafte Eindrücke erhalten. Dieser gegenseitige Einfluß und Verbindung der Nerven- und Muskelfasern auf das Eingeweide und Gefäßsystem, ist die eigentliche Triebfeder des vegetativen Lebens der Thiere.

So wie jeder äußere Sinn, nur für gewisse Reitze Empfänglichkeit zeigt, so zeigt auch jedes innere Organ nur für bestimmte Reitze Empfänglichkeit, man nennt dies die

Digitized by Google

spezifische Reitzbarkeit der Organe, solche spezifische Reitze sind zum Beyspiel das Quecksilber für die Speicheldrüsen, die spanischen Fliegen für die Harnwerkzeuge u. s. w.

Da das Nervensystem gleichartig ist und alle seine Theile von einander abhängen, so müssen örtliche Empfindungen und Reitze aufs Ganze wirken; und jeder zu lang anhaltender Reitz, sey er örtlich oder allgemein, endlich eine Erschöpfung der Kraftäußerung, eine Schwächung derselben hervorbringen, und so die Ueberreitzung des einen Organs auch Erschöpfung und Schwäche der andern zur Folge haben. So hindert zu starke Anfüllung des Magens die freye Ausübung der Denkkraft; und umgekehrt zu anhaltendes Denken wirkt schwächend auf die Verdauung. So kann also örtliche Schwäche allgemeine Schwäche zur Folge haben, da die Lebenskraft, unter deren Herrschaft das Ganze steht, sich hier gleichsam nach diesem Punkte hinzieht, und sich erschöpft.

Ein stärkerer Reitz, auf eine andere Stelle angebracht, hebt den ersten auf oder vermindert seine Wirkung, der stärkere leitet den schwächern ab. So können z. B. bey Brustentzündungen Purgiermittel die Entzündung mindern, oder Blasenpflaster auf die Brust gelegt, den Reitz der auf die Lungen wirkt, aufheben.

So kurz auch die angeführten Sätze sind, so reichen sie doch hin, die Möglichkeit zu erklären, die Gesetze aufzufinden, welche die Erscheinungen des physischen Lebens untergeordnet sind. Die Annahme des Nervenfluidums, wie es dargestellt worden, erklärt alles durch die Eigenschaften, welche ihm eigen sind.

Digitized by Google

Allgemeiner Begriff über die Verrichtungen und die Organe der thierischen Körper, und Entwicklung der Verschiedenheit ihrer Zusammensetzung.

Die vorhergehende Darstellung der Elemente, welche den thierischen Körper zusammensetzen, der chemischen Urstoffe und der Kräfte, unter deren Herrschaft er steht, macht es nun leichter, allgemeine Begriffe der einzelnen Funktionen, durch deren Zusammenwirkung das Leben besteht, aufzustellen, und die Organe näher kennen zu lernen, durch deren Hilfe sie ausgeübt werden.

Die Verrichtungen des thierischen Körpers bilden zwey verschiedene Klassen.

In die eine Klasse gehören alle diejenigen, welche blos den Thieren zukommen, welche das Thier von der Pflanze auszeichnen: Empfindung und willkührliche Bewegung. (Thierische Verrichtungen.)

Die andere Klasse begreift die Verrichtungen, welche blos das Leben bezeichnen, und den Pflanzen wie den Thieren gemein sind, die Ernährung, die Absonderung, die Erzeugung, oder diejenigen, welche ohne Willen, ohne Bewußtseyn vergehen. (Vegetative Verrichtungen.)

Die Empfindlichkeit hat ihren Sitz im Nervensystem. Der im ganzen Thierreich am allgemeinsten verbreitete Sinn ist das Gefühl. Der Sitz des Gefühls ist die Haut, oder jene Ausbreitung des Zellgewebes, welche den Körper allenthalben einhüllt, und mit einer Menge von Nerven, die von allen Seiten in sie eindringen, durchkreuzt ist. Die feinsten Aestchen dieser Nerven, endigen sich in

kleine

Digitized by Google

kleine Wärzchen auf der Oberfläche der Haut, und sind mit der Oberhaut bedeckt, und noch überdies durch andere Theile, denen das Gefühl ebenfalls fehlt, geschützt, wie die Haare, Schuppen, Nägel, Stacheln. Geschmack und Geruch sind nur feinere Arten des Gefühls, die Haut der Zunge und das innere der Nase sind dazu besonders eingerichtet. Auf der Zunge finden sich zu diesem Endzweck größere und schwammigtere Wärzchen. Die Nase dagegen ist mit einer zarten Haut überzogen, welche faltig und immer feucht ist. Auge und Ohr sind schon im Allgemeinen beschrieben worden. Die Organe der Zeugung sind mit einem sechsten Sinne versehen, wenigstens kann man die Regungen dieser Theile wohl am schicklichsten mit einem Sinne vergleichen, der Sitz dieses Sinnes scheint die innere Haut des Zeugungsorgans zu seyn; gewisse innere Empfindungen geben uns auch Nachricht von dem Zustande des Magens und der Eingeweide. Ueberhaupt können in jedem Theile des Körpers durch Zufall oder Krankheit mehr oder minder schmerzhafte Empfindungen entstehen *).

*) Nicht jeder Physiologe wird in Hinsicht dieses sechsten Sinnes mit Herrn Cuvier gleicher Meynung seyn, obschon allerdings nicht geläugnet werden kann, daß die Empfindung bey Ausübung des Geschlechtst-Triebes deutlicher ist, als irgend eine, welche uns durch das Gemeingefühl kund wird. Alle Empfindungen aber, welche in dem Willen nicht unterworfenen Organen entstehen, wie im Magen, Darmkanal sind undeutlich und gehören dem Gemeingefühl an, welches uns niemals klare Begriffe überliefert, wie wir sie durch die eigentlichen Sinne erhalten. Hunger, Durst, Eckel, Schmerz

Digitized by Google

Vielen Thieren mangeln die Ohren und die Nase, mehrern selbst die Augen; ja einige scheinen ausser dem Gefühl, welches keinem einzigen mangelt, gar keinen Sinn zu haben.

Der durch die äußern Organe empfangene Eindruck, pflanzt sich durch die Nerven bis in das Centralorgan des Nervensystems fort, welches in den Thieren der höhern Klassen aus dem Hirn und Rückenmark besteht. Je höher das Thier auf der Stufe zusammengesetzter Bildung steht, desto größer ist sein Hirn, desto mehr ist das Hirn der Centralpunkt der Empfindung; je tiefer dagegen ein Thier auf der Stufe des thierischen Lebens steht, desto mehr vertheilt ist die Nervenmasse. In den Thieren der untersten Klasse scheint die Nervensubstanz ganz in der übrigen Körpermasse verschmolzen zu seyn. Wenn ein Reitz auf das Thier wirkt, so entsteht in denselben der Wille, und die Nerven thun den Muskeln den Willen kund, und setzen sie in Bewegung.

Muskeln sind also jene aus Fleischfasern bestehenden Bündel, durch deren Zusammenziehung alle Bewegung im thierischen Körper hervorgebracht wird. Das Ausstrecken der Glieder, jede Verlängerung eines Theils, ist eben so gut Folge der Muskelzusammenziehung, als die Biegung und Verkürzung. Die Muskeln jedes Thiers sind in der Zahl und in der Lage vorhanden, als für alle Bewegungen nöthig ist, welche dasselbe machen soll. Wenn diese Bewegungen mit einer gewissen Kraft vor sich gehen müs-

---

sind Empfindungen des Gemeingefühls, aber keine eigenen Sinne zu nennen. A. d. Ueb.

Digitized by Google

sen, so müssen die Muskeln an harte, aber mit Gelenken versehene Theile befestigt seyn, und zwar so, daß einer über dem andern liegt, sie sind als so viele Hebel anzusehen, als Muskeln sind. Diese harten Theile heißen in den Wirbelthieren Knochen, und befinden sich im innern des Körpers, als die Grundsäulen desselben, sie entstehen aus einer gallertartigen Masse, welche von phosphorsauter Kalkerde durchdrungen ist. Man nennt diese harten Theile Schale, Kruste, Schuppe bey den Weichthieren, Krustenthieren und Insekten, wo sie außen liegen und bald aus einer kalkartigen, bald hornartigen Masse bestehen, welche zwischen Haut und Oberhaut ausschwitzt.

Die fleischigen Fasern befestigen sich an den harten Theilen, durch andere Fibern von gallertartiger Masse, welche als Fortsetzungen der ersten erscheinen, und Sehnen heißen.

Die Bildung der Gelenkflächen der harten Theile, bestimmen ihre Bewegung, die Gelenke werden durch Faserbündel und faserige Häute aneinander geschlossen, dieses nennt man Bänder.

Durch die verschiedene Bildung dieser Muskel und Knochengebilde, durch die Form und Größe der Glieder, die dadurch hervorgebracht wird, werden die Thiere in den Stand gesetzt, die mannigfaltigen Bewegungen auszuführen, durch welche das Gehen, Springen, Fliegen, Schwimmen hervorgebracht wird.

Obschon die Muskelfibern, welche den Verdauungsorganen und denen des Kreislaufs eingewebt sind, dem Willen nicht unterworfen sind, so erhalten sie dennoch Nerven, aber wie schon bemerkt worden ist, so zerästeln diese Ner-

ven ſich in unendliche Zweige, und vereinigen ſich hier und da wieder zu Knoten, oder einzelne Nerven bilden Geſchwülſte, deren Zweck zu ſeyn ſcheint die unter dieſen Knoten von ihren Nerven erhaltenden Theile der Herrſchaft des Willens zu entziehen *). Nur wenn heftige Leidenſchaften beym Thiere in Thätigkeit ſind, ſo zeigt ſich die Kraft des Bewußtſeyns, auch jenſeits dieſer Dämme, meiſt aber werden dadurch die Verrichtungen in Unordnung gebracht. Nur im kranken Zuſtand ſind die Bewegungen ſolcher Theile mit Empfindung verbunden, im geſunden Zuſtand geht die Verdauung vor ſich, ohne daß das Thier ſich derſelben bewußt iſt.

Die Nahrungsmittel, werden im Munde durch die Kinnladen und Zähne verkleinert, oder bey Thieren, welche blos Flüßigkeiten genießen eingeſogen, in beyden Fällen aber durch die Muskeln des Rachens und des Schlundes verſchluckt, und in den erſten Theil des Darmkanals gebracht, der meiſt weiter iſt, und in ein oder mehrere Magen ſich theilt. Hier miſchen ſich mit ihnen Säfte, welche die Auflöſung befördern.

Aus dem Magen treten ſie in den übrigen Darmkanal, und werden hier mit neuen Säften gemiſcht, welche ihre Auflöſung vollenden. Die Wände dieſes Kanals ſind mit einſaugenden Gefäßen oder einfachen Poren verſehen,

---

*) Es iſt doch wohl noch keine ausgemachte Thatſache, daß der Zweck der Knoten und Geflechte darin beſtehe, den Einfluß des Willens und des Hirnes aufzuheben, es laſſen ſich ſehr viele Gründe dagegen aufſtellen, deren Anführung hier zu weit führen würde. A. d. U.

Digitized by Google

welche diejenigen Theile aus dem Speiſenbrey aufnehmen, welche zur Ernährung geſchickt ſind, der im Darmcanal bleibende Ueberreſt aber, wird als Exkrement ausgeſtoſſen.

Der Canal, in welchem dieſer erſte Akt der Verdauung vorgeht, iſt eine Fortſetzung der Haut, und beſteht aus ähnlichen Häuten, wie ſie. Die Faſern, welche ihn umgeben, ſind eben ſo beſchaffen, wie diejenigen, welche an der innern Seite der Haut ſich finden, man nennt ſie Muskelhaut oder Fleiſchhaut. Aus ihr ſchwitzt allenthalben auf die innere Oberfläche des Darmcanals eine Feuchtigkeit aus, welche mit der Hautausdünſtungsmaterie einige Aehnlichkeit hat, ſie wird häufiger, wenn die Hautausdünſtung unterdrückt iſt. Die Haut aber ſaugt auf ähnliche Art ein, wie die Haut des Darmcanals.

Nur in der unterſten Claſſe der Thiere gehen die Exkremente zum Munde wieder heraus, und die Eingeweide bilden einen blinden Sack.

Die Zahl der Thiere, in welchen der Nahrungsſaft, der durch die Wände der Eingeweide iſt eingeſogen worden, ſich unmittelbar in alle zelligen Theile des Körpers verbreitet, iſt die größere, dahin ſcheint die ganze Claſſe der Inſekten zu gehören. Bei den Spinnen und Würmern circulirt der Nahrungsſaft in einem Syſtem von verſchloſſenen Gefäſſen, aus deren feinſten Aeſtchen allein die Theilchen den Theilen zugeführt werden, welche ſie nähren ſollen. Die Gefäſſe, welche dieſen Nahrungsſaft den Theilen zuführen, heiſſen Pulsadern oder Arterien, diejenigen hingegen, welche dieſen Saft wieder in den Centralpunkt zurückführen, von welchem ſie ausgeſtrömt ſind, heißen Venen. Der Circulations-Wirbel iſt bald einfach, bald dop-

Digitized by Google

pelt, ja selbst dreifach, wenn man den Umlauf in der Pfortader dazu rechnet; die Schnelligkeit seiner Fortbewegung wird meist durch die Zusammenziehung gewisser muskulöser Organe, welche man Herzen nennt, unterstützt und angetrieben: diese Herzen befinden sich immer im Mittelpunkt des Kreislaufs, bei einigen Thieren giebt es gar zwei Herzen.

In den Wirbelthieren mit rothem Blut kommt der das Blut unterhaltende Saft weiß aus den Eingeweiden, und hat dann den Namen des Chylus oder Milchsaftes: er fließt durch ein eigenes Gefäßsystem, welche den Namen der Milchgefäße hat, in das System der Venen, wo er sich mit dem Blute mischt. Noch andere, den Milchgefäßen ähnliche Gefäße bilden mit diesen ein System, welches man das Lymphatische nennt; diese Gefäße bringen in das venose System verschiedenes, welches sie aus den schon abgesonderten Säften wieder aufgenommen haben, oder was sie auf der Aussenfläche der Haut haben aufnehmen können.

Wenn aber das Blut die Theile gehörig ernähren soll, muß es erst durch die Elemente der atmosphärischen Luft, oder des Wassers, welche durch das Athmen in den Körper aufgenommen wird, noch bestimmte Veränderungen erleiden. In den Thieren, welche einen Kreislauf haben, ist ein Theil der Gefässe bestimmt, das Blut in die Athmungsorgane zu bringen, hier verbreiten sich die Gefäße auf eine große Oberfläche, damit der Einfluß der eindringenden Stoffe größer seyn könne. Ist das einzunehmende Luft, so ist diese Oberfläche hohl, und heißt Lunge, ist es aber Wasser, so ist sie erhaben, und heißt Kieme (branchiae). Eigene

Digitized by Google

Muskulareinrichtungen sind bestimmt, das einzunehmende Element in oder auf das Athmungsorgan eindringen zu lassen.

In denjenigen Thieren, welche keinen Kreislauf haben, verbreitet sich die Luft in alle Theile des Körpers durch elastische Gefäße, welche Tracheen oder Luftgefäße heißen, ist es aber Wasser, so dringt dieses ebenfalls durch Gefäße ein, und zersetzt sich, oder die Zersetzung geschieht durch die Hautoberfläche.

Das Blut, welches den Veränderungen, welche durchs Athmen bewirkt werden, ausgesetzt gewesen, ist nun im Stande, das zu leisten, was man Ernährung nennt. Was aber hierbei höchst wunderbar und unerklärlich ist, ist die Leichtigkeit des Blutes sich zu zersetzen, und dadurch jedem Theil diejenigen Stoffe zuzuführen, welche ihm nöthig sind; diese wunderbare Eigenschaft ist dem organischen Leben überall in Thieren und Pflanzen eigen. Um die Ernährung der festen Theile zu bewirken, bemerkt man keine andere Einrichtung, als eine mannigfaltige Theilung der arteriellen Gefäße; um aber die flüssigen Theile abzusondern, sind die Einrichtungen viel zusammengesetzter; entweder die äußersten Enden der feinsten Gefäße öffnen sich ganz einfach, und dunsten mit offnen Mündungen auf den Flächen den Saft aus; oder dieses Ausdunsten geschieht in gewisse kleine hohle Säckchen, aus welchen der Saft aussickert; am häufigsten aber geben die Endigungen der Gefäße, zum Theil ohne in Venen überzugehen, in absondernde Canälchen über, andere aber verändern sich an demselben Ort in Venen, und die Absonderung scheint auf dem Punkt der Vereinigung dieser beyden Gefäßarten zu geschehen:

Digitized by Google

Diese Vereinigung von Blutgefäßen und absondernden Canälchen bildet durch ihre Verwicklung diejenigen Organe, welche man absondernde Drüsen nennt. In denjenigen Thierklassen, welche keinen Kreislauf haben, benetzt die nährende Flüssigkeit alle Theile, und so erhält jeder die nährenden Theilchen, die er bedarf. Wenn aber auch hier die Absonderung einer Flüssigkeit nöthig war, so schwimmen die Endmündungen eigener Gefäße in dem nährenden Saft, und saugen durch ihre Poren die nöthigen Elemente ein, aus welchen die Flüssigkeit bereitet werden muß.

Das Blut ist also die Mutter aller Theile, die von ihm neue Stoffe erhalten, wodurch der Abgang ersetzt wird, der eine nothwendige Folge der Verrichtungen der Organe seyn muß. Die allgemeinen Begriffe, welche wir uns von diesem Vorgange machen können, sind ziemlich deutlich, obschon wir keine bestimmte und deutliche Kenntniß von dem haben, was in jedem einzelnen Theile vorgeht. Da es uns auch an einer gründlichen Kenntniß der chemischen Stoffe, welche in jedem Organe vorwalten, fehlt, so kennen wir auch die Vorgänge nicht genau, welche Umformungen und Mischungsveränderungen zur Folge haben.

Ausser denjenigen Drüsen, welche aus dem Blute solche flüssige Theile absondern, welche im innern des Körpers bestimmte Zwecke zu erfüllen haben, giebt es noch andere, welche Säfte absondern, deren bloße Bestimmung ist, ausgeleert zu werden, entweder sind es überflüssige Stoffe, wie der Urin, welcher in den Nieren abgesondert wird, oder sie leisten auch durch ihre Ausleerung dem Thiere noch einigen Nutzen, wie die Tinte der Tintenfische, der Purpursaft mehrerer Weichthiere u. s. w.

Digitized by Google

Was die Fortpflanzung betrift, so kommt dabei eine Erscheinung vor, welche eben so schwer zu erklären ist, als der Vorgang bei den Sekretionen, nemlich die Entstehung des Keimes. Man kann in der That kaum erwarten, daß dieses Problem je werde gelöst werden können. Nimmt man aber wirklich das Daseyn eines Keimes an, so hat die Erklärung der Zeugung wenig bedeutende Schwierigkeiten mehr. So lange ein Keim einen Theil des Mutterkörpers ausmacht, wird er von da aus wie jedes andere Organ Nahrung erhalten; trennt er sich aber einmal von ihm, so ist die eigene Lebenskraft die Triebfeder seiner fernern Entwicklung, da diese Kraft in jedem belebten Körper, sey er jung oder alt, dieselbe ist. Der Keim, der sich entwickelnde Embrio, die Frucht, und das Neugeborne haben aber niemals dieselbe Gestalt, wie das Erwachsene, und der Unterschied ist oft so groß, daß die Verähnlichung den Namen der Verwandlung mit Recht verdient. Wer würde wohl, ohne Selbstbeobachtung oder Belehrung von andern, je glauben können, daß eine Raupe sich in einen Schmetterling verwandeln könnte.

Alle lebende Wesen bestehen mehr oder minder im Verfolge ihres Wachsthums eine Verwandlung, sie verlieren gewisse Theile, und andere vorher fast unsichtbare entwickeln sich. So z. B. sind die Fühlhörner, die Flügel und andere Theile des Schmetterlings unter der Haut der Raupe verborgen; diese Haut, diese Kinnladen, diese Füße der Raupe und andere Organe verschwinden, und der Schmetterling trägt keine Spur davon. Die Füße der froschartigen Thiere sind unter der Haut der Kaulquappe verborgen, und die Kaulquappe muß, um Frosch zu werden, Schwanz,

Digitized by Google

Mund und Kiemen verlieren. Das Junge des Saugethieres verliert nach der Geburt den Mutterkuchen, und die Eihüllen; in einem gewissen Alter verschwindet der grösste Theil der Brustdrüse, nach und nach entwickeln sich Haare, Zähne, Bart. Das Verhältniß der Größe der Theile wird verändert, der Körper wächst verhältnißmäßig mehr, als der Kopf, und der Kopf mehr, als die innere Theile des Ohres.

Der Ort, wo der Keim im Mutterkörper festsitzt, oder wo mehrere Keime beisammen sind, heißt der Eierstock: Der Kanal durch welchen die einmal losgerissenen Keime sich ausser die Eierstöcke begeben, heißt der Eiergang Die Höhle, in welcher sie bey mehrern Arten vor der Geburt sich längere oder kürzere Zeit aufhalten, heißt Gebärmutter, Fruchthalter oder Uterus; die äußere Oeffnung, durch welche sie aus dem Körper herausschlupfen, heißt die Scheide. Da, wo getrennte Geschlechter vorhanden sind, ist das männliche Geschlecht das befruchtende, das weibliche hingegen dasjenige, in welchem die Keime sich entwickeln. Der befruchtende Saft heißt der Saame; die Drüsen, welche ihn absondern, heißen Hoden oder Testickel, und wenn dieser Saame in den Körper des Weibchens gelangen muß, so heißt das Organ, durch welchen er eindringt, die Ruthe.

Kurze Uebersicht der geistigen Verrichtungen der Thiere.

Wie der Eindruck der äußern Objecte auf das Bewußtseyn geschehe, wie die Fortpflanzung der erhaltenen Empfindung vor sich gehe, und Vorstellung errege, sind Erscheinungen deren Wesen für unsern Geist nach undurch-

Digitized by Google

dringliches Geheimniß iſt. Die Annahme, daß bloße Materie hier wirke, iſt eine um ſo gewagtere Hypotheſe, als die Philoſophie uns durchaus keinen ſichern Beweis darbietet, daß nur eine ſolche Materie exiſtire. Aber der Naturforſcher ſoll unterſuchen, welches die materiellen Bedingungen ſeyen, unter welchen Empfindung entſteht. Er ſoll die Verrichtungen der Seele zu belauſchen ſuchen, um zu beſtimmen, wie groß in jedem Weſen ihr Einfluß ſey, und ob ſich nicht noch aus der Organiſation jeder Art, oder dem augenblicklichen Zuſtand des Körpers eines Individuums Einflüſſe herleiten laſſen, welche auf die geiſtigen Verrichtungen Einfluß haben.

Um Bewußtſeyn hervorzubringen, muß nothwendig eine ununterbrochene Nervenverbindung zwiſchen den äußern Sinnen und dem Vereinigungspunkt des Markſyſtems vorhanden ſeyn. In dieſem Vereinigungspunkt allein iſt der Sitz deſſen, was wir Seele nennen, der allgemeine Sammelplatz der Empfindungen, der Sitz des Bewußtſeyns. Hier können ſelbſt Empfindungen ſtatt haben, ohne daß die äußern Organe dazu erſt den Reiz angeben, dieſe Empfindungen ſcheinen am Urſprunge der Nerven oder im Hirn zu entſtehen, man nennt ſie Träume, es ſind dies durch zufällige Urſachen hervorgebrachte Empfindungen.

Unter Vereinigungspunkt der Nerven oder Central-Maſſen muß man nicht blos das Hirn verſtehen, ſondern auch das ſogenannte verlängerte Mark, welches um ſo kleiner iſt, je höher das Thier auf der Stufe der Organiſation ſteht. Beym Menſchen macht es eine vom Hirn nur etwas getrennte Maſſe aus, und ſteht mit dem Hirn in unmittelbarer Verbindung. Bei den Reptilien aber iſt das verlän-

Digitized by Google

gerte Mark bedeutender als das Hirn, und steht weniger mit ihm in Verbindung, bis endlich das Hirn in den untern Classen ganz fehlt, das verlängerte Mark aber um so grösser ist, so daß also hier der Sitz der Empfindung ohne eigentliches Hirn vorhanden ist.

Die Aufnahme der Empfindung durch das Bewußtseyn, bringt eine Vorstellung der erhaltenen Empfindung hervor. Wir suchen die Ursache der Empfindung ausser uns, und so entsteht die Vorstellung des Gegenstandes, welcher sie hervorgebracht hat. Nach einem nothwendigen Gesetze, welches uns der Verstand an die Hand giebt, sind alle Ideen der materiellen Gegenstände in Zeit und Raum beschränkt.

Die im Sensorium empfangenen Reitze, lassen daselbst Eindrücke zurück, welche sich wieder auffrischen können, und dem Geiste die erhaltenen Vorstellungen und Ideen zurück rufen. Dies ist das Gedächtniß, eine körperliche Eigenschaft, welche sehr nach dem Alter und der Gesundheit sich ändert. Verwandte Ideen, oder solche, welche zur nemlichen Zeit erhalten werden, rufen eine die andere zurück, so entsteht die Ideenverbindung. Die Ordnung, die Ausdehnung und die Schnelligkeit mit welcher diese Ideenverbindung geschieht bestimmt die Vollkommenheit des Gedächtnisses. Jeder Gegenstand stellt sich im Gedächnisse mit allen seinen Eigenschaften und mit allen damit verbundenen Nebenideen vor. Der Verstand aber hat die Kraft, die zufälligen Ideen der Gegenstände trennen, diejenigen aber vereinigen zu können, welche sich zugleich bei mehrern Gegenständen finden, und so sie sich unter einer allgemeinen Idee zu denken, deren Gegenstand in der That nirgends vorhanden ist, und sich

Digitized by Google

nirgends als abgesondertes Wesen zeigt: Dies nennt man Abstraktion.

Jede Empfindung ist mehr oder minder angenehm, oder unangenehm. Erfahrung und wiederholte Versuche, belehren bald, wie die angenehmen zu erhalten, die unangenehmen auszuweichen seyen, und der Verstand bildet sich in dieser Hinsicht allgemeine Regeln, um den Willen nach diesen Erfahrungen zu leiten.

Eine angenehme Rührung kann ausser dem ersten Eindruck, den sie auf den Verstand macht, auch noch andere Ideen erwecken, und umgekehrt kann diese zweite Ideenverbindung wieder auf die erste Rührung zurückführen, und so kann der Verstand in dieser Hinsicht die allgemeinen Gesetze ändern, dies nennt man Klugheit. Die Anwendung der Regeln auf allgemeine Ideen, bedingt Gewisse Formeln, welche sich leicht einzelnen Fällen anpassen lassen, dies nennt man Urtheilskraft. Eine lebhafte Erinnerung an früher empfundene Rührungen und daher entstandener Ideen, an empfundene Vergnügungen oder Unannehmlichkeiten bildet die Einbildungskraft.

Der Mensch allein hat den Vorzug erhalten, allgemeine Ideen zu fassen, und dieselben auf besondere mehr oder minder willkührliche Vorstellungen anzupassen, sie dadurch leicht seinem Gedächtniße einzuprägen, und aus diesen einzelnen Vorstellungen sich die allgemeinen Ideen wieder zurückzurufen, von welchen die besondern Vorstellungen ausgegangen sind. Die Verbindung dieser Vorstellungen nennt man Zeichen; die Zusammenstellung der Zeichen aber Sprache. Wenn die Sprache durch Töne hervorgebracht wird, so heißt sie Wort oder Stimme.

Digitized by Google

Bezieht sie sich aber auf Zeichen, welche nur das Gesicht bemerkt, nennt man sie Sprachzeichen oder Hyeroglyphen. Die Schrift bezeichnet durch eine Folgenreihe von Sprachzeichen dem Gesicht Vorstellungen und Begriffe, und drückt sie durch Worte aus; die Schrift ist daher eine hyeroglyphische Vorstellung der Ideen. Diese Fähigkeit allgemeine Ideen durch Zeichen darzustellen, und seine eigenen Gedanken einem andern auf diese Art mitzutheilen, dem Gedächtniße nachzuhelfen, und so ohne Verwirrung eine unendliche Reihenfolge von Gedanken sich folgen zu lassen, sich einander mitzutheilen, ohne sich zu sehen oder zu hören, und so einmal erkannte Wahrheiten oder Entdeckungen den entfernten Jahrhunderten zu überliefern, ist der Triumpf aller Vorzüge, welche den Menschen vor dem Thiere auszeichnen, einen Vorzug den er allein seiner Vernunft zu danken hat.

Auch die vollkommensten Thiere stehen in Hinsicht der Vernunft unendlich weit unter dem Menschen, aber dennoch ist es erwiesen, daß ihr Verstand ähnlicher Combinationen fähig ist. Sie betragen sich in Folge erhaltener Rührungen, sie sind für daurende Leidenschaften empfänglich; sie erlangen durch Erfahrung eine gewisse Kenntniß der Umstände, nach welchen sie sich richten, unabhängig von den Beschwerden und Vergnügungen des Augenblicks, sind sie im Stande, gewisse Folgerungen zum voraus zu machen. Diejenigen Thiere, welche unter der unmittelbaren Herrschaft des Menschen leben, fühlen ihren Sklavenstand, sie wissen, daß das Wesen, welches sie straft, die Freyheit hat, es zu thun oder zu lassen, sie schmiegen und unterwerfen sich daher, wenn sie sich schuldig glauben, oder wenn

Digitized by Google

ſie glauben, den Menſchen erzürnt zu haben. Sie vervollkommnen oder verſchlimmern ſich in der Geſellſchaft des Menſchen; ſie ſind der Nachahmung, der Eiferſucht fähig; ſie haben unter ſich ſelbſt eine verſtändliche natürliche Sprache, welche ihre augenblicklichen Gefühle bezeichnet, aber der Menſch hat ſie eine viel zuſammengeſetztere Sprache kennen lernen, durch welche er ihnen ſeinen Willen kund thut, und ſie zwingt, ihm Folge zu leiſten. Mit einem Wort, man bemerkt unter den Thieren der höhern Klaſſe einen gewiſſen Grad von Vernunftſchlüſſen, mit allen ihren guten oder ſchlimmen Folgen, ungefähr wie bei Kindern, welche noch nicht reden können. Je nach dem Grade, in welchem das Thier ſich vom Menſchen entfernt, werden die höhern Geiſteseigenſchaften ſchwächer, und in den unterſten Klaſſen beſchränken ſie ſich blos auf wenige oft ſelbſt noch undeutliche Zeichen der Empfindlichkeit: auf wenige ſchwache Bemühungen dem Schmerz zu entgehen. Die Abſtufungen zwiſchen dieſen beiden Extremen ſind unendlich.

Bei einer ſehr großen Zahl von Thieren iſt dagegen eine Eigenſchaft vorhanden welche vom Verſtand unterſchieden werden muß, und welche man Inſtinkt nennt. Der Inſtinkt, oder geheime Trieb zwingt ſie gewiſſe Handlungen zu begehen, welche die Erhaltung der Art bezwecken, dieſe Handlungen ſcheinen aber auch oft den Bedürfniſſen des Thieres fremd zu ſeyn, oft erſcheinen ſie ſehr zuſammengeſetzt, und den Handlungen des Verſtandes ſich annäherend, welcher indeß eine weit größere Vorſehungsgabe, weit mehr Kenntniße vorausſetzen würde, als man dieſen Thieren nach allen andern Umſtänden zutrauen darf.

Digitized by Google

Die Handlungen des geheimen innern Triebes, sind nicht Folge der Nachahmung, denn die Individuen, welche sie ausüben, haben sie oft niemals von andern ausüben sehen; sie stehen in keinem Verhältniß mit den Verstandeskräften, aber sie werden um so sonderbarer, um so geschickter, je mehr die Thiere den untern Klaßen angehören, während alle übrigen Handlungen dieser Geschöpfe um so einfacher sind.

Sie bezeichnen so bestimmt eine Art, daß alle Individuen derselben Art, sie gleichartig ausüben, ohne darin etwas zu vervollkommnen. Zum Beispiel die Arbeitsbienen bauen, seit Erschaffung der Art, sehr künstliche Gebäude, berechnet nach den sinnreichsten Schlüssen der Rechenkunst, und bestimmt, eine Nachkommenschaft zu erhalten, die nicht einmal von ihnen abstammt.

Die Hummeln und Wespen bauen eben so künstliche und zusammengesetzte Gebäude, um ihre Eier darein zu legen. Aus diesen Eiern entstehen Würmer, die niemals ihre Mutter gesehen haben, die keinen Begriff von der Art des Baues ihrer Gefängniße haben, und welche doch, wenn sie einmal in vollkommene Insekten sich verwandelt haben, Gebäude verfertigen, ganz ähnlich denen ihrer Mutter.

Man kann sich keinen deutlichen Begriff machen, was Instinkt sey; man muß annehmen, daß im Sensorium dieser Thiere gewisse angeborne und sich immer gleich fortpflanzende Vorstellungen vorhanden seyen, welche sie zwingen so zu handeln, wie ihre gewöhnlichen oder zufälligen Bedürfnisse es erfordern. Es ist eine Art von Traum oder Einbildung, welcher ihnen beständig vorschwebt, und sie

in

in ihren nothwendigen Handlungen leitet; man könnte sie dem Zustande der Nachtwandler beym Menschen vergleichen.

Der Instinkt ist dem Thiere statt der Vernunft gegeben, und setzt sie in den Stand, mit Kraft und Geschick die Handlungen auszuüben, welche zur Erhaltung jeder Art nöthig sind.

Man findet nirgends ein Organ, welches zum Sitze des Instinkts dienen könnte: der Verstand dagegen ist immer in vollkommenem Verhältniß mit der Größe des Hirnes, und vorzüglich mit der Größe der Halbkugeln des Hirnes.

Methode, das Thierreich einzutheilen.

Nach dem was im Allgemeinen über die verschiedenen Grundsätze gesagt worden ist, nach denen man bey Eintheilung der Thiere zu verfahren hat, ist nun zu bestimmen, welches die wichtigsten Hauptcharaktere der Thiere seyen, auf welchen die Grundlage der ersten Eintheilung beruhet. Sehr natürlich werden diese Charaktere sich auf die thierischen Verrichtungen der Empfindung und Bewegung beziehen müssen, denn diese machen das Wesen des Thieres aus, sie bestimmen so zu sagen das Wesen der Thierheit. Die Beobachtung bestätigt diese Grundsätze vollkommen, und zeigt, daß der Grad der Entwicklung, und der innigen Verbindung der Verrichtungen mit denjenigen Organen, welche zur Ausübung der vegetativen Verrichtungen bestimmt sind, in Einklang stehen. Das Herz und die Circulation machen eine Art Vereinigungspunkt für

Digitized by Google

die blos organischen Verrichtungen, wie das Hirn- und Nervensystem für die thierischen. Wir sehen nun aber, daß beyde diese Systeme mit einander einfacher werden und mit einander verschwinden. In den Thieren der untersten Classe, wo keine sichtbaren Nerven mehr sind, finden sich auch keine deutlichen Fasern mehr, die Verdauungsorgane bilden eine einfache Höhle in dem aus gleichartiger Maße bestehenden Körper. Ja das Gefäßsystem verschwindet, ehe das Nervensystem ganz verschwunden ist, in den Insekten. Im Allgemeinen aber entspricht die Vertheilung der Nervenmaße der Vertheilung der Muskeln. Ein Rückenmark, an welchem eine Menge Knoten und Geflechte ebenso viele kleine Gehirne bilden, findet sich in denjenigen Thierkörpern, welche aus zahlreichen Ringen zusammengesetzt sind, und die aus diesen Knoten entstehenden Nerven vertheilen sich an die Gliederpaare, welche der Länge des Körpers nach liegen.

Die Uebereinstimmung gewisser Formen, welche der Bildung und Ordnung der Bewegungsorgane entsprechen; die Bildung der Nervenmaßen, und die Kräfte, welche sich in den Organen des Kreislaufes äußern, geben uns zusammen die Grundlage an die Hand, auf welche sich die Hauptabtheilungen des Thierreiches gründen lassen. Bey jeder dieser Abtheilungen aber müssen wir genau bestimmen, welche Charaktere einander entsprechen und von einander abhängen, dies wird uns die Grundsätze zur Bildung von Unterabtheilungen an die Hand geben.

Digitized by Google

Allgemeine Eintheilung des Thierreichs in vier große Abtheilungen.

Wenn man nun das Thierreich nach den eben angeführten Grundsätzen betrachtet, und keine Vorliebe für die ältern Eintheilungen hat, wenn man bloß auf die Organisation und auf die natürlichen Eigenschaften der Thiere sieht, nicht aber auf ihre zufällige Größe, oder ihren bekannten Nutzen für uns, oder auf andere zufällige Umstände, so wird man finden, daß vier hauptsächliche Formationen aufzustellen sind, vier Generalmodelle, nach welchen die Natur alle Thiere geformt hat, man wird finden, daß die besten Ordnungen, mit welchem Namen sie auch von den Naturforschern bezeichnet worden seyn mögen, sich nur auf leichte Modificationen gründen, hergenommen von der Entwicklung oder dem Hinzukommen einiger Organe, welche im Wesentlichen die Ordnung nicht ändern.

Bey der ersten dieser Formen, welche den Menschen und die Thiere, welche ihm an Bildung am meisten gleichen, in sich begreift, ist das Hirn und das Rückenmark, als der Hauptstamm des Nervensystems in einer Knochenhöhle eingeschlossen, welche vom Schedel und den Wirbeln gebildet wird; an der Seite dieser Mittelsäule, sind die Ribben befestigt, und die Knochen alle, welche das Hauptgerüst des Körpers bilden; die Muskeln bedecken überall die Knochen und setzen sie in Bewegung, und die Eingeweide sind im Schedel und im Rumphe eingeschlossen. Die Thiere dieser Abtheilung nennt man am schicklichsten: Wirbelthiere (animalia vertebrata). Sie haben alle rothes Blut, ein muskulöses Herz, einen Mund mit zwey auf-

Digitized by Google

einanderliegenden Kinnladen; entwickelte Organe für Geſicht, Gehör, Geruch und Geſchmack, welche alle am Kopfe liegen; niemals mehr als 4 Bewegungsglieder; immer getrennte Geſchlechter, und eine beynahe ähnliche Vertheilung der Markmaßen und der Verzweigung des Nervenſyſtems. Unterſucht man genauer jeden Theil dieſer großen Abtheilung, ſo wird man allenthalben auf große Aehnlichkeiten ſtoßen, ſelbſt in den Arten, welche ſich durch ihre Bildung gar ſehr von den andern zu entfernen ſcheinen, und man wird finden, daß ſie alle als Glieder einer Kette zu betrachten ſind, vom Menſchen bis zum Fiſche herunter.

Bey der zweyten Hauptform findet ſich kein knöchernes Gerüſte; die Muskeln ſind an der Haut befeſtigt, welche als eine weiche Hülle den Körper einhüllt, dieſe Hülle iſt nach verſchiedener Richtung zuſammenziehbar; bey vielen Arten ſind kalkartige Schalen, mit dieſer Haut enge verbunden, deren Lage und Entſtehung ihrem ſchleimichten Körper entſpricht. Das Nervenſyſtem iſt mit den Eingeweiden von der allgemeinen Haut eingeſchloſſen, und beſteht in zerſtreuten Maſſen, die unter einander durch Nervenfäden verbunden ſind, der Hauptſtamm liegt am Schlunde, und hat den Namen Hirn erhalten. Von den Sinnen, welche die vorige Abtheilung beſitzt, erkennt man hier nur noch den des Geſchmacks und des Geſichts, letzterer mangelt aber oft. Eine einzige Familie hat auch Organe für das Gehör. Bey allen iſt ein vollkommenes Circulationsſyſtem und eigene Athmungsorgane. Die Organe der Verdauung und der Abſonderungen ſind beynahe ſo zuſammengeſetzt, wie bey den Wirbelthieren. Dieſe Thiere

der zweyten Form kann man Weichthiere (animalia mollusca) nennen.

Obschon das allgemeine Model ihrer Formation nicht so gleichartig ist, wie bey den Wirbelthieren, besonders in Hinsicht der Bildung der äußern Theile, so ist doch immer unter den einzelnen Theilen eine große Aehnlichkeit im Baue und den Verrichtungen.

Die dritte Form ist die der Insekten und Würmer. Das Nervensystem besteht hier in zwey langen Strängen, welche längs dem Bauche liegen, und von Distanz zu Distanz in Geflechte und Knoten aufgeschwollen sind. Das erste dieser Geflechte liegt am Schlunde, und heißt Hirn, ist aber nicht größer als die andern. Die Hülle ihres Körpers ist durch Falten in eine gewisse Zahl Ringe eingetheilt, deren Decke bald hart, bald weich ist, in beyden Fällen aber sind die Muskeln an dieser Hülle befestigt. Der Körper hat oft an seinen Seiten gegliederte Füße, oft aber mangeln sie. Diese Thiere kann man Gliederthiere (animalia articulata) nennen.

Bey diesen Thieren bemerkt man den Uebergang von Circulation in festen Gefäßen zur bloßen Einsaugung der Nahrungsstoffe, und ebenso den Uebergang von bestimmten Athmungsorganen, in bloße Luftgefäße oder Kanäle, die im ganzen Körper verbreitet sind. Die Organe des Geschmacks und Gesichts sind deutlich ausgebildet; bey einer einzigen Familie auch das Gehör. Ihre Kinnladen, wenn solche vorhanden sind, stehen immer an den Seiten des Kopfes.

Die vierte Form endlich, umfaßt alle Thiere, welche unter dem Namen der Pflanzenthiere (Zoophyten) bekannt

Digitized by Google

sind. Man kann sie ihres Baues wegen Strahlenthiere (animalia radiata) nennen.

Bey allen vorigen Abtheilungen waren die Organe der Bewegung und der Sinne auf symetrische Weise auf beyden Seiten einer Are befestigt, bey dieser letzten Classe stehen sie dagegen rund um einen Mittelpunkt. Sie nähern sich an Einförmigkeit den Pflanzen; man bemerkt hier weder ein bestimmtes Nervensystem, noch entwickelte Sinnen. Nur bey einigen wenigen bemerkt man eine schwache Spur von unvollkommener Circulation. Die Athmungsorgane sind meist an der Oberfläche des Körpers. Die meisten haben statt aller Verdauungsorgane, einen blinden Sack, und die letzten Familien endlich stellen nichts als eine bewegliche und empfindliche gleichartige gallertartige Maße dar *).

*) Alle frühern Systematiker theilten die Thiere ohne Wirbel in zwey Classen, Insekten und Würmer. Cuvier prieß diese neue Eintheilung zuerst in einer Abhandlung an, welche er der naturforschenden Gesellschaft in Paris unterm 10. May 1795 vorlas, welche in der Decade philosophique gedruckt ist. Er bemerkte die Charaktere und die Gränzen, welche die Weichthiere, die Krustenthiere, die Insekten, die Würmer, die Stachelhäute und die Pflanzenthiere trennen. In einer andern Vorlesung vom 31. December 1801 unterschied er die Würmer mit rothem Blut oder Ringelwürmer. Nachher theilte er diese verschiedenen Classen in drey Ordnungen, ähnlich denen der Wirbelthiere, in einer Vorlesung beym Nationalinstitut im Juli 1812, welche in den Annalen des Museums Band XIX. gedruckt ist.

Digitized by Google

Erste große Abtheilung des Thierreichs.

Wirbelthiere.

Der Körper dieser Thiere ist auf ein Gerüste gestützt, welches aus vielen mit einander verbundenen Knochenstücken besteht; durch diese Einrichtung erhalten alle Bewegungen eine bestimmte Richtung und Kraft, und die Festigkeit der knöchernen Stütze erlaubt dem Körper eine ansehnliche Größe zu erreichen; unter dieser Abtheilung finden sich daher die größten Thiere. Das Nervensystem bezieht sich auf ein gemeinschaftliches Sensorium, die Centralmaßen, woraus es gebildet wird, sind sehr groß, daher haben alle ihre Empfindungen Dauer und Kraft, und die Geistesfähigkeiten sind überwiegend und vollkommener, als bey den Thieren der folgenden Classen.

Der Körper besteht immer aus Kopf, Rumpf und Gliedern. Der Kopf wird durch den Schedel, welcher das Hirn einschließt, durch das Gesicht, durch die Kinnladen und durch die Höhlen gebildet, welche die Sinne aufnehmen.

Der Rumpf wird durch die Wirbelsäule und die Ribben unterstützt. Die Wirbelsäule ist aus beweglichen Wirbeln, von denen einer auf dem andern steht, zusammengesetzt, der oberste Wirbel trägt immer den Kopf, und die ganze Säule schließt einen Kanal ein, in welchem der gemeinschaftliche Bündel von Nervenmark liegt, welcher das Rückenmark heißt. Bey den meisten Thieren verlängert sich die Wirbelsäule in einen Schwanz, indem sie über den übrigen Körper vorspringt.

Ribben nennt man knöcherne oder knorplichte Halb-

Digitized by Google

zirkel, welche von der Seite die obere Höhle des Rumpfes bilden und schützen. Bey den meisten Thieren befestigen sie sich auf der hintern Seite durch Gelenke an den Wirbeln und vorn am Brustbein. Bey einigen sind sie sehr klein, unvollkommen und kaum bemerkbar.

Niemals sind mehr als zwey Paar Füße; zuweilen mangelt das eine oder andere, oder alle beyde Paare, und nehmen, je nachdem sie Bewegungen auszuführen haben, verschiedene andere Formen an. Die vordern Glieder sind entweder Hände oder Füße, oder Flügel, oder Floßen; die hintern Füße oder Floßen. Das Blut ist immer roth, und hat diejenige Zusammensetzung, welche zur Unterhaltung der Muskel- und Nervenkraft nöthig ist, aber diese Zusammensetzung ist bey den Classen verschieden, und bezieht sich vorzüglich auf die Stoffe, welche durch das Athmen aufgenommen werden. Diese Verschiedenheit bedingt die Unterabtheilung der Wirbelthiere in vier verschiedene Classen.

Die äußern Sinnorgane bestehen immer aus zwey Augen, zwey Ohren, zwey Naselöchern. Der Geschmack liegt bey den meisten in der Zunge und ihren Bedeckungen, und das Gefühl hat seinen Sitz in der Haut.

Die Nerven gelangen zum Rückenmark, oder kommen vielmehr von ihm durch eigene Löcher, welche zwischen den Wirbeln liegen, oder sie gelangen durch Schedellöcher zum Hirn. Alle Nerven scheinen sich im Rückenmark in einen doppelten Bündel zu vereinigen, aus welchen dieses deutlich besteht. Diese Bündel sind durch Faden mit einander verbunden und bilden ein Ganzes, an dessen oberm Ende das Mark sich in die verschiedenen Erhöhungen entfaltet,

Digitized by Google

und indem es an Maße zunimmt, das Gehirn bildet. Der obere Theil des Hirnes bildet zwey markige Halbkugeln, deren Größe das Maaß der Verstandeskräfte bestimmt, welche jedes Thier erhalten hat.

Bey allen Thieren dieser Classe sind zwey Kinnladen; die untere ist hauptsächlich beweglich, indem sie auf- und abwärts geht; die obere ist sehr oft ganz fest; diese Kinnladen sind bey den mehrsten Arten mit Zähnen versehen; dieses sind Auswüchse eigener Art, in Hinsicht ihrer Zusammensetzung chemisch den Knochen gleich, aber sie wachsen schichtweise und entstehen durch ausschwitzen von Knochenmaterie. Eine ganze Classe, die der Vögel, hat Kinnladen, welche mit hornartiger Substanz bekleidet ist; eben so haben die Schildkröten, aus der Classe der kriechenden Thiere, ähnliche Kinnladen.

Der Darmcanal geht vom Munde zum After und ist an einigen Stellen weiter, an andern enger, mit Anhängen versehen. In seinem Innern sondern sich Säfte ab, welche zur Auflösung von Speisen dienen, die einen, welche sich im Munde ergießen, heißen Speichel, die andern aber, welche sich in den Darmcanal ergießen, haben verschiedene Namen: die beyden vorzüglichen sind der Saft der Bauchspeicheldrüse, und die Galle, welche in einem großen drüsenartigen Eingeweide in der Leber abgesondert wird.

Indem die Nahrungsmittel den Darmcanal durchlaufen, lösen sie sich nach und nach auf, und diejenigen Theile, welche zur Ergänzung des Blutes dienen, welche Milchsaft genennt werden, werden durch eigens dazu bestimmte Gefäße, die Milchgefäße, eingesogen und in die

Digitized by Google

Venen gebracht. Aehnliche Gefäße nehmen von andern Theilen Säfte auf, welche schon abgesondert waren, und bringen sie ebenfalls in die Venen, diese sämmtlichen Gefäße bilden das System der einsaugenden oder Lymphgefäße. Die Venen bringen das Blut, welches nicht zur Ernährung der Theile verwendet wurde, zum Herzen zurück, nachdem es durch Aufnahme des Chylus und der Lymphe schon wieder neue Theile aufgenommen hat. Allein dieses zurückgekommene Blut, muß nun entweder alles oder doch großentheils durch die Athmungsorgane gehen, um hier neue Theile aufzunehmen, wodurch es in Pulsaderblut verwandelt wird, und nun so verändert zum Herzen zurückkommt, um von da aus durch die Pulsadern aufs Neue den Kreislauf durch den Körper zu beginnen. In den drey ersten Klassen besteht das Athmungsorgan in Lungen, das heißt in Theilen, welche schwammig und so aus Zellen gebildet sind, daß sie Luft aufnehmen können. In den Fischen hingegen findet man Kiemen oder Plätchen, die in einer gewissen Ordnung liegen, an den Wänden dieser Plätchen sind viele Gefäße, und das Wasser tritt zwischen sie ein und zersetzt sich.

Bey allen Wirbelthieren ist das Blut, welches zur Leber geht, und zur Absonderung der Galle bestimmt ist, venoses Blut, welches in den Eingeweiden des Unterleibs circulirt hat, und sich dann in einen gemeinschaftlichen Stamm sammelt, welcher die Pfortader heißt, dieser Stamm vertheilt sich in der Leber aufs neue in Aeste, und diese sondern die Galle ab.

Alle diese Thiere sondern auch Harn ab, diese Absonderung geschieht in zwey großen Drüsen, welche zur Seite

Digitized by Google

der Rückenwirbel liegen und Nieren heißen. Der abgesonderte Harn wird meist in einem Gefäß angesammelt und aufbewahrt, welches die Harnblase heißt.

Die Geschlechter sind getrennt. Die Weibchen haben immer ein oder zwey Eierstöcke, aus welchen die Eier sich nach der Empfängniß losreißen. Das Männchen befruchtet durch den Saamen, aber die Art, wie diese Befruchtung geschieht, ist sehr verschieden. In den meisten Thieren, welche die drey ersten Klassen bilden, wird zur Befruchtung ein Eindringen des männlichen Saamens in die weiblichen Geschlechtstheile erfordert, bey einigen Reptilien und bey den meisten Fischen geschieht die Befruchtung außerhalb dem mütterlichen Körper, wenn die Eier schon gelegt sind.

Unterabtheilung der Wirbelthiere in vier Klassen.

Im vorigen Abschnitt wurde gezeigt, bis auf welchen Grad die Wirbelthiere sich ähnlich sind; dieser Aehnlichkeit ungeachtet ergiebt sich bey näherer Vergleichung, daß man sie füglich in vier große Untergbtheilungen bringen kann, welche durch die Art oder auch durch die Kraft ihrer Bewegungen sich unterscheiden lassen, welche Verrichtung wieder von der Menge der Luft abhängt, welche eingeathmet wird, indem es ausgemacht ist, daß die Muskelfibern durch die Respiration wenigstens einen großen Theil ihrer Kraft und Reitzbarkeit erhalten. Die Quantität der eingeathmeten Luft hängt vorzüglich von zwey Punkten ab: Zuerst von der Menge des Blutes, welches in einem gewissen Zeitraume in die Athmungsorgane dringt; dann zweytens von

Digitized by Google

der Menge des Sauerstoffes, welcher ins Blut überzugehen bestimmt ist. Die Quantität des Blutes, welche auf einmal Luft einnimmt, hängt vom Bau der Organe des Athmens und der Circulation ab.

Die Organe der Circulation sind bey den einen Thieren doppelt, und so eingerichtet, daß alles Blut, welches von den Theilen durch die Venen zum Herzen zurückkommt, nun gezwungen ist, den Weg durch die Lungen und von da wieder zum Herzen zurückzunehmen, ehe es vom Herzen aus wieder in die Arterien strömt; bey den andern aber ist der Kreislauf einfach, so daß nemlich ein Theil des circulirenden Blutes, indem er durch die Athmungsorgane geht, neue Stoffe aufnimmt, während der andere ohne dies zu thun, zum Herzen zurückkehrt. Dieser letzte Fall hat bey den Reptilien statt. Die Menge der eintretenden Luft und alle davon abhängigen Erscheinungen sind nach der Menge des Blutes verschieden, welches bey jedem Herzschlag in die Lungen strömt.

Die Fische haben zwar doppelten Kreislauf, aber ihre Athmungsorgane sind so eingerichtet, daß sie durch das Wasser athmen können; und ihr Blut leidet Veränderungen, je nachdem mehr oder minder Sauerstoff im Wasser enthalten ist, so daß sie wahrscheinlich noch weniger Stoffe aufnehmen, als die Reptilien.

Bey den Säugethieren ist der Kreislauf doppelt, die Luftathmung aber einfach, das heißt, sie geht allein in den Lungen vor. Die Menge der Luft, welche sie einathmen, ist größer, als bey den Reptilien und Fischen, da bey den ersten die Organe weniger vollkommen sind, bey den letzten hingegen das umgebende Element weniger Luft enthält.

Digitized by Google

Die Vögel hingegen athmen noch mehr Luft als die Säugethiere, da sie nicht nur einen doppelten Kreislauf und Luftathmung haben, sondern außer den Lungen die Luft noch überdies durch mehrere andere Kanäle in den Körper bringt, so dringt die Luft bey ihnen durch den ganzen Körper, und berührt die Aeste der Aorta oder der Pulsadern des übrigen Körpers eben so gut als die der Lungen.

So bilden sich also vier Arten von Bewegungen, welche die vier Klassen der Wirbelthiere charakterisiren. Die Säugethiere, welche eine mittelmäßige Menge Luft einathmen, sind überhaupt zum Gehen und Laufen geschickt, wobey sie viel Kraft entwickeln; die Vögel, welche eine noch größere Menge Luft einathmen, haben Kraft und Leichtigkeit zum Flug erhalten; die Reptilien athmen wenig Luft, und sind daher blos zum Kriechen geschickt *), und mehrere unter ihnen bringen einen Theil ihres Lebens in einem Zustand von Erstarrung zu. Die Fische endlich hatten eigene Werkzeuge nöthig, um sich in einem Elemente zu bewegen, welches beynahe dieselbe spezifische Schwere hat, wie sie selbst.

Die Einzelnheiten des Baues, welche jeder dieser vier Klassen eigen sind, und vorzüglich die Organe der Bewegung und der äußern Sinne, müssen nothwendig in Bezug mit den wesentlichen Charaktern derselben stehen und mit ihnen harmoniren.

Die Klasse der Säugethiere hat indeß vorzüglich

*) Einige auf dem Land lebende Reptilien sind jedoch sehr schnell und behende, und ihre Muskelkräfte sind groß, z. B. Eidechsen, Krocodile.

darin etwas auszeichnendes, daß alle dahin gehörigen Thiere lebend gebärend sind, daß alle ihre schon gebildeten Jungen eine gewisse Zeit in der Gebärmutter tragen, wo sie durch die Nabelgefäße aus dem Mutterkuchen, der mit den Wänden und Gefäßen des Uterus in Verbindung steht, unmittelbar Säfte von der Mutter erhalten, und so sich nähren, daß sie alle nach der Geburt ihre Jungen durch die in den Brüsten bereitete Milch säugen. Die übrigen drey Klassen sind dagegen größtentheils eierlegend, und wenn man sie im Allgemeinen mit der ersten Klasse vergleicht, so findet man gewisse Aehnlichkeiten, wodurch sie sich in der allgemeinen Anlage ihrer Rückenwirbel mehr gleichen, als den Säugethieren.

Erste Klasse der Wirbelthiere.

Säugethiere.

Man stellt die Säugethiere an die Spitze der Thierwelt, nicht blos um deswillen, weil wir selbst zu dieser Klasse gehören, sondern weil sie überhaupt die meisten Fähigkeiten und die feinsten Sinne besitzen und der mannigfaltigsten Bewegungen fähig sind, weil bey ihnen alle diese Eigenschaften dahin wirken, auch die höhern Geisteskräfte in Thätigkeit zu setzen, wodurch sie nicht blos blindlings dem Instinkt zu folgen gezwungen sind, sondern sich vervollkommnen und je nach den Umständen ihre Handlungen einrichten können.

Da die Menge der Luft, welche sie einathmen, nicht sehr groß ist, so sind sie im Allgemeinen dazu geschaffen, auf der Erde zu gehen, aber ihr Gang ist voll Kraft, und

Digitized by Google

kann lange fortgesetzt werden, da alle Gelenke ihres Scelettes so in einander passen, daß ihre Bewegungen mit Sicherheit und Leichtigkeit geschehen.

Einige aus dieser Klasse können sich indeß in die Luft erheben, mit Hülfe ihrer verlängerten Glieder, zwischen welchen Häute ausgespannt sind; andere haben so verkürzte Glieder, daß sie nur im Wasser sich mit Schnelligkeit fortbewegen können, und in ihrem Aeußern mehr den Fischen ähnlich sind, ohne daß auf sie die allgemeinen Charaktere der Säugethiere weniger paßten.

Bey allen Thieren dieser Klasse ist die obere Kinnlade am Schedel befestigt, die untere besteht dagegen aus zwey Stücken, und articulirt durch einen Vorsprung, der am Schläfenbein befestigt ist. Der Hals hat sieben, bey einer einzigen Art neun Wirbel. Die wahren obern Ribben sind vorn an das Brustbein, welches aus mehrern Stücken zusammengesetzt ist, befestigt. Die vordern Extremitäten fangen mit dem Schulterblatt an, welches mit andern Knochen nicht articulirt, sondern bey vielen nur in den Muskeln versteckt ist; bey andern hingegen mit dem Brustbein durch einen Seitenknochen, welcher das Schlüsselbein heißt, sich verbindet. Diese Extremität besteht ferner aus dem Hinterarm, dem Vorderarm und der Hand, welche selbst wieder aus zwey Reihen von Knochen, welche Wurzelknochen heißen, zusammengesetzt ist, mit dieser Handwurzel steht die Knochenreihe von langen Knochen in Verbindung, welche die Mittelhand heißt, und mit diesen die Finger, welche ebenfalls wieder aus zwey oder drey Knochen zusammengesetzt sind.

Wenn man die Wallfische ausnimmt, so sind bey allen

Digitized by Google

andern die hintern Extremitäten an die Wirbelsäule befestigt, durch Knochen, welche um dieselbe eine Art von Gürtel bilden, welchen man das Becken nennt, dieses besteht bey jungen Thieren aus drey Paar Knochen, nemlich dem Darmbein, welches an der Wirbelsäule befestigt ist, dem Schaambein, welches vorn das Becken schließt, und dem Sitzbeine, welches den hintern und unterm Theil bildet. Da, wo diese drey Knochen sich vereinigen, ist eine Grube, in welche der Kopf des Hüftbeins paßt, und die Pfanne genennt wird. Die Extremität selbst besteht aus dem Hüftbein, dann dem Unterschenkel, welcher wieder aus dem Schienbein und Wadenbein zusammengesetzt ist, und dem Fuße, der ebenso gebaut ist, wie die Hand oder Vorderfuß und aus der Fußwurzel, dem Mittelfuß und den Zehen besteht.

Der Kopf ist immer durch zwey Knochenvorsprünge, welche an den obersten Wirbel oder Atlas passen, eingelenkt.

Das Hirn besteht immer aus zwey Halbkugeln, welche durch eine Markbrücke, den sogenannten Balken, vereinigt sind, in diesem Mark liegen ferner zwey Höhlen oder Ventrikel, und weiter unten zeigen sich vier Paar Erhabenheiten oder Hügelchen, welche gestreifter Hügel, Sehehügel, Hinterbacken und Testikel heißen. Zwischen den Sehehügeln liegt die dritte Hirnhöhle, welche mit der vierten, die unter dem kleinen Hirn liegt, in Verbindung steht; die Schenkel des kleinen Hirnes bilden immer unter dem verlängerten Mark einen Vorsprung, welcher die Varolsche Brücke heißt.

Das Auge liegt in seiner Augenhöhle, und ist durch zwey Augenlieder geschützt, ein Anfang eines dritten Augenliedes

genliedes ist ebenfalls vorhanden. Die Crystalllinse wird durch die Ciliarfortsätze befestigt, und die Hornhaut ist ganz einfach zellicht. An dem Organ des Gehörs ist eine Höhle zu bemerken, welche man Trommelhöhle nennt, diese ist auswendig durch das Trommelfell geschlossen, in der Höhle sind vier Knöchelchen, der Hammer, der Ambos, der Steigbügel und das linsenförmige Knöchelchen; ein Vorhof, an dessen Eingang der Steigbügel befestigt ist, dieser Vorhof steht mit drey halbcirculförmigen Canälen in Verbindung; ferner bemerkt man noch die Schnecke, welche mit der einen Mündung in die Trommelhöhle, mit der andern in den Vorhof sich öffnet.

Der Schedel ist aus Knochen gebildet, welche einen dreyfachen Gürtel vorstellen, der vordere besteht aus den beyden Stirnbeinen, und dem Siebbein. Der mittlere aus den Scheitelbeinen und dem Keilbein; und der hinterste aus dem Hinterhauptsbein. Zwischen Keilbein, Hinterhauptsbein und Scheitelbeinen sind die Schläfenbeine eingeschoben, von denen ein Theil zum Gesicht gehört. Im Fötus theilt sich das Hinterhauptbein in zwey Theile, ebenso der Körper des Keilbeins, von dem noch drey seiner Flügelpaare getrennt sind; das Schläfenbein bildet drey Knochen, von denen einer den Schedel schließt, der andere das Labyrinth des Ohres enthält, der dritte aber die Wand der Trommelhöhle bildet. Diese einzelnen Knochen verwachsen nach der Geburt in kürzerer oder längerer Zeit, je nach den Arten, und endlich bilden nur die erstgenannten Knochen den Schedel des erwachsenen Thieres.

Das Gesicht wird hauptsächlich durch die beyden Kinnladen gebildet, zwischen welchen die Nasenhöhle liegt: zwi-

schen den Kinnladenknochen liegen die beyden Zwischenkinnladenknochen eingekeilt, hinten aber verbinden sich die Kinnladenknochen mit den Gaumenknochen, zwischen welche die vorstehende Plate des Keilbeins steigt, welche die Pflugschaar heißt. Am Eingang des Nasenkanals liegen die Nasenknochen; an ihrer äußern Scheidewand befestigen sich die untern Muscheln, die obern Muscheln, welche den obern und hintern Theil der Nasenhöhle einnehmen, gehören zum Siebbein. Die Jochbeine vereinigen auf jeder Seite die Kinnladen mit den Schläfenbeinen, und oft mit den Stirnbeinen. Die Thränenbeine endlich füllen den innern Winkel der Augenhöhle aus, und bilden zuweilen einen Theil der Backen.

Die Zunge ist immer fleischig und muskulös, und am Zungenbein befestigt, welches mit dem Schedel durch Bänder verbunden und gleichsam aufgehängt ist.

Die Lungen haben immer zwey Flügel, und bestehen aus zahllosen Zellchen, sie liegen frey in der Brusthöhle, welche hinten durch die Wirbel, zur Seiten durch die Ribben, vorn durch die Brustbeine gebildet und unten durch den Zwerchmuskel von der Unterleibshöhle getrennt ist, inwendig ist sie mit der Brusthaut umkleidet. Das Organ der Stimme befindet sich immer am obern Ende der Luftröhre, am Luftröhrenkopf; eine fleischige Verlängerung, der Gaumensegel, ist so beschaffen, daß zwischen dem Luftröhrenkopf und der Nasenhöhle eine Verbindung statt hat.

Da die Säugethiere beständig auf der Oberfläche der Erde sich aufhalten, so sind sie weniger den Abwechslungen von Kälte und Wärme ausgesetzt, als die Vögel, ihr Körper hat daher eine mittelmäßig warme Bedeckung, und in den

Digitized by Google

warmen Ländern haben sie im Allgemeinen weniger Haare. Die Wallfischarten, welche beständig im Wasser leben, sind die einzigen Säugethiere, welche gar keine Haare haben.

Der Darmkanal wird durch Falten des Bauchfells, welche man Gekröse nennt, festgehalten, zwischen den Blättern dieses Gekröses liegen zahlreiche Drüsen, welche zum System der Milchgefäße gehören: eine andere Fortsetzung des Bauchfells bildet die sogenannten Netze, welche als eingehöhlte Blätter sich zwischen die Eingeweide einschieben und sie bedecken.

Der Harn sammelt sich in einer Blase an, und geht bey beyden Geschlechtern mit sehr weniger Ausnahme durch eine Harnröhre weg, welche die Geschlechtstheile durchbort.

Alle Säugethiere sind lebend gebärend; das will sagen, nach der Empfängniß geht der Fötus in die Gebärmutter herunter, und oft mit einer doppelten Hülle eingeschlossen, die äußere heißt die Lederhaut, diese setzt sich durch ein oder mehrere Gefäßnetze an der Wand der Gebärmutter fest, diese Gefäße bilden den sogenannten Mutterkuchen, und unterhalten zwischen dem Fötus und der Mutter eine Verbindung, indem sie dem Fötus von der Mutter her Nahrung zuführen, und wahrscheinlich erhält derselbe auf diesem Wege auch den nöthigen Sauerstoff. Indeß haben die Fötus der Säugethiere, wenigstens in den ersten Zeiten der Schwangerschaft, eine Blase, ähnlich der Nabelblase der Vögel und anderer eierlegender Thiere, bey diesen enthält diese Blase den Dotter und hängt durch Gefäße mit dem Darmkanal des Fötus zusammen, ebenso bemerkt man bey den Säugethieren eine ähnliche Verbin-

dung, nur verschwindet sie früher, als bey eierlegenden Thieren. Auch haben alle Säugethiere, außer den Menschen, noch eine andere Blase, welche mit der Urinblase in Verbindung steht und Allantois heißt.

Die zweyte innere Haut, welche den Fötus unmittelbar umgiebt, heißt die Schafhaut, sie umschließt den Fötus mit dem ihn umfließenden Wasser, welches das Schafwasser heißt.

Die Empfängniß erfordert immer eine wirkliche Begattung, der Saame des Männchens muß bis zur Gebärmutter des Weibchens dringen.

Die Jungen werden nach ihrer Geburt kürzere oder längere Zeit von der Mutter gesäugt, das will sagen, sie saugen aus den drüsigten Brüsten der Mutter einen nährenden Saft ein, welcher Milch heißt. Gleich nach der Geburt tritt bey den Müttern die Absonderung der Milch in den Brüsten ein, und dauert so lange, als die Jungen dieser zarten Nahrung bedürfen. Diese, allen Säugethieren gemeinsame Ernährungsart, und dieses allgemeine Daseyn der Brüste und der Milcherzeugung ist dieser Klasse eigen, und hat ihnen den Namen der Säugethiere gegeben, welcher sie recht gut charakterisirt.

Eintheilung der Säugethiere in Unterordnungen.

Die veränderlichen Kennzeichen, welche die spezifische Verschiedenheit der Säugethiere unter sich begründen, sind von den Organen des Gefühls hergenommen, da auf dem Bau dieser Organe die mehr oder mindere Geschicklichkeit

Digitized by Google

und Schnelligkeit des Ganges beruht, und ebenso von den Organen des Kauens, da diese die Art der Nahrungsmittel bestimmen, welche die Natur jedem Thiere angewiesen hat. Auf die Kauorgane beziehen sich nicht nur die unmittelbar auf die Verdauung Bezug habenden Verrichtungen, sondern auch noch mehrere andere spezifische Verschiedenheiten, welche sogar auf die intellectuellen Fähigkeiten Einfluß haben.

Die Vollkommenheit der Tastorgane beruht auf der Zahl und Beweglichkeit der Finger, und auf der mehr oder minder dichten Umhüllung der Fingerspitzen, welche bald mit einer Klaue, bald mit einer Art von hornigen Schuh versehen sind. Ein solcher Schuh, welcher die Spitze der Finger, da wo sie beym Gehen den Boden berühren, ganz umhüllt, muß das Getaste in diesem Theil ganz aufheben, und ebenso den Zehengliedern die Fähigkeit rauben, etwas damit zu fassen. Das entgegengesetzte Verhalten muß dann eintreten, wenn ein Nagel, der aus einer Platte besteht, nur den Rücken der Fingerspitze einnimmt, und so der entgegengesetzten Seite die ganze Feinheit des Getastes giebt.

Man kann aus dem Bau der Backenzähne und Kinnladen erkennen, welche Nahrung ein Thier genieße, denn auch selbst die Einlenkung der Kinnladen richtet sich nach dem Bau der Zähne. Um Fleisch zerreißen zu können, müssen die Backenzähne scharf und sägenartig gezähnt seyn, die Kinnladen aber sich wie eine Schere öffnen und schließen. Soll dagegen das Thier Körner kauen, so müssen die Backenzähne platte Kronen haben, und die Kinnladen müssen einer Seitenbewegung fähig seyn, um zermahlen zu kön-

Digitized by Google

nen; die Kronen müssen aber zugleich Unebenheiten haben, wie ein Mühlstein, und ihre Oberfläche muß ungleich hart seyn, und nicht zu gleicher Zeit abgerieben werden.

Alle Thiere mit hornigen Fußumhüllungen sind Grasfressend und haben platte und gereifte Backenzahnkronen, da ihre Füße ihnen nicht Geschicklichkeit geben, eine lebende Beute zu faßen. Die Thiere mit Klauen dagegen genießen mehrfache Nahrung, und außer der verschiedenen Form der Backenzähne, ist auch die Beweglichkeit der Zehen, und das in ihnen liegende Getaste an Feinheit verschieden. Vorzüglich bemerkt man in dieser Hinsicht eine Art des Fußbaues, welche außerordentlich viel beyträgt, den Gebrauch dieser Theile mannigfaltig zu machen, und sie geschickt anzuwenden, wenn nemlich ein abstehender Daum den andern Fingern entgegensteht, wodurch der Fuß das Vermögen erhält, auch ganz kleine Gegenstände zu fassen, dies nennt man eine Hand. Unter allen Thieren hat der Mensch die vollkommenste Hand, da die ganze Vorderhand frey ist, und zum Ergreifen angewendet werden kann.

Diese merkwürdigen und charakteristischen Verschiedenheiten geben die besten Unterscheidungsmerkmale der Ordnungen ab, und so kann man folgende Ordnungen aufstellen.

Unter den mit Nägeln begabten Thieren ist der Mensch das vorzüglichste, da er in jeder Hinsicht noch eine Menge anderer Vorzüge voraus hat. Er hat nur an den vordern Extremitäten Hände, und ist, das einzige zweyhändige Thier. Die hintern Extremitäten sind so gebildet, daß sie den Körper in scheitelrechter Richtung tragen.

Die dem Menschen am nächsten stehende Klasse ist die

Digitized by Google

der vierhändigen Thiere, welche an allen vier Extremitäten Hände haben.

Die Raubthiere haben keinen freyen Daum an den vordern Extremitäten.

Diese drey Ordnungen haben jede drey Arten von Zähnen, Backenzähne, Hauzähne oder Eckzähne, und Schneidezähne.

Die vierte Klasse bildet die Nagethiere, die Füße sind wenig von denen der Raubthiere verschieden, sie haben keine Eckzähne, vorn dagegen zwey Schneidezähne, welche so gestellt sind, daß sie damit auf ganz eigene Art kauen können.

Auf diese folgen Thiere, welche ihre Finger schon sehr ungeschickt brauchen können, da sie sehr große, krumme Nägel haben, welche die Spitzen bedecken: zugleich haben sie keine Schneidezähne, einige auch keine Eckzähne, ja bey einigen fehlen alle Zähne. Man kann sie daher unter dem Namen der Zahnlosen begreiffen.

In diese Klassen könnte man alle Klauenthiere eintheilen, und die Eintheilung würde eine vollkommene Kette von Thieren darstellen, wenn nicht Neuholland eine Klasse von Thieren besäße, welche sich eignen, eine eigene Seitenordnung daraus zu bilden: dies sind die Beutelthiere, deren Gattungen zwar unter sich Verwandtschaft haben, auf der einen Seite aber den fleischfressenden, auf der andern den Nagethieren sich nähern, und einige sogar den Zahnlosen, nach dem Bau ihrer Zähne und der Art ihrer Nahrung.

Die Thiere, deren Füße mit hörnenen Schuhen bekleidet sind, sind weniger zahlreich und zeigen weniger Abweichungen.

Digitized by Google

Die Wiederkauer bilden eine ganz bestimmte Ordnung, sie haben gespaltene Klauen oder Schuhe, in der Oberkinnlade keine Schneidezähne und vier Magen.

Alle andere Säugethiere mit Schuhen lassen sich in eine Ordnung bringen, welche man hufige Thiere nennen kann, mit Ausnahme des Elephanten, der eine eigene Ordnung ausmacht, welche eine sehr entfernte Aehnlichkeit mit den Nagern hat.

Zuletzt endlich kommen diejenigen Säugethiere, welche keine hintere Extremitäten haben und deren fischförmiger Körper und Aufenthalt im Wasser, sie zu einer eigenen natürlichen Ordnung bildet, so sehr auch alle ihre übrigen Verrichtungen mit denen der Säugethiere übereinstimmen. Die Alten nannten sie Fische mit warmem Blut oder Wallfische; sie vereinigen mit der Stärke der andern Säugethiere den Vortheil, vom Wasser getragen zu werden. In dieser Klasse kommen die gröfsten aller Thiere vor.

Erste Ordnung der Säugethiere.

Zweyhändige oder Menschen.

Der Mensch bildet nur eine Gattung, und diese Gattung bildet eine besondere Ordnung. Da die Geschichte der menschlichen Gattung uns vor allen angeht, da der Mensch das Ideal der Vollkommenheit ist, nach welchem wir andere Thiere beurtheilen, so ist es wohl billig, auch etwas mehr vom Menschen zu sagen.

Zuerst haben wir zu untersuchen, welche Eigenheiten uns jedes organische System des Menschen zeige, welche

hingegen er mit andern Thieren gemein habe; daraus wird sich ergeben, welche Vorzüge ihm die eigenthümlichen Eigenschaften gewähren und den Menschen über seine Mitgeschöpfe erheben. Dann werden wir zu zeigen suchen, wie viele ausgezeichnete Menschenraßen es gebe, und welche Charaktere jede auszeichne; endlich aber ist der Standpunkt zu bestimmen, wohin der Mensch durch seine Organisation sowohl in Hinsicht als einzelnes Individuum, als auch seiner gesellschaftlichen Verhältnisse gestellt werden müsse.

Besondere Bildung des Menschen.

Der menschliche Fuß ist in seiner Bildung sehr von dem der Affen verschieden. Er ist breit, der Schenkel steht scheitelrecht auf demselben; die Sohle ist unten aufgeschwollen; die Zehen sind kurz, und können sich nur schwer biegen; der Daum ist länger und dicker als die andern Zehen, und steht mit denselben auf einer Linie, nicht abstehend oder entgegensetzbar; der menschliche Fuß ist daher ganz dazu eingerichtet, den Körper zu tragen, dagegen ist er zum Fassen und Klettern nicht geschickt, und da auf der andern Seite die Hände nicht zum Gehen geschickt sind, so ist der Mensch das einzige zweyhändige und zweyfüßige Thier.

Der ganze Körper des Menschen ist zum aufrechten Gange geschaffen. Seine Füße breiter, als bey keinem andern Thiere, geben dem Körper eine feste Grundlage beym Stehen; die Muskeln, welche Fuß und Schenkel ausdehnen, sind sehr stark, daher sind Waden und Hinterbacken stärker und vorspringender, als sonst bey keinem Thier; die

Digitized by Google

Bieger des Unterschenkels setzen sich höher oben fest, daher kann das Knie sich ganz gerade strecken, und die Waden treten hervor; das Becken ist breiter, dadurch kommen auch die Schenkelköpfe weiter auseinander zu stehen, und der Rumpf erhält eine pyramidalische Form zum Halten des Gleichgewichts sehr bequem. Die Hälse der Schenkelköpfe bilden mit dem Körper des Schenkelknochen einen Winkel, der das Auseinanderstehen der Füße noch vermehrt und die Grundlage des Körpers breiter macht; der Kopf endlich steht in scheitelrechter Richtung auf der Wirbelsäule, und hält dem Rumpfe das Gleichgewicht, da sein Einlenkungspunkt unter die Mitte seiner Masse eingerückt ist.

Der Mensch kann auch mit dem besten Willen nicht geschickt auf allen Vieren gehen, sein Fuß ist kurz und unbiegsam, sein Schenkel zu lange, das Knie reicht daher fast auf die Erde; die Schultern stehen zu weit auseinander, und die Arme kommen zu weit über die Mittellinie des Körpers hinaus zu stehen, daher unterstützen sie den Körper nur schlecht; die großen Sägemuskeln, welche bey den Vierfüßern, den Rumpf zwischen die Schulterblätter, wie an einen Gurt aufhängen, sind im Menschen kleiner, als bey irgend einem andern Thiere; der Kopf ist schwerer, wegen der Größe des Hirnes, und wegen der Kleinheit der Knochenhöhlen der Schedelknochen: Zugleich sind auch die Muskeln zu schwach, um den Kopf hängend zu erhalten, um so mehr, als auch das Nackenband fehlt, und die Rückenwirbel die zu starke Biegung des Kopfs nach vorn hemmen; der Mensch kann daher höchstens den Kopf in der Linie der Wirbelsäule erhalten, dann aber sehen seine Augen zur Erde, und er kann nicht vor sich sehen;

Digitized by Google

der Mund ſteht zugleich nach unten: Die ganze Einrichtung dieſer Organe, iſt dagegen vortrefflich zum gewöhnlichen Stande des menſchlichen Kopfs geſchaffen.

Die zum Kopfe gehenden Pulsadern theilen ſich nicht in ſo viele Aeſte, wie bey den meiſten Säugethieren, daher das für die größere Hirnmaſſe nöthige Blut mit Gewalt zum Kopfe ſtrömt, und bey vorwärts gerichtetem Kopfe ſich anſammelt, und ſomit häufig Schlagflüſſe entſtehen müßten.

Der Menſch iſt einzig zum aufrechten Gange geſchaffen. So allein behält er den freyen Gebrauch ſeiner Hände, und kann damit Dinge verrichten, wie kein anderes Geſchöpf, und die Lage ſeiner Sinnesorgane, macht ihn zu den feinſten Wahrnehmungen fähig.

Dieſe Hände, ſchon ihrer Lage wegen ſehr vortheilhaft zum Gebrauche, ſind es nicht weniger durch ihren Bau. Der Daum, länger nach Verhältniß als bey den Affen, giebt mehr Geſchicklichkeit auch die kleinſten Gegenſtände zu faſſen. Alle Finger, mit Ausnahme des Ringfingers, können jeder für ſich bewegt werden, welches bey keinem andern Thiere, ſelbſt nicht einmal bey den Affen, ſtatt hat. Die Nägel bedecken nur den Rücken der Fingerſpitze, und geben denſelben beym Fühlen oder Getaſte einen Wiederhalt, ohne der Feinheit deſſelben etwas zu nehmen. Die Arme, an welchen dieſe Hände befeſtigt ſind, haben einen guten Befeſtigungspunkt, durch das breite Schulterblatt und die ſtarken Schlüſſelbeine.

Der Menſch in Hinſicht ſeiner Geſchicklichkeit ſo ſehr begünſtigt, iſt es weniger in Hinſicht ſeiner Muskularkräfte. Er kann nicht ſo ſchnell laufen, als alle Thiere ſeiner

Digitized by Google

Größe; ohne vorstehende Kinnladen, ohne Eckzähne, ohne spitzige und krumme Nägel, ist er ohne alle Vertheidigungs-Waffen; unter allen Thieren bedarf er die längste Zeit, ehe er die nöthigen Kräfte erhält, um sich selbst helfen zu können; kein Thier ist so unbehilflich, und so lange unbehilflich als das neugebohrne Kind. Allein diese Schwäche hat für ihn den Vortheil, daß er dadurch gezwungen wird, die innern Kräfte desto mehr zu entwickeln und seinen Verstand zu Hilfe zu nehmen, der ihm jene Schwäche vielfach ersetzt.

Kein Thier hat ein so großes Hirn, und so große Halbkugeln desselben, und diese Hirntheile sind vorzüglich die Organe, in welchen die höhern Geistesfähigkeiten ihren Sitz haben; die hintern Lappen des großen Hirns verbreiten sich nach hinten über das kleine Hirn weg. Schon die äußere Form des Schedels, zeigt diese Größe des Hirnes, während im Gegensatze das kleine Gesicht ankündigt, daß der, den äußern Sinnesorganen zukommende Theil des Nervensystems, nicht auf Kosten der für die Seelenkräfte bestimmten, vergrößert ist. Dessen ungeachtet haben diese äußern Sinne, ob schon sie von denen, mancher Thiere übertroffen werden, doch die nöthigen Kräfte erhalten, und stehen mit den übrigen in Ebenmaß.

Die nach vorn stehenden Augen, machen das Sehen auf beyde Seiten nicht möglich, welches mehrere Säugethiere thun können, dagegen entsteht der Vortheil, daß die Augen den Gegenstand, auf den sie sich heften, besser auffassen und betrachten können. Die Kugelform des Auges, und die Regenbogenhaut, können wenig verändert werden, dieses beschränkt den Raum des deutlich

Digitized by Google

Sehens in engere Grenzen; die Ohrmuſchel iſt wenig beweglich, und wenig ausgedehnt, daher vermehrt ſie die Stärke des Tons nur wenig, und doch iſt kein Thier, welches die feinſten Töne ſo leicht auffaſſen und unterſcheiden könnte; die Naſe iſt in ihrem Bau zwar zuſammengeſetzter, als bey den Affen, aber weniger entwickelt als bey andern Thiergattungen, und dennoch iſt kein anderes Thier für Uebelgerüche ſo empfindlich, wie der Menſch. Die Feinheit des Geruchs hat Einfluß auf den Geſchmack, und der Menſch ſcheint auch in dieſer Hinſicht vor den Thieren Vorzüge zu haben, beſonders vor den Thieren, deren Zunge ſchuppig iſt. Das Getaſte endlich, deſſen Feinheit von der Feinheit der Haut, und von der Abweſenheit aller das Gefühl ſchwächenden Hüllen abhängt, iſt durch den Bau der Hand vorzüglich geeignet, jede, auch die kleinſte Unebenheit der Gegenſtände zu bemerken.

Der Menſch hat in ſeinen Stimmorganen eine vorzügliche Biegſamkeit; er iſt das einzige Säugethier, welches articulirte Laute von ſich geben kann, wozu beſonders auch die Form des Mundes, und die große Beweglichkeit der Lippen mit beyzutragen ſcheint: Die Sprache iſt einer der Hauptvorzüge des Menſchen, denn die Töne ſind unter allen Zeichen, womit man ſich ſeine Gedanken und Ideen mittheilt, doch diejenigen, welche man am weiteſten und zugleich nach allen Richtungen hören kann.

Selbſt die Lage des Herzens und der großen Gefäße, zeigt die Beſtimmung des Menſchen zum aufrechten Gange; das Herz liegt ſchief auf dem Zwerchmuskel und ſeine Spitze ſieht nach links, daraus entſteht eine Vertheilung der Aorta, welche von der der meiſten Thiere verſchieden iſt.

Digitized by Google

Der ganze Bau des Menschen, scheint ihn mehr zur Nahrung aus dem Pflanzenreich geschaffen zu haben, und Obst, Wurzeln und saftige Pflanzentheile, scheinen dem Körper am angemessensten. Seine Hände geben ihm Leichtigkeit, solche Körper zu sammeln; seine kurzen Kinnladen, und die mäßige Stärke, welche sie besitzen, die nicht über die andern vorstehenden Eckzähne, und die höckerichten Mahlzähne, gestatten ihm weder Gras abzumähen, noch Fleisch zu zerreissen; allein da der Mensch durch Hilfe des Feuers, und durch die Kunst, womit er die Thiere fangen oder von weitem tödten kann, sich auch diese Dinge auf eine Art zuzubereiten versteht, welche seinem Gaumen und seiner Kaukraft zusagt, so kann er sich aller lebenden Wesen zur Nahrung bedienen, und seine Art allenthalben ausbreiten, da ihm alle Klimate, Lebensmittel bieten.

Die Organe der Verdauung entsprechen den Kauorganen: Der Magen ist einfach, der Darmkanal von mittlerer Länge; der dicke Darm ausgezeichnet, der Blinddarm kurz und ausgedehnt, mit einem schmalen Anhang, die Leber in zwey große und einen kleinen Lappen getheilt; das Netz hängt zwischen den Eingeweiden, bis ins Becken herab.

Der menschliche Körper hat an seiner Wirbelsäule zwey und dreißig Wirbel, von denen sieben Halswirbel, zwölf Rückenwirbel, fünf Lendenwirbel, fünf gehören zum Heiligenbein, und drey zum Steisbein. Von den Ribben befestigen sich sieben Paare am Brustbein durch knorplichte Verlängerungen und heißen wahre Ribben, die übrigen fünf Paare heißen falsche Ribben. Der Schedel besteht aus acht Knochen, nemlich einem Hinterhauptsgrundbein, zwey Schlä-

Digitized by Google

fenbeinen, zwey Scheitelbeinen, einem Stirnbein, einem Siebbein, einem Flügel- oder Keilbein. Das Geſicht hat vierzehen Knochen: zwey Oberkinnbackenknochen, zwey Jochbeine, von denen jedes ſich an das Kinnbackenbein ſeiner Seite durch einen Vorſprung befeſtigt, welcher Jochbogen heißt; zwey Naſenbeine, zwey Gaumenbeine vornen am Gaumen, ein Pflugſchaarbein zwiſchen den Naſenlöchern, zwey Muſchelbeine in der Naſe, zwey Thränenbeine an der innern Seite der Augenhöhle, eine Unterkinnlade. Jede Kinnlade hat ſechzehn Zähne, vier Schneidezähne in der Mitte, zwey Hauzähne oder ſpitzigere Eckzähne, und zehen Backenzähne mit höckerigen Kronen, fünf auf jeder Seite, alſo in allem zwey und dreißig Zähne. Das Schulterblatt hat am Ende ſeiner vorſpringenden Gräthe eine Erhöhung, welche Ackromium heißt, an welcher ſich das Schlüſſelbein befeſtigt, und oben am Gelenke, eine Spitze, welche man Rabenſchnabel nennt, zur Befeſtigung einiger Muskeln. Die Speiche dreht ſich vollkommen um den Ellenbogen, da ſie mit dem Schulterknochen ſich wie eine Charniere einlenkt. Die Handwurzel beſteht aus acht Knochen, vier in jeder Reihe; die Fußwurzel hat nur ſieben; die Knochen der übrigen Hand und des Fußes, laſſen ſich leicht nach der Menge der Finger und Zehen zählen.

Der Menſch, der ſich durch ſeinen Fleiß und Verſtand meiſt geſunde und gleichartige Nahrung verſchaffen kann, kann den Geſchlechtstrieb vom Zeitpunkt der Mannbarkeit an, immer befriedigen, ohne je von ihm tyranniſch beherrſcht zu werden, wie das Thier; das männliche Glied hat keinen Knochen; die Vorhaut befeſtigt es nicht am Bauche, es hängt vom Schaambein herab: Große und

Digitized by Google

zahlreiche Venen, bringen einen Theil des Blutes aus den Testikeln wieder zum Herzen zurück, so daß weniger Saame abgesondert wird, was zur Mäßigung des Geschlechtstriebs beyträgt.

Die weibliche Gebärmutter bildet eine eiförmige Höhlung; die Brüste, zwey an der Zahl, liegen an der Brust, und das Saugen des Kindes, wird durch die Bequemlichkeit das Kind auf den Armen tragen zu können, erleichtert.

Physische und moralische Entwicklung des Menschen.

Das menschliche Weib gebiert gewöhnlich nur ein Kind, und nur etwa auf fünfhundert Geburten fallen Zwillinge; Drillinge sind schon viel seltener, und Vier- oder Fünflinge, kommen unter einer Million Geburten kaum einmal vor und sind die höchste Zahl. Die Schwangerschaft des Menschen dauert neun Monate. Im ersten Monat zu acht und zwanzig Tagen gerechnet, erlangt der Fötus die Größe eines Gerstenkorns, höchstens einer Erbse, und das ganze Ei ist etwa ein Zoll lang. Im zweyten Monat ist der Fötus etwa ein halber Zoll lang, das Ei zwey Zoll. Im dritten Monat erreicht die Größe des Fötus zwey Zoll, das Ei etwa vier und einen halben Zoll; im fünften Monat hat das Ei schon einen Längedurchmesser von elf Zoll, der Fötus ist zehen bis elf Zoll lang; im sechsten Monat findet man den Fötus schon zwölf Zoll lang; im siebenden vierzehen Zoll, und im achten und neunten Monat erreicht derselbe eine Größe von achtzehen bis zwey und zwanzig Zoll. Kinder, welche im siebenden Monat geboren werden, können

zwar

zwar lebend zur Welt kommen; leben aber meiſt nur wenige Stunden. Fünf bis ſechs Monate nach der Geburt kommen die erſten oder Milchzähne hervor. Im zweyten oder dritten Jahr hat das Kind zwanzig Zähne, welche um das ſiebende Jahr nach und nach ausfallen, und von neuen erſetzt werden. Die zwölf Backenzähne fallen nicht aus, die vier erſten erſcheinen im vierten oder fünften Jahr, die vier folgenden erſt im achten oder neunten, und die vier letztern erſcheinen oft erſt gegen das zwanzigſte Jahr.

Je näher der Fötus dem Zeitpunkt ſeiner Entſtehung ſteht, deſto ſchneller iſt ſein Wachsthum. In den erſten Monaten der Schwangerſchaft ſchreitet daſſelbe daher am meiſten vorwärts, nach der Geburt hingegen geht es immer langſamer, je älter das Kind wird. Bey der Geburt hat das Kind mehr als einen Viertheil der Größe erreicht, die es nachher erhalten ſoll; im dritten Jahr erreicht es die Hälfte; und im neunten oder zehnten Jahr drey Viertheile, und im achtzehnten oder zwanzigſten Jahre iſt das Wachsthum vollendet. Selten erreicht der Körper eine Länge von mehr als ſechs Fuß, oft bleibt er unter fünf Fuß. Der Körper des Weibes bleibt meiſt um einige Zolle kürzer.

Die Mannbarkeit tritt im weiblichen Geſchlecht im zehnten bis vierzehnten Jahr ein, im männlichen im zwölften bis ſechszehnten. In warmen Climaten tritt ſie früher ein als in kalten. Das Eintreten der Mannbarkeit bezeichnen im männlichen Geſchlecht die Saamenabſonderung, im weiblichen der monatliche Blutabfluß, und dieſe beyden Erſcheinungen machen erſt die Fortpflanzung möglich.

Wenn der Körper ausgewachſen iſt, ſo fängt er oft an in die Breite ſich auszudehnen, und fetter zu werden; das

Fett setzt sich in gröſserer Menge ins Zellgewebe ab. Mehrere Gefäſse verschlieſsen sich nach und nach, und die festen Theile werden härter, und nach einem kürzern oder längern, mehr oder minder thätigen und mühsamen Leben tritt das Alter ein, und mit ihm Hinfälligkeit, Abnahme des Körpers und endlich muſs der Tod, die nothwendige Folge des Lebens, eintreten. Selten erreicht der Mensch das hundertste Jahr, weit aus die meisten Menschen sterben eines frühzeitigern Todes durch Krankheiten oder Zufälle, oder das Alter tritt früher ein, doch kann der Mensch ein Alter von hundert und fünfzig Jahren und darüber erreichen.

Unter allen neugebornen Thieren hat das Kind des Menschen am längsten der Beyhülfe seiner Eltern nöthig, und noch lange wenn es der Muttermilch entsagt hat. Es erfordert daher der Mensch eine physische und geistige Ausbildung, die zwar langsamer geht als beym Thier, aber desto kräftiger sich entwickelt, desto herrlichere Früchte bringt, und vorzüglich eine Anhänglichkeit zwischen Eltern und Kindern begründet, die wir beym Thiere nicht wahrnehmen. Die fast gleiche Zahl beyder Geschlechter, die Schwierigkeiten, welche bey den vielfachen Bedürfnissen der Menschen für die Ernährung mehrerer Weiber eintreten, wenn nicht groſse Reichthümer vorhanden sind, und andere Gründe mehr, zeigen, daſs die Einweiberey eigentlich dem Menschen am angemessensten sey, um so mehr, da nur bey diesem engern Band auch der Vater mit Antheil an der Erziehung nimmt. In der langen Zeit, welche die Erziehung erfordert, kommen andere Kinder nach, und so knüpft sich das eheliche Band dadurch immer aufs Neue; die lang daurende Hülflosigkeit des kindlichen Alters erfor-

Digitized by Google

dert Unterwerfung der Kinder unter den Willen der Eltern, ſo bilden ſich Familien, und aus dieſen die bürgerliche Ordnung, indem die Kinder neue Verbindungen eingehen, und zugleich den Umgang mit ihren Eltern fortietzen, an welche ſüße Erinnerungen ſie knüpfen. Dieſe geſellſchaftliche Verbindungen vermehren gar ſehr die Vorzüge des Menſchen, und erringen ihm Vortheile, die der einzelne nie genießen kann; nur durch gemeinſame Hülfe kann der Menſch die Angriffe wilder Thiere zurückſchlagen, gegen die Einflüſſe der Climate ſich verwahren, und ſo allein ward für ihn die ganze Erde bewohnbar.

Unter allen Thieren hat der Menſch am wenigſten Inſtinkt, er hat keine von der Natur ihm angeborne Kunſttriebe erhalten; alle ſeine Kenntniſſe ſind Folgen ſeiner Erziehung, ſeines Nachdenkens, ſeiner Vernunft, welche ihm Inſtinkt und Kunſttriebe erſetzt. Frühere Entdeckungen ſind ihm durch die Sprache von andern mitgetheilt worden, er bereichert ſie durch eigenes Nachdenken, und richtet alle ſeine Handlungen, je nachdem es ſeine Bedürfniſſe und Genüſſe erfordern ein, und ſo betreibt er Künſte und Wiſſenſchaften. Die Sprache, verbunden mit der Kunſt zu ſchreiben, läßt ihn das einmal erlernte nicht mehr vergeſſen, und ſo kann er auf der Bahn der Wiſſenſchaften immer vorwärts ſchreiten, ſo bildet er immer neue Ideen, ſo hat er ſich die ganze Natur gleichſam zinsbar gemacht.

Nicht alle Völker der Erde ſtehen aber auf der gleichen Stufe der geiſtigen Entwicklung. Diejenigen Völker, welche blos von der Jagd leben, ſind gezwungen, alle ihre Zeit darauf zu verwenden, ihre Nah-

rung zu ſuchen, ſie können ſich nicht ſtark vermehren, und ihre Cultur ſteht auf der unterſten Stufe; ihre Künſte beſchränken ſich darauf, elende Hütten oder Schiffe zu bauen; ſie bedecken ſich mit den Häuten der erlegten Thiere; ſie wiſſen Pfeile und Bogen oder Wurfſpieſe und Netze zu bereiten. Bey ihren Wanderungen und Jagden dienen ihnen die Geſtirne zu Wegweiſern, und ihre Kenntniß der natürlichen Körper beſchränkt ſich auf ſolche, welche ihnen Nutzen oder Schaden bringen. Der Hund iſt der einzige Geſellſchafter aus dem Thierreich, der ſie begleitet, weil eine ähnliche Lebensart ihm behagt. Sind die Menſchen weiter gelangt, und haben ſie gelernt, grasfreſſende Thiere ihrem Willen zu unterwerfen, ſo ſind ſie im Beſitze zahlreicher Heerden, welche ihnen ihren Unterhalt ſichern, ſie haben daher ſchon mehr Zeit, ihre Kenntniſſe zu erweitern; ſie ſind in der Baukunſt, in der Kunſt, ſich Kleider zu machen, weiter geſchritten; ſie haben Begriffe von Eigenthum, und ſomit hat Reichthum und Ungleichheit des Vermögens bey ihnen ſtatt, und dies iſt die Quelle, welche edle Nacheiferung erregt, aber auch ſchändliche Leidenſchaften erzeugt. Der Unterhalt der Heerden zwingt ſie indeß zu einem nomadiſchen Leben, ſie müſſen wandern, um neue Waide für ihre Thiere zu finden, je nachdem die Jahreszeiten abwechſeln, und ſo mußten auch dieſe Hirtenvölker noch auf einer niedrigern Stufe der Cultur ſtehen bleiben.

Diejenigen Völker allein konnten ſich ſehr vermehren und einen höhern Culturgrad erreichen, welche mit der Viehzucht noch den Ackerbau verbinden; dadurch erſt wird der Begriff von Eigenthum vollkommen, wenn auch der

Digitized by Google

Boden von den Vätern den Kindern zum Erbtheil überlaſſen wird, ſo nur wird er gehörig angebaut, ſo entſtund der Stand der Ackerbauer, welche den übrigen Mitgliedern der Geſellſchaft die nöthigen Nahrungsmittel verſchaffen, dieſe andere Mitglieder dadurch den Nahrungsſorgen enthoben, haben Zeit gewonnen, ſich andern Beſchäftigungen zu widmen, und die Genüſſe und Annehmlichkeiten des Lebens durch verſchiedene Gewerbe zu erhöhen, und dieſer Trieb nach Genuß, trieb wieder zu neuen Erfindungen an. Dazu kam die Erfindung des Geldes, als des leichteſten Mittels zum Tauſch, dieſes iſt nach und nach das einzige Mittel geworden, ſich alle Genüſſe des Lebens zu verſchaffen, und ſo mußte auch die Begierde, dieſes Mittel zu erlangen, das kräftigſte Triebrad ſeyn, in der Cultur weiter zu ſchreiten. Die Leichtigkeit, ſich mit Geld unabhängig von andern zu machen, und ſeinen Begierden zu fröhnen, mußte aber auch Laſter, Weichlichkeit und Geldgeitz zur Folge haben.

Den ängſtlichen Sorgen für tägliche Nahrung überhoben, gewann der Reichere Zeit, einem innern Triebe zu folgen, der den Menſchen anſpornt, ſich höhere Begriffe zu erwerben, und die Urſache der Dinge zu erforſchen, dadurch entſtund der Stand der Gelehrten, welche ſich bemühen, neue Begriffe den ſchon vorhandenen beyzufügen, und ſo Künſte und Wiſſenſchaften immer mehr zu fördern. Nur zu oft ſuchen ſie dadurch eine Geiſtesherrſchaft über andere zu erlangen, ihr Verdienſt auf Koſten anderer zu erheben, und um ihre Schwäche zu verbergen, werden oft von ihnen aus der Luft gegriffene Ideen ſtatt Wahrheiten verbreitet.

Ein trauriges Uebel iſt es wohl, daß der Menſch ſeine Kräfte ſo oft zur Unterdrückung ſeiner Mitmenſchen miß-

Digitized by Google

braucht, der Mensch ist das einzige Geschöpf, welches beständig im Kriege mit seinesgleichen ist. Die Wilden stritten über den Besitz ihrer Wälder, die Nomaden über den Genuß der Waiden: und oft werden die ackertreibenden Völker von ihnen überfallen, und der Früchte ihrer Arbeit beraubt. Die civilisirten Völker, weit entfernt mit ihrem Schicksal zufrieden zu seyn, streiten über die Vorrechte, welche ihr Stolz verlangt, oder über Handelsmonopole. Daraus entstund die Nothwendigkeit, fester Regierungsformen, um diese Kriege zu leiten, oder Gesetze für bürgerliche Streitigkeiten zu entwerfen und auszuüben.

Mehr oder weniger günstige Umstände haben indeß der geistigen Entwicklung der Völker Grenzen gesetzt, oder ihre Fortschritte befördert. Die fast immer mit Eis bedeckten Gegenden gegen den Nordpol in beyden Festländern, und die undurchdringlichen Wälder Amerikas, sind nur wenig von Jägern und Fischern bevölkert. Die unermeßlichen Sandebenen Afrikas und die salzigen Steppen Asiens sind von Hirtenvölkern bewohnt, und mit zahllosen Heerden bedeckt; diese halb civilisirten Horden versammelten sich oft, wenn einer ihrer ehrgeizigen Anführer sie aufrief, und stürzten sich über die benachbarten civilisirten Länder, um sie zu erobern; an feste Sitze gebunden verweichlichten sie nach und nach, bis neue Horden von Nomaden sie selbst wieder unterjochten. Durch solche halbwilde Horden wurden von den ältesten Zeiten her die Gegenden von Persien, Indien und China überschwemmt, und die Fortschritte der Künste in diesen milden Climaten gehindert.

Ein mildes Clima, ein gut bewässerter Boden, reich an Pflanzen, ist von der Natur bestimmt, die Wiege der

Civiliſation und des Ackerbaues zu werden; und wenn die Lage ſolcher Länder ſie vor den Ueberfällen von Barbaren ſchützte, ſo blühten in ihnen von jeher Künſte und Wiſſenſchaften auf, ſo war es früher in Europa, Griechenland und Italien: ſo iſt es heut zu Tage faſt in dieſem ganzen glücklichen Welttheil. Es giebt indeß zuweilen eigene Urſachen, welche die Geiſtesfortſchritte von Nationen hemmen, wo die günſtigſten Umſtände ihrer Fortbildung vorhanden ſind.

Abänderungen der Menſchengattung.

Obſchon es nur eine Gattung von Menſchen giebt, da alle Völker der Erde ſich fruchtbar vermiſchen können, ſo bemerkt man doch bey verſchiedenen Nationen eine eigene Bildung, welche ſich erblich fortpflanzt, die Abweichungen in der Bildung machen die verſchiedenen Raſſen aus. Drey dieſer Raſſen ſcheinen ſich beſonders von einander zu unterſcheiden. Die weiße oder kaukaſiſche; die gelbe oder mongoliſche; und die ſchwarze oder Ethiopiſche.

Die kaukaſiſche Raſſe, zu welcher wir gehören, unterſcheidet ſich durch das ſchöne Oval des Kopfes, zu ihr werden die Nationen gerechnet, welche in der Civiliſation am weiteſten vorgeſchritten ſind, und welche daher einen Theil der übrigen Nationen unterjocht haben.

Die Haut iſt mehr oder minder hell, und die Farbe der Haare veränderlich, dies bezeichnet einzelne Unterabtheilungen, und richtet ſich nach Clima und Lebensart.

Die mongoliſche Raſſe zeichnet ſich durch hervorſpringende Augenrandknochen, durch plattes Geſicht, tiefe,

Digitized by Google

schiefliegende Augen, schwarze Haare, dünnen Bart und olivenfarbene Haut aus. Ihre Stämme bewohnen die großen Reiche China und Japan, und haben ihre Eroberungen selbst über die großen asiatischen Steppen hinaus, ausgedehnt. Ihre Civilisation ist seit Jahrhunderten nicht weiter fortgeschritten.

Die schwarze Rasse oder die Negervölker bewohnen Afrika mittäglich vom Atlas, die Hautfarbe ich schwarz, das Haar kraus und schwarz, der Schedel zusammengedrückt, die Nase platt, die Kinnladen vorstehend, die Lippen groß, ihre Gesichtsbildung nähert sich auffallend den Affen. Die Völker, welche sie bilden, sind immer in der Cultur zurückgeblieben.

Man nennt die Rasse, zu welcher wir gehören, die Caucasische, weil alte Sagen es wahrscheinlich machen, daß der ursprüngliche Wohnsitz dieser Völker die Gebirgskette gewesen, welche um das caspische und schwarze Meer herum liegen, von daher haben sie sich rings umher ausgebreitet. Die Bewohner des Caucasus, und die Tscherkassen und Georgier, werden noch heut zu Tage für die schönsten Völker der Erde gehalten. Man kann die vorzüglichsten Verzweigungen dieser Rasse nach ihren Sprachen bezeichnen. Die armenische oder syrische Verzweigung verbreitete sich gegen Mittag: dahin gehören die Bewohner Assyriens und Chaldeas, und die bis auf den heutigen Tag noch immer ungezähmten Araber, welche nachdem sie die Religion Mahomets angenommen, einst einen großen Theil der alten Welt unter ihre Herrschaft brachten; die Phönicier, Juden und Abyßinier, sind arabische Colonien, zu welchen auch die Egyptier zu gehören scheinen. Unter dieser Verzweigung war von jeher Hang zur Reli-

Digitized by Google

gionsſchwärmerey vorherrſchend, und aus ihrem Schooße giengen Religionsſekten hervor, welche ſich ſehr weit ausbreiteten. Künſte und Wiſſenſchaften blüheten zuweilen unter ihnen, aber immer unter ſonderbaren Formen, und blumenreichen Wortgepränge. Nach Indien, Griechenland und Deutſchland, verbreiteten ſich die Verzweigungen dieſer Raſſe ſehr weit, und ſchon in den älteſten Zeiten. Indeß ſo verſchieden auch die Sprachen dieſer Völker unter ſich ſind, ſo zeigen ſie doch alle einen vierfachen Urſprung: Die Sanscrit-Sprache, jetzt die heilige Sprache der Indier, iſt die Stammſprache aller hindoſtaniſchen Völker; die alte Sprache der Pelasger ſcheint die Stammſprache der Griechen, der Lateiner, vieler ausgeſtorbener Sprachen, und aller Sprachen, welche im ſüdlichen Europa geſprochen werden; die gothiſche oder allemanniſche Sprache hat ſich über den Norden von Europa verbreitet, und iſt in der deutſchen, holländiſchen, engliſchen, däniſchen und ſchwediſchen Sprache verzweiget: und endlich iſt die ſlaviſche Sprache die Stammſprache der nordweſtlichen Europäer, der Ruſſen, Polen, Böhmen und Wenden. Unter dieſer Verzweigung beſonders blühten ſeit undenklichen Zeiten Künſte und Wiſſenſchaften, die ſich ſeit faſt dreitauſend Jahren unter ihren Nationen fortpflanzten. In den früheſten Zeiten kamen die Celten aus Norden nach Europa, und ihre zahlreichen Stämme, früher über weite Länder verbreitet, ſind jetzt nur noch auf einem weſtlichen Flecke von Frankreich zu finden. Die Cantabrer, welche aus Afrika nach Spanien einwanderten, haben ſich faſt gänzlich unter den zahlreichen Nationen verloren, welche nach und nach dieſe Halbinſel überſchwemmten.

Digitized by Google

Die alten Perſer haben mit den Indiern gemeinſamen Urſprung, und ihre Abkömmlinge tragen noch heut zu Tage alle Kennzeichen naher Verwandtſchaft mit den europäiſchen Völkern.

Die ſcythiſche und tartariſche Verzweigung verbreitete ſich anfangs gegen Norden und Nordweſt, und faßte niemals feſte Wohnplätze in den unermeßlichen Ebenen, aus welchen ſie von Zeit zu Zeit hervorſtürzten, um ihre civiliſirten Nachbarn zu überfallen: So brachen die Scythen in Oberaſien ein; die Parther zerſtörten dort die römiſchen und griechiſchen Reiche: die Türken bemächtigten ſich der arabiſchen Länder, und unterjochten in Europa die traurigen Reſte der Griechen. Alle dieſe Nationen ſind Zweige der tartariſchen Stämme: Die Finnländer und Hungarn verirrten ſich unter die ſlaviſchen und deutſchen Nationen, und ſtammen von der nordweſtlichen Seite des caſpiſchen Meeres, wo ehemals noch andere Stämme deſſelben Urſprunges und mit ähnlichen Sprachen lebten; aber jetzt mit vielen Stämmen verſchiedener Abkunft und Sprache verſchmolzen ſind. Die tartariſchen Völker haben noch am meiſten ihren urſprünglichen Charakter in ihren weiten Wohnſitzen beybehalten, von welchen aus ſie lange Zeit Rußland bedroheten, bis ſie endlich ſelbſt unter ruſſiſchen Scepter kamen, unter welchem ſie von der Mündung der Donau, bis zu der des Irtiſch ſtehen. Indeß haben ſie ſich auch mit den Mongolen, welche ihre Eroberungen über ſie ausbreiteten zum Theil vermiſcht, und man bemerkt bey den Völkern der kleinen Tartarey häufige Spuren dieſer Vermiſchung.

Digitized by Google

Im Oſten des tartariſchen Zweiges der caucaſiſchen Raſſe, fangen die Wohnungen der mongoliſchen an, welche das ganze Land bis zum ſindiſchen Meere beſitzen. Die Kalmucken und Kalkas, ſind nomadiſche Horden, welche die großen Steppen durchſtreichen. Zu drey verſchiedenen Zeiten, haben ihre Stammältern unter Attila, Tſchengis-kan und Tamerlan, Verwüſtung und Schrecken über weite Länderſtrecken verbreitet. Die Chineſer ſind diejenige Verzweigung der mongoliſchen Raſſe, welche von den älteſten Zeiten her, civiliſirt war, ja unter die älteſten aller civiliſirten Völker überhaupt gehören. Ein dritter Zweig, die Mantſchu, haben in neuern Zeiten China erobert, wo ſie jetzt noch herrſchen. Die Japaner, die Einwohner von Corea, und faſt alle Horden, welche die nordweſtlichen Theile von Sibirien bewohnen, und gegenwärtig unter Rußland ſtehen, gehören ebenfalls dem mongoliſchen Urſtamme an. Mit Ausnahme einiger chineſiſchen Völker, ſind alle Mongolen der Religion des Fo ergeben. Die erſten Wohnſitze der Stammeltren der mongoliſchen Raſſe, ſcheinen in den Gebirgen des Altai geweſen zu ſeyn, ſo wie die der unſrigen am Caucaſus; allein es iſt viel ſchwieriger, die Verzweigungen zu verfolgen, und wie ſie nach und nach vom Altai her ſich verbreiteten, anzugeben. Die Geſchichte dieſer Nomaden iſt eben ſo unbeſtimmt, als ihre Wohnungen: und die Geſchichte der Chineſer, welche auf ihr Reich beſchränkt ſind, giebt von ihren Nachbarsvölkern nur kurze und unzuverläßige Angaben. Selbſt die Aehnlichkeit der Sprachen iſt noch zu wenig unterſucht, um aus dieſem Labyrinthe zu leiten.

Die Sprachen im Norden der großen indiſchen Halb-

Digitized by Google

inſel, jenſeits des Ganges, ſo wie die von Thibet, haben einige Aehnlichkeit mit der Chineſiſchen, wenigſtens in Hinſicht der vielen einſilbigen Wörter, und die Völker, welche dieſe Sprachen ſprechen, haben in ihren Geſichtszügen einige Aehnlichkeit mit den Mongolen; aber im Süden der Halbinſel wohnen die Malajen, deren Geſichtszüge viel ſchöner ſind. Die Stämme und Sprache dieſer Malajen haben ſich über die ſüdlichen Küſten der indiſchen Halbinſel, und über alle Inſeln des indiſchen Archipels verbreitet, ja ſelbſt über die meiſten Inſeln der Südſee, man hat daher die Malajen zu einer eigenen Raſſe gemacht, und die Malaiſche genannt. Die Hauptfarbe iſt braun, einerſeits ins helle Mahagoni, anderſeits ins dunkelſte nelken- und kaſtanienbraun übergehend. Das Haar dicht, lockig und ſchwarz. Der Kopf breiter, als beym Neger. Die Stirne etwas hervorſtehend. Die Naſe dick, breit und platt, an der Spitze dicker. Der Mund groß, der Oberkiefer etwas hervorſtehend.

In den größten Inſeln der Südſee, in den wildeſten Gegenden, Neuſeeland, Dinmensland und ſo weiter, wohnen Völker mit krauſem, kurzem Haar, ſchwarz von Farbe, und negerähnlichem Geſicht, ſie ſind unter dem Namen der Papu bekannt, alle von grauſamem und rohem Charakter.

Indeß weder die Malajen noch die Papus, obſchon ſie zu keiner der drei großen Hauptraſſen gezählt werden können, haben ſo viel Charakteriſtiſches, um aus ihnen eigene Raſſen zu bilden. Man kann die Malajen nicht gut von ihren beidſeitigen Nachbarn den caucaſiſchen Indiern, und den mongoliſchen Chineſen, durch beſtimmte Merkmale unterſcheiden. Und von den Papus weißt man nicht,

Digitized by Google

ob es nicht Völker vom Negerſtamme ſind, welche ſich in den älteſten Zeiten auf die Inſeln des indiſchen Meeres verirrt haben.

Die eigentlichen Völker der Schwarzen- oder Negerraſſe, bewohnen nur Afrika. Ueber die Verbreitung ihrer Stämme iſt ſehr wenig bekannt, da das ganze Land, welches ſie bewohnen, überhaupt noch zu den faſt gar nicht bekannten gehört, und da ſie in der Cultur am weiteſten zurück und überhaupt ſehr roh und barbariſch ſind, ſo kennt man weder ihre Geſchichte, noch auch in wie fern ihre Sprachen einander ähnlich ſind. Die ſchwärzeſten von ihnen, ſind die Völker am Gambia und an der Sierre Leona. Die Senegalier und Fulier ſind mehr ſchwarzroth.

Die Bewohner des Nordens beyder Feſtländer, die Samojeden, Lappen, Eskimos, ſtammen nach der Meinung der einen von der mongoliſchen Raſſe; andere halten ſie für ausgeartete Abkömmlinge der Scythen oder Tartaren von der caucaſiſchen Raſſe.

Die Amerikaner bilden nach Blumenbachs Meinung auch eine eigene Raſſe, und in der That kann man ſie zu keiner der Raſſen des alten Feſtlandes zählen, und doch haben ſie zu wenig ausgezeichnete Charakterzüge, um aus ihnen eine eigene Raſſe zu bilden. Die Haut iſt kupferfarb oder lohgelb: das Haar ſchlicht, ſteif und ſchwarz. Die Stirn niedrig, die Augen liegen tief. Die Naſe ſteht mit ihrem Rücken hervor, die Spitze aber iſt ſtumpf. Das Geſicht breit, hat hervorragende Wangenknochen, iſt aber nicht platt, ſondern hat ſtarke und ausgewirkte Züge, der Bart ſchwach. Die kupferrothe Farbe iſt aber kein Hauptcharakter; ihre ſchwarzen Haare, und der dünne Bart,

Digitized by Google

würden sie den Mongolen nähern, wenn nicht die stark ausgewirkten Gesichtszüge, und die hervorspringende Nase sie von ihnen hinlänglich unterschieden. Sie sprechen eben so viele Sprachen, als Völkerschaften sind, und ihre Stämme sind fast unzählbar; bis jetzt hat man die Aehnlichkeit, welche sie unter einander so wohl, als mit den Völkern des alten Festlands haben, noch nicht gehörig auseinandergesetzt.

Blumenbach hat in seinem trefflichen Werke: De generis humani varietate nativa et decades craniorum, alles dieses trefflich entwickelt, und das Weitere ist darüber in diesem Werk nachzulesen.

Der Säugethiere zweyte Ordnung.

Vierhändige.

Die Verschiedenheit des Körperbaues zwischen den Menschen und Affen, beruhet wie schon im Abschnitt vom Menschen ist gesagt worden, hauptsächlich auf den Theilen, welche zum aufrechten Gange dienen. So ähnlich, der Bau des Affen dem menschlichen ist, so unterscheidet er sich eben durch diesen verschiedenen Bau, der Hinterfuß hat einen freyen, den übrigen Fingern entgegengesetzten Daum, die Zehen sind biegsam, dadurch bildet sich der Fuß zur wahren Hand; alle vierhändigen Thiere klettern daher sehr leicht auf Bäume, dagegen stehen und gehen sie nur mit Mühe auf den Hinterhänden, da der Fuß nur mit dem äußern Rande fest steht, und da das schmale Becken das Gleichgewicht nicht hält. Die Eingeweide gleichen sehr den menschlichen, die Augen stehen vorwärts, die

Digitized by Google

Brüste stehen an der Brust, die männliche Ruthe ist hängend, das Hirn hat auf jeder Seite drey Lappen, von denen der hintere über das kleine Hirn weggeht, die Schläfengrube, ist durch einen knöchernen Vorsprung von der der Augenhöhle getrennt; das Gesicht weicht gradweise sehr vom menschlichen ab; besonders tritt die Schnautze unten hervor, es bildet sich ein Schwanz, und der Gang ist fast ganz vierfüßig; dessen ungeachtet gestattet ihnen die freye Bewegung der Arme, und die Verbindungsart der Hände, eine Menge von Bewegungen, welche den menschlichen ähnlich sind.

Schon Linne trennte die Vierhänder in zwey Gattungen, die Affen und Makis, oder Make, beyde Gattungen aber machen wirkliche Familien aus, zwischen welche eine dritte die der Uistitis oder Seidenaffen tritt, welche an beyde Familien grenzen. Die Menge der Arten aber, und die große Verschiedenheit ihrer Bildung und intellectuellen Eigenschaften hat die neuern Naturforscher bewogen aus beyden Familien mehrere Gattungen aufzustellen, welche sich durch bestimmte Kennzeichen und Charaktere unterscheiden.

Illiger zählt diesen beyden Familien auch noch den größten Theil der Beutelthiere zu, und bezeichnet diese ganze Ordnung mit dem Namen der Daumenfüßer, Policata.

Affen. Simia. Linn.

Die Affen haben sämmtlich vier gerade stehende Vorderzähne in jeder Kinnlade, und an allen Fingern platte Nägel; diese zwey Charaktere nähern sie unter allen Säu-

Digitized by Google

gethieren am meisten dem Menschen, ihre Backenzähne haben wie die menschlichen, stumpfe Erhabenheiten, sie ziehen ihre Nahrungsmittel vorzüglich aus dem Pflanzenreich, und fressen eigentlich kein Fleisch; der Zwischenkieferknochen in der obern Kinnlade, welcher die Vorderzähne enthält, und sich bey allen Säugethieren ausser dem Menschen findet, verlängert ihre Schnautze: Die Eckzähne sind bey den meisten länger als die übrigen Zähne, und dies giebt ihnen eine Waffe, welche der Mensch nicht hat, und erforderte einen leeren Raum in der entgegengesetzten Kinnlade, in welchen diese Zähne bey geschlossenem Munde einpassen.

Man kann sie in zwey Hauptgruppen trennen, in diejenige, welche die alte Welt, und in diejenige, welche die neue Welt bewohnen. Allein jede dieser Gruppen muß nothwendig in mehrere Gattungen zerfallen *).

Alle Affen bewohnen die Länder zwischen den Wendekreisen, oder das Palmenclima. Europa und Neuholland haben keine Affen.

Eigentliche Affen, oder Affen der alten Welt.

Sie haben dieselbe Zahl Backenzähne wie der Mensch, unterscheiden sich aber unter einander durch manche Charaktere, welche Unterabtheilungen nöthig machten. Die Haupt-

*) Die Zahl der bekannten Affenarten steigt schon über hundert, und man entdeckt noch immer viele neue. A. d. U.

Hauptcharaktere aller Affen der alten Welt sind *): Die Nasenscheidewand schmal, die Nasenlöcher öffnen sich gerade unter der Nase. Die Nasenknochen sind unter einander verwachsen, ehe die Milchzähne ausfallen.

Fünf Backenzähne auf jeder Seite und in jeder Kinnlade.

Der Gesichtswinkel läuft parallel mit der Fläche des Kinnbackenknochens.

Bey den meisten Arten sind Backentaschen und Gesäßschwielen.

Eigentliche Affen oder Orangs. Simia. Erxleb. und Illig. Pithecus Geoffroy.

Die Schnauze kurz, der Kopf rundlicht, die Stirne vorspringend, der Gesichtswinkel 65 Grade, die Ohren mittelmäßig, menschenähnlich, die Arme so lang, daß sie bey einigen Arten fast die Erde berühren, wenn sie auch aufrecht stehen. Gar kein Schwanz, nur bey einigen Gesäßschwielen, keine Backentaschen. Es sind die einzigen Affen, deren Flügelbein, Leber und Blinddarm diesen Theilen des Menschen gleichen.

---

*) Cuvier folgte bey der Eintheilung der Affen größtentheils den von Geoffroi vorgeschlagenen, in den Annalen du Museum d'histoire naturelle. Paris 1812. im XX. Band enthaltenen Eintheilung. Diese wird also auch hier mit Hinsicht auf Humboldt, Tiedemann, Oken und Illiger befolgt, und die Arten, welche bereits bekannt sind, alle angegeben. A. d. U.

Bayerische Staatsbibliothek München

Digitized by Google

1. Der Orang-Utang. Waldmensch. S. Satyrus Linn.

Jocko. Buff. Schreb. Taf. II. B. II. C. II. Troglodytes C. I. Audebert. Taf. 2. Drey bis vier Fuß hoch, der Körper mit langen rothbraunen Haaren besetzt; die Stirne ist so hoch, als die Hälfte des übrigen Gesichts, das Gesicht bläulich, keine Gesäßschwielen. Das letzte Glied am Daum der Hinterhand mangelt, der Daum hat also keinen Nagel. Das Zwischenkieferbein vollkommen deutlich, am Schenkel kein Aufhängeband. Dieser Affe gleicht unter allen Thieren am meisten dem Menschen, sowohl in Hinsicht der Kopfform, als auch in Hinsicht der Größe des Hirnes. Seine Geschichte ist voll Fabeln, besonders da er mit dem Schimpanse und andern großen Arten verwechselt wurde. Er bewohnt nur die östlichen Gegenden von Indien, Malacca, Cochinchina, vorzüglich Borneo, von wo er einigemale über Java nach Europa gekommen ist. Er ist ein sanftes Thier, wird leicht zahm; und kann, vermöge seiner menschlichen Bildung, viele unserer Handlungen nachahmen, doch scheinen seine Fähigkeiten nicht so groß zu seyn, als man gewöhnlich glaubt, nicht einmal viel die des Hundes zu übertreffen. Der Gesichtswinkel ist 54 Grade, beym Neger 70. Der Zahnrand des Oberkiefers läuft mit dem Hinterhauptsloch nicht in einer Flucht, das Schläfenbein ist schmäler, der Stachelfortsatz länger, daher der Kopf nicht völlig aufrichtbar. Das Becken schmäler, das Hüftbein lang, schmal, flach. Camper hat zwey häutige Säcke an seiner Luftröhre entdeckt und sehr gut beschrieben, sie stehen mit den Seitenhöhlen

des Kehlkopfs in Verbindung, und scheinen die Stimme zu dämpfen *).

2. Der Schimpanse. Simia Troglodytes.

Troglodytes niger. Geoffroy. Jocko. Buff. Schreb. B. I. II. Pongo Audebert F. I. sect. I. Tab. I.

Das Haar schwarz oder braun, vorn dünne stehend. Wenn den Berichten der Reisenden zu trauen ist, so erreicht er fast die Größe eines Menschen, oder soll sie sogar übersteigen, allein man hat noch keinen Theil von diesem Thier in Europa gesehen, welche dieser Größe entsprechen. Der Kopf ist rund, der Gesichtswinkel 50 Grade. Die Stirnhöhlen springen über die Augen vor, die Augen sind rund und stehen nahe beysammen, der Mund weit. Nach Leach neuesten Beobachtungen soll der Zwischenkieferknochen vollständig mit dem Maxillarknochen verwachsen seyn, ohne Spur einer Nath, er hat also keinen Zwischenkieferknochen, und nähert sich hierin dem Menschen, von dem man bis dahin glaubte, er sey das einzige Säugethier ohne Zwischenkieferknochen, auch das Aufhängeband am Schenkel ist wie am Menschen. Die letzte Phalanx am Daum hat einen Nagel. Die Brust ist breit, keine Gesäßschwielen, wenn schon nacktes Gesäß. Die Ohren sehr groß, menschenähnlich, die Arme kurz. Die Hände breit und kurz. Der Daum steht sehr zurück. Die Eckzähne stehen wenig vor,

*) Die einzige ältere gute Abbildung ist von Vormaer nach einem Thier, welches im Haag lebte. Die von Buffon ist schlecht; die von Allemand von Schreber copirte etwas besser, die von Bontius gar nichts.

Digitized by Google

und die Zähne stehen nahe an einander. Dieser Affe lebt in Truppen in Guinea, Congo, Angola, soll (was aber unwahrscheinlich ist) sich aus Baumzweigen Hütten bauen, sich mit Stöcken und Steinen gegen Menschen und Elephanten vertheidigen, und sogar Negerinnen entführen. (Gewiß eine Fabel). Er ist vom Orang Utang verschieden, aber wie jener sehr gelehrig, kann zum aufrechten Gange, zum Sitzen am Tische, und zum Essen mit Gabel und Löffel gewöhnt werden *).

Mit sehr langen Armen. Armaffen. Hylobates. Illig. Pithecus. Geoff.

Der Zahnbau ist ganz wie bey den Orangs, der Gesichtswinkel bildet etwa 60 Grade. Das Gesicht ist nackt. Die Nasenscheidwand sehr schmal. Keine Backentaschen, gerändelte Ohren. Kein Schwanz. Die Hinterbacken nackt und schwielig.

---

*) Tulpius nennt diesen Affen Quoja-Morou und giebt davon eine schlechte Abbildung in den Obs. med. Tysons Pygmee ist weit besser (Anatomy of Pygmi I.) Schreber I. B. c. I. Büffons Abbildung ist schlecht, obschon nach einem lebenden gemacht, unter dem Namen Jocko. Besser zeichnete es Lecat unter dem Namen Quimpese. Herr Cuvier glaubt aus spätern Vergleichungen von verschiedenen Köpfen, daß der Schimpanse und der Orang-Utang ein und dasselbe Thier seyen, und zwar der Schimpanse der Alte, es ließe sich dann auch erklären, warum Leach am Schedel des letztern keine Zwischenkieferknochen entdecken konnte, somit würden also beyde Arten doch nur eine ausmachen? A. d. U.

Digitized by Google

1. Der ſchwarze Gibbon. Hylob. Lar.

Schreber III. Audebert. I. Fam. Sect. 2. pl. I. Simia longimana.

Mit groben langen Haaren bedeckt, ein Kreis um Geſicht und Hände grau, die Stirn faſt gar nicht hervorſtehend, und der Schedel nach hinten zuſammengedruckt, ſehr kleine Geſäßſchwielen. Die Ohren kurz, die Eckzähne vorſtehend. Iſt in Oſtindien zu Hauſe, nach Geoffroy in Pondichery.

2. Grauer Gibbon. Hyl. Moloch. Audeb.

Simia leucisca. Lin. Schreb. B. III. Audeb. F. I. Sect. I. Tab. 2. Wouwou Campes.

Der ganze Körper hellgrau, Geſicht ſchwarz, ſtarke Geſäßſchwielen. Das Naturell munter, poſſirlich. Dieſes ſchöne Thier iſt ſehr gemein in Java und den Molukken, wo es ſich vorzüglich im Rohr aufhält, auf die höchſten Bambusrohre ſteigt und ſich ſchaukelt.

Noch wird gewöhnlich eine dritte Art unter dem Namen des ſchäckigen Gibbons Hylob. variegatus Schreb. III. angeführt, nach einem Exemplar, welches im Pariſer Muſeum ſtund und von Drubenton beſchrieben wurde, da man dieſes Thier aber ſeitdem nie mehr geſehen hat, und es nicht mehr im Pariſer Muſeum iſt, ſo kann es auch nicht mit Gewißheit für als eigene Art beſtimmt werden. Neuhofes Feſe aus China, der ſogar Menſchen freſſen ſoll, iſt ein fabelhaftes Thier, und Devismus Golokk aus Bengalen. Trans. philos. LIX. p. 111. iſt ebenfalls unbeſtimmt, und wenigſtens kein Gibbon, da er keine langen Arme hat.

Digitized by Google

Die Affen der alten Welt, welche nun folgen, haben alle eine in mehrere Lappen getheilte Leber, der Blinddarm ist dick, kurz, ohne Anhang. Das Zungenbein bildet eine Art von Schild.

Meerkatzen. Affen mit Schwänzen. Cercopithecus.

Die Schnauze mittelmäßig vorstehend, Gesichtswinkel 60 Grade, Backentaschen: der Schwanz mehr oder minder lang; Gesäßschwielen; der hinterste Backenzahn unten hat ein Höcker, wie die übrigen. Die Arten zahlreich, an Größe und Farbe sehr verschieden, sie leben in Afrika und Ostindien, in großen Gesellschaften, richten in Gärten und Feldern große Verwüstungen an, die meisten werden leicht zahm.

1. Der Entelle. Cercopithecus Entellus. Dufresne Audeb. Fam. IV. Sect II. pl. II. Schreb. XXIII. B.

Gelbweißlicht; Augenbraunen und Hände schwarz. Eine der größten Arten mit sehr langem Schwanze. Lebt in Bengalen.

2. Der Patas. Cercopithecus ruber.

Simia rubra Linn. Patas Buffon. S. Patas. Schreb. Taf. XVI. S. rufa Schreb. Taf. XVI. B.

Auf dem Rücken lebhaft rothgelb, weißlicht unten, über die Augen ein schwarzer Streif, über denselben zuweilen ein weißer. Vaterland Afrika. Senegal.

3. Der Mohraffe. Cercop. maurus. Linn.

S. maura Linn. Schreber Taf. XXII. B. Guenon négre Buff.

Der Pelz schwarz; braungelb in der Jugend. In Java.

Digitized by Google

4. Goldhaarige Meerkatze. Cercop. auratus. Temmink.

Der Pelz goldgelb; Stirn und Ohren mit langen Haaren bedeckt. An der Kniescheibe ein schwarzer Fleck. Nirgends abgebildet. Findet sich nach Temmink auf den Molukken.

?5. Schwarznase. Cercop. Talapoin.

Simia Talapoin. Linn. Talapoin Buff. Schreb. XVII.

Pelz olivenfarb, am Bauche gelblichtweiß, die Füße schwarz, der Schwanz unten grau. Nase und Fußsohle schwarz. Vaterland wahrscheinlich Ostindien?

6. Großbartige Meerkatze. C. latibarbus Geoff.

Guenon à face pourpre Buff. supp. Sim. dentata Shaw, I. F. I. 13. Guenon barbique Temmink. S. cephalopterus?

Ein breiter flügelartiger Bart; am Ende des Schwanzes ein Büschel. Das Gesicht röthlicht violet. Die Farbe des Felles im Alter schwarz, in der Jugend rothbraun, mit weichem und gekräuseltem Haar. Vaterland unbekannt.

7. Blaumäuliger Affe. Cercop. Cephus.

Le Moustac Buff. Simia cephus Linn. Schreber XIX. Audebert Fam. IV. Sect. 4. Fig. II.

Braungrau, unter jedem Ohr nach dem Gesicht ein gelber Haarbüschel, über die Oberlippe ein hellblauer Streif in Form eines Schnurbarts. Vaterland Guinea *).

*) Geoffroy rechnet auch Schrebers Mone. Taf. XV. zu Cephus.

Digitized by Google

8. Weißnaſiger Affe. Cercop. Petaurista.

S. Petaurista. Linn. Blanc nez. Buff. supp. Audebert. F. 4. Sect. 2. F. 15. Ascagne Audebert. F. 4. Sect. 2. F. 14. Schreb. XIX. B. u. C.

Oben bräunlich ins olivenfarbe ſpielend, unten weißlicht, Geſicht blau, Naſe weiß, vor den Ohren ein weißer Haarbüſchel, Schnurbart ſchwarz. Vaterland Guinea.

9. Weißmaulige Meerkatze. Cercop. nictitans.

S. nictitans Linn. Schreb. XIX. A. Guenon a long nez proeminant. Buff. supp. Le Hocheur Audeb. Fam. 4. Sect. I. F. 2.

Pelz ſchwarz, die Haare mit weißgraulichter Spitze, die Naſe mitten im ſchwarzen Geſicht allein weiß, um Lippen und Augen ein roſtfarber Haarkreis. Vaterland Guinea.

10. Gekrönte Meerkatze. Cerc. pileatus. Geoff. Guenon couronné Buff. supp. S. pileata Shaw.

Pelz gelblicht braun, unten weißlicht; die Stirne mit ſehr langen Haaren geziert. Vaterland unbekannt.

11. Die Mone. Cercopith. Mona.

S. Mona. Linn. Mone Buff. Audebert Fam. 4. Sect. 2. fig. 7.

S. Mona et Monacha. Schreb. XV. und XV. B. Cuvier et Geoffr. mammiferes cahier 9.

Pelz rothbraun, Bruſt, inneres der Arme, und Kreis

---

dagegen hält er den Ascanius Geoff. et Cuv. mammiferes L. 14. doch verſchieden von Petaurista, aber nur wegen des blauen Geſichts, welches, wie er ſelbſt ſagt, auch bloß vom Alter herrühren kann. A. d. U.

Digitized by Google

um den Kopf weißlicht, das Ende der Extremitäten schwarz, ein schwarzes Band um die Stirne, und ein weißer Fleck an jeder Seite der Schwanzwurzel. Vaterland unbekannt.

12. Die Diane. Cercop. Diana.

S. Diana Linn. Rolowai. Buff. S. Diana et Rolowai Schreb. XV. et XXV.

Pelz schwärzlich, die Haare oben mit weißer Spitze, der ganze Unterleib weiß, die Hinterschenkel braun ins purpurfarbne spielend, Gesicht schwarz, weiß umsäumt, am Kinn ein kleiner weißer Bart. Vaterland Guinea.

13. Der Malbruck. Cercop. Faunus.

Malbroue Buff. S. Faunus Linn. S. cynosuros Scopoli. Schreb. XII. und XIV. B. Callitriche. Var. A. Audeb. fam. 4. sect. 2. fig. 5. Geoff. et Cuvier mammif. Livr. 2.

Oben grünlicht, die Extremitäten graulicht, Unterleib weißlicht, über den Augen ein weißer und ein schwarzer Streif. Gesicht schwärzlicht, in der Jugend fleischfarb. Die Spitze der Unterkinnlade schwarz. Gesäßschwielen und männliches Glied hochroth, der Hodensack lasurblau *). Vaterland Ostindien.

14. Die graue Meerkatze. Cercop. griseus.

Le Grivet Geoff. et Cuvier Mammiferes Livr. 7.

Diese Art steht zwischen dem Malbruck und dem grünen Affen, unterscheidet sich aber von beyden. Der

*) Buffons Talapoin ist vielleicht nur ein junger dieser Art. Cuvier.

Digitized by Google

Kopf ist weniger rundlicht, als bey dem Malbruck, der Hodensack ist schön kupfergrün, und das Haar um die Geschlechtstheile pomeranzenfarb, beym Malbruck weiß. Rücken und Scheitel schmutzig grüngelb röthlicht, das äußere der Hinterschenkel und Schwanzrücken, aschgrau. Der ganze Unterleib, das innere Gesicht schwarz röthlicht, der Schenkel und das untere Theil des Schwanzes weiß. Um die Augen weiß; über die Augen läuft ein weißer, zu beyden Seiten schwärzlicht eingefaßter Streif. Das innere der Hände, wie das Gesicht, so auch die Ohren, welche mit weißen langen Haaren umgeben sind.

Vaterland unbekannt, wahrscheinlich Afrika.

Die meisten der bisher angeführten Meerkatzen sind leicht zähmbare und artige Thiere, sie variren oft in der Farbe. Die nun folgenden werden von Geoffroi zu einer neuen Gattung, welche er Cercocebus nennt, gemacht, als Hauptkennzeichen giebt er an:

Die Schnauze mehr verlängert, daher der Gesichtswinkel nur 45 Grade, der Rand der obern Augenhöhle erhaben, und nach der Nase zu mehr ausgeschweift. Der Daum der Vorderhand dünn wenig abstehend, an der Hinderhand breit und sehr abstehend. Starke Gesäßschwielen, der Schwanz länger als der Körper.

Alle diese Abänderungen berechtigen aber höchstens zu einer Unterabtheilung und bilden keine neue Gattung.

15. Die grüne Meerkatze. Cecop. sabaeus.

S. sabaea Linn. Schreb. XVIII. Audeb. fam. 4. sect. 2. fig. 4. Callitriche Buff. Geoffr. et Cuv. mammifer. Livr. 3.

Pelz schön gelblicht olivengrau, unten schmutzig weiß;

Digitized by Google

an den Backen stehen lange weißlichte Haare, Ohren und Gesicht schwarz. Vaterland Afrika. Senegal. Das grüne Vorgebirge.

16. Der Mangabey. Cercop. Aethiops.

S. Aethiops. Linn. Mangabey à collier blanc. Buff. Schreb. XXI. Geoffr. et Cuv. Mammif. Livr.

Der ganze Oberkörper rothbraun, an den Füßen schwärzlich. Unterleib grauweiß. Der Backenbart ist bald dunkler bald heller, grau oder weißlicht. Das Gesicht dunkelolivenfarb, oder kupferfarb, die Ohren violet, die Augebraunen immer weiß *).

Vaterland Ethiopien.

17. Der Mangabey ohne Halsband. Cercop. Fuliginosus.

S. Aethiops. Linn. Mangabey sans collier. Audebert Fam. 4. Sect. 2. F. 9. Schreber Taf. XX.

Pelz rußbraun einfarbig, die obern Augenlieder weiß. Vaterland Afrika aber nicht Madagaskar.

18. Meerkatze mit straligem Haar. Cercop. radiatus Geoffr. **).

Pelz braun-grünlich, Rücken der Schenkel grau, der Bauch hellgrau, das Haar auf dem Scheitel geht stralig auseinander und bildet eine Art von Mütze.

Neue nirgends abgebildete Art aus Ostindien.

---

*) Cuvier giebt die Farbe als chokoladebraune an, allein dem widerspricht sowohl die Schreberſche als auch die Abbildung von Geoffroi und Cuvier, denen ich daher folgte. A. d. U.

**) Hieher möchte wohl der Affe gehören oder einzuschalten seyn,

Digitized by Google

19. Die Chinesermütze. Cercop. sinicus.

Bonnet - chinois. Buff. S. sinica. Linn. Schreb. XXIII. Audeb. F. 4. Sect. 2. Fig. 11.

Pelz kastanienbraun, die Schenkel lebhaft rothbraun, die Haare auf dem Scheitel bilden eine Mütze. Vaterland Bengalen.

20. Der Atys. Cercop. Atys.

S. Atys Audeb. F. 4. Sect. 2. Fig. 12. Schreb. XIV. B.

Pelz ganz weißlicht.

Nach einem Exemplar im Museum zu Paris wurde diese Art bestimmt. Ob nicht ein Albino einer nach unbestimmter Art? Aus Ostindien.

21. Der Tiákko. Cercop. Aigula.

S. Aygula. Linn. Aigrette Buff. Schreb. XXII.

Oberleib olivenbraun, Unterleib grau, Gesicht fleischfarb, auf der Stirn ein Haarbüschel. Der obere Augenrand vorstehend. Vaterland unbekannt, wahrscheinlich Afrika.

---

welchen der Missionär John aus Tranquebar (Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin. 1. Bd. pag. 211.) beschreibt. Langgeschwänzt, völlig schwarz am Körper, die Haare borstenartig abstehend, am Kopfe ins braune fallend, stachelartig. Gesicht und Ohren schwarz. Vielleicht wäre er unter dem Namen schwarze Meerkatze. Cercop. niger anzuführen. Vaterland Ostindien, Provinz Tellicherie. Anm. d. U.

Digitized by Google

22. Der Makac, oder die eigentliche Meerkatze. Cercop. Cynamolgus.

S. Cynamolgus Linn. Macaque Buff. Schreb. Taf. XIII.: Aigrette. Audeb. Fam. 4. Sect. 2. F. 3. Geoffr. et Cuvier. Cior. 3. Männchen und Junges.

Pelz oben graulicht ins goldfarbe spielend, Backenbart und Unterleib graulicht weiß, Gesicht fleischfarb, Hände und Füße schwarz. Vaterland wahrscheinlich Afrika, nicht Java *).

23. Der Kahau. Cercop. Nasica. (larvatus Kuhl.)

Nasique. Daub. Mem. de l'acad. Guenon á long nez. Buff. Supp. Simia Nasica, Schreb. X. B. X. C. Audeb. Fam. 4. Sect. 2. F. 1. Simia nasalis Shaw 1. p. 55. Nasalis larvatus. Geoff.

Die Schnauze kurz; die Stirne vorspringend, aber nicht stark erhaben. Der Gesichtswinkel 50 Grade. Die Nase vorspringend, rüßelartig verlängert. Die Ohren kurz und rund. Der Körper untersetzt. Der Pelz halb mit rostfarb gemischt, besonders Kopf, Hals, Oberarme und Oberschenkel, Vorderarme, Unterschenkel und Bauch röthlicht grau. Die Nase wie eine ausgeschweifte Spatel, sehr lang.

Vaterland Borneo. In großen Gesellschaften versam-

*) Noch unbestimmt in systematischer Hinsicht sind die von Illiger angeführten Arten Cercopithecus Glaucus, Flavus, Fulvus, Verrucosus und Audeberti, die beyden ersten sollen Afrika, die übrigen dem südlichen Asien angehören. A. d. U.

Digitized by Google

meln sie sich Morgens und Abends auf den Zweigen grosser Bäume, am Ufer der Flüsse und schreien, kahau: Man soll sie auch in Kochinchina finden *).

24. Der Duk. Cercop. nemaeus.

Simia nemaeus Linn. Schreb. XXIV. Douc. Buff. Audeb. Fam. 4. Sect. 1. F. 1.

Keine Gesäßschwielen. Unter allen Affen ist dieser der bunteste, daher nennt ihn auch Oken Kleideraffe, da er wie bekleidet ist. Gesicht fleischfarb, über die Stirn ein schwarzes Band, lange gelbweißliche Backenbärte, unter dem Kinn ein rostfarber und unter diesem ein schwarzer Streif; Kopf, Oberarm und Körper grau, Vorderarm und Schwanz weiß. Hände und Oberschenkel schwarz, Unterschenkel rostbraun. Vaterland Kochinchina **).

Gattung Stummelaffe. Colobus. Illiger.

Schnauze kurz: Stirn niedergedrückt: Der Körper lang und dünne. Die Extremitäten dünne, die Finger kurz. An den Vorderhänden nur vier Finger ohne Daum, Der Daum am Hinterfuß abstehend, und sehr nach hinten gerückt, Schwanz länger als der Körper, dünne. Backentaschen und Gesäßschwielen? Zahnbau unbekannt.

---

*) Geoffroi macht aus diesem Affen ein eigenes Geschlecht unter dem Namen Nasalis.

**) Wegen dem Mangel der Gesäßschwielen, macht Illiger aus ihm und dem nictitans die Gattung Lasyopyga, Geoffroi die Gattung Pygathrix. Cuvier glaubt, die Gesäßschwielen könnten beym Ausstopfen verschwunden seyn, da nur ein Exemplar in Europa existirt.

Digitized by Google

Die beyden erſten Arten, welche zu dieſer Gattung gehören ſollen, ſind noch nicht genau bekannt.

1. Der gemähnte Stummelaffe. Col. Polycomos.

Fuill Botton. Penn. S. Polycomos. Schreb. X. D. Guenon à camail. Buff. S. comosa. Shaw. 1. F. 24.

Schwarz von der Stirn fallen lange graulichte Haare bis auf die Schultern, der Schwanz weißlicht. Vaterland Guinna.

2. Roſtfarbner Stummelaffe. Col. ferrugineus.

Bay Monkey. Penn. Quad. p. 200. Autre guenon. Buff. Supp. Sim. Ferruginea Shaw.

Pelz roſtfarb; Scheitel, Hände und Schwanz ſchwarz. Vaterland Guinna.

3. Temminks Stummelaffe. Colob. Temminkii. Kuhl.

Oben ſchwarz, Schultern und Schenkel außen ſchwarz, Hände, Geſicht und Schwanz roſtroth purpurfarben, die übrigen Theile der Glieder lebhaft roſtfarb, der Bauch rothgelb. Von der Schnauze bis zur Schwanzwurzel 19½ Zoll lang, der Schwanz 12 Zoll lang (obgleich verſtummelt). Vaterland unbekannt. Nach einem Exemplar im Temminkſchen Muſeum.

Gattung. Magot. Innuus. Geoffr *).

Die Schnautze verlängert und dick; der Kopf drei-

*) Dieſen und allen folgenden Affen der alten Welt außer dem Pongo, rechnet Illiger zu ſeiner Gattung Cynocephalus, al

eckig. Die Kinnladen abgerundet. Der Gesichtswinkel 40 Grade, die Nase platt aber lang. Der obere Rand der Augenhöhle erhaben, nach den Augen zu ausgeschweift. Die vordern Hände ziemlich lang. Große Backentaschen und Gesäßschwielen. Der Schwanz fehlt ganz oder ist sehr kurz, niemals länger als ein Drittheil des Körpers. Die Eckzähne zwar länger als die übrigen, aber bey weitem nicht wie bey der folgenden Gattung, mit welcher sie übrigens das gemein haben, daß der hinterste Backenzahn der untern Kinnlade eine unpaarige Erhabenheit mehr hat; daß sie alle, (auch der Makak, der Tjakko und die Chinesermütze) an der Kehle einen Sack haben, der mit dem Luftröhrenkopf unter dem Schildknorpel in Verbindung steht, und welcher, wenn sie schreien, mit Luft sich anfüllt.

1. Ohngeschwänzter Magot. Gemeiner Affe. Innuus ecaudatus.

S. Innuus Linn. S. Silvanus, pithecus et innuus. Schreb. IV. IV. Bet. V. Audeb. Fam. 1. Sect. 3. F. 1. Geoff. et Cuvier mammif. Livr. 2. Magot. Buff.

Pelz graugrünlich: ein Hautanhengsel statt des Schwanzes. Von allen Affen derjenige, der am häufigsten nach Europa kommt, unser Klima am besten verträgt, und sich selbst bey uns fortpflanzt. Sein Vaterland ist Afrika, beson-

---

lein weder der Bau der Schnauze noch der Zähne stimmen überein, man thut daher besser sie zu trennen, wie auch Cuvier gethan hat, welcher auch den Makak, den Tjakko und die Chinesermütze dazu rechnet, welche aber schicklich sich den Meerkatzen anschließen. A. g. U.

Digitized by Google

besonders längs dem Mittelmeer, verwildert findet er sich in den unzugänglichsten Felsen von Gibraltar.

2. Der Rhesus. Innuus Rhesus.

Macaque à queue courte. Buff. Patas à queue courte. S. erythraea Schreb. VIII. c.? (So schlecht, daß man nicht weiß, was es seyn soll). Aud. Fam. 2. Sect. 1. F. 3. Musee d'histoire naturelle.

Pelz graulich, auf Kopf und dem Hinterrücken ins goldgelbe spielend. Schwanz dick aber kurz an seiner Wurzel mit ausstehenden Borstenhaaren. Vaterland? wahrscheinlich Afrika. Ob eine eigene Art?

3. Schweinschwanzaffe. Maimon. Innuus nemestrinus *).

Maimon Buff. S. nemestrina. Linn. Schreber IX. et Platypigos. V. B. Simia Rhesus. Audebert Fam. 2. Sect. 1. F. 3.

Pelz rostfarb oder dunkelbraun oben, auf dem Kopf ein schwarzer Fleck, der sich dem Rücken nach verlängert; um Kopf und Extremitäten gelblich, der Schwanz dünne, und hängend, erstreckt sich nur bis zur Mitte der Schenkel. Vaterland Java und Sumatra.

Eigentliche Hundsköpfe oder Paviane.

Gattung. Hundskopf. Cynocephalus. Illiger. Papio Geoff.

Die Schnauze lang und breit; bey einigen wie ein

*) Kurzschwänziger Magot. Innus leucophaeus Fr. Cuv. Innuus brachyurus. Temmink. Oben grüngelb, fast braun, der Kopf oben, Mittelrücken, Schultern, Hüften, Bauch und innere Seite der Extremitäten weiß, der Schwanz ein Zoll lang mit wenig grauen Haaren bedeckt. Am Nacken mit sehr langen Haaren. Cuvier hält ihn für eine von Maimon verschiedene Art, Geoffroi aber glaubt es sey nur eine Varietät dieses Affen. Er bewohnt Ostindien. A. d. U.

Digitized by Google

Schweinsrüßel, an deſſen Ende die Naſenlöcher liegen. Dies giebt dem Kopf das Anſehen eines Hundskopfes. Der Geſichtwinkel 30—35 Grad; der Schwanz ungleich lang: Der Körper meiſt unterſetzt und ſtark: Die Glieder nicht ſehr lang. Sehr große Backentaſchen; breite Geſäßſchwielen; das Geſäß ſelbſt nackt und aufgedunſen.

Die Backenzähne haben vier Höcker, der hinterſte fünf bis ſieben, die Eckzähne bey einigen ſehr lang und kegelförmig.

1. Der Wanderu. Cynoceph. Silenus. Illig.

S. Silenus Linn. Schreber XI. Ouanderou. Buff. Aud. Fam. 2. Sect. 1. F. 3. S. Leonina Schreb. XI. B.

Schwarz, mit einer graulichen Mähne und weißlichtem Barte, welche den Kopf einfaſſen. Noch iſt es ungewiß, ob der weiße Affe mit ſchwarzem Barte (Simia veter) dieſelbe Art ſey, und dieſe Affen überhaupt in der Farbe abändern. Herr Cuvier ſetzt dieſen Affen noch unter die Meerkatzen. Vaterland Zeilon *).

2. Der braune Pavian. Cynoceph. Sphinx.

S. cynocephalus Linn. Schreb. VI. XIII. B. S. Basiliscus. XXII. C. Geoff. et Cuvier. Mammif. Livr. 6. Papion.

Die Naturgeſchichte dieſes Thieres iſt durch die Herrn Geoffroi und Cuvier vortrefflich auseinandergeſetzt worden, und der Unterſchied zwiſchen dieſem und dem folgenden Affen ſehr gut angegeben, ſo ähnlich ſie auch wirklich ſind.

*) Ob auch Schrebers Simia geron XIC., mit rothbraunem Pelze, ſchwarzen Füßen, ziemlich langem Schwanze, weißem langbeharrtem Scheitel und Backenbart, und fleiſchfarben Fußſohlen hieher gehört, und als neue Art hier einzuſchalten wäre? A. d. U.

Digitized by Google

Die Farbe am ganzen obern Theil des Körpers iſt ein ſchönes Rothbraun, am Bauche und den innern Schenkeln ſchmutzig weißgelb, Geſicht, Ohren und Hände ſchwarz, der Backenbart roſtfarb, der Schwanz ziemlich lang, die Geſäßſchwielen hochroth. Dieſer Affe iſt geil, lebhaft, ſtark, behende, hat in ſeinen Händen ſehr viel Geſchicklichkeit. Scheint ſehr viele intellectuelle Fähigkeiten zu haben, iſt jung ſehr artig und unterhaltend, alt böſe und wild. Vaterland Afrika.

3. Der Hundskopf der Alten. Cynoceph. Antiquorum *).

Papio cynocephalus Kuhl. Le Babouin. Geoff. et Cuvier. Mammif. Babouin.

Auch dieſer Affe iſt trefflich in dem angeführten Werke abgebildet und beſchrieben.

Pelz grüngelb viel heller, als am vorigen, am Bauche und den innern Schenkeln wenig heller. Geſicht olivenfarb, Backenbart gegen die Schnauze heller. Die Augen weiß, ebenſo das innere der Ohren, übrigens hell gelbgrün. Hände fleiſchfarb, der Schwanz ſo lang als am vorigen. Die Naſe iſt ſo lang als die Schnauze, die Löcher ſind oben durch einen Ausſchnitt getrennt; indem die mittlere Naſenknorpel weiter vorgeht, als ſeine Seitenknorpel. Den Schwanz trägt er an ſeinem Urſprung in

*) Ich ſchlage dieſe Benennung darum vor, weil dieſer Affe der Hundskopf der Alten iſt, und derjenige, der in den egyptiſchen Hieroglyphen vorkommt. Ich habe beyde Arten zugleich lebend geſehen, und mich von ihrer gänzlichen Verſchiedenheit leicht überzeugt. A. d. U.

Digitized by Google

die Höhe gerichtet steif, dann aber biegt er sich, und macht einen starken Winkel und geht bis zur Kniekehle herab, er trägt ihn immer steif, und scheint ihn wenig biegen zu können.

Sein Naturell ist wie beym vorigen. Das Vaterland Oberegypten, Aethiopien. Arabien.

4. Der Bären-Hundskopf. Cynoceph. Ursinus. (comatus Geoff.)

Babouin de Bois Buff. Audeb. Variet. de Papion. Fam. 3. Sect. 1. Fig. 2. *) Chacma Geoff. et Cuv. Livr. 7.

Schwarz ins grünlichte spielend, heller an Backenbart, Schultern und längs den Seiten, auf dem Kopf spielt die Farbe mehr ins grünlichte; Gesicht, Ohren, Hände und Fußsohlen nackt, die sehr langen Haare am Hals bilden eine Art Mähne, der nach hinten gehende Backenbart spielt ins graue. Der Schwanz dick und endigt mit einer starken Haarzote. Gesicht schwärzlicht, die obern Augenlieder weiß. Die Nasenlöcher durch eine starke Ausschweifung getrennt.

Das Naturell wild und unbändig. Vaterland Vorgebürge der guten Hoffnung landeinwärts.

5. Schweins-Hundskopf. Cynoc. porcarius.

Simia porcaria et silvestris. Schreb. VIII. B. C.

Groß, der Schwanz kurz, viel kürzer als am braunen

*) Ich zweifle, ob S. Sphingiola Herrmann. Schreb. VI. B. dahin zu rechnen sey, es müßte ein junges Thier mit ganz abgestutztem Schwanze seyn. Geoffroys Papio comatus, würde als Art verschwinden und unter dem Namen Ursinus vorkommen. A. d. U.

Pavian. Die Haare sehr lang, grob, der Körper schwarz. Gesicht und Hände schwarz. In Afrika. Im Berliner Museum. Schrebers Abbildung ist gut. Geoffroi hat ihn nie gesehen.

6. Der Tartarin. Cynoceph. Hamadryas.

S. Hamadryas. Schreb. X. Babouin à museau de chien. Buff. supp. Geoff. et Cuvier. Livr. 5.

Pelz schön hell aschgrau, leicht ins grünlichte spielend. Die Haare am Hals und über die Schultern sehr lang, bilden einen dicken Pelz über den ganzen vordern Theil des Körpers. Der Backenbart geht nach hinten und besteht aus sehr langen weißgraulichten Haaren. Gesicht und Ohren fleischfarb ins ledergelbe ziehend. Der ziemlich lange Schwanz endigt mit einem Büschel. Vaterland Afrika, Aethiopien, Arabien.

Mandrills.

Die Schnautze noch mehr verlängert, als an den vorigen, Gesichtswinkel 30 Grade, die Eckzähne sind so lange als bey keinem Raubthiere, sie erreichen eine Länge von 3 Zollen; wodurch die Schnautze der Schweinsschnautze ähnlich wird. Der Schwanz sehr kurz.

7. Der Drill. Cynoceph. leucophaeus. Geoffroi *).

Geoff. et Cuvier mammif. Livr. 1. und 14. Annal. du Musee. T. IX.

Pelz fein und langhaarig, oben olivengrün, unten

*) Ob der Vellow Baboon. Pennant hieher gehört, ist ungewiß.

weiß. Das Gesicht ist völlig nackt, schwarz, breit, gleicht einer häßlichen Maske, wie die Ohren völlig nackt. Die Backen vorspringend breit und gefurcht. Der Backenbart heller, hinter den Ohren bilden weißlichte Haare eine Art von Halsband, welches am Kinn einen kleinen Bart bildet. Der Schwanz sehr kurz, wie ein Pinsel, Gesäßschwielen und Hodensack nackt, lebhaft hochroth. Das Weibchen wird alle dreißig Tage brünstig, dann schwellen die Geschlechtstheile sehr stark an, und erscheinen wie ein großer Wulst. Ob wirklicher Blutabgang geschehe, ist ungewiß.

Die Länge des erwachsenen Thiers ist etwa vier Fuß. Vaterland Afrika.

8. Der Mandrill. Cynoceph. Mormon.

S. Maimon. Linn. Schreb. VII. jung. S. Mormon Linn. Schreb. VIII. alt. Mandrill jung, Choras alt. Buff. Mandrill. Audeb. F. 2. Sect. 2. F. 1.

Pelz olivenbraun oben, heller und graulicht am Bauche. Am Kinn ein gelber, kleiner, spitziger Bart, auf dem Kopf bilden die Haare eine Art von Wulst, wodurch der Kopf ein fast rautenförmiges Ansehen bekommt. Das Gesicht in der Jugend schön blau und gefaltet, bey alten Männchen wird die Nase lebhaft roth, daher das Gesicht sehr sonderbar. Die Geschlechtstheile und After ebenfalls lebhaft roth, die Gesäßschwielen dunkler ins violette spielend. Der Schwanz sehr kurz. Dieses sonderbare Gesicht, und diese schrecklichen Zähne, geben dem Thier ein häßliches und fürchterliches Ansehen.

Digitized by Google

Beyde Arten, der Drill und Mandrill, sind wilde, unbändige und ihres Gebisses und ihrer Stärke wegen fürchterliche Thiere. Ihre intellectuellen Fähigkeiten scheinen jedoch nicht sehr groß. Vaterland Afrika.

Die Pongos.

Die Aerme und die Abwesenheit des Schwanzes nähern sie den Orangs, Backentaschen, Gesäßschwielen und Zahnbau aber den Hundsköpfen. Die Eckzähne sehr lang. Die Schnauze sehr lang; die Stirne sehr flach und zurücktretend. Der Gesichtswinkel 30 Grade. Der Schedel sehr klein und zusammengedrückt, das Gesicht pyramidenförmig, da die Kronfortsätze der Unterkinnlade sehr vorstehen und gegen das Gesicht erhöhet sind, ein Beweis, daß die Stimmorgane etwas ähnliches mit denen der Brüllaffen haben. Sie haben auch einen häutigen Kehlsack, der mit dem Luftröhrenkopf in Verbindung steht.

Man kennt nur eine Art, der größte aller Affen.

Der Pongo des Wurmbs. Pongo Wurmbii.

Nur der Skelet ist gut abgebildet bey Audebert. Pl. 11. F. 5.

Eines der merkwürdigsten Thiere dieser Klasse. Der Pelz dunkelbraun fast schwarz, Gesicht und Hände schwärzlich. Vaterland Borneo.

Vieles, was man von seiner Geschichte erzählt, gehört vielleicht dem Orang-Utang, und beyde wurden miteinander verwechselt. Die Länge seiner Arme, die Länge der Wirbelfortsätze seiner Halswirbel, die Erhabenheit seines Sprungbeins, können ihm, ungeachtet der verlängerten

Digitized by Google

Schnautze das aufrechte Stehen erleichtern, dann hat er beynahe die Größe eines erwachsenen Menschen *).

Amerikanische Affen. Sapajous.

Die allgemeinen Kennzeichen aller amerikanischen Affen sind.

Die Nasenscheidewand ist breit, daher auch die Nase breit, die Nasenlöcher öffnen sich zur Seite. Die Nath, welche die Nasenknochen vereinigt, verschwindet erst im höhern Alter. Sie haben vier Backenzähne mehr als andere Affen, in allem 36 Zähne. Der Schwanz fast bey allen lang, keine Backentaschen und Gesäßschwielen. Ihre dicken Därme sind weniger aufgeblasen, und der Blinddarm ist länger und schmächtiger als bey den übrigen Affen.

Die einen haben einen Wickel- oder Rollschwanz, das heißt, sie können mit dem Ende desselben, mit ziemlicher Stärke, wie mit einer Hand fassen. Man hat diesen den Namen der Sapajous vorzüglich gegeben.

Brüllaffen. Stentor. Geoff. Mycetes. Illiger.

An der Spitze dieser Affen stehen die Brüllaffen, welche sich durch einen pyramidenförmigen Kopf, an welchem die Oberkinnlade viel tiefer herabsteigt, als der Grund des

*) Dies sind alle Affen des alten Festlandes, welche mit Gewißheit bis jetzt bestimmt werden können. Die Arten Senex oder Geron, veter, penicillatus, nasutus, superciliaris, recti caudis, einereus, aemulus, nigrita, cristatus, grandis, welche Illiger anführt, und welche mit Ausschluß der drey ersten, welche in Asien leben, alle in Afrika sich finden sollen, sind durchaus unbestimmt und fraglich? A. d. U.

Schedels, auszeichnen. Die Kronfortsätze der Unterkinnladen sind sehr lang, weil im Raume der Unterkinnlade eine knöcherne Trommel liegt, welche durch eine blasenartige Erhöhung des Zungenbeins gebildet wird, und mit dem Luftröhrenkopf in Verbindung steht, durch diese Einrichtung können diese Affen ein fürchterliches und weittönendes Gebrüll von sich geben, daher der Name Brüllaffen. Derjenige Theil des Schwanzes, mit welchem sie fassen können, ist nackt und schwielig. Die Eckzähne vorstehend und pyramidenförmig. Der Gesichtswinkel ungefähr 60 Grade.

1. Rother Brüllaffe. Stentor seniculus *).

Alouate Buff. S. seniculus Linn. Schreb. XXV. C. Audeb. fam. V. sect. I. f. I. Mono colorado Humboldt Observ. Zool.

Pelz rothbraun, Brust und Bauch kahl. Die Größe eines starken Fuchses. Der Ton ist kurz und grunzend aber doch laut. Er lebt in großen Gesellschaften; ist wild boshaft, kommt selten auf die Erde, ist schwer zu zähmen, beist heftig. Lebt mehr von Blättern als von Früchten. In den Wäldern von Guiana.

2. Bärenartiger Brüllaffe. St. Ursinus.

L'Araguato Humb. observ. Zool. fig. 30.

Mit Bart, langen rothen Haaren, das Gesicht schwarzblau. Das Haar länger als am vorigen. Der zahlreich-

*) Die Arten der Brüllaffen sind noch nicht mit Gewißheit bestimmt und einige der angeführten vielleicht bloße Varietäten. A. d. U.

Digitized by Google

ſte Affe in ſeinem Vaterland, Humboldt zählte am Apure oft vierzig auf einem Baum, und glaubt, daß im Umfang einer Quadratmeile wohl 2000 leben. Vaterland Venezuela, Neuandaluſien und Granada am untern Orinoko, auch in Braſilien.

3. Strohfarber Brüllaffe. St. stramineus.

Das Haar an der Wurzel braunlicht mit ſtrohfarber Spitze. Gumilla nennt ihn Arabata. In den Wäldern von groß Para.

4. Der Caraja. St. Caraya Humb.

Carraya d'Azzara. Stent. niger. Geoff.

Kopf und Rücken tiefſchwarz, das Weibchen iſt an den Seiten und Bauch braun. Lebt in Paraguay.

5. Der Guariba. St. Guariba. Humb.

St. fuscus Geoff. Quarine Buff. S. Belzebuth. Linn. Schreb. XXV. B.

Der Pelz kaſtanienbraun, die Spitzen der Haare mit Goldglanz. Dies iſt der Brüllaffe, deſſen langgedehnte, lauttönende brüllende Stimme man ſtundenweit, bey Tag und bey Nacht hören kann, oft heult nur einer, dann fallen die andern im Chor ein. Vaterland Braſilien, wird häufig gegeſſen, ſein Fleiſch iſt ſüßlicht.

*) 6. Der Choro. St. flavicaudus. Humb.

Pelz ſchwarzbraun, der Schwanz olivenfarb, von der

*) Außer dem bärenartigen Brüllaffen, welcher in Humboldts zoologiſchen Heften treflich abgebildet iſt, und Audeberts

Mitte gegen die Spitze ziehen ſich zwey gelbe Längsſtreifen. Das Geſicht gelbbraun, etwas haaricht, die Ohren nackt. Der Schwanz kürzer als der Körper. Beynahe der größte Affe Amerikas, drey Fuß 8 Zoll lang. Seines ſanften und glänzenden Pelzes bedient man ſich um die Sättel der Maulthiere über die Cordilleras zu bedecken. Sie iſt Handelsartikel für die Wilden. In Truppen am Amazonen-Strome, in den Provinzen Jaen und Maynas.

7. Rothhändiger Brüllaffe. Stent. rufimanus. Kuhl.

Schwarz, Hände und Schwanzende roſtfarb. Unterleib und Geſicht nackt. Der Schwanz ſo lang als der Körper. So groß als der Spinnenaffe. Im Temminkiſchen Muſeum.

Klammeraffen. Ateles.

Geſicht rund und platt, der Geſichtswinkel ungefähr 60 Grad. Das Zungenbein von außen nicht ſichtbar, aber etwas aufgeblaſen und zellig. Vollkommener Wickelſchwanz. Die Vorderhände nur vierfingerig, entweder ganz ohne Daum, oder nur mit einer Daumwarze. Die Eckzähne vorſtehend kegelförmig. Arme und Beine ſehr lang und dünne. Ihre Bewegungen ſind langſam *).

Alouate, iſt kein Affe dieſer Gattung gut abgebildet, die Schreberſchen ſind höchſt elend. A. d. U.

*) Sie haben am Schenkel den zweybauchigen Schenkelmuskel, welchen kein anderes Thier als der Menſch hat.

Digitized by Google

1. Der Chamek. Ateles pentadactylus.

Ann. du Mus. 7. p. 267.

Ganz schwarz, ein sehr kurzer Daum an der Vorderhand. Vaterland Peru.

2. Der Coaita. A. Paniscus.

Coaita Buff. S. paniscus Linn. Schreb. XXVI. Aud. fam. 5. S. 1. fig. 2. Annal. du Mus. 7. p. 269. Geoff. et Cuvier. Mammiferes. Tom. I.

Ganz schwarz ohne Daum an der Vorderhand. Leben von Baumfrüchten und Insekten. Die Männchen sind sehr geil, das Weibchen wirft zwey Junge, trägt dann das eine auf seinem Rücken, das andere unter dem Arme. Die Jungen lassen sich zähmen, sind dann artig und einschmeichelnd, allein ihre Bewegungen sind langsam und mühsamer als bey andern Affen. Dauren in kalten Ländern nicht lange. Wird in Amerika gegessen. Vaterland Guiana.

3. Der Belzebuth. At. Belzebuth.

Annales du Museum VII. p. 271. Marimonda. Humb.

Braunschwarz, vierfingerig, Bauch, Beine und unterer Theil des Schwanzes weiß.

An den Ufern der Orinoko, oberhalb der Wasserfälle von Atures und Manpures.

Sein Charakter ist sanft, furchtsam, melancholisch und langsam. Sein Wickelschwanz ist der vollkommenste, er scheint in seiner Spitze ein vollkommenes Getaste zu haben, langt damit in die kleinsten Oeffnungen, und holt die ge-

Digitized by Google

wünschten Gegenstände heraus. Sie hängen sich oft je zwey zu zweyen aneinander und bilden so seltsame Gruppen.

4. Der Chuva. At. marginatus.

Ann. d. Mus. VII. pl. 10.

Schwarz das Gesicht, mit weißem oder gelblichem Rande eingefaßt, Brust und innere Schenkel weißgrau. Häufig in der Provinz Jaen, an den Ufern des St. Jago und Amazonenflusses.

5. Der Spinnenaffe. At. arachnoides.

Ann. d. Mus. XIII. pl. 11.

Braungelb, der Daum fehlt gänzlich. Wahrscheinlich in Brasilien: Den Namen hat er wohl als besonderer Liebhaber von Spinnen, welche viele Affen gerne fressen, erhalten?

6. Rußschwarzer Clammeraffe. Atel. fuliginosus. Kuhl.

Kein Rudiment des Daumens. Rußfarbig, dunkler an der Außenseite der Vorderfüße und am Schwanz, auf den Hinterbacken und an der untern Seite des Schwanzes gelblich. Backen und Unterleib graugelb. Auf dem Rücken haben die Haare graue Wurzeln, an den Unterschenkeln, Knieen und Händen dunkel. So groß als der folgende, aber Glieder und Schwanz dünner. Im Pariser Museum.

7. Geoffroys Clammeraffe. Atel. Geoffroyae. Kuhl.

Keine Daumwarze. Der Körper blaß bleifahl, oder rußig grau, Unterleib graulich oder gelblich weiß. Der

Digitized by Google

Schwanz an seiner Wurzel und Unterseite gelblich. An den Unterschenkeln ein großer schwarzer Fleck, die Hände schwarz, an den vorderen mit einigen weißen Haaren gemischt. Scheitel und äußere Seite des Vorderarms schwarzbraun. Die obere Seite des Schwanzes und seine Spitze braungrau; die Stirnhaare nach hinten, die Scheitelhaare nach vorn gekehrt, die Größe des Belzebuth, sehr schlank, Glieder und Schwanz sehr lang. Im Pariser Museum.

8. Der Mono. Atel. Hypoxanthos. Neuwied.

Mit langen Gliedern, starkem langem Schwanze. Haar fahl graugelblich, an der Schwanzwurzel gelbroth, Gesicht fleischfarben mit schwarzen Punkten und Flecken bestreut. Ganze Länge bis zur Schwanzwurzel 46 Zoll 4 Linien. Der Daum an der Vorderhand ist ein Rudiment. Ostküste von Brasilien heißt auch Miriki *).

Der Wollhaaraffe. Lagothrix.

Der Kopf rund: Gesicht vorspringend. Der Gesichtswinkel etwa 50 Grade. Das Jnngenbein von außen wenig sichtbar; die Hände fünffingerig. Das Haar weich und kraus. Die Nägel kurz und gebogen.

1. Humboldts Wollhaaraffe. Lagothr. Humboldtii. Caparro. Humb.

Grau die Haare mit schwarzen Spitzen, das Gesicht schwarz, das Haar lang. Zwey Fuß, zwey Zoll lang, starker Körper, nicht unangenehme Physiognomie. Sehr

*) Die Arten sind schwer zu bestimmen, und wahrscheinlich auch bey Ateles ändern Alter und Geschlecht viel.

Digitized by Google

lebhaft. Das Haar weich, um den Mund ſtehen lange ſteife Haare, der Schwanz Greifſchwanz. Am Guaviare und Amazonenſtrom. Nirgends abgebildet.

2. Grauer Wollhaaraffe. Lagothr. canus.

Mit kurzen graulicht olivenbraunen Haaren, Kopf und Schwanz rothgrau. Vaterland Braſilien. Nirgends abgebildet.

Sajous . . . Cebus. (auch Sahui).

Der Kopf rund, die Schnautze kurz. Die Stirne etwas vorſpringend. Der Geſichtswinkel 60 Grade. Das Hinterhaupt nach hinten vorſpringend. Der Schwanz ganz kurz behaart. Greifſchwanz, die Nägel gewölbt und kurz. Die Eckzähne vorſtehend koniſch.

1. Der braune Sajou. Ceb. Apella.

Sajou brun. Buff. S. Apella Linn. Schreb. XXVIII. Aud. fam. 2. f. 2.

Der Körper braun, Scheitel und Füße ſchwarz, das Geſicht mit ſchwarzbraunen Haaren bedeckt.

Lebhaft, munter, ſpielend, leicht zähmbar, nicht ſehr zärtlich. Wirft ſelbſt in Europa Junge: frißt Blätter, Obſt, Inſekten. Im franzöſiſchen Gujana.

2. Winſelaffe. Sai. Ceb. capucinus.

Sai Buff. S. capucina Linn. Schreb. XXIX. Aud. fam. 5. s. 1. f. 4.

Mehr oder minder braun, Scheitel und Füße ſchwärzlich, Geſicht mit einem gelblichen Rande umgeben. Die Farbe wechſelt gar ſehr, es iſt daher ſchwer zu beſtimmen,

Digitized by Google

ob es mehr Varietäten sind oder wirkliche Arten, welche unter dieser Art angeführt werden.

3. Der Hornaffe. Ceb. fatuellus.

Sajou cornu. Buff. Simia fatuellus Linn. Schreb. XXVII. B. Audeb. fam. 5. s. 2. f. 3. Mico in Brasilien.

Auf dem Rücken kastanienbraun, an den Seiten heller, lebhaft, rothbraun am Bauche, Füße und Schwanz schwarz. Der Kopf verlängert; an der Stirne erheben sich zwey starke abgesonderte Haarbüschel, wie Hörner. Vaterland Gujana. Brasilien *).

6. Zitteraffe. Ceb. trepidus.

S. trepida Linn. Schreb. XXVII.

Kastanienbraun; das Haar am Kopfe aufstehend, schwarzbraunlich wie eine Haube; Hände grau. Vaterland Holländisch Gujana.

7. Schwarzer Sajou. C. niger.

Buffon Supp.

Gesicht, Hände und Schwanz schwarz, Stirn und Backen weißlicht. Vaterland? Ungewiß als Art.

8. Weißstirniger Sajou. Ceb. albifrons Hub.

L'Ouavapavi Humboldt.

Ohne Bart, weißgrau, Scheitel schwarz, Gesicht blau, Stirn und Augenlieder weiß, Arme und Schenkel

*) Die Arten vier und fünf scheinen nur Abänderungen des Sai zu seyn, doch läßt sich darüber nichts bestimmtes sagen, dies scheint noch bey einigen andern ebenfalls der Fall zu seyn, da Alter, Geschlecht und Aufenthalt viel in der Farbe ändern.

Digitized by Google

kel bräunlicht. Häßliche aber ſanfte und muntere Thiere, leben in Heerden in Wäldern am Orinoko. Humboldt ſah einen zahmen, der den ganzen Tag auf dem Rücken eines Schweines herumritt, ein anderer ſtieg auf den Rücken einer Katze, welche ihn geduldig trug. Nirgends abgebildet.

9. Gemähnter Sajou. Ceb. cirriferus. Geoff.

Kaſtanienbraun, am Bauche heller. Scheitel und Schwanzſpitze ſchwarz, das Haar an der Stirn iſt ſehr lang und bildet ein Hufeiſen. Das Haar lang und weich. Vaterland Braſilien. Nirgends abgebildet.

? 10. Bärtiger Sajou. Ceb. barbatus. Geoff.

Sai var. A. Aud. Fam. 5. S. 2. F. 6. Sajou gris. Buff.

Pelz rothgrau, oder weißgrau, der Bauch roſtfarb; an den Backen ein langer Bart. Kopf rund. Haar lang und weich. Vaterland Gujana. Ungewiß als Art.

11. Geſchäckter Sajou. Ceb. variegatus.

Pelz ſchwärzlich mit Goldſchein. Der Bauch röthlicht: Die Kopfhaare dreyfarbig; an der Wurzel braun, dann roth und an der Spitze ſchwarz: Der Kopf rund: Die Schnautze vorſpringend. Vaterland Braſilien. Nirgends abgebildet.

12. Weißkehliger Sajou. Ceb. Hypoleucos.

Cariblanco Humboldt. Say a gorge blanche. Buff. Aud. Fam. 5. S. 2. Fig. 5.

Pelz ſchwarz: Mitte und Seiten des Kopfs, Kehle und Schultern weiß. Schwanz rothbraun. Schreit immer kläglich. In zahlreichen Heerden am Fluße Siu.

? 13. Gelber Sajou. Ceb. Flavus.

Sim. Flavia. Schreb. XXXI. B.

Pelz ganz gelbröthlicht, oder graulichgelb. Brasilien. Margrafs Caitaia. Ungewiß als Art.

? 14. Weißer Sajou. Ceb. albus *).

Pelz ganz weiß. Wahrscheinlich nur weiße Varietät einer der vorigen Arten. Brasilien.

15. Sajou Macaco. Ceb. Xanthosternos. Neuwied.

Macaco di bando.

Körper bräunlich, Brust und Unterhals gelblich, Glieder schwarzbraun, Kopf dick mit schwarzbraunem Backenbart. Die ganze Länge zwey und dreißig Zoll, acht Linien, des Rollschwanzes siebenzehen Zoll, sieben Linien, Ostküste von Brasilien.

16. Schwarzscheitliger Sajou. Cebus frontalis Kuhl.

Auderb. Saj. variet. F. 5. Sect. 2. F. 3.

Schwarzbraun fast einfärbig, Scheitel, Hinterfuß, Schwanzende schwarz. In der Mundgegend und an den Händen einige weiße Haare. Die Haare an der Stirn aufstehend, sehr dicht. Der Kopf groß. 15½ Zoll lang. Im Pariser Museum.

---

*) Viele dieser Arten sind vielleicht nur Spielarten, da die Farben bey den Sajous gar sehr abwechseln. Auszustreichen sind Ceb. Sirichta Schreb. und morta, da sie nicht existiren.

Digitized by Google

17. Braunschwarzer Sajou. Ceb. lunatus. Kuhl.

Braunschwärzlich, Kopf, Vorderfüße und Stirn schwarz, auf den Wangen ein weißer halbmondförmiger Fleck, von den Augen zum Munde gehend. Von der Größe des Apella.

18. Starker Sajou. Ceb. robustus. Neuwied.

Von der Größe des Xanthosternos, der Körper stark, die Extremitäten und der Schwanz mit starken Muskeln, und sehr dichten Haaren. Der Kopf groß, rundlich, das Gesicht breit, graulich fleischfarben, wenig behaart. Die Eckzähne kegelförmig sehr stark. Am Scheitel stehen einzelne kleine Haarbüschel aufrecht. Der Kopf schwarz, Hände, innere Seite der Extremitäten, Vorderarme, Unterschenkel und Schwanz glänzend braunschwarz, die übrigen Theile mit langen, weichen, glänzenden, röthlich kastanienbraunen Haaren besetzt, welche an ihrer Wurzel grau sind. Der Bauch wenig behaart, die Geschlechtstheile braunschwarz, nackt. Bey Alten ist das Gesicht oft grau eingefaßt.

Gemein in Brasilien, doch nicht südlich dem Fluße Doce. Das Weibchen hat oft auf der Schulter eine gelbrothe Binde. Die Stimme hat viel Aehnliches mit der des gehörnten Sajou. Im Neuwiedischen und Pariser Museum.

Sagoine. Callithrix.

Kein Wickelschwanz. 6 Backenzähne. Die Eckzähne länger als die Vorderzähne, kegelförmig von den Vorderzähnen nicht abstehend. Der Kopf rund. Die Schnautze kurz. Gesichtswinkel 60 Grade. Die Ohren groß, der

Digitized by Google

Schwanz länger als der Körper, kurzhaarig ganz schlaff. Die Nägel kurz und gerade.

1. Der Saimiri. Titiam Orinoko. Call. sciureus.

Saimiri Buff. Aud. Fam. 5. S. 2. F. 7. S. sciurea. Linn. Schreb. XXX.

Gelb ins goldfarbe spielend, Schultern, Oberarm und Schenkel rosifarb. Gesicht weißlicht. Mund und Nase schwarz. Der niedlichste und gesuchteste Affe Amerikas. Seine Bewegungen sind munter, leicht und anmuthig. Das Naturell sehr sanft: frißt besonders gern Spinnen und Insekten. Häufig am Orinoko, Guaviare und Caßiquiare.

2. Der maskirte Sagoin. Call. personatus.

Graubraun, Kopf und Füße braunschwarz, der Schwanz rosiroth. Sauaßu in Brasilien. Nirgends abgebildet.

3. Die traurende Wittwe. Call. lugens.

La Viduita. Humb.

Schwarz ohne Bart mit weißgeflecktem Gesicht, weißer Kehle und Vorderarmen. Die Füße schwarz, die Hände außen weiß, innen schwarz, die Nägel schwarz.

Nicht so sanft, frißt Vögel und anderes frisches Fleisch, doch auch Blätter und Obst. Bringt alles mit beyden Händen zum Mund. Klettert leicht und lauft schnell.

In Wäldern am Caßiquiare und Guaviare. Nirgends abgebildet.

Digitized by Google

4. Halsband Sagoin. Call. torquatus. Hoffm.

Kastanienbraun, Bauch und Arme am innern Theile weißgelb, Hände und ein Fleck an der Kehle schneeweiß. In groß Para.

5. Sagoin mit Halskragen. Call. Amictus. Hoffm.

Braunschwarz mit weißer Kehle, gelben Händen, Schwanz länger als der Körper. Lebt in Brasilien. Nirgends abgebildet. Lugens, torquatus und amictus scheinen nur eine Art auszumachen?

*) 6. Der Moloch Sagoin. Call. Moloch. Hoffm.

Mausefarb, Schläfe, Wangen und Bauch rostfarb, der Schwanz braun mit weißer Spitze, die Hände weiß. In groß Para. Nirgends abgebildet.

7. Der Gigot. Call. melanochir. Neuwied.

Das Haar lang, dicht und sanft, schwärzlich und weißlich gemischt, daher grau, der Rücken kastanienbraun, der Schwanz weißlich, oft beynahe weiß, oder auch gelblich. Gesicht und Hände schwarz. Länge 35 Zoll, wovon der Schwanz allein fast 22 Zoll wegnimmt.

In den Urwäldern an der Ostküste von Brasilien.

8. Weißaugichter Sagoin. Call. infulatus. Lichtenst.

Oben an jedem Auge ein großer, weißer Fleck, der schwarz umfaßt ist. Der Körper oben grau, unten gelb-

*) Diese drey Affen beschreibt Herr von Hoffmannsegg in den Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin. Ister Band.

Digitized by Google

röthlich. Der Schwanz an der Wurzel gelbbraun, die Spitze schwarz. Selten. In Brasilien. (Im Berliner Museum).

Nachtaffe. Aotus. Illiger.

Kopf rund und breit, die Schnauze kurz, der Gesichtswinkel etwa 60 Grade. Die Augen sehr groß, nahe beysammen. Die äußern Ohren sehr klein; der Schwanz länger als der Körper. Die Nägel kurz. Nächtliche Thiere.

1. Humboldts Nachtaffe. Aotus Humboldti.

Aotus trivirgata, Douroucouli. Humb. observ. Zoolog. p. 306. F. 18.

Grau, die Haare an der Spitze weißlicht, silberglänzend, sehr weich. Kehle, Brust und Unterleib gelbröthlicht. Schwanz am Ende schwarz und langhaarig. Der Kopf katzenartig, die Stirn weißlicht, mit drey schwarzen Streifen. Schläft am Tage, ist nur des Nachts munter, sieht am Tag nicht gut; frißt besonders gerne Fliegen, aber auch alle Arten von Vegetabilien.

In den dichten Wäldern am Caßiquiare, auch in Guiana und Brasilien.

Schweif-Affe. Pithecia.

Der Kopf rund; die Schnautze kurz, den Gesichtswinkel etwa 60 Grade. Die Nasenscheidewand breiter, als die Zahnreihe der Vorderzähne der Oberkinnlade. Die untern Vorderzähne stehen vorwärts, sind etwas lang von den Eckzähnen abstehend; die Ohren mittelmäßig abgerundet und gerändelt wie am Menschen. Der Schwanz we-

Digitized by Google

niger lang als der Körper, langhaarig. Die Nägel kurz zurückgebogen, über das letzte Gelenk vorragend.

A. Mit Bart.

1. Der Satan. Pith. Satanas. Hoffm.

Couxio Humb. observ. Zool. pl. XXVII.

Schwarzbraun mit langem Bart, der Schwanz sehr haarig, Brust und Bauch fast nackt. Länge bis Ende des Schwanzes 2 Fuß 9 Zoll. Am Orinoko.

2. Der Händetrinker. P. Chiropotes. Humb.

Le Capucin de l'Orenoque.

Bärtig, kastanienbraun, das Haar des Scheitels der Länge nach getheilt. Gesicht menschenähnlich und nackt. Trinkt mit der hohlen Hand schöpfend, fürchtet sich den Bart naß zu machen. Von traurigem Naturell. Lebt Paarweis am obern Orinoko. Nirgends abgebildet.

3. Der Saki. Pith. rufiventer. Geoff.

Aud. Fam. 6. S. 1. F. 1.

Braun, röthlich gewässert; der Bauch rothbraun. Das Haar an der Wurzel braun, gegen die Spitze rothbraun und braun geringelt. Am Scheitel lang auf die Stirn herabhängend. Munter, aber tückisch und boshaft. Vaterland Gujana und Brasilien.

4. Der Mönch. Pith. Monachus. Geoff.

Pelz mit braunen und goldfarben Flecken, die Haare weißbraun, am Ende rothgoldgelb; das Haar am Hinterhaupt lang, die Stirne nackt. Nirgends abgebildet. Brasilien?

Digitized by Google

5. Der Miriquouina. Pit. Azzaræ. Geoff.

Azzar. hist. natur. de Paraguay.

Graubraun, am Rücken weiß und schwarz geringelt, am Bauch röthlicht; über den Augen zwey weiße Flecke. Nicht abgebildet. In Paraguay.

6. Der Jarke. Pith. leucocephala.

Aud. Fam. 6. S. 1. F. 2. Schreb. XXXII.

Schwarz, das Haar um den Kopf weiß. In Gujana. Ohne Bart, kurzem Schwanz.

7. Der Schwarzkopf. Pith. melanocephala. Humb.

Humb. Observ. Zool. pl. XXIX.

Unter allen amerikanischen Affen der einzige, dessen Schwanz kürzer als der Körper ist, nur drey Zoll lang, die übrige Körperlänge ein Fuß, fünf Zoll. Der Kopf schwarz, der übrige Körper braungelblicht. Vaterland Brasilien, Gujana.

8. Rothbärtiger Schweifaffe. Pith. rufibarbata. Kuhl.

Seiten, Hüften, Schultern, und Haare unter den Augen blaßrosifarben. Die übrigen Theile mit sehr langen rußschwarzen Haaren, die an der Spitze blaß geringelt sind, bedeckt. Der Schwanz zugespitzt, da alle Haare nach der Spitze zu immer an Länge abnehmen, wodurch sich diese Art leicht unterscheidet. In Surinam. (Im Temminkischen Museum.)

Digitized by Google

9. Gelbköpfiger Schweifaffe. Pithecia ochrocephala. Kuhl.

Die Haare um das Geſicht, beſonders die Stirne, die Haare unter den Augen weißlicht ochergelb. Die Stirnhaare der Länge nach geſcheitelt. Obertheil des Schwanzes, äußere Seiten der Extremitäten lebhaft kaſtanienbraun, die Haare mit weißen Spitzen. Die Hände braunſchwarz, die untern Seitentheile und die innern Theile der Schenkel rothgraugelb. In Cayenne. (Im Temminkiſchen Muſeum.)

Die letzte Familie der Affen, begreift die Familie der Seidenaffen, der Uiſtitis von Buffon. Illiger nennt ſie Hapale. Geoffroi Arctopithecus. Letzterer macht daraus zwey Gattungen, die des Uiſtiti und des Tamarins. (Jacchus et Midas.)

Dieſe Familie iſt klein, ähnelt den Sakis, und wurde lange mit den übrigen amerikaniſchen Affen vermiſcht: Sie haben, wie die meiſten amerikaniſchen Affen, einen runden Kopf, ein etwas plattes Geſicht, die Naſenlöcher zur Seite, keine Backentaſchen und Geſäßſchwielen, kein Wickelſchwanz wie die Sakis; aber nur zwanzig Backenzähne, wie die Affen des alten Feſtlandes; alle ihre Nägel ſind zuſammengedrückt und ſpitzig, ausgenommen der Nagel des Hinterdaums, und die Daumen der Vorderhand ſind ſo wenig abſtehend, daß man ſie kaum wahre Vierhänder nennen kann. Es ſind alles kleine Thiere von angenehmer Geſtalt, welche leicht zahm werden.

Seidenaffe. Hapale.

Die Schneidezähne ungleich, die mittlern geſtreift, die äußern ganz ahlenförmig, die untern äußern ein Drittheil

länger als die obern, in eine Lücke der obern schließend, die Augenhöhlenränder nicht hervorstehend.

1. Der weißohrige Uistiti. Hapale Jacchus.

S. Jacchus Linn. Schreb. XXXIII. Cuvier et Geoff. mammif.

Graulich mit langen weißen Haarbüscheln an den Ohren. Der Schwanz braun und graugeringelt. Länge 19 Zoll, des Schwanzes 11 Zoll. Azzara nennt ihn Titi.

Dieses Thier hält sogar das Klima von Petersburg aus, und hat daselbst Junge geworfen. Sie bedienen sich ihrer Hände ungeschickt, klettern aber leicht. Vaterland fast ganz Südamerika.

2. Uistiti mit Pinselschwanz. Hap. penicillatus.

Graulicht; auf dem Rücken und Schwanz braun und graugeringelt; Kopf und Oberhals schwarz, Ohrenbüschel lang und schwarz. Nirgends abgebildet. Scheint nur eine Varietät des vorigen? Vaterland Brasilien.

3. Weißköpfiger Uistiti. Hapal. leucocephalus.

Rothbraun, Kopf und ein Fleck auf der Brust weiß; der Oberhals schwarz; der Schwanz braun und grau geringelt; vor und hinter den Ohren sehr lange schwarze Haare. Nirgends abgebildet. Vaterland Brasilien?

4. Langöhriger Uistiti. Hap. auritus.

Schwarz: Schwanz schwärzlich und grau geringelt; auf der Stirn ein weißer Fleck: Sehr lange weiße Haare bedecken das Ohr, selbst inwendig. Nicht abgebildet. Brasilien?

Digitized by Google

5. Weißſchultriger Uiſtiti. Has. humeralifer.

Kaſtanienbraun, Schultern, Bruſt und Arme weiß, der Schwanz undeutlich geringelt. Nicht abgebildet. Braſilien.

6. Schwarzſchwänziger Uiſtiti. Hap. melanurus.

Braun, Unterleib gelbbraun, Schwanz ſchwarz. Nicht abgebildet. Braſilien.

6. Weißer Uiſtiti. Hap. argentatus.

Le Mico Buff. Aud. fam. 6. s. 2. f. 1. Schreb. XXXVI.

Weiß ins ſilberfarbe ſpielend; Schwanz ſchwarz. In groß Para. Nur 7 Zoll lang ohne den Schwanz.

Tamarins. Midas Geoffr.

Schneidezähne ſtehen nahe an einander, ſind gleich lang, vorn ſchief abgeſchnitten; der obere Augenhöhlenrand ſteht vor. Die Ohren groß.

1. Der rothhändige Tamarin. Mid. rufimanus.

Tamarin. Buff. Aud. fam. 6. s. 2. fig. 5. S. Midas Linn. Schreb. XXXVII.

Schwarz: auf dem Unterrücken grau gemiſcht. Hände roſtgelb. Gujana.

2. Der ſchwarze Tamarin. Mid. ursulus. Geoff.

Tamarin nègre Aud. f. 6. s. 2. f. 6. Geoffr. et Cuv. mamm. IX.

Schwarz: auf dem Rücken rothbraun gewellt. Die Hände ſchwarz. In Para.

Digitized by Google

3. Weißlippiger Tamarin. Mid. labiatus Geoff.

Pelz schwärzlicht; unten rostroth: Kopf schwarz, Nasen und Lippen weiß. Nicht abgebildet. Brasilien?

4. Löwen Tamarin. Mid. leoninus.

Leoncito Humb. observ. Zoolog. Pl. V.

Bräunlicht olivenfarb, die Haare schwarz geringelt, am Hals bilden sie eine Art von Mähne. Gesicht schwarz, Mund weiß. Schwanz von der Farbe des Rückens. Südseite der Anden.

5. Der Marikina. Mid. Rosalia.

Marikina Buff. Aud. fam. 6. s. 2. f. 5. Schreb. XXXV. Geoff. et Cuv. Mammif. Livr. I.

Pelz gelb goldglänzend, das Gesicht nackt, mit langen seidenartigen glänzenden Haaren umflossen. Brasilien.

6. Der Pinche. Mid. Oedipus *).

S. Oedipus Schreb. XXXIV. Aud. Pinche fam. 6. s. 2. f. 2.

Falb bräunlicht, unten weiß, um den Kopf eine weiße seidenartige Mähne; der Schwanz an der Wurzel braunroth, an der Spitze schwarz, dünne. Am Amazonen Strom und in Gujana.

7. Goldstirniger Tamarin. Mid. chrysomelas. Neuwied.

Schwarz, Stirn und oberer Theil des Schwanzes

*) Schreber hat auch nicht einen einzigen von allen amerikanischen Affen erträglich abgebildet, die meisten unkenntlich, am besten Simia flavia. A. d. U.

Digitized by Google

goldglänzend, Vorderfüße, oberer Theil der Unterſchenkel, Bruſt und Seiten des Kopfs kaſtanienbraun.

Selten in Braſilien zwiſchen dem 14. und 15. Grad in den großen Wäldern am Rio dos Ilheos.

In dem Muſeum des Prinzen von Neuwied, Temminks und zu Berlin, alle vom Prinzen aus Braſilien gebracht.

Halbaffen. Makis. Lemures. Cuv. Prosimii. Illiger.

Linneus zählte unter dieſe Gattung alle Vierhänder, welche in der obern oder untern Kinnlade mehr als vier Vorderzähne haben, oder bey denen ſie wenigſtens anders ſtehen, als bey den Affen. Da dieſer Charakter verneinend iſt, ſo konnte daraus nichts anders als Verwirrung entſtehen, es wurden Thiere in eine Gattung gebracht, welche ſehr von einander verſchieden ſind, und andere nahe verwandte Thiere wurden dagegen in andere Gattungen verwieſen. Geoffroi hat mehrere der Natur angemeſſenere Unterabtheilungen gemacht, von welchen folgende wohl wirklich angenommen werden müſſen.

Eigentliche Makis. Lemur.

Sechs Vorderzähne in der untern Kinnlade, welche zuſammengedrückt ſind, und nach vorn ſtehen; oben vier gerade ſtehende, die mittlern von einander abſtehend; lange koniſche zweyſchneidige Eckzähne; die Backenzähne wie bey den Affen, ein langer ſchlaffer Schwanz; die Nägel wie bey dem Affen, aber am Zeigefinger der Hinterhand eine ſpitzige Klaue; alle andern platt. Es ſind ſehr muntere

Digitized by Google

und lebhafte Thiere, welche man auch Affen mit Fuchsköpfen heist, da ihre Schnautze fuchsartig verlängert und spitzig ist. Sie leben von Früchten. Die Arten sind zahlreich, alle leben auf Madagascar, wo sie die Stelle der Affen vertreten, von denen man dort keine findet. Von einander unterscheiden sich die Arten hauptsächlich durch die Farbe.

1. Der Mokoko. Lemur Catta. Linn.

Mococo Buff. Schreb. XLI. Geoff. et Cuvier mammif.

Pelz oben grau, röthlicht überlauffen, grau an den Schenkeln, weiß an den Backen, den Ohren, an der Kehle und am Bauch. Der Schwanz weiß und schwarz geringelt. Der niedlichste und schönste aller Makis; leicht zu zähmen, soll in seinem Vaterland gesellschaftlich leben.

2. Der Vari. Lem. Macaco.

Vari Buff. Schreb. XL. B. Aud. fig. 5. fig. 6.

Pelz weiß, mit großen schwarzen Flecken; Haar dicht und lang.

3. Schwarzer Maki. Lem. niger Geoff.

Ganz schwarz; mit langen fliegenden Haaren am Hals. Schreber XL. A.

4. Rothbrauner Maki. Lem. ruber. Geoff.

Pelz lebhaft kastanienbraun: Kopf, Hände, Schwanz und Bauch schwarz, oben auf dem Halse ein halbes, weisses Halsband: der Rand der Augenhöhle oben vorspringend. Nicht abgebildet.

Digitized by Google

5. Der Mongos. Lem. mongos *).

Geoff. et Cuvier mammif. Livr. 11.

Gelbbraun ins olivenfarbe ſpielend, der Schwanz am Ende ſchwarz, die Stirne ſchwarz.

6. Der rothbraune Maki. Lemur rufus.

Audeb. Makis. f. 2.

Rothbraun ins goldgelbe ſpielend oben, unten weißgelblicht: die Gegend um den Kopf weiß, das Geſicht ſchwärzlicht.

7. Der weißſtirnige Maki. Lem. albifrons.

Aud. Makis f. 3. Geoff. et Cuvier mammif. Livr. 3.

Rothbraun ins goldgelbe ſpielend, Geſicht ſchwarz, Stirn und ein Streif um den Kopf weiß. Ob nicht das Männchen des vorigen.

8. Weißfüßiger Maki. Lem. albimanus Geoff.

And. Mak. 1.

Pelz oben graubraun: an den Seiten des Halſes zimmetfarb: Bruſt weiß; Bauch rothgelb: Hände weiß.

9. Brauner Maki. Lem. fulvus.

Grand Mongous. Maki brun Menagerie du Museum.

Pelz oben braun, unten grau, die Stirn erhaben und vorragend.

---

*) Dahin ſcheint zu gehören der ſchwarzſtirnige Maki. Lemur nigrifrons. Geoff. L. simia sciurus. Schreb. XLII. wenigſtens finde ich nichts Charakteriſtiſches, was dieſen vom Mongus unterſcheidet. A. d. U.

Digitized by Google

10. Maki mit der Halskrause. Lem. collaris Geoff.

Pelz oben braunroth, unten falb; ein Halskragen von kastanienbrauner Farbe. Das Gesicht bleifarbig: die Haare des Schwanzes stehen seitwärts. Nicht abgebildet.

11. Maki von Anjouan. Lem. anjouanensis.

Lebhaft rothbraun oben, rothgrau an den Gliedern, vorn grau. Nicht abgebildet.

Insel Anjouan, nahe bey Madagaskar *).

Indri. Lichanotus. Illig. Indri. Geoff.

Die Zähne wie bey den Makis, aber nur vier Vorderzähne oben und unten, die untere Kinnlade kürzer als die obere. Das Gesicht lang und dreieckig. Die Klauen wie bey den Makis.

1. Kurzgeschwänzter Indri. Lichanot. Indri. Illig.

Indri brevicaudatus Geoff. Audeb. Schreb. XXXVII. C.

Schwarz, am Hintern weiß, mit sehr kurzem Schwanz. Gesicht grau. Sonnerat beschreibt ihn in seiner Reise. Er ist drey Fuß hoch und wird von den Einwohnern von Mada-

*) Unter diesen Thieren herrscht noch viele Verwirrung. Die Aehnlichkeit der Farbe macht es schwer, zu bestimmen, welches eigentliche Arten seyen, so scheint Lemur Mongos und Anjouanensis fast ein und dasselbe Thier, vielleicht nur nach Alter und Geschlecht verschieden, und Lemur rufus zu albifrons zu gehören. Was ist Lem. abyssinicus mit langem hellweißem Pelze, schwarz auf dem Rücken, schwarz und weißgeringeltem Schwanz, nach Oken in Abyssinien lebend? A. d. U.

Madagascar gezähmt und wie ein Hund zur Jagd abgerichtet.

2. Langgeschwänzter Indri. Lichan. laniger.

Sonnerat Reise. 2. B. Fig. 89. Schreb. XLII. A.

Pelz falb, Schwanz sehr lang. Ob dieses Thier hierher gehört oder zur vorigen Gattung, ist nicht ganz bestimmt. Madagascar ist ebenfalls sein Vaterland.

Lori. Stenops. (Lori Geoff.

Zähne und Klauen wie bey den Makis, nur sind die Spitzen der Backenzähne schärfer; der Kopf rund, aber die Nase verlängert, der Körper schlank, kein oder ein kurzer Schwanz, die Ohren kurz abgerundet, an der Muschel inwendig bey einigen Arten faltig. Sie leben von Insekten, zuweilen auch von kleinen Vögeln. Es sind nächtliche Thiere, sie schlafen meist den ganzen Tag, des Nachts sind sie munter, sie klettern sehr behende und geschickt, und sind nichts weniger als langsam. Auf dem Boden dagegen gehen sie schwerfällig und ungeschickt, wegen den langen Armen. Herr Carlisle hat die Vertheilung der Pulsadern an ihren Extremitäten gerade so gefunden, wie bey den wahren Faulthieren. Die Augen sind sehr groß, nahe an einanderstehend und braun. Alle bekannten Arten leben in Ostindien.

1. Der faule Lori. Stenops tardigradus.

Audebert Loris.

Graufalb, ein brauner Längsstreif geht über den Rücken, zuweilen mangeln ihm zwey obere Vorderzähne. Aus Bengalen.

Digitized by Google

2. Schlanker Lori. St. gracilis.

Audebert Loris.

Kleiner als der vorige, kaum wie ein Eichhörnchen, sehr schlank, Pelz weich wie Seide, dicht, einfärbig, hellrothgelb, ohne Rückenstreif, die Nase stark hervorstehend durch einen Vorsprung des Zwischenkiefernochens. Schenkel und Arme sehr dünne.

Soll nur das Junge des vorigen seyn, woran aber zu zweifeln ist. In Ceylon.

? 3. Javanischer Lori. Kukang. St. Javanicus.

Nicticebus. Geoff.

Pelz rothbraun; über den Rücken eine dunkle Linie, oben nur zwey Vorderzähne, und ein kurzer Schwanz. Java.

? 4. Ceylonischer Lori. Sten ceylonicus *).

Tardigrad. Ceylonicus Seb. I. F. 47.

Pelz braunschwarz, auf dem Rücken ganz schwarz. Schwanz sehr kurz. Ceylon.

5. Der Potto. St. Potto.

Lemur Potto Linn. Bosmann Reise nach Guinea.

Pelz rothbraun, in der Jugend grau, Schwanz von mittlerer Länge. Soll so langsam seyn, wie ein Faulthier? Guinea. Vielleicht gehört der Potto eher zur Gattung Otolicnus.

---

*) Diese beyden Arten sind zweifelhaft, daher mit einem Fragezeichen versehen, welches allemal beweist, daß die Existenz der Art zweifelhaft sey.

Digitized by Google

Die Galagos. Ohrentbiere nach Illiger.

Galago Geoffroi. Otolicnus. Illig.

Zähne und Nägel, wie bey den vorigen, auch sind sie Insekten fressend, aber ihre Fußwurzeln sind lang, daher hat ihr Hinterfuß eine Mißgestalt. Der Schwanz ist lang und buschig, die Ohren groß und hautig. Die Augen groß und deuten auf nächtliche Lebensart. Man kennt mehrere Arten, alle aus Afrika. Die Fußwurzel ist dreymal so groß, als der Mittelfuß. Der Oberarm länger, als der Schenkel. Die Eckzähne sind undeutlich, die obern groß und krumm, die untern den Vorderzähnen ähnlich.

A. Oben mit vier Vorderzähnen.

? 1. Der Galago von Madagascar. Otolic. Madagascariensis.

Rat de Madagascar Buff. Lem. murinus Penn.

Pelz rothbraun, die Ohren halb so lang als der Kopf. der Schwanz länger, als der Körper, mit kurzen Haaren bedeckt.

2. Der dickschwänzige Galago. Otolic. crasicaudatus. Geoff.

Pelz grauroth: Ohren zwey Drittheile so lang als der Kopf. Schwanz buschig. Nicht abgebildet.

Vaterland unbekannt?

B. Oben mit zwey Vorderzähnen.

Digitized by Google

3. Der Galago von Demidof. Otolic. Demidofii *).

Fiſcher in den Actis moscaviensibus. Petit Galago Lem. minutus. Cuv.

Pelz rothbraun: Schnautze ſchwärzlich: Ohren halb ſo lang als der Kopf. Der Schwanz länger als der Körper, endigt mit einem Pinſel.

4. Galago vom Senegal. Otolic. Senegalensis. Lemur Galago. Schreb. XXXVIII. B. 6.

Pelz grau röthlich: Ohren ſo lang als der Kopf: Schwanz länger als der Körper, endigt mit einem Pinſel. Etwas größer als eine Ratte.

Fußthiere, Tarſier. Tarsius.

Die Fußwurzel verlängert, wie bey den Galagos, überhaupt in der Geſtalt viel Aehnlichkeit mit dieſen. Der Kopf rund, die Schnauze ſehr kurz. Die Augen ſehr groß. Die Ohren lang, nackt und hautig. Oben vier, unten zwey Vorderzähne. Die mittlern obern ſind länger und ſpitzig, die äußern klein. Die obern Eckzähne ſind kürzer, die untern länger als die Vorderzähne. Sechs Backenzähne auf jeder Seite. Es ſind nächtliche Thiere, welche von Inſekten leben und auf den Molukken zu Hauſe ſind.

1. Der Tarſier mit rothbraunen Händen. Tars. spectrum.

Lem. Spectrum. Pal. Schreb. XXXVIII. E.

Pelz rothbraun: Ohren halb ſo lang als der Kopf. Vaterland Amboina.

*) 1 und 3 ſind zweifelhafte Arten von Otolicnus, ſo wie der folgende Tarsius fuscomanus.

Digitized by Google

? 2. Tarsier mit braunen Händen. Tars. fuscomanus.

Fischer Anatomie der Makis.

Pelz hellbraun; unten weißgrau: Ohren zwey Drittheile so lang als der Kopf. Madagascar.

Zu dieser Abtheilung gehören wahrscheinlich die von Kommerson beschriebenen Thiere, welche Geoffroi unter dem Namen Chirogaleus anführt, und in den Annalen des Pariser Museums T. XIX. abbildet. Der Zahnbau dieser Thiere ist unbekannt, daher können sie auch nicht mit Bestimmtheit geordnet werden, der Bau ihrer Füße und des Schwanzes macht auf jeden Fall nöthig, eine eigene Familie aus ihnen zu bilden. Immer ist diese Gattung problematisch.

Rollschwanzthiere. Chirogaleus Geoff.

An allen Zehen, außer am Daum, lange spitzige Nägel. Kopf rundlicht und katzenartig. Schnauze kurz. Augen groß nach vorn stehend, Ohren kurz. Schwanz länger als der Leib, sie tragen ihn immer gerollt. Der Daum abstehend mit rundem Nagel. Die Zehen stark gespalten, dünne. Die Fußwurzel kurz. Vaterland Madagascar.

1. Großes Rollschwanzthier. Ch. major.

Eilf Zoll hoch. Besonders gegen die Stirn dunkelbraun.

2. Mittleres Rollschwanzthier. Ch. medius.

Acht Zoll und ein halber lang. Die Farbe heller: ein Kreis um die Augen schwarz, die Stirne hell.

Digitized by Google

3. Kleines Rollschwanzthier. Ch. minor.

Sieben Zoll lang; die Farbe heiter, um die Augen ein schwarzer Kreis, die Stirne hell.

Der Säugethiere dritte Ordnung.

Fleischfressende Thiere Carnivora.

In dieser Ordnung sind viele Gattungen und Arten enthalten, welche sämmtlich zu den Klauenthieren gehören. Sie haben, wie die vorige Ordnung, drey Arten von Zähnen in beyden Kiefern. Vorderzähne, Eckzähne und Backenzähne, welche meistens mit scharfen Spitzen versehen sind. Alle leben von thierischen Substanzen, und sind um so ausschließender auf thierische Nahrung beschränkt, je schneidender ihre Backenzähne sind. Diejenigen, deren Backenzähne alle oder zum Theil höckerig sind, leben mehr oder weniger auch von Pflanzen, und diejenigen, deren Backenzähne mit kegelförmigen Spitzen versehen sind, leben meist von Insekten. Die Verbindung der Unterkinnlade mit der obern, ist so eingerichtet, daß sie keine Seitenbewegung erlaubt, sie schließt mit einem Angel, und kann nur gerade aufwärts und unterwärts bewegt werden.

Das Hirn hat den dritten Lappen nicht, und reicht nicht weiter über das kleine Hirn hin, als bey den folgenden Ordnungen, seine Windungen sind nicht zahlreich aber tief und sehr symetrisch. Der Schedel ist nach hinten abgeplattet und die Jochbogen auseinanderstehend und stark gebogen, wodurch Raum und größere Stärke für die Kaumuskeln gewonnen wird. Der vorherrschende Sinn ist der des Geruchs, und die Schleimhaut der Nase ist sehr gefaltet

Digitized by Google

und über zahlreiche Knochenblättchen ausgebreitet, die Stirnhöhlen weit. Die Augen sind bey den meisten vortreflich und groß, und da die meisten nächtliche Thiere sind, sehr reitzbar, bey vielen funkeln sie in der Nacht. Das Gehör bey den meisten nicht sehr scharf.

Der Vorderarm hat noch einige Seitenbewegung, doch bey weitem weniger als bey den Vierhändern, und sie haben niemals einen abstehenden Daum. Das Getaste an den Füßen ist sehr wenig ausgebildet.

Die Eingeweide des Unterleibs sind einfach, der Darmkanal kurz, da die Natur ihrer Nahrungsmittel schnelle Verdauung zuläßt, und überdas ein längerer Aufenthalt der Fleischtheile in einem längern Darmkanal leicht faulichte Verderbniß hätte bewirken können.

Die Bewegungen der fleischfressenden Thiere geschehen meist mit Schnelligkeit und Kraft, da sie sich ihrer Beute nur durch List, Gewandtheit und durch Ueberlegenheit bemächtigen können.

Im Allgemeinen ist ihre Bildung sehr verschieden, und diejenige einzelner Organe ist ihren verschiedenen Bedürfnissen angemessen, so daß es nicht wohl möglich ist, die einzelnen Gattungen auf dieselbe Linie zu stellen, sondern die Abtheilung in mehrere Familien hier durchaus nothwendig war, die Annäherung und Verkettung dieser Familien aber hat durch mehrere Aehnlichkeiten statt *).

*) Herr Illiger hat aus den Raubthieren seine XII. Ordnung gebildet, und die Beutelthiere unmittelbar auf die Vierhänder folgen lassen. A. d. U.

Erste Familie.

Handflügler. Chiroptera.

Mit den Vierhändern haben sie noch einige entfernte Aehnlichkeit, durch das hängende männliche Glied, durch die an der Brust befindlichen Saugwarzen (Linneus rechnete sie daher zu den Primaten). Ihr Hauptcharakter aber ist die Flughaut, welche zwischen den vier Füßen und den verlängerten Fingern ausgespannt ist, durch diese Haut haben sie das Vermögen, sich in der Luft zu erhalten, und diejenigen, deren Vorderfüße sehr entwickelt sind, können recht gut fliegen. Dieses Vermögen erforderte starke Schlüsselbeine, breite Schulterblätter, damit die Hinterarme den gehörigen Stützpunkt haben; dagegen hat der Vorderarm kein Drehungsvermögen, dieses hätte die nöthige Kraft zum Fliegen geschwächt. Alle diese Thiere haben vier starke Eckzähne, dagegen wechselt die Zahl der Vorderzähne. Man hat seit langer Zeit zwey Gattungen daraus gebildet, begründet auf die Struktur der Flugorgane, allein die gar verschiedene Bildung der ersten, macht es durchaus nothwendig, sie in mehrere Gattungen zu theilen.

Die Fledermäuse. Vespertilio. Linn.

Arm, Vorderarm und Finger sind außerordentlich verlängert, und bilden, vermittelst der Flughaut, welche die Zwischenräume ausfüllt, wahre Flügel, so groß wie bey den Vögeln. Die Fledermäuse fliegen auch sehr hoch, schnell und geschickt. Die Brustmuskeln haben die nöthige Dicke, um die Flugkraft auszuüben, und das Brustbein hat in der Mitte eine Gräthe, zur vestern Anlage der Muskeln, wie

bey den Vögeln. Der Daum ist kurz und mit einem krummen scharfen Nagel bewaffnet, welcher diesen Thieren zum Aufhängen und Kriechen dient. Der Blinddarm fehlt. Die Augen sind sehr klein, dagegen die Ohren meistentheils groß, und bilden zuweilen eine sehr große hautige Oberfläche, welche fast nackt und sehr empfindlich ist, so daß die Fledermäuse ihren Flug dadurch in den dunkelsten Orten leiten können, und daß sie selbst wenn man ihnen die Augen ausreißt, an keinen Gegenstand anstoßen, und sich aus den engsten Gängen herauszufinden wissen, wahrscheinlich blos durch die Feinheit des Gefühls in den Ohren, welches sie von der Nähe der Gegenstände benachrichtigt; so sind die Ohren also zugleich das Organ des Tastsinnes bey den Fledermäusen. Es sind nächtliche Thiere, welche in unsern Climaten den Winter in Erstarrung zubringen, und wie die meisten Säugethiere, welche im Winter schlafen, ein kälteres Blut haben. Sie werfen gewöhnlich nur ein bis zwey Junge, welche den Alten an der Brust hängen und von ihnen im Fliegen mitgetragen werden, obschon sie verhältnißmäßig groß sind. Die meisten leben von Insekten und sind unzähmbare und bißige Thiere, aber durch ihre Nahrung für uns sehr nützlich.

Flatterthier. Fliegender Hund. Pteropus.

Die Vorderzähne sind schneidend, die Backenzähne haben platte Kronen, mit zwey Leistchen, welche parallel laufen, und eine Furche dazwischen zeigen; sie leben zwar großentheils von Früchten und Blüthen, sie machen aber auch auf Vögel und kleine Säugethiere Jagd. Es sind die größten Thiere dieser Familie, sie lassen sich zähmen und

Digitized by Google

werden zutraulich. Ihr Vaterland ist Ostindien Die Flughaut ist zwischen den Schenkeln tief ausgeschnitten, sie haben keinen oder einen sehr kurzen Schwanz; der Zeigefinger um die Hälfte länger als die übrigen, hat ein drittes Gelenk mit einem kleinen Nagel, der den übrigen Fledermäusen allen fehlt, die übrigen Finger haben nur zwey Gelenke, die Nase ist einfach, das Ohr klein, ohne Ohrdeckel, die Zunge mit vielen harten nach hinten gerichteten Wärzchen bedeckt; der Magen ist ein langer ungleich ausgedehnter Sack.

A Ohne Schwanz mit vier Vorderzähnen.

1. Eßbarer fliegender Hund. Pter. edulis.

Ueberall schwärzlich, der Rücken mit kurzen glänzenden Haaren, unten dunkler. Flügelweite fast vier Fuß. Auf Timor und den Südseeinseln. Hat ein vortreffliches Fleisch.

2. Edwards fliegender Hund. Pter. Edwardsii.

Vespert. Vampyrus. Schreb. XLIV.

Fuchsroth, am Rücken kastanienbraun. Flugweite drey Fuß, acht Zoll. Auf Madagascar.

3. Gemeiner fliegender Hund. Pter. vulgaris.

Roussette Buffon. Chien volant. Daubent.

Braun, Gesicht, Rücken und Seiten fuchsroth. Flugweite drey Fuß. Auf den Inseln Frankreich und Bourbon auf Bäumen in Wäldern.

4. Rothhalsiger fliegender Hund. Pter. rubricollis.

Rougette á cou rouge. Rougette. Vespert. Vampyrus Linn.

Graubraun, der Hals rothbraun. An denselben Orten, wo der vorige.

Digitized by Google

5. Grauer fliegender Hund. Pter. griseus.

Röthlichgrau, Kopf und Hals fuchsroth. Auf Timor. (Annal. du Musée XV. pl. 6.).

6. Nackter fliegender Hund. Pter. nudus. Oken.

Der Leib nackt, Flugweite zwanzig Zoll. Vaterland unbekannt. Ob wirkliche Art?

7. Braunrother fliegender Hund. Pterop. Celaeno. Oken.

Ohren lanzetförmig, Hinterkopf, Nacken, Schultern braunroth, auf dem Kreutz ein ähnlicher Fleck, lange Hundsschnauze, die Vorderzähne nicht angeschlossen, vierzehn Rippen. Flugweite vier Fuß. Vaterland unbekannt, Größe eines Hasen, wird gegessen.

8. Fliegender Hund von St. Mauritzius. Pter. mauritianus. Oken.

Seiten des Kopfs und Rückens braunroth, Hals, Rücken und Unterleib unten rostfarben. Ohren einfach, auf der Insel Mauritzius.

B. Fliegende Hunde mit kurzem Schwanz, mit vier Vorderzähnen.

9. Strohgelber fliegender Hund. Pter. stramineus.

Chien volant, Seba. I. Taf. 57. F. 1. 2.

Gelbröthlicht, Schwanz sehr kurz. Flugweite zwey Fuß. Auf Timor und Ternate in hohlen Bäumen und Felslöchern.

Digitized by Google

10. Egyptiſcher fliegender Hund. Pter. Aegyptiacus.

Pelz wollig, graubraun. Flugweite 21 Zoll. In Unter-Egypten in Höhlen und in den Pyramiden.

11. Schwanzumgebener fliegender Hund. Pter. amplexicaudatus. Geoff.
Annal. du Mus. XV. 96.

Röthlichgrau; Schwanz von der Länge des Schenkels, halb von der Zwiſchenhaut eingefaßt. Auf Timor. Flugweite 16 Zoll.

12. Fliegender Hund mit geränbelten Ohren. Pter. marginatus.
Annal. du Mus. XV.

Olivenbraun, die Ohren mit weißer Einfaſſung. Flugweite 13 Zoll. In Bengalen.

13. Kleinſter fliegender Hund. Pter. minimus.

Wolliges hochfuchsrothes Haar. Flügelweite 10 Zoll. In Java.

14. Fliegender Hund mit dem Mantel. Pter. palliatus.

Die Flughaut von der Mittellinie des Rückens entſpringend. Vaterland unbekannt.

Großkopf. Cephalotes. Geoffroy.

Der Zahnbau wie bey den fliegenden Hunden, aber der Zeigefinger iſt kurz nur mit zwey Gelenken ohne Nagel. Die Flughaut befeſtigt ſich nicht an den Seiten, ſondern vereinigt ſich mit der der andern Seite auf dem Rücken, an welchen ſie durch ein häutiges der Länge und der

Quere nach laufendes Band befeſtigt iſt. Sie haben nach Illiger unten gar keine Vorderzähne, er nennt die Gattung Harpyia.

1. Perons Großkopf Ceph. Peronii.

Mit kurzem rothbraunem Haar. Die Naſe wie bey gewiſſen Doggen geſpalten. Flugweite mehr als vier Fuß. Ohne Nagel am Zeigefinger.

Von Peron auf Timor entdeckt. Ann. d. Mus. XV. pl. 7.

2. Pallas Großkopf. Ceph. Pallasii.

Vesp. cephalotes Pall. Schreb. LXI.

Kleiner, Schnauze groß. Ohren rundlicht und klein, einfach. Pelz oben grau, unten weiß ichr. Am Zeigefinger ein Nagel. Flugweite 3 Fuß 9 Linien.

Molucken von Pallas entdeckt.

Es folgen nun die eigentlichen Fledermäuſe, welche alle meiſt von Inſekten leben, ihre Backenzähne ſind mit kegelförmigen Spitzen verſehen. Der Zeigefinger hat eine Gattung ausgenommen, nie einen Nagel. Die Flughaut geht immer zwiſchen den Schenkeln durch.

Grämler. Hundsmaul. Molossus Geoff.

Dysopes. Illig.

Oben und unten zwey Vorderzähne, die untern ſehr klein, fallen leicht aus, die Naſe einfach. Die Ohren breit und kurz, ſie entſtehen unweit der äußern Mundwinkel und vereinigen ſich durch eine häutige Fortſetzung über der Naſenwurzel. Statt dem Ohrdeckel ein kurzes Ohrläppchen. Der Schwanz ſo lang als die Flughaut, bey einigen länger als die Schenkel. Alle leben im ſüdlichen Amerika.

Digitized by Google

1. Rothbraunes Hundsmaul. Mol. rufus.

Oben dunkel, unten hellkastanienbraun, Schnauze kurz, groß und dick. Flugweite 15 Zoll.

2. Schwarzes Hundsmaul. Mol. ater.

Schwarz, oben glänzend, unten dunkler.

3. Dunkelbraunes Hundsmaul. Mol. obscurus.

Braunschwärzlich oben, Haarwurzel weißlicht.

4. Langschwänziges Hundsmaul. Mol. longicaudatus.

Schreb. LIX. untere Figur.

Graufahl, ein dunkleres Band von der Schnauze zur Stirn laufend.

5. Kastanienbraunes Hundsmaul. Mol. castaneus.

Oben kastanienbraun, unten weißlicht, ein dunklerer Streif geht von der Stirn zur Schnauze. Paraguai.

6. Braunbauchiges Hundsmaul. Mol. fusciventer.

Oben graubraun, unten graulicht, der Bauch in der Mitte braun.

7. Breitschwänziges Hundsmaul. Mol. laticaudatus.

Oben dunkelbraun, unten heller, der Schwanz mit einem häutigen Rand. Paraguai.

Digitized by Google

8. Hundsmaul mit umfaßtem Schwanz. Mol. amplexicaudatus.

Schwärzlich, unten heller. Schwanz in die Flughaut verwachſen *).

9. Dickſchwänziges Hundsmaul. Mol. crassicaudatus.

Pelz zimmetbraun, unten lichter; Schwanz an beyden Seiten von der Zwiſchenſchenkelhaut eingefaßt.

Haaſenmaul. Spaltnaſe. Nictinomus. Geoff.

Unten und oben vier Vorderzähne, die Oberlippe bey der Naſe ausgeſchnitten und aufgeſtülpt, an den Seiten dagegen hängend, wie bey einer Dogge. Sie ähneln in der übrigen Geſtalt dem Hundsmaul.

Haaſenmaul. Spaltnaſe von Bourbon. Nict acetabulosus.

Braunroth oben, unten braun, Schenkelhaut verlängert. Inſel Bourbon.

1. Egyptiſche Spaltnaſe. Nict. aegyptiacus.

Braunroth, unten heller, Haare am Kopf länger, ein Streif in der Flughaut behaart. Schwanz halbfrey. Ohrdeckel. In Egypten in Häuſern und Höhlen von Geoffroi entdeckt.

---

*) Gujaniſches Hundsmaul. Mol. gujanensis iſt unbeſtimmt und gehört eher zu der folgenden Art. Buff. supp. VII.

A. d. U.

2. Faltenflügel. Nyct. plicatus.

Linnean transactions T. V.

Graubraun, Kopf groß. Hirnschale sehr dick, Schnauze lang aber stumpf, herzförmig. Nase einfach.

Aus Bengalen.

Schmalhäutler. Stenoderma. Geoff.

Mit einfacher Schnauze, die Flughaut zwischen den Schenkeln ausgeschweift, bis auf das Schwanzbein, kein Schwanz. Vorderzähne oben zwey, unten vier. Die Ohren klein mit Deckel.

1. Rothbrauner Schmalhäutler. Sten. rufum

Rothbraun. Vaterland?

Kantenlefzer. Noctilio.

Schnauze kurz, geschwollen, gespalten, mit Warzen und Furchen durchzogen; die Ohren getrennt. Oben vier, unten zwey Vorderzähne, Schwanz kurz und frey, steht über die Flughaut vor.

1. Haasenschartiger Kantenlefzer. Noctilio. leporinus.

Schreb. LX.

Einfarbig strohfarb, von der Größe einer Ratte. Südamerika.

Blattnase. Phyllostoma.

Die Zahl der Vorderzähne vier, in der untern Kinnlade fallen sie zuweilen aus, wenn die großen Eckzähne sie wegstoßen. Auf der Nase steht ein häutiger Anhang in der Form eines Blattes, es erhebt sich von der Spitze der Nase, und steht queer über dieselbe. Auch über dem Ohrhügel

gel steht ein ähnliches Blättchen als Ohrdeckel. Die Zunge ist ausdehnbar, und endigt mit harten vorwärtsstehenden, wahrscheinlich hohlen Wärzchen, welche eine Vertiefung umgeben, und ein Saugorgan bilden. Um die Unterlippe stehen regelmäßig geordnete Wärzchen oft die Form eines V bildend. Sie bewohnen alle Amerika, und laufen auf dem Boden so schnell wie Ratten. Sie sind eine Plage für Menschen und Thiere, da sie zum Theil von ihrem Blut leben. Es ist noch nicht ausgemacht, ob sie die Wunden, welche anfangs gar nicht schmerzen, mit den Zähnen, oder vielmehr mit der spitzen Zunge machen. Geoffroi behauptet letzteres. Die Wunden werden bey Menschen nur zufällig gefährlich, bey Thieren zuweilen brandig. Nebenbey fressen sie aber auch alle Insekten, wie die übrigen Fledermäuse. Sehr selten werden Menschen von ihnen verwundet. Neuwied sagt, er habe davon kein Beyspiel erfahren können.

A. Mit Schwanz.

1. Zahnblattnase. Phyll. crenulatum.
Ann. d. Mus. XV. pl. 10.

Nasenblatt gezähnelt, Schwanzende frey. Flugweite ein Fuß. Vaterland Amerika?

2. Langblattnase. Phyll. elongatum.
Ann. d. Mus. XV. pl. 9.

Nasenblatt mit glattem Rand, Schwanzende frey. Flugweite 20 Zoll. Vaterland Amerika?

3. Lanzennase. Phyll. hastatum.
Schreb. XLVI. und XLVI. A.

Nasenblatt glattrandig, der Schwanz ganz in der

Flugbaut verwachsen, Fußwurzel länger als der Fuß. Flugweite 20 Zoll. Die Basis des Nasenblattes so schmal, daß es fast auf einem Stiele steht, dagegen der häutige Fortsatz unten breiter. Oben kastanienbraun, unten gelbbraun. Guiana.

4. Speernase. Phyll. soricinum.

Schreber XLVII.

Nasenblatt glattrandig; der Schwanz ganz in der Flughaut. Die Fußwurzel um die Hälfte kürzer als der Fuß. Flugweite 8 Zoll. Die Zunge lang und dehnbar, schmal. Surinam *).

B. Ohne Schwanz.

5. Brillennase. Phyll. perspicillatum.

Nasenblatt kurz, ausgeschweift nahe an der Spitze. Zwey weiße Streifen gehen von der Nase zu den Ohren. Guiana.

6. Gestreifte Blattnase. Phyll. lineatum.

Nasenblatt ganz; vier weiße Streifen gehen über das Gesicht, einer über den Rücken. Paraguai.

7. Rundblattnase. Phyll. rotundum.

Blatt ganz, an der Spitze abgerundet. Pelz rothbraun. Paraguai.

8. Lilienblattnase. Phyll. lilium.

Blatt ganz, oben so breit als hoch, an der Basis schmal. Die Kinnladen verlängert. Paraguai.

---

*) Geoffroy macht daraus eine neue Gattung. Glossophaga. Zungenfresser.

9. Mampyr. Phyll. spectrum.

Blatt, nicht ausgeſchweift, weniger breit als lang, obſchon an der Baſis breit, trichterförmig. Kinnladen lang. Größe einer Elſter. Flugweite 2 Fuß.

Schreb. XLV. Seba. I. LVIII. Andira-acu. Braſilien.

10. Größte Blattnaſe. Phyllost. maximum. Princ. Max.

Die Größe zeichnet dieſe Blattnaſe vorzüglich aus, ſie iſt die größte aller bekannten Arten, und mißt mit ausgeſpannten Flügeln 6 Fuß 5 Zoll, die Länge des Körpers ohne Schwanz 5 Zoll. Naſenblatt kurz und breit. Der Schwanz iſt kurz, weich und ſchwach. Der Pelz dicht und ſanft dunkelbraun, unten etwas bläſſer. Im öſtlichen Braſilien.

11. Blattnaſe mit weißem Augenſtreif. Phyll. superciliatum. P. Max.

Dunkelgraubraun, vom Naſenblatt bis zum Ohr lauft ein reinweißer Streif über die Augen hin. In Wäldern an der Oſtküſte von Braſilien. Wahrſcheinlich Azaras Chauve souris première.

12. Großblattnaſe. Phyllost. macrophyllum. P. Max.

Flugweite 10 Zoll 4 Linien. Das Naſenblatt beynahe 5 Linien lang, länglicht herzförmig, der Schwanz lang. Die Farbe dunkel rußbraun. In den Wäldern von Braſilien.

Digitized by Google

13. Kurzschwänzige Blattnase. Phyllost. bernicaudum. P. Max.

Das Nasenblatt schmal, etwas speerförmig, $2\frac{1}{2}$ Linien lang, der Schwanz kurz. Flugweite 11 Zoll. Die Farbe des etwas wolligen Haares grauröthlichtbraun. Vielleicht Phyllost. elongatum.

14. Dunkler Mampyr. Phyllost. obscurum. P. Max.

Kein Schwanz, langhaarig, dunkelschwärzlicht rußfarben, nach dem Auge zu ein etwas hellerer Streif. Flugweite 16 Zoll 7 Linien. Ostküste von Brasilien.

15. Breitöhriger Mampyr. Phyllost. brachyotos. P. Max.

Von derselben Farbe wie die vorige, doch etwas heller, die Ohren breiter, der Körper breiter und dicker, das Nasenblatt bis drey Linien hoch. In den dichten Waldungen am Mucuri in Brasilien. Beyde Arten gehören zu den eigentlichen Mampyren.

Großhäutler. Megaderma. Geoff.

Auf der Nase ein zusammengesetzteres Blatt, als die Blattnasen. Ohrdeckel groß, oft gegabelt, die Ohrmuscheln sehr weit, und beyde Ohren verbinden sich auf dem Scheitel; Zunge und Lippen glatt; die Schenkelflughaut ganz, ohne Schwanz. Oben keine Vorderzähne, unten vier, so daß es scheint, ihr Zwischenkieferknochen bleibe knorplicht. Sie leben alle in der alten Welt.

Digitized by Google

1. Kleeblattnaſe. Meg. trifolium.

Naſenblatt eiförmig, Naſenklappen faſt ſo groß, als das Blatt ſelbſt; den fünften Theil ſo lang als das Ohr; Ohrdeckel dreylappig. Flugweite 11 Zoll. Java.

2. Herznaſe. Meg. spasma.

Schreber pl. XLVIII.

Blatt herzförmig, die Naſenklappe ebenſo, ſo daß es ſcheint, als ob zwey Herzen über einander ſtünden; Ohrdeckel mit zwey ungleichen Lappen. Auf Ternate.

3. Leyernaſe. Meg. Lyra.

Naſenblatt recht winklicht abgeſtutzt, Naſenklappe um die Hälfte kleiner. Ann. du Mus. XV. pl. 12.

Vaterland unbekannt.

4. Stirnblatt. Meg. Frons.

Naſenblatt eiförmig, faſt von der Größe des Kopfes und halb ſo groß als die Ohren. Senegal.

5. Großohr. Meg. Megalotis.

Die Ohren nur um ein Drittheil kürzer als der Leib, wohl 2½ Zoll lang, und faſt eben ſo breit. Ohrdeckel ſehr lang, ſo daß es ſcheint, als ob vier Ohren vorhanden wären. Naſenblatt ohrförmig und groß. Pelz grau.

Vaterland Südafrika.

1. Kammnaſe. Rhinolophus. (Noctilio Kuhl).

Die Naſe iſt mit ſehr zuſammengeſetzten Häuten und häutigen Vorſprüngen beſetzt, welche zum Theil auf der Oberlippe ſitzen, und im Allgemeinen die Form eines Hufeiſens bilden; der Schwanz iſt lang und mit der Flugbaut verwachſen; eine Art ohne Schwanz. Sie haben unten

Digitized by Google

vier Vorderzähne, oben nur zwey sehr kleine, welche in einem knorplichten Zwischenkieferknochen stecken. Die Ohrmuschel groß, aber einfach und ohne Deckel. Sie haben vier Säugewarzen, während alle andern Thiere dieser Familie nur zwey haben, nemlich zwey an der Brust und zwey am Bauche oben an den Schaambeinen. Diese letztern scheinen aber nach Kuhls Untersuchungen keine wahren Brüste zu seyn, da keine Milchdrüsen gefunden werden, sie erscheinen erst beym zweyjährigen Weibchen, und erst im dreyjährigen erreichen sie ihre Größe, ohne daß man je Milch in ihnen fände.

1. Hufeisennase. Rhinol. ferrum. equinum. Kuhl.

Schreb. LXII. Rhin. bifer. Geoff. petit fer à cheval. Vespert. hipposideros et ferrum equinum.

Auf der Nase ein hufeisenähnliches Blatt. Gewicht ½ Loth, Länge 2 Zoll 9 Linien. Flügelbreite 9—10 Zoll. Der Kopf macht mit dem Hals einen rechten Winkel. In der Mitte des Hufeisens liegen die Nasllöcher, und hinter denselben eine kleine Muschel, am Ende des Hufeisens ein kleiner Sattel. Die Ohren trichterförmig: Flügel und Füße schwärzlich. Nase und Ohren hellaschgrau. Der Rücken bald hellbraun, bald rothbraun, die Haare an der Wurzel weiß, an der Spitze roth. Der Bauch röthlichweiß. Im mittlern Deutschland und der Schweiz. Hipposideros ist die Junge.

2. Große Hufeisennase. Rhinol. bifer. Geoff.

Flügelbreite über 13 Zoll, die Länge fast 4 Zoll, die Haare kürzer, als bey der vorigen, aber wolliger auf dem

Digitized by Google

Rücken. An der Wurzel weiß, an der Spitze rothbraun, an der Unterseite heller, Flughaut schwarzbraun. In Frankreich.

3. Dreyzahnige Kammnase. Rhinol. tridens. Geoff.

Nasenblatt einfach, endigt in drey Spitzen. Vaterland Egypten.

4. Die Tiefnase. Rh. speoris. Geoff.

Peron voyage. pl. 35. Rhin. crumenifer. Schreb. LIX. B.

Nasenblatt einfach, am Endrande abgerundet, hinter diesem ein Loch, durch einen Schließmuskel schließbar. Die Ohren so lang als der Kopf. Die Nasenlöcher liegen in einer Grube. Auf Timor.

5. Die Stirnbinde. Rhinol. Diadema. Geoff. Ann. du Mus. XX. pl. 6.

Nasenblatt einfach, am Endrande abgerundet, dreymal so breit, als lang, setzt sich in ein Hufeisen fort, so daß das Geruchsorgan, wie mit einer Krone umgeben ist. Der Pelz ist lebhaft rothbraun mit Goldglanz. Die größte Art. Auf Timor.

6. Commersons Kammnase. Rhin. Commersonii. Geoff.

Nasenblatt einfach, am Endrande abgerundet, kein Loch auf der Stirn; der Schwanz halb so lang, als der Schenkel. Madagascar.

7. Kammnase ohne Schwanz. Rhinoph. ecaudatus. Neuwied.

Oben zwey starkgekrümmte und zusammengedruckte Vorderzähne, unten vier mit gespaltener Schneide, die Eckzähne nagelförmig. Eine Hautfalte schließt die Nase ein und bildet über jedem Nasenloch eine kleine flache Spitze, über deren Mitte eine andere Hautfalte eine einfache ähnliche Spitze bildet. Kein Schwanz. Die Farbe gelbröthlich. Diese neue Art ist die einzige, welche sich in der neuen Welt vorfindet, und zeichnet sich durch den Mangel an Schwanz aus. Neuwied fand sie an der Ostküste von Brasilien.

Nachtflieger. Nycteris Geoffroy.

Ueber die Stirne lauft eine nackte Furche, welche selbst am Schedel sichtbar ist, die Nasenlöcher sind mit einem Kreise von Hautplättchen umgeben. Oben stehen 4, unten 6 Vorderzähne, die Ohren groß, nicht vereinigt. Der Schwanz ganz in die Flughaut verwachsen; der Zwischenlieferknochen beweglich; die Nasenlöcher sind durch Klappen verschlossen; es sind Backentaschen vorhanden, welche mit Luft angefüllt werden können, und hinten durch ein Loch unter die Haut münden. Diese ist ganz frey, und nur an einigen Stellen durch Zellgewebe mit den Muskeln leicht verbunden, das Thier steckt darin, wie in einem Sacke. Es kann durch seine Backentaschen Luft unter die Haut bringen, während es die Nasenlöcher durch die Klappen schließt, so wird das ganze Thier, wie ein Ball aufgeblasen.

Digitized by Google

1. Daubentons Nachtflieger. Nyct. Daubentonii, Geoff.

Chompagnol volant, Vespert. hispidus Schreb. LVI.

Pelz fuchsröthlich; Bauch schmutzigweiß. Ohren länglicht. Am Senegal.

2. Thebaischer Nachtflieger. Nyct. thebaicus. Geoff.

Annal. du Mus. XX. Taf. 1.

Pelz hellbraun, Bauch aschfarben, weite große Ohren. In Egypten.

3. Javanischer Nachtflieger. Nyct. javanicus. Geoff.

Annal. du Mus. XX. Taf. 1.

Pelz hellfuchsroth, Bauch röthlichbraun.

Faltennase. Rhinopoma.

Die Grube an der Nase ist weniger merkbar und bildet blos eine Falte, die Nasenlöcher liegen am Ende der Schnauze, über dieselbe eine kleine Hautfalte, die Ohren vereinigen sich. Der Schwanz länger als die Flughaut.

1. Kleinblättrige Faltennase. Rhin. mycrophyllum.

Grau, Schwanz schwarz. Flugweite 8 Zoll, der Schwanz nur an seinem Anfang in die Flughaut verwachsen, welche die Schenkel nicht vollkommen verbindet.

In Oberegypten in den Pyramiden *).

*) Zwey Arten, wovon die eine in Egypten, die andere in Carolina sich finden soll, sind noch nicht mit Gewißheit bestimmt.

Grabflieger. Taphozous.

Mit einer Stirnrinne, aber die Nase ohne hautige Vorsprünge, oben nur zwey, unten vier Vorderzähne, die Ohren getrennt, der Schwanz steht über die Flughaut vor. Die Nase in einen kurzen Rüßel verlängert, an dessen Ende die Nasslöcher stehen. Ohren mittelmäßig mit Deckel.

1. Senegalischer Grabflieger. Taph. senegalensis.

Pelz gelbbraun, oben keine Vorderzähne, Ohrdeckel klein. Am Senegal.

2. Beutel Grabflieger. Taph. lepturus.

Schreb. LVII. Saccopteryx. Täschelflügel Illig.

Schnauze mittelmäßig, die Nasslöcher wie zwey Röhren, am Ellbogen eines jeden Flügels ein kleiner faltiger Beutel. In Surinam *).

Klappenschwanz. Diclidurus. Neuwied.

Vorderzähne oben wahrscheinlich zwey, unten sechs, drey auf jeder Seite unmittelbar an den Eckzahn gereihet, in der Mitte eine Lücke, alle klein mit breiter Schneide. Die Eckzähne nagelförmig, die obern vorwärts gerichtet, hinten mit einer kleinen Nebenspitze, die untern senkrecht. Backenzähne oben vier, unten fünf mit Zackenspitzen und einigen kleinen Nebenhöckern. Der Unterkiefer länger als

*) Oken beschreibt noch als ungewisse Arten Taph. aegyptiacus grauroth, unten grau. In den Gräbern von Theben und Taph. mauritianus. Braun unten röthlicht, aus der Barbarey. A. d. U.

der obere, letzterer vor und zwischen den Augenhöhlen, durch eine große elliptische Vertiefung ausgezeichnet, welche die Gesichtsknochen zu beyden Seiten über die Höhlen heraustreibt, Stirn und Scheitelknochen in blasenartige Erhöhungen aufgetrieben. Die Zunge fleischig mit ganzem Rande, kürzer als der Unterkiefer, und stark befestigt; statt des Schwanzes laufen die Schwanzknochen mit mehreren Gelenken, in zwey äußerlich an der Haut des Körpers befestigte Hornstücke aus, welche ein aus zwey Klappen zusammengesetztes Organ bilden. Die obere Klappe ist halbmondförmig mit wulstig verdicktem Rande, in der Mitte vertieft, unter dieser Klappe steht eine kleinere dreyeckig zugespitzte, von der Haut gebildete Klappe, welche gegen die obere angeschlossen werden kann. Beyde sind hohl durch eine besondere Haut vom Körper getrennt, die Schwanzwirbel laufen in die obere Klappe hinein. Die Flughaut wie bey andern Fledermäusen, ihr hinterer unterer Rand geht über die Klappe hinaus.

1. Weißer Klappenschwanz. Diclid. Freyreisii. Neuwied.

Diclid. Albus Oken.

Rein weiß, Flughaut graubraun, am Armknochen lauft ein Streif von weißen Haaren. Am Rio Pardo an der Ostküste von Brasilien, in Palmbäumen von Freyreis entdeckt *).

*) Hypexodon. Rafinesque. Vorderzähne oben keine, unten 6 ausgerundete, an der Wurzel des untern Eckzahns eine Warze. Die Schnauze nackt abgerundet, vorspringend. Der Schwanz in der Flughaut verwebt.

Digitized by Google

Eigentliche Fledermäuse. Vespertilio.

Die Schnauze und Naſe ohne hautige Fortſätze oder ſonderbare Bildungen, die Ohren getrennt, oben vier Schneidezähne, die beyden mittlern von den äußern abſtehend, unten ſechs, ſchneidend und etwas gezähnelt. Der

---

Hyp. mystax. Ganz rothgelb, oben auf dem Kopf braun, Flughaut ſchwarz, der Schwanz ſpitzig, ein ſtarker Schnurbart, die Ohren braun mit Läppchen verſehen und innerlich queer geribbt; Länge 3 Zoll, wovon der Schwanz 2 Zoll. In Kentucky.

Nycticejus. Rafinesque. Unterſcheidet ſich von der vorigen Gattung durch zwey Vorderzähne oben, welche weit von einander abſtehen, an die Eckzähne feſt anliegen, und ſpitzig eingeſchnitten ſind, die 6 untern Vorderzähne ſind ſtumpf, an der Wurzel der Eckzähne keine Warze.

1. Schwarzſchultriger Nycticejus. Nyct. humeralis. Der Rücken dunkelbraun, die Schultern ſchwarz, Bauch und Flughaut grau, der Schwanz faſt ſo lang als der Körper, mit langer Spitze. In Kentucky.

2. Gewürfelter Nycticejus. Nyct. tessellatus. Oben braun, unten rothgelb, mit einem ſchmalen gelblichen Halsbande, die Achſeln weiß, die Flügel mit würfelförmigen rothbraunen Flecken, der Schwanz ſo lang als der Körper, am Ende mit einer vorſpringenden Warze, die Ohren kurz, abgerundet mit Ohrläppchen. In Kentucky.

Herr Prof. Rafinesque zu Lexington hat dieſe beyden Geſchlechter aufgeſtellt, ich führe ſie der Vollſtändigkeit wegen an, obſchon es mir ſcheint, daß ſie der Gattung Vespertilio einverleibt werden könnten, umſomehr als die Sippen der Flederthiere ohnehin zu ſehr vervielfältigt worden ſind. A. d. U.

Digitized by Google

Schwanz ist mit der Flughaut verwachsen. Diese Gattung ist sehr zahlreich und besonders gehören dazu alle europäischen Arten außer Rhinolophus. Nach den neuern Entdeckungen eines Leisler, Kuhl, Natterer und Schreibers sind in Deutschland und den benachbarten Ländern vierzehn Arten bekannt *). Sie leben alle von Insekten, der Bisamgeruch, welchen einige von sich geben, kommt aus Talgdrüsen. Sie fliegen alle sehr geschickt und schön, und leben meist in großen Gesellschaften; werfen nur ein höchstens zwey Junge.

1. Langöhrige Fledermaus. Vesp. auritus **). Schreb. L.

Die Ohren länger als der Kopf, $1\frac{1}{2}$ Zoll lang mit Ohrdeckel. Die Schnauze spitzig zulaufend, hinter den Nasslöchern wulstig. Oben graufahl unten graulicht.

In Deutschland in Städten und Dörfern.

2. Bechsteinische Fledermaus. Vesp. Bechsteinii Leisler.

Ohren etwas über 11 Linien lang und 6 breit. Daum $3\frac{3}{4}$ Linien lang. Flugweite 11 Zoll. Oben gelblicht braun, unten weißlicht. Das Gebiß blendend weiß.

Häufig in Thüringen. Ann. der Wett. Gesellsch. IV. Taf. XXII.

---

*) Siehe Naturgeschichte der deutschen Fledermäuse von Heinrich Kuhl. Annalen der Wetterauischen Gesellschaft. IV. Bd. A. d. U.

**) Um dieser langen Ohren willen hat Cuvier und Geoffroi diese Art unter dem Namen Plecotus getrennt, allein dies Kennzeichen ist nicht charakteristisch genug eine Gattung zu bilden. A. d. U.

Digitized by Google

3. Natterers Fledermaus. Vesp. Nattereri. Kuhl.

Die Schwanzflughaut gefranzt. Auf dem Rücken schwarzbraun, an der Spitze der Haare fahl. Am Bauche heller. Die Ohren nur $8\frac{1}{2}$ Linie lang, und der Kopf schwach und klein. Flugweite $9\frac{1}{2}$ Zoll.

Selten in der Wetterau. Ann. d. Wett. Gesellsch. IV. Taf. XXIII.

4. Rattenartige Fledermaus. Vesp. Myotis. Kuhl.

Vesp. murinus auct. Schreb. LI.

Unten weiß, die Alten röthlicht braun, die Jungen aschgrau. Flugweite 15 bis 16 Zoll. Die gröste inländische Art. Die Ohren so lang als der Kopf.

Häufig in der Schweiz und in Deutschland auf Kirchenböden.

5. Frühfliegende Fledermaus. Vesp. proterus. Kuhl.

Vesp. Noctula et lasiopterus. Schreb. LII. u. LVIII. B.

Einfärbig rothbraun. Die untere Seite der Flughaut längs dem Arme hin sehr stark behaart. Die Ohren kurz, und nierenförmig abgerundet. Die Ohrdeckel klein und breit. Flugweite $14\frac{1}{2}$ Zoll.

Im gröstten Theil von Europa gemein, auf Kirchen und in Bäumen.

6. Leislersche Fledermaus. Vesp. Leisleri. Kuhl.

Die Haare zweyfarbig. Die untere Seite der Flughaut längs dem Arm hin sehr stark behaart. Schwanz-

Digitized by Google

spitze kaum aus der Flughaut vorragend. Flugweite 11 Zoll. Die Haare an der Wurzel dunkelbraun, an der Spitze zimmetbraun, gelb überlaufen, unten graubraun. Nicht selten in Deutschland in hohlen Bäumen.

7. Schreibers Fledermaus. Vesp. Schreibersi. Natt.

Rücken aschgrau, Unterseite hellaschgrau, oft gelblichweiß überlaufen. Ohren kurz $4\frac{1}{2}$ Linien lang und breit, Nase kurz und stumpf. Schwanz 1 Zoll 8 Linien. Daumen $2\frac{1}{2}$ Linien. Die Flügel klaffen 10—11 Zoll.

8. Zweyfarbige Fledermaus. Vesp. discolor. Natterer.

Kuhl Fledermäuse. Taf. XXV.

Unterleib schmutzig weiß. Die braunen Haare des Rückens haben weiße Spitzen. Schwanzspitze 2 Linien vorragend. Länge $3\frac{1}{2}$ bis 4 Zoll, die Flügel klaffen 10—11 Zoll. Die Schnauze stark, breit, lang und aufgeworfen, die Nase dick und breit. Die Ohren $6\frac{1}{2}$ Linien lang, 5 Linien breit, rundlich eiförmig.

Südliches Europa.

9. Späthfliegende Fledermaus. Vesp. serotinus. Daub.

Schreber LIII.

Braunroth, unten matter, die Haare lang und glänzend, Ohren kürzer als Kopf, Flughaut fast schwarz. Deckel kurz und gebogen. Flugweite 13 bis 14 Zoll. Fliegt spät.

In Deutschland, Frankreich, der Schweiz in hohlen Bäumen.

Digitized by Google

10. Kurzmaulige Fledermaus. Vesp. barbastellus. Daub.

Schreb. LV.

Die Ohren eben so breit als lang, gehen vorn über die Stirn zusammen und sind ausgeschweift, der Ohrdeckel halb herzförmig. Die Farbe schwarzgrau. Flugweite 10 Zoll. Die Schnauze wie abgestutzt.

Hin und wieder in Deutschland und Frankreich.

11. Daubentonische Fledermaus. Vesp. Daubentonij. Leisl.

Kuhl Flederm. Taf. XXV.

Schwanz ungesäumt, Schwanzspitze zwey Linien aus der Schwanzhaut vorragend. Ohren 5 Linien lang, Flügelweite $9\frac{1}{2}$ Zoll. Unterseite weißlicht, oben röthlichtgrau Gewicht kaum $\frac{1}{2}$ Loth. In Deutschland.

12. Zwergfledermaus. Vesp. Pipistrellus.

Schreb. LIV.

Ohren die Hälfte so lang als der Kopf, stumpf zugespitzt. Die Ohrdeckel klein. Die Farbe schwärzlichtbraun. Flugweite nur 7 Zoll, die kleinste deutsche Art.

Nicht selten an Wassern in Deutschland, der Schweiz, Frankreich.

13. Kuhlische Fledermaus. Vesp. Kuhlii.

Natterer.

Unterseite fahl ohne Spuren von weiß oder grau, Oberseite hellbraunroth. Ohren fast dreieckig, an der Basis 4 Linien breit. Obere Hälfte der Schwanzflughaut lauf

der

der Rückenseite dicht behaart. Zähne stark. Flugweite 8 Zoll 8 Linien. Haare lang, zart und wollig.

In der Gegend von Triest.

14. Schnauzbärtige Fledermaus. Vesp. mystacinus. Leisler.

Längs der Oberlippe ein dichter, langer, weißbaariger Bart, der über die Unterlippe hinaushängt, $7\frac{1}{2}$—8 Zoll Flugweite. Kopf klein, Gesicht behaart, Schnauze kurz und stumpf, die Ohren 6 Linien lang und bloß $2\frac{1}{2}$ breit, der Ohrdeckel lanzetförmig lang und schmal. Oben schwärzlicht, Unterleib weißlicht. Selten in Mitteldeutschland.

15. Halsband Fledermaus. Vesp. collaris. Meisner.

Der Kopf bräunlicht, Gesicht stark behaart, um den Hals geht ein deutliches gelbweißes Halsband, welches unter dem Kinn sich verliert, der Unterleib aschgrau, der Rücken gelblichtbraun. Länge bis zur Schwanzspitze $2\frac{1}{2}$ Zoll. Flugweite 7 Zoll. Die Ohren 5 Linien lang, lanzetförmig zugespitzt, unten 2 Linien breit, Ohrdeckel lanzetförmig. Das Haar sanft.

Aus der Gegend des Montblank.

16. Schöngezeichnete Fledermaus. Vesp. pictus.

Schreb. XLIX.

Schnauze kurz, Nase klein, Ohren kürzer als der Kopf, eiförmig. Das Haar lang, rothbraun ins Goldfarbe spielend. Flugweite $4\frac{1}{2}$ Zoll.

Vaterland Ceylon.

Digitized by Google

17. Bourboniſche Fledermaus. Vesp. burbonicus.

Pelz braunroth und röthlichtweiß. Ohren halb ſo lang als der Kopf. Inſel Bourbon.

18. Schwärzling. Vesp. Nigrita. Schreb. L.

Schnauze, Ohren und Flügel ſchwarz. Oben braunfahl, unten graufahl. Flugweite 16 Zoll. Ohren kürzer als Kopf. Senegal.

19. Starkbehaarte Fledermaus. Vesp. lasiurus.

Schreb. LXII. B.

Ohren kürzer als Kopf, Pelz rothgelb, die Flughaut zwiſchen den Schenkeln ſtark behaart.

Aus Cayenne.

20. Neujorkiſche Fledermaus. Vesp. nove boracensis.

Ohren kurz, breit und rundlicht, Pelz hellbraun, an den Schultern ein weißer Fleck.

Neujork.

21. Weißliche Fledermaus. Vesp. albescens.

Schwärzlicht, unten dunkelbraun wie gepudert. Ohren kurz.

Paraguay.

22. Rothbraune Fledermaus. Vesp. ruber.

Oben zimmtfarb, unten ins roſenfarbe ſpielend. Die Ohren ſehr ſpitzig, pfriemförmig. Flugweite 9 Zoll.

Paraguay.

Digitized by Google

23. Langhaarige Fledermaus. Vesp. villosissimus.

Sehr langhaarig, die Ohren pfriemförmig. Pelz hellbraun, ins weißlichte spielend. Flugweite 12 Zoll.

Paraguay.

24. Größte Fledermaus. Vesp. maximus.

Schnauze lang und zugespitzt, oben kastanienbraun, unten schmutzigweiß. Flugweite 19 Zoll.

Gujana.

25. Timorische Fledermaus. Vesp. timoriensis.

Ohren breit, so lang als der Kopf, durch eine schmale Haut vereinigt. Ohrdeckel halb herzförmig. Pelz oben braunschwarz, unten weiß.

26. Nasenfledermaus. Vesp. Naso. Neuwied.

Mit stark verlängerter fast rüßelförmiger Nase, welche um eine starke Linie über den Oberkiefer vortritt. Länge 2 Zoll 4 Linien. Flughaut stark behaart; Ohr schmal und stark zugespitzt. Haar am Oberleib dunkelgelblicht graubraun, an den Unterbeilen blässer gelblich grau.

Ostküste von Brasilien.

27. Hundsschnauzige Fledermaus. Vesp. canimus. P. Max.

Die Schnauze dick, der Mund breit mit aufgeschwollenen Lippen. Die Ohren kegelförmig abgerundet, der Ohrdeckel kurz. Die Flughaut schmal, das Haar lang dunkelschwarzbraun, an den untern Theilen etwas heller. Flugweite 10 Zoll 4 Linien. Ostküste von Brasilien.

28. Schwärzliche Fledermaus. Vesp. nigricans. P. Max.

Klein, der Schwanz halb so lang als der Körper, die

Schnauze kurz. Die Farbe dunkelrußfarbig oder schwärzlichtgraubraun. Flugweite 8 Zoll 8 Linien. Ostküste von Brasilien.

29. Gespornte Fledermaus. Vesp. calcaratus. P. Max.

Pelz röthlichtbraun, unten röthlichtfahl, die Ohren schmal lanzettförmig, die Fersenspitzen sind sehr lang und bilden einen Sporn. Flugweite 11 Zoll 3 Linien. Ostküste von Brasilien.

30. Weißbauchige Fledermaus. Vesp. leucogaster. P. Max.

Die Schnauze ganz besonders kurz, die Ohren länglicht zugerundet. Der Pelz oben schwarzbraun mit gelblichen Haarspitzen, Kehle und Brustseiten schwarzbräunlicht, Bauch und Aftergegend weißgraulicht. Flugweite 8 Zoll 11 Linien. Ostküste von Brasilien.

Fliegende Makis. Galeopithecus.

Sie sind ungeachtet ihrer Flughaut wohl von den Fledermäusen zu unterscheiden, weil die Finger ihrer Hände alle mit schneidenden Nägeln bewaffnet, auch nicht länger sind als die Finger an den Füßen, so daß die Haut, welche zwischen den Füßen liegt, und sich bis an die Seiten des Schwanzes fortsetzt, nicht eigentlich als Flughaut dient, sondern wie bey den Flieg-Eichhörnchen als eine Art Fallschirm gebraucht werden kann. Die Eckzähne sind kurz und wie die Backenzähne gezähnelt. In der obern Kinnlade stehen zwey gezähnelte und von einander entfernte Vorderzähne; unten sechs Vorderzähne, welche in Lamellen gespalten sind, wie ein Kamm, dieser Bau ist der Gattung allein eigen. Diese Thiere leben auf Bäumen im

Digitized by Google

indiſchen Archipel von Inſekten, und wahrſcheinlich auch Vögeln. Wenn man von dem Abreiben der Zähne urtheilen ſoll, ſo freſſen ſie auch Früchte. Der Blinddarm iſt groß.

Die einzige mit Gewißheit beſtimmte Art lebt auf den Molucken und den Südinſeln.

1. Fliegender Maki. Galéopithecus rufus.
Audeb. pl. 1. 2. Schreber CCCVII. C. D.

Etwa von der Größe einer Katze, oben zimmetfarb, oder grauroth, unten roſtfarb. Er lebt auf den Molucken, Ternate, den Südinſeln u. ſ. w.

Der geſcheckte fliegende Hund. Gal. variegatus ſoll das junge Thier ſeyn. Er iſt grau, ſchwarz und weißlicht, geſcheckt und gewellt, unten weißlicht *).

Zweyte Familie der Raubthiere.

Inſektenfreſſer. Insectivora. Subteranea. Illig.

Die Säugewarzen am Bauche. Wie bey den Händeflüglern ſind die Backenzähne mit kegelförmigen Spitzen beſetzt, und die meiſten ſind nächtliche Thiere, welche meiſt unter der Erde leben. Ihre vorzüglichſte Nahrung ſind Inſekten, in den kalten Gegenden bringen viele den Winter in Erſtarrung zu. Sie haben nicht wie die Hände-

*) Die Familie der Händeflügler iſt wohl nicht mit Unrecht von den meiſten Syſtematikern von den Raubthieren getrennt worden, und macht eine eigene Ordnung aus. Da ſie alle Inſekten freſſend ſind, ſo paßt die Benennung Inſektenfreſſer nicht ausſchließlich auf dieſe zweyte Familie der Raubthiere, für welche der Name grabende wohl ſchicklicher wäre. A. d. U.

Digitized by Google

flügler Flughäute, aber immer Schlüsselbeine; ihre Füße sind kurz, die Bewegung meist langsam; die Säugewarzen liegen am Bauche, und die männliche Ruthe in einer Scheide; alle haben keinen Blinddarm, und beym Gehen setzen alle den ganzen Fuß auf die Erde.

Man kann sie in zwey Unterabtheilungen theilen, und dieselben nach der Lage und Größe der Vorderzähne und Eckzähne bestimmen. Die erste hat zwey lange Vorderzähne, denen zu jeder Seite kürzere Schneidezähne und Eckzähne folgen, die Eckzähne sind selbst kürzer als die Backenzähne, wie bey den Tarsiern unter den Vierhändern. Dieser Bau der Vorderzähne nähert sie auch einigermaßen den Nagthieren.

Bey der zweyten Abtheilung finden sich vier abgesonderte Eckzähne, wie bey den übrigen Raubthieren.

Erste Abtheilung.

Igel. Erinaceus.

Der Körper ist mit Stacheln und Haaren besetzt, auf dem ganzen Rücken stehen Stacheln, am Bauch Haare. Das innere der Rückenhaut ist mit Muskelfasern durchwebt, durch diese Einrichtung kann der Igel den ganzen Körper mit Kraft kugelförmig zusammenziehen, und Kopf und Füße verbergen, so daß der ganze Körper einer Stachelkugel gleicht, die schwer anzugreifen ist. Der Schwanz ist kurz, die Füße alle fünfzehig. Die mittlern Vorderzähne oben sind cylindrisch und von einander abstehend.

1. Der Europäische Igel. Erinac. europaeus. Schreb. CLXII.

Mit kurzen Ohren. In allen gemäßigten Gegenden von Europa in Gebüschen. Im Winter verkriecht er sich

unter Baumwurzeln, oder gräbt sich ein Loch, wo er in anhaltendem Schlafe die kalte Zeit zubringt. Im Frühjahr sind beym Erwachen die Saamenbläschen des Männchens zu einer ganz außerordentlichen Größe angeschwollen. Er lebt von Insekten, aber auch von Mäusen, Maulwürfen, Fröschen und andern kleinen Thieren, und von Obst und Weintrauben. Im Alter findet man oft die Spitzen seiner Backenzähne ganz abgerieben. Ehedem brauchte man seine Haut zum Hecheln des Hanfes. Er soll auch in Asien und Afrika vorkommen?

2. Langbhriger Igel. Erin. auritus.

Schreb. CLXIII.

Kleiner als der europäische, die Ohren so lang als zwey Drittheile des Kopfs, übrigens dem unsrigen sehr ähnlich. Er soll die spanischen Fliegen, welche Hunden und Katzen schreckliche Schmerzen verursachen, ohne allen Schaden in Menge fressen. Von der Nordseite des kaspischen Meeres an, findet er sich bis in Egypten.

Spitzmaus. Sorex.

Kleine Thiere ohne Stacheln, die Schnauze in einen beweglichen Rüßel verlängert. Auf jeder Seite des Körpers steht unter den Haaren eine Reihe von gröbern Haaren, zwischen welchen eine riechende Materie ausschwitzt, welche in einer eigenen Drüse abgesondert wird. Die mittlern obern Vorderzähne sind etwas gebogen und an ihrer Basis gezähnt, unten zwey lange Vorderzähne, welche gerade vorwärts stehen. Unbestimmte Eckzähne, kürzer als die Vorderzähne, oben fünf, unten zwey auf jeder Seite. Die Backenzähne oben vier, unten drey, alle mit Spitzen bedeckt. Die Augen sehr klein, kein Jochbogen,

Digitized by Google

die Ohren kurz und rund. Der Schwanz behaart, lang oder mittelmäßig oder fehlt ganz. Säugewarzen sechs bis zehn an Brust und Bauch. Sie leben in Löchern, welche sie selbst graben, sind mehr nächtliche Thiere und fressen Würmer und Insekten, auch Aas.

1. Gemeine Spitzmaus. Sor. araneus.

Schreb. CLX.

Grau mit eckigem Schwanz von der Länge des Körpers. Fast in ganz Europa gemein, von der Größe der Hausmaus. Hunde und Katzen tödten sie, fressen sie aber nicht, wegen ihrem Bisamgeruch.

2. Wasserspitzmaus. Sor. fodiens.

Schreb. CLXI.

Schwarz mit weißem Bauche, eckigem Schwanz von der Länge des Körpers. An den Füßen stehen eine Reihe steifer Haare zum Schwimmen; das Ohr kann durch drey Klappen fest verschlossen werden, sie schwimmen und tauchen daher geschickt; leben an Flüssen und Waldbächen von Wasserinsekten, Fischrogen.

Im mittlern Europa.

3. Weißzähnige Spitzmaus. Sor. leucodon.

Schreb. CLIX. D.

Oben braunschwarz, unten weiß, der Schwanz kürzer als der Körper. Der Körper gestreckter als bey der vorigen. Keine Schwimmhaare. Vorderzähne sehr weiß.

Im mittlern Europa.

4. Spitzmaus mit vierseitigem Schwanz. Sor. tetragonurus.

Schreb. CLIX. B.

Schwanz vierseitig, kürzer als der Körper. Pelz bräunlichtschwarz, unten grau. Mittleres Europa.

Digitized by Google

5. Grabende Spitzmaus. Sor. constrictus. Schreb. CLIX. C.

Schwanz kürzer als der Körper, oben schwärzlicht, unten graulicht. Vorderzähne gelb. Gräbt tiefe.

Mittleres Europa.

6. Breitschwänzige Spitzmaus. Sor. remifer. Geoff.

Annal. du Mus. XVIII. p. 2.

Um die Hälfte größer als die gemeine, gedrungener, schwärzlichtbraun, unten graubraun. Ohren weiß. Schwanz anfangs gefurcht, am Ende platt.

In Frankreich, an Flüssen.

7. Kleinste Spitzmaus. Sor. exilis.

Das kleinste Säugethier, wiegt etwa $\frac{1}{2}$ Drachmen, Schwanz so lange als der Körper, anfangs dünne, dann rund und dick. Pelz bräunlicht.

In Sibirien nach Pallas.

8. Zwergspitzmaus. Sor. minutus. Schreber CLXI. B.

Ohne Schwanz, mit sehr langem Kopf, nur etwas größer als die vorige.

Sibirien.

9. Gestreifte Spitzmaus. Sor. lineatus. Geoff.

Braunschwärzlicht oben, der Hals grau. Ueber das Gesicht geht eine schmale weiße Linie von der Nase bis zur Stirn, an den Ohren ein weißer Fleck.

Gegend um Paris.

Digitized by Google

10. Indiſche Spitzmaus. Sor. indicus.

Oben graubraun, unten röthlicht, der Schwanz rund. Vaterland Pondicheri.

11. Kapiſche Spitzmaus. Sor. capensis.

Gleicht der vorigen, aber die Schnauze iſt ſpitzer und länger und der Schwanz halb ſo lang als der Körper. Sie iſt graulicht, über den Rücken ins Rothgelbe ſpielend.

Am Kap. Ann. du Mus. Tom. XVII. pl. 4.

12. Rattenſchwänzige Spitzmaus. Sor. myosurus *).

Weiß, der Schwanz lang, die Schnauze kurz.

Vaterland unbekannt.

Ann. du Mus. XVII. pl. 3.

Desman. Mygale.

Oben zwey ſpitzige dreyeckige Vorder zähne, unten vier die mittlern ſehr klein. Unbeſtimmte Eckzähne kürzer als die Vorderzähne. klein und kegelförmig, oben und unten fünf. Backenzähne oben fünf, unten vier, mit Spitzen beſetzt. Die Schnauze ſehr lang und rüßelförmig, ſehr beweglich und biegſam; der Schwanz iſt ſchuppig und zu beyden Seiten abgeplattet, die Füße fünfzehig, die Zehen mit einer Haut verbunden. Sehr kleine Augen, keine äußeren Ohren.

---

*) Unbeſtimmte Arten ſind Sorex proboscideus und guineensis aus Afrika. Sorex pusillus. caerulescens, Daryurus und murinus aus Aſien. Sorex suriramensis und albus aus Amerika. Coeculiens aus Sibirien, und Ceylonicus aus Ceylon. Einige davon gehören wahrſcheinlich zur folgenden Gattung. A. d. U.

Digitized by Google

1. Rußiſcher Desman. Mygale moscovitica.

Sorex moschatus. Schreb. CLIX.

Beynahe von der Größe eines Igels, oben aſchgrau. Dieſes Thier iſt ſehr gemein an den Seen und Flüſſen des ſüdlichen Rußlands. Es nährt ſich von Würmern, Blutigeln, Inſekten, welche es aus dem Schlamme leicht mit ſeinem beweglichen Rüßel hervorwühlt. Es gräbt Löcher in die ſteilen Ufer, der Eingang iſt unter dem Waſſer, das Lager hingegen ſo hoch, daß es immer über dem höchſten Waſſerſtand liegt. Das Thier kommt ſehr ſelten aufs Trockene; man fängt es aber häufig in Fiſchnetzen. Es verbreitet einen ſtarken Biſamgeruch, welcher von einer Salbe entſteht, die in Drüſen unter dem Schwanze abgeſondert wird. Sie riecht ſo ſtark, daß ſelbſt das Fleiſch der Hechte, welche ſolche Thiere verzehrt haben, davon riecht.

2. Pyrenaiſcher Desman. Myg. pyrenaica. Geoff.

Ann. du Mus. XVII. pl. 4.

Viel kleiner mit längerm Schwanze, der am Ende haarigt iſt. Die Nägel ſind doppelt ſo lange, als am rußiſchen, und die Zehen an den Vorderfüßen nur halb verwachſen, der Daum am Hinterfüß faſt frey. Die Farbe oben kaſtanienbraun, die Seiten graubraun, der Bauch ſilberfarb.

In Frankreich am Fuße der Pyrenäen.

Waſſermaulwurf. Scalops.

Der Zahnbau wie beym Desman, die Schnauze wie bey den Spitzmäuſen, die Hände breit, mit ſtarken Nägeln

zum Graben sehr geschickt, wie bey den Maulwürfen, die Lebensart unterirdisch, wie beym Maulwurf.

Canadischer Wassermaulwurf. Scal. canadensis. Illig.

Sorex aquaticus. Schreb. CLVIII.

An den Flüssen von Nordamerika, scheint weit in diesem Theil von Amerika verbreitet.

Goldmaulwurf. Chrysochloris.

Zahnbau wie bey den vorhergehenden. Die Schnauze kurz, breit und aufgeworfen, an den Vorderfüßen drey Klauen die äußere sehr groß, die andern kleiner, an den Hinterfüßen fünf Zehen. Auch diese Thiere leben unter der Erde. Die Vorderfüße zum Graben, durch einen dritten unter dem Ellbogen liegenden Knochen verstärkt.

Afrikanischer Goldwurf. Chrys. aurata.

Talpa inaurata Schreb. CLVII.

Etwas kleiner als der gemeine Maulwurf, ohne deutlichen Schwanz, der Pelz giebt einen schön metallischen kupferrothen Schimmer, der nach dem Lichte bald mehr ins Grünliche, bald mehr ins Rothe spielt. Die Ohren sind äußerlich nicht sichtbar, die Augen sehr klein.

Vaterland Afrika *).

*) Der rothe Maulwurf, welchem Seba Amerika zum Vaterland anweißt, scheint zu Scalops zu gehören. Ob der merikanische Tukan, der fuchsroth ist, und in Merico häufig ist, und dort gegessen wird, zu Scalops oder Talpa oder zu den Nagern gehört, ist ungewiß. Ebenso wohin der langschwänzige Maulwurf Pennants gehört.

Digitized by Google

Zweyte Abtheilung. Mit wahren Eckzähnen.

Borstenigel. Centetes. Illig.

Der Körper ist wie bey den Igeln mit Stacheln bedeckt, allein sie können sich nicht so vollkommen zusammenrollen wie die Igel, haben wahre Eckzähne, keinen Schwanz, zwischen den Stacheln stehen sehr viele Borsten. Die Augen klein, der Kopf sehr verlängert durch die sehr spitzige Schnauze. Man findet auf Madagascar drey Arten, von denen man eine auf der Insel Frankreich naturalisirt hat. Es sind nächtliche Thiere, welche drey Monate erstarrt sind, obgleich sie in dem heißen Erdstriche leben, die Erstarrung soll während der größten Hitze statt haben. Die Füße kurz, fünf zehig.

1. Der ungeschwänzte Borstenigel. C. ecaudatus.

Schreb. CLXV.

Mit steifen Stacheln besetzt, die Vorderzähne sind ausgeschweift, unten stehen nur vier Vorderzähne, er ist größer als unser Igel, und die größte Art.

2. Der weichstachlichte Borstenigel. C. setosus.

Schreb. CLXIV.

Die Stacheln sind biegsam, eher borstenartig, hat sechs ausgeschweifte Vorderzähne in jeder Kinnlade.

3. Der gestreifte Borstenigel. C. semispinosus.

Schreb. CLXV.

Mit Stacheln und Borsten besetzt, gelb und schwarz gestreift. Er hat sechs Vorderzähne, die Eckzähne sind dünne und gebogen, er ist nicht größer als ein Maulwurf.

Digitized by Google

Maulwurf. Talpa.

Der ganze Bau dieser Thiere ist zum Graben und zum Leben unter der Erde eingerichtet. Der Vorderschenkel ist sehr kurz, das Schulterblatt sehr lang, das Schlüsselbein sehr stark, mit außerordentlich großen Muskeln versehen, die Hand sehr breit, ihr inneres steht immer auswärts gerichtet. Der untere Rand der Hand ist schneidend; die Finger sind undeutlich getheilt, aber die Nägel sind lang, stark, platt und schneidend. Beym Graben wirft der Maulwurf die Erde nach hinten. Das Brustbein ist wie bey den Vögeln und Fledermäusen, indem eine Gräthe daran befindlich ist, welche den starken Brustmuskeln zur Anlage dient, und ihnen die nöthige Stärke giebt. Auch der lange Kopf des Maulwurfs, dessen spitzige Schnauze mit einem eigenen Knöchelchen versehen ist, und dessen Nackenmuskeln sehr stark sind, wird zum Durchwühlen der Erde gebraucht. Das Nackenband selbst verknöchert sich oft ganz. Der hintere Theil des Körpers ist schwach, und das Thier bewegt sich auf freyem Boden mit Langsamkeit und Beschwerde, während es unter der Erde schnell geschieht. Das Gehör ist sehr fein, das Trommelfell sehr breit, obschon kein äußeres Ohr vorhanden ist. Die Augen aber sind so klein, und so im Pelz verborgen, daß man lange ihm dieselben absprach. Seine Kinnladen sind schwach, die Nahrung besteht aus Insekten und Regenwürmern, auch wohl aus zarten Wurzeln. Oben sind sechs, unten acht Vorderzähne.

1. Europäischer Maulwurf. Talpa europaea.

Schreber CLVI.

Mit spitzer Schnauze, langem weichem schwarzen Haar, man findet zuweilen ganz weiße, erbsgelbe und ge-

ſchäckte. Allenthalben in Europa, ausgenommen im höchſten Norden. Sein Wühlen im Boden iſt mehr dem Feldbau hinderlich, als eigentlich ſchädlich.

Spitzwurf. Talpa sorex *). Condylura.

Oben ſechs, unten vier Vorderzähne, keine Eckzähne, oben ſieben, unten acht Backenzähne auf jeder Seite, alſo in allem 46 Zähne (bey Talpa 44). Die Schnauze ſehr verlängert, ſehr geſpalten, mit einem Knochen verſehen, der am Ende in eine knorplichte Spitze auslauft und mit einer Scheibe ſich endigt, welche mit einem Kranz von beweglichen Franzen umgeben iſt. Die Form des Körpers iſt maulwurfsartig, die Vorderfüße ſehr kurz und handförmig, mit fünf kurzen Zehen, weichem ſehr kurzem Pelz und ſehr kleinen Augen.

1. Der Spitzwurf mit aufgeworfener Schnauze. Tal. cristata.

Condylura. Illig. Sorex cristatus. Linn.

Die Naſe iſt mit beweglichen knorplichten Spitzen umgeben, welche eine Art von Stern bilden, wenn er ſie ausbreitet. Er iſt kleiner als der europäiſche, der Schwanz mißt die Hälfte des Körpers, und iſt mit ſehr kurzen weichen Haaren bedeckt **).

Aus Canada.

---

*) Man kennt nur eine beſtimmte Art, wenn nicht die von Pennant beſchriebene und von Illiger unter dieſes Geſchlecht verſetzte Talpa longicaudata hieher gehört.

**) Talpa oder Codylura fissipes, Talpa flava, purpurascens, und radiata, alle aus Amerika, ſind unbeſtimmte Arten. Da

Eigentliche Fleischfresser Carnivora.

oder

Dritte Familie der Raubthiere.

Obschon der Beyname Fleischfressend allen mit Klauen versehenen Thieren zukommt, welche drey Arten von Zähnen haben, und nicht zu den Vierhändern gehören, da sie alle sich mehr oder minder von thierischer Nahrung erhalten, so beschränkt die Schwäche der ersten beyden Familien, die dahin gehörenden Thiere meist blos auf Insekten, in dieser dritten Familie hingegen sind solche Thiere enthalten, welche die Kraft haben, größere Thiere anzugreifen, und ihren Blutdurst zu stillen. Sie haben alle vier einzeln stehende starke und lange Eckzähne, zwischen welchen sechs Vorderzähne stehen, von welchen der zweyte untere mit seiner Wurzel etwas zurücktritt. Die Backenzähne sind entweder alle schneidend, oder einzelne von ihnen haben stumpfe Erhabenheiten, aber keine konische und dünne Spitzen. Je mehr die Zähne schneidend sind, desto mehr ist die Nahrung ausschließlich an das Thierreich gebunden, und man kann fast immer mit Bestimmtheit auf ihre Nahrung schließen, wenn man die Zahl der höckerigten Zähne mit der Zahl der schneidenden vergleicht. Die Bären, welche fast durchaus höckerige Backenzähne haben, können sich aber auch mit

---

gegen hat Cüvier die Gattung Condylura Illig. mit Unrecht unterdrückt, da sie wirklich, wie er selbst nun überzeugt ist, besteht; nur taugt der Name Knotenschwanz nicht, da er nicht ausgezeichnet knotig ist. Ich schlage Talpa sorex vor, da die Gattung zwischen Talpa und Sorex steht. A. d. U.

Digitized by Google

vegetabilischen Nahrungsmitteln allein behelfen, obschon sie das Fleisch auch nicht verschmähen.

Die vordern Backenzähne sind immer am meisten schneidend; dann kommt ein Backenzahn, der größer ist als die andern, mit breiter und höckeriger Krone, und hinter diesem stehen ein oder zwey kleine mit ganz flacher Krone. Mit diesen kleinen Hinterzähnen zerbeißen auch die Hunde das Gras, welches sie zuweilen fressen. Friedrich Cuvier nennt diesen großen Zahn Fleischzahn, die vordern scharfen und spitzigen falsche Backenzähne (Reißzähne), und die hintern stumpfen Höckerzähne. Die Arten, welche wenig Backenzähne haben, und deren Kinnladen zugleich kurz sind, können heftiger beißen.

Nach dem Zahnbau lassen sich die Gattungen am sichersten bestimmen, indeß muß man dabey auch den Bau der Hinterfüße in Betrachtung ziehen. Mehrere Gattungen setzen, wie alle Gattungen der beyden ersten Familien, beym Gehen den ganzen Fuß auf die Erde, auch wenn sie aufrecht stehen, alle diese haben nackte Fußsohlen. Die größere Zahl aber setzt beym Gehen nur die Zehen auf die Erde, und berührt sie mit den Fußwurzeln nicht, diese können viel schneller laufen. An diesen Unterschied knüpfen sich noch andere Gewohnheiten, und selbst der innere Bau richtet sich darnach. Weder die einen noch die andern haben ein Schlüsselbein, und nur ein kleiner Knochenfortsatz hält die Vorderschenkel im Fleisch fest.

Sohlengänger. Plantigrada.

Sie gehen auf der ganzen Sohle, sie können mit einiger Leichtigkeit auf den Hinterfüßen allein stehen. Sie

gleichen in Hinsicht der Langsamkeit ihres Ganges den Insektenfressern, haben wie sie, keinen Blinddarm, und sind nächtliche Thiere. Diejenigen, welche die kalten Länder bewohnen, fallen im Winter in Erstarrung. Sie haben an allen vier Füßen fünf Zehen.

Bären. Ursus.

Die Bären haben auf jeder Seite drey große Backenzähne, welche ganz höckerig sind; sie fressen auch, ungeachtet ihrer Stärke, lieber vegetabilische Nahrungsmittel, als Fleisch. Oben sind überhaupt fünf, unten sechs Backenzähne. Der erste ist klein, stumpf, dreyspitzig, steht nahe am Eckzahn, dann folgt in einem weiten Abstand der zweyte noch kleinere und leicht ausfallende, unten steht er von den übrigen Backenzähnen weiter ab als oben. Der dritte Backenzahn oben ist zweyspitzig, die beyden übrigen höckerigen Mahlzähne, der hinterste sehr lang und breit. Unten ist der dritte einspitzig, die übrigen höckerig, der fünfte nach hinten ist der größte *).

Die Bären sind große Thiere mit starkem Körper, dicken Gliedern, kurzem Schwanz. Der Nasenknorpel ist verlängert und beweglich. Sie graben sich Höhlen, welche sie mit Baumästen und Laub auslegen, um da den Winter in mehr oder minder tiefem Schlaf zuzubringen, während dieser Zeit genießen sie keine Nahrung. In diesem Zufluchtsort wirft auch das Weibchen Junge.

Die

*) Dieses ist die genaue Beschreibung der Zähne nach einem sehr großen Kopf von Ursus arctos, Illiger sagt irrig molares supra sex, infra quinque, es ist gerade umgekehrt. A. d. U.

Die Arten ſind einander ziemlich ähnlich und haben wenig unterſcheidende Charaktere.

1. Brauner europäiſcher Bär. Ursus arctos.

Schreb. CXXXIX. Geoff. et Cuv. Mammif. Livr. 7.

Die Stirn erhaben, der Peiz braun, mehr oder weniger wollig, bald mehr braun, bald mehr gelb bald mehr ſchwarz, bald ſogar ins ſilberfarbe ſpielend; auch die Höhe der Beine iſt verſchieden, ohne Hinſicht auf Alter oder Geſchlecht. In der erſten Jugend geht ein weißlichtes Halsband um den Hals. Dieſes Thier bewohnt die hohen Gebirge und großen Wälder faſt von ganz Europa und einem großen Theil von Aſien. Die Begattungszeit des Bären iſt im Oktober, die Tragzeit iſt 6 Monate, und die Mutter wirft im April oder May ein bis drey Junge, gewöhnlich in der Höhle ihres Winteraufenthalts *). Das Fleiſch iſt eßbar, beſonders das der Jungen, als eine vorzügliche Delikateſſe werden die Tatzen geprieſen. Sie ſteigen geſchickt auf Bäume. Es ſoll in Europa beſonders zwey Varietäten dieſes Bären geben, eine ſchwarze, welche größer und weniger fleiſchfreſſend, und eine kleinere rothbraune Art, welche das Vieh anfällt, und mehr Fleiſch als Vegetabilien genießt, man unterſcheidet daher beyde von einander unter dem Namen des ſchwarzen Bären (urs. niger) und des braunen Bären (urs. fuscus) ob es wirklich zwey verſchie-

*) Cuvier ſetzt die Begattungszeit in den Juni, die Zeit der Geburt in den Januar, allein dies fällt ja gerade in die Zeit des Winterſchlafs, wo ſollte dann die Bärin Kräfte zur Milcherzeugung bernehmen. In der Schweiz wenigſtens iſt nach Angabe aller Jäger, der Oktober die Begattungszeit. A. d. U.

dene Arten sind, ist noch nicht bestimmt entschieden. Der schwarze soll eine flächere Stirne und wolligeres Haar haben als der braune. Es werden zuweilen Bären gefangen, welche an 400 Pfund wiegen. Sie greifen Schafe, Ziegen, Kühe, Pferde an und bemächtigen sich ihrer.

Der indische Bär hat bey schwärzlichtem Pelz einen weißen Fleck auf der Brust.

2. Amerikanischer schwarzer Bär. Urs. americanus.

Schreb. CXLI. B. Menag. du Mus.

Mit glatter Stirn, schwarzem glänzendem Pelz und rothgelber Schnauze, zuweilen auch mit einem rothgelben Fleck über den Augen, auch wohl ein solcher oder weißer auf der Brust oder dem Halse. Er soll mehrere kleine Zähne hinter den Eckzähnen haben als der europäische Bär. Man hat auch ganz rothgelbe gesehen. Er wird sehr groß, man fand ihn bis zu sieben Fuß lang. Sie bewohnen hohle Bäume, in denen sie oft hoch oben aufsteigen. An der Hudsonsbay machen sie Löcher in den Schnee. Er scheint mehr Vegetabilien als Fleisch zu lieben, und im Winter weniger zu schlafen, da er um diese Zeit bis nach Louisiana wandert, wenn es kalt ist. Frißt auch Fische. Er findet sich in ganz Nordamerika bis zum Eismeer.

Ob der noch größer beschriebene graue amerikanische Bär. Ursus magnus horribilis von diesem verschieden sey, ist nicht gewiß, doch sehr wahrscheinlich, er ist weißgrau, fast weiß, und erreicht ein Gewicht von fast 500 Pfund. Am Mißuri häufig.

Digitized by Google

3. Der Eisbär. Ursus maritimus.

Menager. du Mus. Schreb. CXLI.

Ganz weiß, mit langem glänzendem Haar. Der Kopf ist länger und platter als an den andern Bären. Wird sehr groß bis zu 10 Fuß lang, ist niedrig auf den Beinen. Das nördlichste Säugethier außer den Seehunden, man hat es so weit nach Norden angetroffen, als man die Meere befahren konnte. Lebt oft auf Eisinseln, wo es auch Junge wirft, verschläft aber den größten Theil des langen nordischen Winters. Ist am meisten fleischfressend und furchtbar selbst dem Menschen.

Frißt Fische, Krebse, junge Seehunde und Wallroße.

4. Langrüßlicher Bär. Ursus longirostris. Tiedemann.

Bradypus ursinus Shaw. Prochilus ursinus. Illiger.

Die Länge des Thiers beträgt etwa sechs und einen halben Fuß, die Höhe drey Fuß. Der Kopf lang zugespitzt, die Schnauze schmal und rüßelartig. Die Ohren kurz, die Augen klein. Die Nasenflügel groß und sehr beweglich. Oben und unten sechs Backenzähne. Die Vorderzähne klein. Das Haar lang, schwarz, glänzend und zackig, der Schwanz sehr kurz; am Hals ein weißer herzförmiger Fleck.

In Bengalen.

Außer diesen wirklich vorhandenen Bären findet man noch die Ueberreste von zwey Arten, welche der Vorwelt angehört haben, man nennt sie Höhlenbären, weil man ihre Ueberreste nur in Höhlen findet, in Franken, in den Karpathen und bey Palermo.

Digitized by Google

Die eine Art Urs. fossilis planus hatte platte Stirn und Schnauze, gar keine kleinen Zähne hinter den Eckzähnen, und gleicht dem amerikanischen, ist aber größer.

Die zweyte Art Urs. fossilis spelaeus muß noch größer gewesen seyn, man findet Schedel von 16 Zoll Länge. Die Hirnschale ist gewölbt, vom Gesicht stark abgesetzt, auch diesem fehlen die kleinen Zähne, wenigstens oben, selten ist einer unten, scheint dem Eisbären näher verwandt gewesen zu seyn.

Waschbär. Procyon. Illiger.

Oben und unten sechs Backenzähne, davon die drey vordern klein und spitzig, die drey hintern dagegen höckerig sind, alle stehen in einer Reihe an einander. Der Schwanz ist lang; außerdem ähnelt ihr Körper dem Bärenkörper, doch ist er etwas leichter gebaut. Nur beym Stillstehen setzen sie die ganze Sohle auf die Erde, beym Gehen aber erheben sie die Sohle.

1. Der Waschbär, Raton. Procyon Lotor.

Schreb. CXLIII. Geoff. et Cuv. mammif. Livr. 2.

Graubraun, die Schnauze weißlicht, über die Augen geht ein brauner Streif, der Schwanz braun und weißlicht geringelt; die Größe etwa die des Dachses. Dieses Thier läßt sich leicht zähmen. Hat sechs Säugewarzen an den Brüsten, im männlichen Glied ein Knochen, keine Saamenbläschen. Seine Nahrung besteht in Fischen, Krebsen, Schaalthieren, Insekten, Reptilien, kleinen Vögeln, Obst und Zuckerrohr. Alles, was er genießt, taucht er erst ins Wasser. Klettert auf Bäume und ist unruhig und lebhaft. Häufig in Nordamerika.

Digitized by Google

2. Krabbenfreſſer. Proc. cancrivorus.

Hellgraubraun einfärbig; die Schwanzringe undeutlich. Aus Südamerika.

Coati. Naſenthiere. Nasua.

Die Naſe ſehr verlängert bildet einen beweglichen Rüßel, der Schwanz lang, der Gang nicht ſchnell. Die Lebensart nächtlich. Der Zahnbau wie beym Raton. Die Naſe endigt ſich mit einem aufgeworfenen Rand. Die Zehen ſind zum Theil mit einer Haut verbunden, doch klettern ſie leicht. Die langen Nägel der Vorderfüße machen zum Graben geſchickt. Sie nähren ſich von Eiern, Vögeln, Mäuſen und andern kleinen Thieren, und ſchlafen am Tage. Alle in Südamerika.

1. Der große Coati. Nasua solitaris. Neuwied.

Viverra Nasica. Schreb. CXVIII. Geoff. et Cuv. mammif. Livr. 1. Nasua Monde. Illig.

Bald fuchsroth, bald graubraun, Naſen und Schwanzringe braun. Lebt nur Paarweiſe. In Braſilien heißt das Thier Cuati mundeo.

2. Kleiner Coati. Nasua sociabilis. Neuwied.

Viverra Narica. Coati di bando. Schreber CXIX. Geoff. et Cuvier mammif. Liv. 4. Nasua narica. Illig.

Variirt in der Farbe wie der vorige, Augengegend und Schnauze weißlicht gefleckt. Lebt in zahlreichen Geſellſchaften in Braſilien.

Kinkajou. Cercoleptes. Illig.

Die Schnauze kurz, die Zunge ſchmal und dehnbar, der Schwanz ein langer Wickelſchwanz. Nur fünf Backen-

Digitized by Google

zähne, davon die zwey vordern spitzig, die drey hintern höckerig. Klettert leicht. Nahrung kleine Vögel, Eier, Honig und Früchte. Nächtliches Thier.

*) 1. Porto Kinkajou. Cercol. caudivolvulus.

Viverra caudivolvula. Schreb. CXXV. B.

Etwa von der Größe eines Marders. Ohren eirund, fast kahl, dunkelbraun, das Haar wollig braungelb. Im Schlafe wickelt es seinen Schwanz um den Hals.

In Suringm. Leicht zähmbar und unterhaltend.

Dachs. Meles.

Linneus versetzte die Dachse und die Ratons unter die Bären, von denen sie sich jedoch durch den Zahnbau unterscheiden. Oben fünf, unten sechs Backenzähne; der erste sehr klein, die drey folgenden obern spitzige Reißzähne, der hinterste ein großer Mahlzahn, nach außen dreyspitzig, innerhalb höckerig; unten der erste dicht hinter dem Eckzahn, sehr klein und fällt leicht aus, die drey folgenden einspitzig, der vierte groß, mehr mit Spitzen als Höckern versehen, besonders sind vorn drey Spitzen, hinten vier Höcker, der hinterste klein höckerig.

Der Gang ziemlich kriechend, die Lebensart nächtlich. Der Schwanz kurz, die Zehen kurz und wenig beweglich. Unter dem Schwanz eine Tasche, in welcher eine fettige stinkende Feuchtigkeit enthalten ist. Mit den langen Nägeln der Vorderfüße graben sie leicht.

---

*) Es soll noch eine Art geben, Cercol. lepidus, auch in Südamerika. A. d. U.

1. Europäiſcher Dachs. Meles vulgaris. Schreb. CXLII.

Oben rothlichtgrau mit ſchwarz gemiſcht, unten ſchwarz. Der Kopf weiß, zu beyden Seiten ein ſchwarzer Streif. Allenthalben in Europa in Löchern, die er ſich ſelbſt gräbt. Lebt von Mäuſen, Fröſchen, Eidechſen, Weintrauben, Obſt und Wurzeln. Iſt ſehr ſchüchtern, ſein Fleiſch wird gegeſſen. Den Winter verſchläft er, die Naſe in ſeinen Beutel geſteckt.

? 2. Amerikaniſcher Dachs. Meles Taxus. Schreber CXLII. Carcajou.

Faſt wie der europäiſche nur etwas kleiner, die ſchwarzen Streifen gehen nicht durch, ſondern ob den Augen weg und ſind ſchmäler, die Ohren ſind weiß, ſchwarz eingefaßt. Soll nur vier Zehen haben.

Nordamerika, Hudſonsbay, Labrador bis Neuyork.

3. Indiſcher Dachs. Meles indica.

Graulichtweiß, unten ſchwarz. Kopf kleiner, Naſe ſpitzer.

In Oſtindien, iſt lebhaft und ſpielend *).

Vielfraß. Gulo.

Auch dieſe Thiere wurden von Linne noch unter die Bären gezählt; allein ſie nähern ſich mehr den Wieſeln ſowohl durch den Zahnbau, als auch durch ihr Na-

*) Es ſoll in Amerika auch einen weißen Dachs geben, wahrſcheinlich ein Schwächling, ſo wie überhaupt auch Meles Taxus kaum eine eigene Art iſt. A. d. U.

Digitized by Google

turel, nur als Sohlengänger gehören sie zu dieser Familie. Sie haben oben fünf Backenzähne, unten sechs, die drey obern und die vier untern einspitzig, dann folgt der vierte große Reißzahn, und hinter ihm noch ein kleiner Höckerzahn, der obere große ist mehr breit als lang, an der Aussenseite zweyspitzig, auf seiner Fläche einhöckerig. Der Schwanz mittelmäßig lang, unter demselben eine Hautfalte statt einem Beutel. In Hinsicht ihres Baues gleichen sie den Dachsen.

1. Nordischer Vielfraß. Pärf. Gul. borealis. Ursus Gulo Linn. Schreb. CXLIV.

So groß als ein Dachs. Die Farbe ist dunkel kastanienbraun, über dem Rücken ein ungleich breiter dunkelbrauner Streif, wie ein Sattel, Füße und Kopf schwarzbraun. Zuweilen sind alle Farben blaßer. Er bewohnt den kalten Norden der alten Welt, Lappland, Finnland, Norwegen, Sibirien, Kamtschatka. Er nährt sich von Fleisch, greift Rennthiere und andere große Thiere an, denen er auf einem Baume auflauert, und ihnen auf das Genik springt; er klettert leicht, ist aber nicht sehr schnell im Laufen, beschleicht auch Vögel, fängt Fische, fürchtet die Hunde nicht. Jung läßt er sich einigermaßen zähmen. Der Name Vielfraß gebührt ihm nicht, und kommt von alten Sagen her, welche seine Grausamkeit und Gefräßigkeit übertreiben.

2. Wolverene. Gulo luscus.

In Nordamerika, scheint wenig vom Vielfraß verschieden zu seyn, dem er an Größe und Farbe gleicht und seine Stelle in der neuen Welt vertritt.

Digitized by Google

3. Honigvielfraß. Gulo. melivorus.
Schreber CXXV.

Oberleib grau, unten schwarz, beyde Farben an den Seiten scharf abgeschnitten, Kopf, Ohren, Kehle und Füße schwarz, letztere sehr kurz, die Zunge rauh. Die Haare steif. Liebt vorzüglich Honig der Erdbienen, Hummeln, klettert nicht, frißt aber auch Vögel und kleine Säugethiere. Läuft nicht schnell. Vaterland Afrika. Sein Koth stinkt entsetzlich.

4. Der Grison. Gul. vittatus.
Schreb. CXXIV. Geoff. et Cuv. Livr. 4.

Schwarz, Scheitel und Hals graulicht, vom Scheitel läuft über die Ohren herunter ein weißer Streif.
Amerika.

? 5. Der Mapurito. Gul. Mapurito *).
Viverra putorius Linn.

Schwarz, von der Scheitel geht ein weißer Streif bis zur Mitte des Rückens, Schwanz halb so lang als der Körper, langhaarig mit weißer Spitze. Gräbt sich in die Erde und stinkt abscheulich. Hat sehr kleine Ohren.
Vaterland Südamerika.

6. Der Taira. Gulo barbarus.
Mustela barbara Linn. Buff. supp. VII. LX.

Braun, oben auf dem Kopf grau, an der Kehle ein breiter weißer Fleck. In Brasilien und Gujana.

---

*) Der Mapurito und eine andere dahin gezählte Art aus Chili, Gulo Quintessis. schwarz mit zwey weißen Längsstreifen sind unbestimmte Thiere.

Digitized by Google

Zehengänger. Digitigradia.

Die Thiere dieser Zunft gehen auf der Spitze der Zehen. Sie bilden aber selbst wieder mehrere Gattungen, welche durch den Bau ihrer Zähne und anderer Eigenschaften sich auszeichnen.

Die erste Abtheilung hat nur einen wahren Mahlzahn hinten; der Körper ist lang gestreckt, die Füße kurz, der Rücken gebogen, man kann sie daher kriechende nennen. Sie schlüpfen leicht durch enge Löcher. Sie haben, wie die vorhergehenden, keinen Blinddarm, erstarren im Winter nicht. Obschon klein und schwach sind sie doch sehr grausam und blutdurstig. Linneus hat daraus nur eine Gattung gemacht, welche aber in mehrere zerfällt.

Wiesel. Mustela.

Diese Thiere sind sehr blutdürstig; der große Reißzahn unten hat innerhalb keinen Höcker. Oben sind fünf, unten sechs Backenzähne. Der erste hinter dem Eckzahn sehr klein, die zwey folgenden oben, und die drey folgenden unten sind einspitzig. Der vierte Backenzahn oben hat zwey Spitzen und einen abstehenden Höcker, der hinterste Höckerzahn steht der Queere nach, der hinterste untere ist sehr klein. Sie klettern auf Bäume. Man kann sie in

---

*) Illiger rechnet noch zu den Vielfraßen den Yzquiepatl, aber dieser ist Nasua vulpecula, und suffocans, und scheint eher zur Gattung Stinkthier Mephitis zu gehören. Oken rechnet darunter auch das Fischerwiesel Mustula mela norphyncha aus Nordamerika, oben und unten schwarz, Seiten braun, Gesicht und Halsseiten grau, Nase, Schwanz und Ohrenrand weiß. A. d. U.

Iltiße und Marder unterscheiden. Die Iltiße haben eine etwas kürzere Schnauze und verbreiten einen starken Gestank. Der abstehende Höcker des vierten obern Backenzahns fehlt.

1. Der gemeine Iltis. Must. putorius.
Le putois Schreb. CXXXI.

Braun, der Mundrand und ein Fleck von dem Ohr auch der Ohrrand weiß, der Schwanz mittelmäßig. Allenthalben in Europa in Städten, Dörfern und in Wäldern. Ein gefürchteter Feind der Hühner, Tauben, Kaninchen; frißt Eier aber auch Mäuse und Ratten. Sein Geruch ist stumpfer, als beym Marder.

2. Das Frett. Mustela Furo.
Le furet. Schreb. CXXXIII.

Weißgelb mit rothen Augen, scheint nur eine Varietät des Iltis, stammt aber eigentlich aus Afrika. Es wird nur gezähmt gehalten, und zur Kaninchenjagd gebraucht.

3. Der Tiegeriltis. Must. sarmatica.
Schreber CXXXII. Perouasca.

Braun, die Beine schwarz, der Körper allenthalben gelbgefleckt, Schnauze, ein Streif über die Stirne, bis zum Hals und Ohren weiß. Seine Haut wird um dieses artigen Ansehen willen zu Pelzwerk gebraucht. Im südlichen Rußland, in Kleinasien und am Caspischen Meere.

4. Das kleine Wiesel. Must. vulgaris.
Schreb. CXXXVIII.

Oben hellröthlichtbraun, unten weiß, Schwanz kurz einfärbig. In Häusern, Gärten und Feldern. Das klein-

Digitized by Google

ſte Thier der Gattung, etwa ½ Fuß lang. Greift doch die gröſte Ratte und noch größere Thiere an.

5. Das Hermelin. Must. erminea. Schreber CXXXVII. A. B.

Im Sommer hellrothbraun, unten weiß, im Winter rein weiß, mit ſchwarzer Schwanzſpitze. Wird alle Winter regelmäßig weiß. Lebt in Steinhaufen, Maulwurfslöchern. Schweift oft umher und findet ſich ſelbſt auf den höchſten Alpen. Das ſibiriſche Hermelin liefert ein ſchönes aber theures Pelzwerk *).

6. Sibiriſches Wieſel. Must. Sibirica Pallas Schreb. CXXXV. B.

Faſt ſo groß als der Tiegeriltis, einfärbig hellbraun, gelb, mit weißlichten Lippen und Ohrenrand.

In Sibirien.

7. Geſtreifter Iltis. Must. Zorilla. Viverra Zovilla.

Schwarz mit unregelmäßigen weißen Streifen, langem buſchigem Schwanz. Man hat ihn mit den Stinkthieren verwechſelt, denen er blos durch die Klauen gleicht, welche zum Scharren eingerichtet ſind. Dieſer Bau zeigt an, daß er unter der Erde lebe, wodurch er ſich von andern Arten der Iltiße unterſcheiden würde.

Vaterland ſüdliches Afrika.

---

*) Die Bocamele des Cetti, welche in Sardinien ſich findet, ſoll keinen üblen Geruch geben, und ſehr leicht zu zähmen ſeyn, würde alſo eine eigene Art ausmachen. A. d. U.

Eigentliche Marder.

Es fehlt ihnen der abstehende Höcker des vierten obern Backenzahns, die Schnauze ist spitzer, der Kopf platter.

8. Edelmarder. Mustel. martes.
Schreb. CXXX.

Braun mit dottergelber Kehle. In Tannenwäldern des mittlern Europa, der gefährlichste Feind der Eichhörnchen und wilden Tauben, klettert mit der größten Leichtigkeit auf Bäume. Ist wild und grausam, läßt sich aber jung sehr zahm machen. Sein Pelz wird sehr geschätzt.

9. Hausmarder. Must. foina.
Schreber CXXIX.

Braun mit weißer Kehle, in Häusern der Dörfer und Städten in Europa, der gefährlichste Feind alles Hausgeflügels, frißt aber auch Mäuse und Ratten.

10. Der Zobel. Must. Zibellina. Linn.
Schreb. CXXXVI.

Dunkelbraun mit einigen weißlichten Flecken am Kopf. Die Füße stark behaart. Im nördlichsten Sibirien, berühmt als eines der kostbarsten Pelzwerke. Die Jagd dieses Thieres mitten im Winter im größten Schnee jener nördlichen Gegenden ist die mühsamste, welche man kennt. Die Begierde, dieses kostbare Pelzwerk zu finden, hat die Entdeckung des östlichen Sibirien zur Folge gehabt.

11. Der Biſon. Mustela Vison.
Schreb. CXXVII.

Ganz braun, unter der untern Kinnlade ein weißer Fleck. Lebt in Nordamerika. Da er keine Schwimmfüße

hat, wie Daubenton angiebt, so gehört er hierher und nicht unter die Ottern, wohin ihn Illiger und Oken zählen.

12. Der Pekan. Must. canadensis.

Schreb. CXXXIV.

Kopf, Hals, Schultern und Oberrücken graubraun gemischt. Nasen, Hinterrücken, Füße und Schwanz schwärzlicht. Diese beyden Arten haben Haare unter den Zehen. Nordamerika.

13. Wollichtes Wiesel. Must. lanata.

Nase lang und spitzig, Oberkiefer länger, Pelz wollig. In Gujana.

14. Nörz. Must. lutreola.

Schreb. CXXVII. Lutra lutreola. Illig.

Braun, Schnauze und Kehle weiß. Etwas größer als ein Marder. Er findet sich in Norden und Osten von Europa vom Eismeer bis zum schwarzen Meer, lebt in Flüssen, nährt sich von Fischen, Fröschen, Krebsen; die Füße haben zwar eine kurze Schwimmhaut, aber der Zahnbau und der runde Schwanz nähern ihn eben so sehr den Wieseln als den Ottern, zu welchen er gewöhnlich gezählt wird. Der Geruch ist bisamartig, und der Pelz sehr fein und gesucht.

? 15. Wiesel von Sinu. Must. Sinuensis*).

Aschgrauschwärzlicht mit weißem Bauch, der Schwanz halb so lang als der Körper, die Ohren aufrecht stehend, spitzig, innerlich weiß.

? 16. Chilisches Wiesel. Must. Quiqui. Molina.

Bräunlicht, mit glattem Kopf, platter Nase, mit weit gespal-

*) Wie alle Arten von Molina sehr unbestimmt.

gespaltenem Maul, hat 28 Zähne, und scheint daher von den übrigen Arten abzuweichen, die Füße kurz, fünfzehig. Auf der Mitte der Nase ein weißer Fleck, Länge bis zum Schwanz 13 Zoll. Der Schwanz kurz. Lebt von Mäusen. In Erdlöchern in Chili.

17. Vielfraßwiesel. Must. Gulina. Neuwied.

Die Zähne wie bey Vielfräßen, allein das Thier ist ein Zehengänger. Der äußerste Vorderzahn oben und unten ist am größten, hat nach innen einen kleinen Ausschnitt und ist kegelförmig, die mittlern dagegen sind stumpf. Oben vier Backenzähne, zuerst ein kleiner Spitzzahn, dann ein größerer, der Reißzahn hat eine große Kegelspitze und vorn ein Höcker, der hinterste ist ein queerstehender etwas platter Mahlzahn. Im Unterkiefer fünf Backenzähne, der erste klein und stumpf, dann zwey einspitzige, der Reißzahn dreyhöckerig, der hinterste rund und stumpf.

Macht den Uebergang zu Gulo. In Brasilien.

? 18. Der Cuja. Must. Cuja. Molina *).

Dem Iltis ähnlich mit aufgeworfener Schnauze, dichtem weichem schwarzem Haar, Schwanz von der Länge des

*) Zwischen den Gattungen Gulo, Mustela, Viverra und Lutra ist noch viele Verwirrung, und man weiß nicht genau, welche zur einen oder andern gehören mögen, es sind nicht alle in Hinsicht des Gebisses gehörig untersucht. Unter den südasiatischen Arten sind die von Illiger angeführten moschata venusta, javanica, fasciata und striata, unter den afrikanischen flavigula, unter den Südamerikanischen aber die von Molina angeführten Quiqui, Cuja und sinuensis einer nähern Prüfung bedürftig, ehe sie gehörig eingereihet werden können, da überhaupt Molina wenig zu trauen ist. A. d. U.

Körpers, ſtark behaart. Lebt von Mäuſen in Chili. Scheint zu Iltis zu gehören.

19. Weißfüßige Wieſel. Must. leucopus. Kuhl.

Alle vier Füße und die Klauen weiß. Der Pelz rothbraun, an den Schenkeln und am Schwanze dunkler. Der Vorderhals rothgelblichtweiß, der Kopf rothgrauweißlicht. Die Ohren inwendig weiß, auswendig braun. In Canada.

Stinkthiere. Mephitis.

Haben oben zwey, unten drey falſche Backenzähne, aber der obere Mahlzahn iſt ſehr groß, und ſo lang als breit, und der untere Reißzahn hat zwey Höcker an ſeiner innern Seite, dieſes nähert ſie mehr den Dächſen, ſo wie ſich die Iltiße mehr den Vielfräßen nähern. Die Stinkthiere haben wie die Dächſe vorn ſehr ſtarke Klauen zum Graben; ja ſelbſt die Vertheilung der Farben hat etwas ähnliches. Die unter dem Schwanze abgeſonderte Materie ſtinkt ganz entſetzlich, ſo daß man davon faſt ohnmächtig wird, und der Geſtank ſich weit verbreitet.

Die Stinkthiere ſind faſt alle geſtreift weiß auf ſchwarzem Grunde, man hat ſie noch nicht ganz gehörig unterſchieden. Die Zahl der Streifen ſcheint bey derſelben Art zu variren. Die amerikaniſchen Arten haben alle einen langen, dick behaarten Schwanz In Java findet ſich eine Art ohne Schwanz. Sie haben an allen vier Füßen fünf Zehen. Oben vier Backenzähne, die zwey vordern halb kegelförmig, der dritte ein Reißzahn, an ſeiner innern Seite mit einem größern Höcker, der vierte der größte, mit vier Höckern. Unten fünf, die drey vordern einſpitzig, der vierte der größte; Reißzahn außen zweyſpitzig, inwendig höckerig, der fünfte kleiner Höckerzahn.

Digitized by Google

* 1. Der Skunk. Meph. putoria.

Schreb. CXXII. Viverra putorius. Conepatl.

Größe des Iltis, die Schnauze etwas spitziger, die Streifen weichen ab, meist aber laufen fünf weiße Streifen über den Körper, der mittlere auf den Rücken. Im Zorne stinken sie abscheulich, lassen sich aber zahm machen und stinken dann nicht, wenn man sie nicht reizt. In Nord- und Südamerika.

2. Der Chinche. Meph. Chinga.

Schreb. CXXI. Viverra Mephitis.

Mit zwey weißen Streifen, welche längs dem schwarzen Rücken hingehen. In Südamerika.

3. Ungeschwänztes Stinkthier. Meph. ecautata.

Ohne Schwanz. Aus Java. Nicht abgebildet.

Otter. Lutra.

Sie haben fünf Backenzähne, oben und unten. Die drey vordern einspitzig, der vierte untere ist der gröste und hat mehr Spitzen als Höcker, der fünfte hinterste ist klein, und der einzige Mahlzahn. Oben drey einspitzige, der vorderste zur Seite des Eckzahns sehr klein, der vierte fast so breit als lang, beynahe dreyeckig. außen zweyspitzig, nach innen platt, wenig höckerig, der hinterste mehr breit

*) Es ist unmöglich, sich hier aus den Beschreibungen herauszufinden, und gute Abbildungen mangeln. Es kommen unter dem Namen Mapurito, Yzquiepatl, Conepatl, mehrere offenbar verschiedene Thiere vor, welche alle in Amerika leben, und theils zu den Vielfräßen, theils zu den Wieseln, theils zu den Stinkthieren gehören. Zu Mephitis rechnet Illiger noch foeda, chilensis und bicolor. Chilensis scheint eine Mustela zu seyn. Alle drey finden sich in Südamerika. A. d. U.

als lang, mit vier spitzigen Höckern. Der Kopf ist etwas platt, die Schnauze kurz und breit, die Zunge halb stachlicht. Die Füße haben mit einer Schwimmhaut verwachsene Zehen, der Schwanz ist von oben nach unten mehr platt als rund. Es sind meist nächtliche Thiere, welche im Wasser und von Fischen und Schalthieren leben. Am After sind Drüsen vorhanden.

1. Europäischer Otter. Lutra vulgaris. Schreb. CXXVI. A.

Der Pelz braun, unten mehr grau, die Ohren rund und kurz, der Schwanz kurz. Die Hoden im Bauche. Schwimmt gut, lauft nicht sehr geschwind, taucht lang unter, fischet meist des Nachts, begattet sich im Hornung, wirft zwey bis vier Junge, welche sich zähmen lassen. An allen Flüssen von Europa ist er meist anzutreffen. Außer Fischen frißt er auch Frösche, Krebse und Wassermäuse. Der Pelz ist zu allen Jahrszeiten gut und kostbar. Das Fleisch wird in Klöstern als Fastenspeise gegessen.

2. Canadischer Otter. Lutra canadensis. Schreb. CXXVI. B.

Viel größer als der europäische, mit etwas längerem Schwanze. In Canada.

? 3. Katzenartiger Otter. Lutra felina. Molina.

Der Kopf katzenartig rund aber platter, mit krummen Klauen, behaarter Schwimmhaut, Pelz braun mit längern und kürzern Haaren. Im Meere an den Küsten von Chili, sind wild und herzhaft und brüllen laut.

Digitized by Google

4. Brasilischer Otter. Lutra brasiliensis.

Saricovierne.

Etwas größer als der europäische, braungelb, mit weißer oder gelblichtweißer Kehle. An den Küsten von Süd- und Nordamerika *).

? 5. Wolfsotter. Lutra lupina.

So groß als ein Hühnerhund, dunkelbraun. Am Orinoko.

9. Otter aus Paraguai. Lutra paraguaensis.

Kleiner als der vorige, Pelz dunkel, weich und glänzend. In Paraguai und am Plata Flusse.

7. Schmächtiger Otter, Lutra gracilis.

Die Ohren sehr klein, fast nicht zu sehen, der Körper schlank und gestreckt, dunkelbraun. Nordamerika.

8. Meerotter. Lutra marina.

Mustela lutris. Schreb. CXXVIII.

Doppelt so groß als unser Otter; der Körper lang gestreckt, der Schwanz etwa ein Drittheil so lang als der Körper, die Hinterfüße sehr kurz. Der Pelz schwarz, glänzend wie Sammet. Dieses Thier liefert das allerkostbarste Pelzwerk; zuweilen ist es am Kopf weiß. Er bewohnt den kalten Norden, und besonders die Meere, wel-

*) Es werden mehrere Thiere von Brasilien unter diesem Namen beschrieben, welche noch nicht gehörig unterschieden worden sind, die Jiya, der Otter aus Paraguai und vom Plata Strom, auch unter dem Namen Saricovienne sind wahrscheinlich mehrere Arten vermengt, auch L. felina, lupina und Phocula bedürfen sehr der Sichtung als Arten. A. d. U.

Digitized by Google

che dieſe Oſtküſte von Nordamerika beſpühlen, und die entgegengeſetzten Küſten von Aſien, wo er ehemals in großer Menge vorhanden war, aber die Habſucht der Menſchen hat ihn immer ſeltener gemacht und an unwirthbare Küſten vertrieben. Es ſind harmloſe Thiere, ſie ſchwimmen oft auf dem Rücken, ſchlafen ſchwimmend, freſſen Fiſche, Krebſe und Schaalthiere. Sie leben paarweis und ſollen nur ein Junges werfen, welches mit offnen Augen und allen Zähnen geboren werde? Dieſes Thier hat durch die Koſtbarkeit ſeines Felles, wovon man in China das Stück zu 80 Rubel bezahlt, vorzüglich die Seereiſen der Rußen in Norden veranlaßt, und iſt vorzüglch Gegenſtand des nordiſchen Pelzhandels mit China.

9. Capiſcher Otter. Lutra capensis.

Größer als der europäiſche. Afrika.

† 10. Seehundartiger Fiſchotter. Lut. Phocula.

Mit dem Meerotter nahe verwandt, die äußere Zehe der Hinterfüße iſt von den übrigen getrennt.

In Nordamerika.

Die zweyte Unterabtheilung der Zehengänger hat zwey platte Höckerzähne hinter dem großen Reißzahn in der obern Kinnlade, der Reißzahn ſelbſt iſt ziemlich breit. Sie ſind fleiſchfreſſend, aber im Allgemeinen in Hinſicht ihrer Größe und Stärke nicht ſehr muthvoll; einige leben oft von Aas. Sie haben alle einen kleinen Blinddarm.

Hunde. Canis.

Oben drey, unten vier falſche Backenzähne, und hinter dem großen Reißzahn allemal zwey Höckerzähne oben und unten, alſo oben 6, unten 7 Backenzähne. Der obere

große Reißzahn hat nur einen kleinen Höcker nach innen, beym untern hingegen ist die dritte Spitze ganz höckerig. Die Zunge ist glatt, die Füße vorn haben fünf Zehen, die hintern vier.

1. Der Haushund. Canis domesticus.

Der nach oben umgebogene Schwanz ist sein Hauptunterscheidungszeichen, außerdem läßt sich kein Hauptcharakter aufstellen, da die Hunderaßen, sowohl in Hinsicht der Form, als der Farbe und übrigen Eigenschaften gar sehr von einander variren. Es ist das treuste, das ausgezeichnetste und fast auch das nützlichste Hausthier, welches der Mensch sich eigen gemacht hat. Alle Arten sind vollkommene Sklaven des Menschen; sie dienen treu ihrem Meister, kennen seine Eigenheiten, und vertheidigen sein Eigenthum ihr ganzes Leben durch, und alles dieses thut der Hund weder aus Noth, noch aus Furcht, sondern aus wahrer Zuneigung. Die Schnelligkeit, die Stärke und der ausgezeichnete Geruch, haben dem Menschen im Hunde einen treuen Mitstreiter gegen andere Thiere gegeben, und dadurch selbst zur Verbreituug des Menschen beygetragen, welchem der Hund allenthalben gefolgt ist. Die sonderbare Verschiedenheit der Hunde hat über ihre Stammracen Zweifel erregt, die einen Naturforscher haben den Wolf, die andern den Schakal zum Stammvater des Hundes gemacht, aber verwilderte Hunde gleichen keinem von diesen Thieren. Die wilden Hunde, und diejenigen der wenig civilisirten Völker, haben geradestehende Ohren, d ies würd es wahrscheinlich machen, daß der Schäferhund oder Wolfshund, die ursprüngliche Race bezeichnete; die Schedel des

Fleiſcherhundes und des däniſchen Hundes gleichen aber dem wilden Hund noch mehr; auf dieſe folgt der Jagdhund, der Wachtelhund und der Dachshund, welche nur durch die Geſtalt und die Proportion der Glieder ſich unterſcheiden. Der Windhund iſt länger, hat kleinere Stirnhöhlen und einen ſchwächern Geruch. Der Schäferhund und der Wolfshund haben die geraden Ohren des wilden Hundes, aber ein größeres Hirn, dieſes wird noch entwickelter beym Budel und beym ſpaniſchen Hund, welche an intellectuellen Fähigkeiten die andern übertreffen. Die Dogge zeichnet ſich durch ihre kurzen und ſtarken Kinnladen aus. Die kleinen Hunde, Mopſe, Bologneſerhund und die kleinen langhaarigen Hunde ſind am meiſten ausgeartet, und ein Beweis, wie viel die Hausgenoſſenſchaft über die Natur der Thiere vermag. Der Hund wird blind geboren; er öffnet die Augen den zehnten oder zwölften Tag; der Zahnwechſel erfolgt im vierten Monat, im zweyten Jahr iſt er ausgewachſen. Das Weibchen trägt 63 Tage, und wirft ſechs bis zwölf Junge. Die ſonderbare Art ſeiner Begattung und ſeine übrigen Eigenſchaften ſind allgemein bekannt. Die Wuth iſt die gefährlichſte Krankheit des Hundes, da ſie ſich durch das Beißen auf andere Thiere fortpflanzt und immer tödtliche Folgen hat.

2. Der Hund von Neuholland. Canis Dingo. White Reiſe nach Neu-Süd-Wallis.

Der Schwanz ein Drittheil des Leibes lang, gerade, ſtark behaart, der Kopf fuchsartig, die Ohren aufrecht, ſpitzig, faſt von der Größe des Wolfes, ſtark. Der Pelz iſt dicht behaart, doch nicht langhaarig. Bellt und knurrt nicht,

Digitized by Google

ſondern ſträubt ſich und beißt. Sind die einzigen Hausthiere der Neuholländer, wird zur Känguruh-Jagd gebraucht, fällt aber Schafe an.

Man kann die Füchſe von den Hunden und Wölfen unterſcheiden, durch ihren längern und dickern Schwanz, durch ſpitzigere Schnauze, durch die lange Pupille, welche ein nächtliches Leben anzeigt, und durch weniger ausgeſchweiften obern Vorderzähne. Die meiſten verbreiten einen üblen Geruch, graben ſich in die Erde und greifen nur ſchwache Thiere an.

3. Der Wolf. Can. Lupus. Schreb. LXXXI. und LXXXVIII.

Mit geradem Schwanz und graugelblichtem Pelz, über die Beine lauft bey alten ein ſchwarzer Streif. Der Wolf iſt das furchtbarſte Raubthier im nördlichen Europa. Man findet ihn von Egypten bis nach Lappland, er ſcheint auch nach Amerika übergegangen zu ſeyn. Im höchſten Norden wird ſein Pelz weiß im Winter. Er greift alle unſere Hausthiere an, und doch iſt er im Verhältniß zu ſeiner Stärke feig. Oft frißt er auch Aas. In mancher Hinſicht gleicht er in ſeinen intellectuellen Eigenſchaften dem Hund, doch nur in den ſchlimmen nicht in den guten Eigenſchaften.

4. Der ſchwarze Wolf. Can. Lycaon. Schreb. LXXXIX.

Im nördlichen Europa, ſelbſt in Frankreich, aus welchem Lande Cuvier vier Stücke erhalten hat. Sein Pelz iſt tief ſchwarz und ein koſtbares Pelzwerk des Nordens. Er ſoll grauſamer ſeyn als der gemeine Wolf.

Digitized by Google

5 Der rothbraune Wolf. Can. Mexicanus. Agoura-Guazu. Canis campestris. Neuwied.

Schön zimmetbraun, längs dem Rückgrath eine kurze Mähne; bewohnt die sumpfigen Gegenden des ganzen warmen und gemäßigten Amerika. In Brasilien in Heiden.

? 6. Surinamischer Wolf. Can. Thous *).

Die Größe einer wilden Katze, oben grau, unten weiß, Schwanz abwärts gebogen und glatt, Ohren steif.

? 7. Nackter Wolf. Can. nudus.

Groß und ganz haarlos (Xaloitzcuintli nach Humboldt). In Mexiko.

? 8. Höckerichter Wolf. Can. gibbosus.

Der Schwanz kurz, der Kopf klein, auf dem Rücken ein großer Buckel (Itzcuintli-potzoli nach Humboldt). Südamerika.

9. Der Goldwolf. Can. aureus. Chacal. Schreb. XCIV. Geoff. et Cuvier mamm. Livr. 2.

Hals, Seiten, Hinterrücken, Bauch und Schenkel rothgelb, auf dem Rücken graubraun, der Kopf bräunlicht, der Schwanz braun, das innere der Ohren weiß. Lebt in starken Truppen beysammen und bewohnt den größten Theil des wärmern Asiens von Indien bis zum Caspischen Meer und Afrika bis nach Guinea. Er ist sehr gefräßig, jagt nach Art der Hunde, dem er in seiner Gestalt und in seinen Manieren gleicht, er ist leicht zähmbar und heulet. Er stinkt abscheulich.

---

*) Die Arten C. Thous, nudus, gibbosus und culpaeus sind höchst unbestimmt und ihre Existenz als Art zweifelhaft. A. d. U.

Digitized by Google

10. Der Capiſche Schakal. Can. mesomelas. Schreb. XCV.

An den Seiten rothgelb, auf der Mitte des Rückens ſchwarz, mit weiß gemiſcht, das Schwarze endigt mit einer Spitze an der Schwanzwurzel.

Am Kap.

? 11. Der Culpeu. Can. Culpaeus *).

Größer als ein Fuchs, kurzhaarig, tiefbraun, bellt ſchwach. Der Schwanz lang aber kurzhaarig.

In Chili.

12. Der Wolfsfuchs. Can. antarcticus.

Größer als der gemeine Fuchs, braungrau, der Schwanz ſchwärzlicht, das Haar wollig, die Spitze des Schwanzes weiß und buſchig.

Auf den Falklandsinſeln.

13. Der gemeine Fuchs. Can. vulpes. Schreb. XC.

Rothgelb oder fuchsroth, die Schwanzſpitze weiß, der Schwanz dicht und buſchig. Der Fuchs iſt von Schweden bis nach Egypten zu finden, die nördlichen ſind lebhafter gefärbt. Auch der amerikaniſche Fuchs ſcheint nicht verſchieden zu ſeyn. Ebenſo ſcheinen der Brandfuchs C. alopex. Schreb. XCI. und der Kreutzfuchs. C. cruciger Schreb. XCI. A. nur climatiſche Verſchiedenheiten des Fuchſes zu ſeyn, letzterer iſt dunkler und hat über dem Rücken einen ſchwarzen Streif, der auf der Schulter mit einem andern etwas hellern durchkreutzt iſt.

*) Wo nicht Schreber oder ein anderes Citat angeführt wird, iſt noch keine gute Abbildung eines Thieres bekannt. A. d. U.

Digitized by Google

14. Der Corsac. Can. Corsac.

Schreb. XCI. B.

Graurothlichtgelb, an der Schwanzwurzel einige schwarze Wellen, Schwanzspitze schwarz, Gegend um den Mund weiß. Gemein in den asiatischen Steppen, von der Wolga bis nach Indien, gleicht in seinen Sitten dem Fuchs, soll gar nicht trinken?

15. Der Caragan. Can. Caragan.

Kleiner als der Fuchs. Oben grau, unten weiß, Ohren und ein Fleck auf der Brust schwarz, Stirn und Rükkenstreif rothgelb.

In den Steppen der großen Tartarey.

16. Der dreyfärbige Fuchs. Can. cinereo argenteus.

Schreb. XCII.

Oben grau, unten weiß, an den Seiten ein zimmetbrauner Streif. In Nord- und Südamerika.

17. Der brasilische Fuchs. Can. brasiliensis.

Neuwied.

L'Agourachay. Azara.

Am Vorderfuße eine fünfte sehr kleine Zehe am innern Theil des Fußes. Die ganze Länge des Körpers beträgt 40 Zoll, des Schwanzes etwa 14 Zoll. Die Ohren sind breit, kurz und zugespitzt. Der äußere Theil der Unterschenkel ist röthlicht zimmetfarb, die Schnauze bis zu den Augen schwärzlicht, der übrige Kopf zimmetfarb mit weißen Punkten, der vordere Theil der Unterkinnlade ist schwarz, das übrige weiß. Der Pelz ist grau, da jedes Haar zwey schwarze und zwey weiße Ringe hat, die Spitze

aber ſchwarz iſt, das weiche Wollhaar aber iſt weiß. Die Pupille lang.

In Braſilien und Paraguay. Nächtlich, zähmbar, lebt in Höhlen.

18. Der Virginiſche Fuchs. Can. virginianus. Schreb. XCII. B.

Weißgrau, um die Ohren etwas röthlicht, ſoll in hohlen Bäumen leben. Wird leicht zahm. In Carolina und weiter nach Süden bis Surinam.

19. Der Silberfuchs. Can. argentatus. Geoff. et Cuvier mamm. Livr. 5.

Schwarz ins ſilberfarbe ſpielend, langhaarig, ſehr ſchön, an der Stirn, Ohrenrändern, Schwanzſpitze weiß. Im kalten Nordamerika, liefert ein treffliches Pelzwerk. Iſt nicht mit dem ſchwarzen Wolf zu verwechſeln *).

20. Blaufuchs. Can. Lagopus. Iſatis. Schreb. XCIII.

Im Sommer ſchwärzlicht, im Winter meiſt weiß. Die Fußballen ſind meiſt behaart. In den nördlichſten Ländern, Grönland, Spitzbergen, Nova Zembla, Lappland, den Beerings- und Kupferinſeln. Lebt geſellig, iſt äußerſt dreiſt und liſtig. Lebt von Vögeln, Lemmingen, Fiſchen, auch von Beeren. Nicht alle ſcheinen im Winter weiß zu werden.

*) Ob der ſchwarze Fuchs des Nordens von Europa, Aſia und Nordamerika auch von dieſem verſchieden ſey, iſt ungewiß. Canis ſuliginosus und grönlandicus gehören wohl zum Iſatis Canis lagopus. Canis pensylvanicus iſt ungewiße Art. Ebenſo ceylonicus und bengalensis.

? 21. Bengalischer Fuchs. Can. Bengalensis.

Kaum halb so groß als der gemeine Fuchs, lichtbraun, Gesicht grau, schwarzer Mittelstreif über den Kopf, um die Augen weiß, Schwanzspitze schwarz. Soll vorzüglich Beeren und Wurzeln fressen, und gehört vielleicht eher zu Meles oder Gulo, so wie auch der

? 22. Ceylonische Fuchs. Can. ceylonicus.

Mit steifen Ohren, weichem graugelbem Pelz. Vielleicht eher zu Viverra gehörig.

23. Barbarischer Fuchs. Can. barbarus.

Wie der gemeine Fuchs, die Beine kürzer, die Nase dünner, Pelz blaßbraun, Füße braun, um die Augen schwarz. Gemein in der Barbarey.

? Großohr. Megalotis.

Der Zahnbau nicht genau bekannt, hundeähnlich, die Schnauze spitzig, die Nase vorstehend. Die Zunge glatt. Die Ohren länger als der Kopf und sehr breit. Der Schwanz mittelmäßig. Augen groß. Die Eckzähne sehr lang und spitzig.

1. Der Zerda. Megal. Zerda.

Diese Gattung ist überhaupt nicht gehörig bekannt und darf nur mit Fragezeichen angeführt werden. Der Zerda soll etwa von der Größe eines Kaninchens seyn, lebt an den Grenzen der großen Wüste von Heuschrecken und andern Insekten, sitzt wie ein Hund, soll auch bellen. Grabt in den sandigen Boden, ist sehr schnell. Läßt sich zähmen. In Afrika um den Atlas.

Digitized by Google

Zibetthier. Viverra.

Oben drey falsche Backenzähne, vier unten, von denen die vordern zuweilen ausfallen; oben sind zwey starke Höckerzähne, unten einer, und an der innern Seite am untern großen Reißzahn befinden sich zwey höckerichte Vorsprünge, und der ganze Zahn ist mehr oder weniger höckerig, überhaupt sind oben und unten sechs Backenzähne, oben ist der vierte, unten der fünfte am größten. Die Schnauze ist spitz, die Nasenlöcher vorstehend und stumpf, die Zunge rauh mit rückwärts stehenden Wärzchen. Die Pupille in die Queere verlängert. Die Ohren kurz und rund. Der Schwanz lang. Die Klauen ziehen im Gehen sich halb zurück, nahe am After eine mehr oder minder tiefe Tasche, oder besondere Drüsen sondern eine öhlichte stark riechende Feuchtigkeit ab. Sie theilen sich wieder in vier Gattungen.

Eigentliche Zibetthiere. Viverra.

Mit tiefer Tasche, zwischen After und Zeugungstheilen, sie bildet inwendig eine Scheidewand, und ist durch eine nach Bisam riechende Salbe angefüllt.

1. Die Civette. Viverra civetta. Schreb. CXI.

Grau mit Queerreihen großer schwärzlicher oder brauner Flecke, Backen, Kehle, Nase, Brust, Füße schwarz, Gesicht und Halsseiten gelbgrau, über den Rücken und Schwanz eine Mähne von schwarzen steifen Haaren, welche sich in die Höhe sträuben können. Lebt in den heißesten Theilen von Afrika.

Digitized by Google

2. Das Zibetthier. Viv. Zibetha. Schreber CXII.

Keine Mähne, Pelz grau, auf dem Rücken drey schwarze Längsstreifen, längs dem Halse schwarze Streifen, über den ganzen Körper schwarze Flecken, Schwanz lang, grau und schwarz geringelt. Dieses Thier liefert den Zibeth, eine äußerst stark riechende schmierige Materie, welche ehemals wie Bisam häufig gebraucht wurde. Männliche und weibliche Thiere haben den Beutel. In Java, Bengalen, Malakka, Siam.

3. Die Genette. Viverra genetta. Schreb. CXIII.

Der Beutel besteht hier nur in einer leichten Vertiefung zwischen den Drüsen, man bemerkt sehr wenig Materie, aber der Geruch ist sehr durchdringend.

Die gemeine Genette ist rothgrau, mit vielen rundlichten schwarzen Flecken, am Bauch heller aschgrau, der Schwanz lang, schwarz mit gelblicht grauen Flecken. Die Größe eines Marders. Vom südlichen Frankreich bis zum Vorgebirg der guten Hoffnung.

? 4. Die Foßane. Viverra fossa. Schreb. CXIV.

Die Flecken sind mehr braun, die Grundfarbe mehr aschgrau, der Schwanz mit undeutlichen Ringen.

Madagascar. (Ungewisse Art).

5. Zibethkatze von Malakka. Viv. malescensis. Schreb. CXII. B.

So groß wie eine Katze. Auf röthlichtgrauem Grunde sehr schön gestreift und gefleckt, über jedem Auge vier

schwarze

schwarze Flecken, vom Kopfe zum Halse laufen drey schwarze Streifen, einer über den Bauch und drey über den Hinterrücken, zwischen diesen 7 Reihen schwarze runde Flecke. Schwanz lang, grau und schwarz geringelt. Am Vorgebirge der guten Hoffnung und in Malakka. Der Genette nahe verwandt.

6. Gestreiftes Zibetthier. Viverra fasciata. Schreb. CXIV. B.

Rothgrau, über den Rücken lauft ein schwarzer Streif zu den Seiten noch zwey andere parallel, der untere kürzer ästig, hinten noch ein dritter ganz kurzer wie ein liegendes >. Der Schwanz lang.

Im südlichen Asien.

? 7. Zwitter Zibetthier. Viv. hermaphradita *).

Wie ein Marder, zwischen Zibeth und Genette stehend. Grauschwarz, Bauch heller, drey schwarze Rückenstreifen, auf den Backen zwey weiße Flecken. (Ungewisse Art).

In der Barbarey.

Manguste. Ichneumon. Herpestes. Illig.

Der Bisambeutel ist einfach, aber groß, der After öffnet sich im Grunde des Beutels. Die Schnauze lang, die Nase vorstehend rundlicht. Die Zunge rauh. Die Augen mit einer Nickhaut. Die Pupille ablang. Die Ohren

*) Viverra moschata scheint eher zum Geschlecht Mustela zu gehören, lebt in Bengalen. Ob Viverra tigrina. Schreb. CXV. des Vosmaer eine eigene Art sey oder zur Genette gehöre, wie Cuvier meint, ist unentschieden. A. d. U.

kurz und abgerundet. Der Körper langgestreckt und dünne. Schwanz lange.

1. Egyptische Manguste. Ichneumon.
H. Ichneumon.
Viverra Ichneumon. CXV. B.

Grau, der Schwanz lang, am Ende mit einem schwarzen Haarbüschel, größer als eine Katze, langgestreckt und kurzbeinig wie die Marder. Er sucht besonders die Eier der Krokodile auf, nährt sich aber auch von Mäusen, Vögeln und andern kleinen Thieren, auch Eidechsen, Schlangen; wird oft gezähmt in den Häusern gehalten, wo er die Stelle der Katzen vertritt. Die Europäer in Cairo nennen ihn Pharaons Ratte, die Einwohner Nems. Daß er die alten Krokodile angreife und ihnen wenn sie schlafen in den Mund krieche, ist durchaus falsch.

Er lebt vorzüglich in Egypten.

2. Der Mungos. Herp. Mungos.
Geoff. et Cuv. mammif. Liv. 5. Schreb. CXVI.

Röthlichtgrau, dunkelbraun in die Quer gereiht und mit ganz kleinen Fleckchen bestreut, Schwanzspitze ohne Quaste, diese und Füße schwarz.

Vaterland Ostindien. Ein großer Feind der Schlangen, selbst die gefährlichsten Giftschlangen greift er an, und soll gegen den Biß die Schlangenwurzel Ophiorhiza Mongos fressen.

3. Der Capische Ichneumon. Herp. cafer.
Schreb. CXVI. B.

Röthlichtgrau, oder bräunlicht einfärbig. Schwanz-

Digitized by Google

spitze nicht buschig und wie die Füße schwarz. Von der Größe des Iltis.

Am Vorgebirge der guten Hoffnung *).

Schnarrthier. Surikate. Ryzaena. Illig.

Sie gleichen den Ichneumons, sowohl in der Gestalt als auch in der Farbe und selbst in Hinsicht der Querstreifen, aber sie unterscheiden sich von allen bis jetzt angeführten Raubthieren dadurch, daß sie nur vier Zehen an allen Füßen haben. Der After öffnet sich durch den Schmiersack. Die Zunge platt.

1. Die Surikate. Ryz. Suricata.

Schreb. CXVII. und CXVII. B. Viverra Suricata et Zenik.

Etwas kleiner als die indische Manguste. Rothgrau, in die Quere gestreift. Nahrung kleine Thiere, Eier Fische? Im südlichen Afrika. Der Zenik scheint nicht von der Surikate verschieden.

Die letzte Unterabtheilung der Zehengänger hat hinter den großen untern Backenzähnen keine kleinen Zähne. Sie enthält die grausamsten und fürchterlichsten Raubthiere, die sich ausschließend vom Raub nähren.

---

*) Zu dieser Gattung gehören wahrscheinlich mehrere Thiere, welche noch nicht gehörig bekannt sind. Dahin gehört die Galera. (Schreb. CXXXV.) der Nems, ferner Ichn. ruber, javanicus, madagascariensis, glaucus, persicus, ceylonicus, welche Oken sämmtlich als Arten des Ichneumon anführt, deren Gattungsrechte aber noch nicht ausgemacht sind.

Digitized by Google

Hyäne. Hyaena.

Diese Gattung, welche von Linne unter die Hunde gerechnet worden, hat oben 5 Backenzähne, unten nur 4, oben sind drey, unten alle vier falsche Backenzähne, sie sind konisch, stumpf und vorzüglich dick: der große obere Reißzahn hat vorn und inwendig einen kleinen Höcker. Der untere dagegen hat nur zwey starke schneidende Spitzen, nur der fünfte hinterste obere Backenzahn ist ein höckeriger Mahlzahn. Dieser starke Zahnbau erlaubt den Hyänen die härtesten Knochen mit Leichtigkeit zu zermalmen. Die Zunge ist stachlicht; die Füße vierzehig, und unter dem After findet sich ein tiefer mit Drüsen versehener Sack. Es sind nächtliche sehr gefräßige Thiere, sie leben vorzüglich von Aas, und graben selbst Leichen aus. Von ihrer Wildheit und Grausamkeit hat man sehr viel gefabelt und übertrieben. Man kennt nur drey Arten.

1. Gestreifte Hyäne. Hyaena striata. Schreb. XCVI.

Röthlichtgrau, braun oder schwärzlicht unregelmäßig in die Quere gestreift, über den ganzen Rücken, vom Nacken an geht eine Mähne, welche sie im Zorne sträubt. Der Schwanz langhaarig und buschig. Sie bewohnt Ostindien und Afrika bis nach Abyßinien und an den Senegal. Ist auch Menschen gefährlich.

2. Gefleckte Hyäne. Hyaena crocuta. Schreb. XCVI. B.

Röthlichtgrau, langhaarig, schwarz gefleckt, die Mähne kurz. Sie soll keinen Afterbeutel haben. In Höhlen und

Digitized by Google

Klüften am Kap. Greift den Menschen nicht an, raubt aber Schafe und gräbt auch Leichen aus *).

3. Schöngezeichnete Hyäne. Hyaena picta. Kuhl.

Le chien sauvage. Vaillant. Hyaena venatrix. Burschel.

An allen Füßen 4 Zehen. Der Körper schwarz, weiß und rostgelb gefleckt. Die äußern Ohren, ein Streif über den Kopf und der obere Theil des Vorderhalses rothbraun, die übrigen Theile des Kopfes und Halses rostgelbweiß. Brust weiß, die Seiten schwarzbraun gefleckt. Der Rücken gelbröthlichtweiß und dunkelbraun gemischt, mit kurzer Mähne, der Unterleib braunroth. Der Schwanz mittelmäßig, langhaarig, an der Wurzel rostgelb, an der Spitze weiß. Die Füße mit großen weißen, braunen und rostgelben Flecken, die meisten mit schwärzlicher Einfassung. Größe des Wolfes aber schlanker. Auf dem Vorgebirge der guten Hofnung.

Katze. Felis.

Unter allen Raubthieren haben diese Thiere die stärksten Waffen. Die Schnauze ist kurz abgerundet, die Kinnladen kurz und die Nägel zurückziehbar. Durch eigene Flechsen werden diese Klauen in die Höhe gezogen und ziehen sich in Scheiden zwischen die Zehen zurück, so daß sie

*) Die Hyaena maculata und immaculata sind wohl keine eigene Arten, ihr Daseyn beruht nur auf unbestimmten Beschreibungen. A. d. U.

Digitized by Google

nie ihre Spitze abnutzen, und um so gefährlicher sind, wenn das Thier sie als Waffe gebraucht. In dieser Gattung finden sich die fürchterlichsten Raubthiere, welche keine Furcht vor den Menschen haben. Ihre Zähne sind sämmtlich Reißzähne, oben sind vier, unten drey Backenzähne, oben und unten zwey einspitzige, der große Reißzahn oben hat drey Spitzen und nach innen einen stumpfen Höcker, der untere zwey Spitzen, nur in der Oberkinnlade steht ein kleiner Höckerzahn hinten. Die Arten dieser Gattung sind zahlreich und sehr verschieden in Größe und Farbe, obgleich in der äußern Form und Sitten ähnlich, der Geruch ist nicht sehr scharf, dagegen Gehör und Gesicht außerordentlich gut. Sie jagen nicht wie die Hunde nach ihrer Beute, sondern bemächtigen sich ihrer durch Sprünge aus dem Hinterhalt, oder beschleichen die Thiere und fallen unversehens über sie. Sie leben nur von Beute und fressen in der Freyheit keine Vegetabilien. Man kann sie nicht leicht in Unterabtheilungen bringen.

1. Löwe. Felis Leo.

Schreber XCVII. A. B. Geoff. et Cuv. mamm. Livr. 9.

Die schönste Abbildung ist in dem Werke Menagerie du Musée.

Einfärbig rothfalb, das Männchen vom vierten Jahr an mit langer Mähne über Hals und Schultern und einem Haarbüschel am Schwanze. Außer dem Tieger ist der Löwe das stärkste und muthigste Raubthier, dessen Art ehemals in allen wärmern Theilen der alten Welt, selbst bis nach Griechenland verbreitet war, jetzt nur noch in Afrika und einigen der heißesten Theilen Ostindiens zu finden ist. Eben so stark, aber weniger blutdürstig als der Tieger und

Digitized by Google

viel furchtſamer als dieſer, greift ſelten Menſchen ungereitzt an, eher des Nachts als am Tage, wo überhaupt der Löwe ſelten zum Vorſchein kommt. Immer durch Sprünge bemächtigt er ſich ſeiner Beute. Er läßt ſich ſehr zahm machen und wirft ſelbſt in Europa Junge, wie in Paris geſchehen *).

2. Der geſtreifte Tieger. Fel. Tigris. Schreb. XCVIII. Menager. du Mus.

So groß als der Löwe, aber mit geſtreckterem Körper, der Kopf runder. Am obern Theil des Körpers auf falbem oder blaßgelbem Grunde mit unregelmäßigen ſchwarzen Querſtreifen, am Bauch rein weiß. Der Tieger iſt das fürchterlichſte und grauſamſte Raubthier der alten Welt, die ſchrecklichſte Plage Oſtindiens; ſeine Kraft, Verwegenheit und Schnelligkeit iſt ſo groß, daß es ſchon begegnet iſt, daß er bey marſchierenden Truppen einen Reiter vom Pferde wegholte und in den Wald ſchleppte, ohne daß man ihn erreichen konnte. Er fürchtet ſich niemals vor dem Menſchen, lechzt unaufhörlich nach Blut, greift ſelbſt den Elephanten an, und lebt mit keinem Geſchöpfe im Frieden. Ganz Oſtindien, Perſien, ein Theil von China iſt das Vaterland dieſer furchtbaren Katze.

3. Der Jaguar. Felis Onca. Yagouaréte d'Azara. Schreb. XCIX. Felis Panthera.

Faſt ſo groß wie der orientaliſche Tieger und eben ſo gefährlich; oben lebhaft falb, längs den Seiten laufen vier Reihen ſchwarzer Flecken oder Augenringe, in deren Mitte ein ſchwarzer Fleck ſteht; der Unterleib iſt weiß mit ſchwarzen Querſtreifen. Er brüllt wie ein Tieger;

*) Es ſcheint mehrere Farbenvarietäten der Löwen zu geben.

greift unerschrocken den Menschen an, macht Jagd auf Schafe, Rindvieh, Pferde u. s. w., springt ihnen auf den Rücken und beißt ihnen das Genik ab und schleppt mit der größten Leichtigkeit ein Pferd weg *).

4. Die schwarze Unze. Felis brasiliensis.

Neuwied.

Felis discolor auctor.

Schwarz, meist ganz kohlschwarz, nur gegen das Licht bemerkt man eben so gefärbte noch schwärzere Flecken, oft nur braun mit schwarzen Flecken.

In Paraguay und Brasilien, auch am Plata Strome. Es ist schwer zu glauben, daß dies nur eine Abart sey, doch sollen nach Aussage der Brasilianer von allen drey Arten Bastarde fallen, was indeß Neuwied bezweifelt.

**) 5. Der Panther. Fel. Panthera.

Menager. du Musée.

Oben falb, unten weiß; mit sechs oder sieben Reihen von schwarzen Flecken, in Form von Rosen. Dieses schöne Thier findet sich in ganz Afrika, ist grausam und blutdür-

*) Nach Neuwieds Beobachtung giebt es zuverläßig zwey Varietäten des Jaguars, welche wahrscheinlich zwey bestimmte Arten bilden. Die eine hat weniger und sehr große Ringflecken, sie heißt in einigen Gegenden Canguen und ist überhaupt größer. Die andere hat mehrere kleinere und sehr genäherte Ringflecken und ist kleiner im Baue, sie findet sich im Sertam von Bahia und heißt Cangussù.

**) Panther, Leopard und Unze sind drey in Hinsicht der wirklichen Artsverschiedenheit noch nicht genug bestimmte Katzenarten, bey welchen überhaupt noch eine große Verwirrung herrscht, und eine genaue Sichtung nöthig wäre. A. d. U.

Digitized by Google

ſtig, fällt jedoch den Menſchen nicht an. Der Capiſche Parder, welcher ſtandhaft, kleiner und lebhafter gefleckt iſt, (Fel. Pardus) ſcheint wirklich als Art vom Panther verſchieden. Der erſtere ſoll auch in Aſien vorkommen.

6. Der Leopard. Fel. Leopardus.
Schreb. CI.

Gleicht dem Panther, hat aber zehen Reihen kleinere Flecken. Ob vom Panther verſchieden? In Afrika.

7. Die Unze. Fel. Uncia.
Schreb. C.

Fell bräunlichtgelb, mit einer Menge unregelmäßig ſtehender ungleicher Flecken beſtreut, der Schwanz berührt den Boden. Bauch weiß.

In Afrika und Aſien.

8. Der Gepard. Fel. jubata.
Schreb. CV.

Hellfalb, mit kleinen ſchwarzen, einfachen, gleichförmig zerſtreuten Flecken; die Nackenhaare etwas länger. Kleiner als der Panther, aber höher auf den Füßen. Wird gezähmt und in Oſtindien ſeinem Vaterland zur Jagd abgerichtet, wozu man in Egypten und Syrien den Panther, in Perſien den Carakal braucht. Dieſe Thiere jagen aber nicht wie die Hunde, ſondern erreichen die Antelopen und andere ſolche Thiere durch große Sprünge; ſie werden vom Jäger hinten aufs Pferd genommen. Er ſoll auch am Kap vorkommen, und nach Illigers Meinung ſogar nur in Afrika, und der Jagdtieger in Oſtindien ſoll Felis guttata ſeyn.

Digitized by Google

9. Panther mit stahlfarbnen Flecken.
Fel. chalybeata.
Schreb. CI. C.

Auf schmutzig fahlem Grunde stehen allenthalben schwarze runde gleichförmig zerstreute ins stahlfarbe schimmernde Flecken, der Bauch weiß.

Vaterland wahrscheinlich Amerika?

10. Getropfter Panther. Fel. guttata.
Hermann.
Schreb. CV. B.

Auf rothbraunem Grunde stehen allenthalben unzählige kleine runde schwarze Tropfen, auch auf dem Schwanzrücken, das Ende des Schwanzes ist schwarz geringelt, die Spitze weiß, Hals und Bauch weiß, ungefleckt.

Vaterland wahrscheinlich Asien *).

?. 11. Grauer Panther. Fel. cinerea.

Grau, unten blasser, unregelmäßig schwarz gefleckt. Aus Guinea.

12. Der Cuguar. Felis concolor. (discolor Cuviet).

Schreb. CIV. Geoff. et Cuvier mammif. Livr. 6. Gouazouara. Azara.

Ganz einfarbig gelbroth, unten heller. Diese große

*) Illiger führt einen kleinern Tieger, der mehr nach Norden in Asien wohnt unter dem Namen Felis virgata an, und glaubt der schwarze Leopard F. infuscata Pennant, sey nicht in Bengalen zu Hause, sondern der amerikanische Felis discolor. Auch Felis varia Hermann ist noch unbestimmt, so wie cinerea, ocreata, malabarica, capensis et novae Hispaniae nähere Prüfung bedürfen. A. d. U.

Digitized by Google

Katze wird in Paraguay und andern Provinzen Südamerikas gefunden. Sie soll auch in Mexiko, Brasilien, Chili und sogar in Pensylvanien sich finden. Ist furchtsam, greift den Menschen und größeres Vieh gar nicht an, höchstens Füllen und Schafe, ist aber blutdürstig. Sie ist sehr behende, klettert auf Bäume. Jung gefangen läßt sie sich ganz zahm machen, muß aber, da sie alles Geflügel tödtet, immer angebunden gehalten werden.

Der Puma, welcher sich in Peru und Mexiko findet, soll viel dreister seyn und Pferde angreifen.

13. Der Ozelot. Felis pardalis.

Felis pardalis et tigrina. Schreb. CIII. CVI. und Felis onca CII.

Kleiner als der vorhergehende, niedriger auf den Beinen, auf rothgraulichtem Grunde, mit langen falben schwarz eingefaßten Flecken besonders lang an den Seiten; an den Beinen kleine runde Flecken; am Hals und Bauche weiß, mit schwarzen Streifen.

In ganz Südamerika. Mbaracaya. Chibigouazou. Azara.

14. Wiedische Katze. Felis Wiedii.

Die ganze Länge dieser vom Prinzen von Neuwied entdeckten und nach ihm benannten Katze ist 34 Zoll 10 Linien, davon nimmt der Schwanz 13 Zoll 9 Linien weg. Die Farbe und Zeichnung fast wie beym Ozelot oder Mbaracaya des Azara, Kopf und Hals falb mit Längsstreifen bezeichnet, der Schwanz viel länger als am Ozelot, auch die Ohren länger, die Fußsohlen graubraun, beym Ozelot ganz schwarz. Der Kopf im Verhältniß kleiner, die Grund-

Digitized by Google

farbe des Pelzes ist fahl weißlicht oder graurothlicht mit vielen unregelmäßigen dunkelbraunen zum Theil länglichten Flecken, auf dem Rücken mehr gestrichelt, auf dem Oberhals befinden sich 5 braune Längslinien und über die Stirne laufen 2 dergleichen bis zu den Augen, welche dunkelbraun eingefaßt sind. Der Schwanz gefleckt, am Ende mit 4 schwarzgrauen Binden und schwarzbrauner Spitze.

In Brasilien.

15. Der Serval. Fel. Serval.

Geoffroi et Cuvier mammif. Livr. 1.

Etwas größer als eine wilde Katze, rothfahl, am Nacken drey lange schmale schwarze Streifen, über die Seiten laufen mehrere Reihen runder schwarzer Flecken. Am Bauche heller, an der innern Seite der Vorderschenkel zwey schwarze Bänder, der Schwanz etwa ein Drittheil so lang als der Körper.

In Südamerika? Lebt von kleinen Thieren. Neuwied fand sihn nicht in Brasilien.

16. Sanfte Katze. Felis mitis. Geoff.

Geoffroy et Cuv. mammif. Livr. 18.

Ein Drittheil größer als die Hauskatze, die Länge des Körpers ist 2 Fuß 1 Zoll, des Schwanzes 11 Zoll. Die Grundfarbe des Pelzes an den obern Theilen ist sehr hell rothgelb, unten weiß. Der ganze Körper ist mit schwarzen Flecken besetzt, welche vorn breiter als hinten sind. Auf dem Rücken sind sie ganz schwarz und machen vier Reihen aus, die an den Seiten haben in der Mitte einen blonden Fleck und stehen in fünf Reihen, an Schenkeln und Schultern sind sie rund. Am Halse, den innern

Theilen des Schenkels und am Schwanze bilden sie Streifen. Diese Katze, wovon ein Weibchen in der Pariser Menagerie lebt, ist sehr zahm und sanft. Das Vaterland ist völlig unbekannt.

17. Der Jaguarundi. Fel. Jaguarundi. Azara.

Niedrig auf den Beinen, der Körper lang gestreckt, einfärbig braunschwärzlicht.

In Südamerika.

18. Der schwarze Panther. Fel. Melas. Peron.

Schwarz, mit einfachen noch schwärzern Flecken. In Ostindien.

19. Die Eyra. Fel. Eyra. Azara.

(Leo rufus. Oken).

Länge 31 Zoll, des Schwanzes 11 Zoll. Einfärbig hell rothbraun. Leicht zu zähmen. In Paraguay.

20. Die Pampa. Felis Pampa. Azara.

(Leo brunneus. Oken).

Von der Größe der Eyra. Die Hauptfarbe ist zimmetbraun, hin und wieder besonders im Gesicht mit dunklern Streifen. Wilder als die Eyra.

In der Provinz Buenos-Ayres.

21. Der Luchs. Felis Lynx.

Schreb. CIX. und CIX. B. Felis rufa.

Rothgelb, dunkler gefleckt. Der Schwanz kurz, die Ohren mit einem schwarzen Haarpinsel; unten heller, fast weiß. Die größte europäische Katze, sie ist noch immer hin und wieder in Deutschland; nicht gar selten in den Gebürgen der Schweiz und in andern Gegenden anzutreffen.

Digitized by Google

Raubt Hirsch- und Rehkälber, greift Schafe an. Klettert auf Bäume, trägt 9 Wochen, läßt sich jung zähmen. Der Rothluchs ist eine bloße Spielart aus Nordamerika.

22. Der canadische Luchs. Fel. canadensis.

Grauweißlicht mit einigen blaßbraunen Flecken. In Canada.

23. Der Carakal. Felis Caracal.
Schreb. CX.

Schwanz halb so lang als der Leib, graubraungelblicht, der hintere Theil der Schenkel schwärzlicht. In den sumpfigen Gegenden von Persien, am Caucasus, in Egypten und Abyßinien, wird gezähmt zur Jagd kleiner Thiere und Vögel abgerichtet.

24. Der Kyrmyschak. Fel. Chaus.
Schreb. CX. B.

Pelz fast zimmetfarb, unten hell gelbbraun, der Schwanz kurz, reicht bis an die Ferse, mit schwarzer Spitze und drey schwarzen Ringen.

Am Caspischen Meer.

25. Wilde Katze. Fel. catus ferus.
Schreb. CVII. A.

Bedeutend größer als die Hauskatze, rothgrau mit dunklern Querstreifen, unten heller, der Schwanz mit schwarzer Spitze und drey schwarzen Ringen. In den dicken Wäldern von Europa, frißt Fische, Vögel, Hasen, Mäuse und andere kleine Thiere, heckt in hohlen Bäumen. Steigt in Gefahr gleich auf Bäume. Sie ist der Stamm-

Digitized by Google

vater unſerer Hauskatze, welche bekannt ſehr verſchieden gefärbt und viel kleiner iſt.

? 26. Lybiſche Katze. Fel. ocreata.

Nicht größer als die Hauskatze, röthlichtbraun, Schwanz weiß, ſchwarz gezeichnet. In Abyßinien und andern Gegenden Afrikas.

? 27. Malabariſche Katze. Fel. malabarica.

Größer als Katze, Schwanz kurz, rothbraun, eine Menge kleiner ſchwarzer Flecken über den Leib zerſtreut.

In Indien, Tibet, Malabar.

? 28. Capkatze. Fel. capensis.

Roſtfarben, Rücken mit länglichten ſchwarzen Streifen, Seiten mit kleinen runden Flecken, Rücken mit ſchwarzen Streifen, unten weiß, Schwanz geringelt.

In Wäldern von Congo bis zum Cap.

? 29. Neu-Spaniſche Katze. Fel. nova Hispaniæ.

Bläulichtgrau, ſchwarz geſtrichelt, lang gefleckt *).

Aus Neuſpanien.

---

*) Dieſes ſind die ſyſtematiſch genau zu beſtimmenden Katzenarten, noch unbeſtimmt ſind Felis guigna, colocola, montana nigra und rostrata aus Amerika, moschata aus Afrika und Bengalensis aus Südaſien, auch Felis tigrina ſcheint vom Ozelot nach Neuwieds Meinung verſchieden, und nicht blos das junge Thier von Pardalis zu ſeyn. Am Mißuri findet ſich eine wilde Katze um die Hälfte größer als die Hauskatze, ſie hat auf glänzend gelbem Grund weiße und ſchwarze Flecken, der Bauch iſt gelb. (Von le Raye beſchrieben).

Digitized by Google

Amphibien = Säugethiere.

Die Thiere dieser Abtheilung bilden die letzte der kleinern Unterabtheilungen, in welche man die Raubthiere bringen kann. Da sie fast mehr im Wasser als auf dem Lande leben, so ist ihr Körper auch mehr zum Schwimmen gebaut. Ihre Füße sind so kurz und so in die Haut eingewickelt, daß sie sich derselben auf dem Lande nur zum Kriechen oder Nachschieben des Körpers bedienen können; allein da die Zehen mit Häuten verbunden sind, so sind sie desto vortreflichere Ruder. Diese Thiere bringen den größten Theil ihres Lebens im Meere zu, und kommen nur ans Land, um sich zu sonnen und ihre Jungen zu saugen. Ihr Körper ist walzenförmig, die Wirbelsäule sehr beweglich und mit Muskeln versehen, welche ihr eine kräftige Biegung verstatten, das Becken ist sehr schmal, das Haar kurz, dicht und anliegend; sie schwimmen daher mit größter Leichtigkeit, und alle einzelnen Theile ihres Körpers entsprechen dieser Bestimmung. Man kennt nur zwey Gattungen, Seehund und Wallroß.

Seehunde. Phoca.

In der obern Kinnlade stehen vier Vorderzähne, und eben so viel unten, die Eckzähne sind vorstehend stark und spitzig, und die Backenzähne an der Zahl von zwanzig, zwey und zwanzig bis vier und zwanzig sind alle schneidend oder konisch, ohne Höcker. An allen Füßen sind fünf Zehen, die an den vordern Füßen nehmen vom Daum an immer an Größe ab, an den Hinterfüßen dagegen sind der Daum und die kleine Zehe am längsten, die mittlern kürzer. Die Vorderfüße stecken bis zur Fußwurzel in der

Haut,

Haut, und die hintern faſt bis zur Ferſe, zwiſchen denſelben iſt der kurze Schwanz. Der Kopf der Seehunde gleicht dem Hundskopf, und ſelbſt der Ausdruck ihrer Phyſiognomie iſt ſo ausdrucksvoll und ſanft, und die Fähigkeiten faſt eben ſo groß als beym Hunde. Sie werden leicht zahm und bekommen Anhänglichkeit an ihre Ernährer. Die Zunge iſt glatt und an der Spitze ausgeſchweift. Der Magen einfach, der Blinddarm kurz und der Darmkanal lang und ziemlich gleich dick. Dieſe Thiere leben von Fiſchen, welche ſie immer im Waſſer freſſen. Wenn ſie tauchen, ſo können ſie ihre Nasldcher durch eine Art von Klappe verſchließen. Da ſie ſehr lange tauchen können, ſo glaubte man das ovale Loch des Herzens bleibe bey ihnen offen; aber dies iſt keineswegs der Fall. Sie haben aber einen ſtarken venoſen Gang in der Leber, welcher das Athmen zur Circulation entbehrlicher macht und beym Tauchen nachhilft. Das Blut iſt ſehr ſchwarz und ſcheint wenig oxydirt, es iſt in großer Menge vorhanden.

Wahre Seehunde ohne äußere Ohren.

Die oberen Vorderzähne ſind ſpitzig, die äußern länger als die innern, die Backenzähne ſchneidend mit mehreren Spitzen; alle Zehen ſind einigermaßen beweglich und mit ſcharfen Klauen verſehen, welche am Rande der Verbindungshaut ſtehen.

1. Der gemeine Seehund. Phoc. vitulina.

Schreb. LXXXIV. Geoff. et Cuvier mammif. Livr. 9.

Drey bis fünf Fuß lang, graugelblicht, mehr oder weniger ſchwärzlich gewellt oder gefleckt, je nach dem Alter. Im höhern Alter wird er weißlicht. Man findet dieſen

Seehund an den französischen und holländischen Küsten und bis tief in Norden, er soll auch das caspische Meer bewohnen und selbst die großen rußischen und sibirischen Landseen, was indeß noch sehr zweifelhaft ist, und kaum auf einer genauen Beobachtung beruhet *).

2. Grönländischer Seehund. Phoca grönlandica.

Graugelblicht, in der Jugend braungefleckt, dann bekommt er auf jeder Seite einen breiten Streif, in Form eines halben Mondes. Im Eismeer. An fünf Fuß lang.

3. Der Münch. Phoc. Monachus.

Zehen bis zwölf Fuß lang, braunschwärzlicht, der Bauch weiß. Im Mittelmeer, vorzüglich aber im adriatischen.

4. Der rauhe Seehund. Ph. hispida. Schreber LXXXVI.

Die Haare liegen nicht glatt an, sondern sind borstig, die Farbe fahlweiß ins bräunlichte fallend. An den Küsten von Grönland und Labrador.

5. Der bärtige Seehund. Ph. barbata.

Schwärzlicht. In Grönland und andern nördlichen Gegenden, wird bis zehen Fuß lang.

6. Seidenhaariger Seehund. Ph. sericea.

Weiß. In Schweden.

---

*) Kommt unter dem Namen Phoca caspica et Sibirica vor.

7. Hundeartiger Seehund. Ph. canina.

Hellgrau ungefleckt. In Schweden, lebt von Stichlingen.

8. Gefleckter Seehund. Ph. variegata.

Grau, schwarzgefleckt. Ebenfalls in Schweden.

9. Die Klappmütze. Ph. cucullata.

Wird acht bis zehen Fuß lang, am Männchen ist die Haut auf dem Kopfe weit, aufblähbar, wie ein Kamm oder eine Mütze vorstehend, im Zorn oder in der Angst kann er Schnauze und Augen damit bedecken.

In Grönland und Nordamerika.

10. Die Rüßelphoke. Seeelephant. Phoc. proboscidea.

Ph. leonina. Linn. Peron Reise pl. XXXII.

Mit rüßelförmig verlängerter Schnauze am Männchen. Die gröste Art der ganzen Gattung, das Männchen kann bis auf dreißig Fuß lang werden und einen Umfang von fünfzehen bis achtzehen Fuß erreichen. Die Farbe ist graulicht oder graublau. Die Barthaare sind hart, rauh und Schraubenförmig. Die Nasenlöcher verlängern sich im Affekt zu einem Fuß langen Rüßel.

Im Südmeere auf wüsten Inseln, z. B. auf der Insel King, sie gebären und saugen auf dem Lande, und wandern im Sommer gegen den Südpol hin. Man fängt sie des Speckes wegen, und die ganze Art hat sich schon sehr vermindert.

Digitized by Google

11. Vierzehiger Seehund. Ph. tetradactyla.

Braun oder grau, vorn nur vier Zehen, kleine Ohrränder. An der Küste von Chili in großer Menge.

12. Haasenhaariger Seehund. Ph. leporina.

Das Haar steht aufrecht und ist in einander verwebt, weich, die Farbe schmutzigweiß.

Im nördlichen Asien.

13. Der gestreifte Seehund. Phoc. fasciata.

Das Haar kurz, borstig, glänzend fast schwarz, an den Seiten schmale blaßgelbe Streifen.

Auf den Kurilen.

Seehunde mit äußern Ohren. Otaria. Peron.

Sie könnten wohl zu einer eigenen Gattung erhoben werden, da sie außer den äußern Ohren auch im Bau der Vorderzähne Abweichungen zeigen, sie haben nämlich oben sechs Vorderzähne, wovon die äußern klein und einfach, die vier innern aber länger und doppelschneidig sind, eine Form, welche sonst an keinem Thiere bemerkt ward, auch die vier untern Vorderzähne sind doppelschneidig, die Backenzähne aber alle kegelförmig, an den Vorderfüßen sind die Zehen fast unbeweglich, die Haut der Hinterfüße hingegen reicht über die Nägel hinaus, alle Nägel sind platt und dünne; das Haar etwas länger, als bey den übrigen Phoken.

14. Der gemähnte Seelöwe. Ph. jubata.

Schreb. LXXXIII. B.

Fünfzehen bis zwanzig Fuß lang, falb, der Hals am Männchen zottig und gemähnt. Im ganzen südlichen Ocean, in der Magellansstraße, und auf den Alaruten.

Digitized by Google

15. Der Seebär. Phoc. ursina. Schreber LXXXII.

Gegen acht Fuß lang, bräunlicht oder weißlicht. Im Norden des ſtillen Meeres.

16. Der kleine Seehund. Phoc. pusilla. Schreb. LXXXV.

Schwarz. Im Südmeer.

? 17. Schweinartiger Seehund. Phoc. porcina *).

Schnauze wie Schweinsrüßel. In Chili.

? 18. Glatter Seelöwe. Phoc. leonina. Schreb. LXXXIII.

Ohne Mähne, braun, auf der Schnauze von der Stirn bis zum Lippenende ein harter drüſiger Kamm. Haben vier vertiefte Zitzen. An der Küſte von Chili.

? 19. Gelbliche Phoke. Phoc. flavescens.

Gelblichtbraun. In Nordamerika.

Wallroß. Trichechus.

Sie gleichen den Seehunden in der Geſtalt der Glieder und allgemeinen Körperbildung, ſind aber durch die Geſtalt des Kopfs und den Zahnbau ſehr verſchieden. In der untern Kinnlade ſind weder Vorderzähne noch Eckzähne; ſie iſt vorn zuſammengedrückt, und ſchiebt ſich zwiſchen

*) Ob dieſe beyden Thiere zu den Phoken oder Otarien gehören, iſt nicht ganz beſtimmt, da ſie wohl das äußere Ohr zum Theil haben, der Zahnbau aber nicht ganz genau angegeben iſt.

A. d. U.

Digitized by Google

die sehr großen Eckzähne der Oberkinnlade hinein. Diese Eckzähne stehen nach unten, sind zuweilen an zwey Fuß lang und verhältnißmäßig dick. Die Größe der Zahnhöhlen, welche für diese Zähne bestimmt sind, giebt der Oberkinnlade ein aufgeblasenes Ansehen, und macht die Schnauze sehr dick; die Nasenlöcher stehen ganz oben aufwärts gerichtet, nicht am Ende der Schnauze. Die Backenzähne sind sämmtlich schief abgeschnittene Cylinder, es finden sich 16 in beyden Kinnladen, aber in einem gewissen Alter fallen zwey von den obern aus. Zwischen den Eckzähnen stehen in der Oberkinnlade zwey Schneidezähne in der Form den Eckzähnen gleichend, sie stecken im Zwischenkieferknochen, und beym jungen Thiere finden sich zwischen ihnen noch zwey spitzige kleine Zähne.

Der innere Bau der Wallroße gleicht dem der Robben. Sie scheinen sich außer von Fischen auch von Seegras zu nähren.

1. Das Wallroß. Trich. Rosmarus. Schreb. LXXIX.

Es bewohnt alle Theile des Eismeers, übertrift an Größe den stärksten Ochsen, wird bis zwanzig Fuß lang, und ist mit gelblichen kurzen Haaren bedeckt. Man fängt dieses Thier um des Thrans und der Zähne willen, deren Elfenbein, obschon körnig, doch zu Kunstsachen verarbeitet wird. Die Haut giebt trefliche Hängeriemen für Kutschen.

Schaw und Illiger unterscheiden eine zweyte Art des Wallroßes, welche Illiger Trich. obesus nennt, und worunter sie das von Cook beschriebene und abgebildete Wallroß verstehen, dessen Zähne weiter auseinanderstehen.

Digitized by Google

Beutelthiere. Marsupialia.

Obschon man diese Thiere in einiger Hinsicht als eine Familie der Raubthiere betrachten kann, so bieten sie in vielen andern Hinsichten so viel Eigenes dar, und sind unter sich selbst so verschieden, daß man nothwendig eine eigene Ordnung aus ihnen bilden muß.

Die ausgezeichnetste und merkwürdigste Eigenschaft dieser Thiere, ist die Art der Fortpflanzung. Die Jungen sind, wenn sie geboren werden, so wenig entwickelt, daß sie den Fötus anderer Thiere wenig Tage nach der Empfängniß gleichen, sie sind bey der Geburt nicht fähig, sich zu bewegen, haben keine sichtbare Anfänge der äußern Glieder, und hängen sich an die Zitzen der Mutter so lange fest, bis sie sich so weit entwickelt haben, als ander Säugethiere bey ihrer Geburt entwickelt sind. Bey den meisten bildet die Haut des Unterleibs, indem sie sich faltet, um die Säugewarzen einen Sack, in welchem diese zarten Jungen Wärme und Schutz, wie in einer zweyten Gebärmutter finden; selbst wenn sie schon gehen können, flüchten sie sich bey Gefahren in den Beutel. Zwey besondere Knochen, welche mit den Schaambeinen in Verbindung stehen, und zwischen den Bauchmuskeln gleichsam eingeschoben sind, geben dem Beutelrand eine feste Haltung, diese Knochen finden sich aber auch bey den Männchen, und selbst bey denjenigen Arten, wo die Hautfalte, welche die Säugewarzen umgiebt, kaum sichtbar ist. Die Gebärmutter dieser Thiere mündet nicht mit einer einzigen Oeffnung in die Scheide, sondern steht mit derselben durch zwey Seitencanäle in Verbindung, welche an der Seite der Blase

hinauflaufen und sich in den Uterus öffnen, zwischen ihren Mündungen entstehen aus der Gebärmutter die Trompeten, welche nach den Eierstöcken gehen. Man soll keinen Muttermund entdecken können, bis das Thier trächtig ist, nach dem Werfen aber ist derselbe sehr weit und unverkennbar. Die Gebärmutter selbst ist eiförmig. Die Männchen haben einen langen hängenden Hodensack vor der Ruthe, diese liegt im After und ist nach hinten gerichtet; an des Mastdarms vorderer Wand ist die Vorhaut, aus welcher eine gespaltene Eichel hervorragt, welche Spaltung durch Verlängerung der schwammigten Körper entsteht, aber nur eine einfache Mündung hat; der Hodensack hängt bey einigen Arten fast wie an einem Stiel, und die Hoden reichen fast auf die Erde, Saamenbläschen sind keine. Auch die weibliche Ruthe ist gespalten, die Harnröhrenöffnung weit hinten in der Scheide, daher harnen eigentlich beyde Geschlechter durch den Mastdarm.

Wie lange die Beutelthiere eigentlich tragen, ist unbekannt, und wahrscheinlich bey den verschiedenen Arten sehr ungleich, aber bey keiner dauert die Tragezeit lange, man fand das Junge eines Kenguruh, welches 56 Pfund wog, nicht größer als ein und ein Viertel Zoll im Beutel, und nicht schwerer als ein und dreyßig Grän. Wahrscheinlich gelangen die Jungen bey der Geburt sogleich in den Beutel, indem der hintere Rand der Scheide so nahe gebracht wird, daß sie sich fast berühren.

Eine andere Eigenheit der Beutelthiere ist, daß sie, ungeachtet sie im Allgemeinen einander so ähnlich sind, daß Linne, der nur wenige kannte, sie alle in eine Gattung brachte, sie so sehr in der Bildung der Zähne, der Ver-

Digitized by Google

dauungsorgane und dem Bau der Füße abweichen, daß sie bald an die Raubthiere, bald an die Nager grenzen, und selbst, wenn man nicht den Beutelknochen als allgemeines Kennzeichen der Beutelthiere annähme, und alle Thiere dahin zählen wollte, welche diese Knochen besitzen, müßte man einige davon den zahnlosen Thieren beyzählen, bey welchen sie auch wirklich unter der Abtheilung Monotreme werden angeführt werden. Man kann also mit Recht sagen, die Beutelthiere machen eine bestimmte Abtheilung der Säugethiere aus, welche mit einigen Abtheilungen der übrigen parallel stehen und in ähnliche Unterabtheilungen gebracht werden können, so stehen die Gattungen der Beutelratte, des Sackthiers und des Schweifbeutlers den Insektenfressern mit langen Eckzähnen vorüber, z. B. den Borstenigeln und Maulwürfen. Die Flugbeutler und Hankenthiere den Igeln und Spitzmäusen. Die eigentlichen Kenguruhs lassen sich mit keinem andern Geschlecht vergleichen; die Nagebeutler aber sind die Gegenstücke zu den Nagern.

Alle gemeinschaftlich bilden die Linneische Gattung Didelphis, ein Wort welches eigentlich Thiere mit doppeltem Uterus bedeutet, in dem der Sack eine zweyte Gebärmutter bildet.

Die erste Unterabtheilung der Beutelthiere hat lange Eckzähne und kleine Schneidezähne in beyden Kinnladen, die hintern Backenzähne sind mit Spitzen versehen, überhaupt haben sie alles Charakteristische der Insektenfresser, welchen sie auch in Hinsicht der Lebensart gleichen. Der Daum der Hinterfüße ist entgegensetzbar, daher nannte man sie auch Fußhänder; der Daum hat keinen Nagel; bey

Digitized by Google

den beyden ersten Gattungen sind die andern vier Zehen getrennt.

1. Beutelratte. Beutelthier. Didelphis. Linn.

Sie haben oben zehen Vorderzähne, die mittlern sind etwas länger, unten acht; drey vordern zusammengedrückte Backenzähne, und vier hintere mit Spitzen, die obern dreyeckig, die untern ablang; in allem fünfzig Zähne, eine Zahl, welche man sonst bey keinem vierfüßigen Säugethier antrift. Die Zunge mit spitzigen Wärzchen besetzt, der Schwanz ein Greifschwanz und zum Theil nackt; der Daum der Hinterfüße ist von den andern getrennt und lang. Der Mund sehr weit gespalten, und die nackten großen Ohren geben ihnen ein eigenes Ansehen. Es sind nächtliche Thiere, welche einen unangenehmen Geruch von sich geben, sie laufen langsam; steigen auf Bäume, wohin sie die Vögel verfolgen und Insekten aufsuchen, aber auch die Früchte nicht verschmähen. Der Magen ist einfach und klein, der Blinddarm mittelmäßig, ohne starken Bug.

Nur bey einigen Arten haben die Weibchen einen wirklichen Sack, der die Zitzen und die Jungen einschließt.

A. Mit Beutel.

1. Das virginische Beutelthier. Did. virginiana.

Sa rigue des Illinois et à long poils. Buff.

Faß so groß wie eine Katze, der Pelz weiß und schwärzlich gemischt, mit weißen Seidenhaaren, die Ohren halb schwarz, halb weiß, der Kopf fast ganz weiß. Man findet dieses Thier fast in ganz Amerika, es greift an bewohnten Orten des Nachts die Hühner an und frißt auch

Digitized by Google

ihre Eier. Die Jungen, zuweilen bis sechszehn an der Zahl, wägen nicht mehr als ein Gran, wenn sie geboren werden, obschon blind und unförmlich, lehrt sie der Instikt doch die Zitzen zu finden und sich daran festzuhängen, bis sie die Größe einer Maus erreicht haben, welches etwa fünfzig Tage dauert, erst jetzt öffnen sie auch die Augen. Sie nehmen so lang ihre Zuflucht in den Beutel, bis sie die Größe einer Ratte erreicht haben. Im Uterus sollen sie sechs und zwanzig Tage getragen werden.

2. Die große Beutelratte. Did. marsupialis.
Did. marsupialis et cancrivora.

Schreb. CXLV.

Von der Größe des vorigen, gelblicht mit braun gemischt durch längere braune Seidenhaare; über die Schnauze geht eine braune Linie. Lebt in sumpfigen Gegenden am Ufer des Meeres vorzüglich von Krabben.

3. Das Opoßum. Did. Opossum.

Schreb. CXLVI. A. und B. Geoff. et Cuv. mammif. 8.

Rothbraun oder kastanienbraun oben, unten weißlich, über jedem Auge ein blaßgelber Fleck, größer als eine Ratte. In Brasilien, Cayenne *).

*) Es ist sehr wahrscheinlich, daß es noch mehrere Arten von Beutelthieren in Südamerika gebe, aber sie sind noch gar nicht bestimmt, und es herrscht noch viele Verwirrung bey dieser Gattung. Soviel ist gewiß, daß die ganze Gattung im wärmern Amerika lebt und keine in Asien. A. d. U.

Digitized by Google

B. Ohne Beutel, blos mit einer Hautfalte zu jeder Seite des Bauches als Anfang des Beutels. Sie tragen die Jungen auf dem Rücken, indem diese ihren Wickelschwanz um denjenigen der Mutter winden und sich so festhalten.

4. Der Cayopollin. Did. Cayopollin.

Did. Philander, Cayopollin et dorsigera. Schreber CXLVII. CXLVIII. und CL.

Graulichtfalb, ein Kreis um die Augen und Streif über die Nase braun, der Schwanz schwärzlicht gefleckt.

5. Die Marmose. Did. murina.

Schreb. CXLIX. Marmose. Buff.

Gelbroth, durch die Augen geht ein brauner Strich, der Schwanz nicht gefleckt. Kleiner als eine Ratte.

6. Das kurzgeschwänzte Beutelthier. Did. brachyura.

Schreb. CLI. Touan Buff.

Der Rücken schwärzlicht, die Seiten lebhaft rothbraun, der Bauch weiß, der Schwanz kurz. Kleiner als eine Ratte. Alle drey leben in Südamerika.

7. Die kleine Beutelratte. Did. nana.

Dunkelgrau, der Schwanz sehr dünne und nackt, Augenring schwarz, kein Stirnstreif.

In Paraguay.

8. Die Beutelratte mit drey Streifen. Did. tristriata. Kuhl.

Der Schwanz ein Drittheil kürzer als der Körper. Die Gestalt ähnlich dem kurzgeschwänzten. Die Farbe rothbräunlicht, unten heller, auf dem Rücken drey schwärzliche

Längsſtreifen. Von der Größe der Feldmaus. Aus Braſilien. (Im Berliner Muſeum).

Schwimmhänder. Chironectes. Illig.

Zähne wie bey Didelphis. Die Schnauze ſpitzig, das Geſicht behaart, die Ohren abgerundet und nackt. Der Schwanz Wickelſchwanz, ſchuppig und nackt. Die Füße fünfzehig, die Zehen mit einer Schwimmhaut verbunden, der Daum abſtehend ohne Nagel. Am Bauche ein Beutel.

1. Gefleckter Schwimmhänder. Chir. variegatus.

Oben braun oder ſchwärzlicht, die Seiten gelbgrau, ſchwarz gefleckt, über jedem Auge ein weißer Fleck, der Bauch weiß. In Guiana und Braſilien. So groß wie eine Ratte.

Schweifbeutler. Dasyurus.

Oben acht, unten ſechs Vorderzähne und acht und zwanzig Backenzähne, alſo in allem nur 42 Zähne. Der Schwanz iſt langhaarig und kein Greifſchwanz. Der Daum des Hinterfußes iſt viel kürzer und gleicht einer Warze. Sie leben in Neuholland von Inſekten, von Aas, kommen ſelbſt in die Häuſer und ſind ſehr gefräßig. Die Mundöffnung iſt nicht ſo weit wie bey der vorigen Gattung, die Schnauze weniger ſpitzig, die Ohren ſammetartig, kürzer als bey den vorigen. Sie ſteigen nicht auf Bäume.

1. Der hundsköpfige Schweifbeutler. Dasyur. cynocephalus.

Act. Societ. Linn. IX.

So groß wie ein mäßiger Hund, drey und einen halben Fuß lang, ohne den Schwanz, welcher beynahe zwey

Digitized by Google

Fuß lang ist. Der Pelz ist oben dunkelgrau, an den Seiten mit sechszehn glänzenden Querstreifen, der Schwanz breit, zusammengedrückt, behaart. Der Kopf hundeartig. An der Nordküste von Diemensland.

2. Bärenartiger Schweifbeutler. Dasyur. ursinus *).

Act. Societ. Linn. IX.

Mit langem, schwarzem, steifem Haar, auf dem Kreuz, Schultern und an der Kehle mit einzelnen weißen Flecken. Das Maul ist weit, der Schwanz unten nackt, kann sich etwas wickeln. Soll Fische fressen.

Nordküste von Diemensland.

3. Langgeschwänzter Schweifbeutler. Das. macrourus.

Peron Reise pl. XXXIII.

So groß wie ein Marder, der Schwanz so lang als der Körper, der Pelz braunroth weiß gefleckt.

Bey Sydney und um den Hafen Jackson.

4. Mauges Schweifbeutler. Das. Maugei.

Olivenfarb, weißgefleckt, auf dem Schwanzbeine Flecken, etwas kleiner als der vorige.

---

*) Harrison, der beyde Thiere beschrieben hat, giebt diesem unten 10, oben 8 Vorderzähne, dies und der etwas wickelnde Schwanz scheinen diese Art zu einer eigenen Gattung zu machen.

Digitized by Google

5. Stinkthierartiger Schweifbeutler. Das. viverrinus.

White.

Schwarzweißgefleckt, der Schwanz ungefleckt. Ein Drittheil kleiner als der vorige.

Oſtküſte von Neuholland.

6. Der Tapoa Taſa. Das. Tafa.

White.

Graulicht einfärbig.

7. Büſchelſchwänziger Schweifbeutler. Das. penicillatus.

Shaw gen. Zool. I II. pl. CXIII.

Grau, der Schwanz mit langen, ſchwarzen, ſteifen Haaren.

8. Kleinſter Schweifbeutler. Das. minimus.

Kleiner als eine Ratte, röthlichtgrau, der Daum länger, die Zähne gleichartiger und geſchloſſener als beym vorigen. Südküſte von Diemensland.

9. Mausartiger Schweifbeutler. Dasyur. murinus.

Kaum ſo groß als eine Maus.

Auf der Inſel Maria an der Südoſtküſte von Diemensland.

Beuteldachs. Perameles. Geoff. Thylacis. Illiger.

Der Daum am Hinterfuß kurz, wie bey den Schweifbeutlern, die beyden folgenden Zehen mit einer Haut verbunden, bis zu den Klauen; der Daum und die kleine

Zehe des Vorderfußes haben die Gestalt einer einfachen Warze, oben zehn Vorderzähne; die äußern sind spitzig und abstehend, unten sind nur sechs; Backenzähne haben sie so viel als die Beutelratten, in allem acht und vierzig Zähne. Der Schwanz ist mit kurzen Haaren besetzt, kein Wickelschwanz. Sie leben in Australien. Ihre großen fast geraden Klauen zeigen, daß sie graben, und ihre langen Hinterfüße, daß sie schnell laufen können. Die Schnauze ist lang und dünne, der Rachen weit, klettern nicht auf Bäume.

1. Stumpfschnauziger Beutelbachs. Peram. obesula. Geoff.

Annales du Museum IV.

Von der Größe des Maulwurfes, Pelz rauh, röthlichtgelb, mit schwarzen Borsten vermischt, der Bauch weißlicht. Die Hinterfüße viel länger. Vorn fünf, hinten vier Zehen. Die langen Hinterfüße nähern sie den Kenguruhs. Bey Port Jackson.

2. Langnasiger Beutelbachs. Peram. nasatus. Geoff.

Annal. du Museum IV.

Die Schnauze sehr lang, die Ohren spitzig, der Pelz braun ins graulichte spielend. Dem ersten Anschein nach gleicht er einem Borstenigel.

Die zweyte Unterabtheilung der Beutelthiere hat in der untern Kinnlade zwey lange und breite Vorderzähne, spitzig und mit schneidendem Rande, die vorwärts stehen; ihnen entgegen stehen sechs Vorderzähne in der Oberkinnlade. Die obern Eckzähne sind lang und spitzig, die untern dagegen sehr klein, zuweilen ganz im Zahnfleisch steckend,

ckend, bey einer Gattung fehlen sie ganz. Sie leben meistens von vegetabilischer Kost, auch sind ihre Därme, besonders der Blinddarm, länger als bey den vorigen; der Daum ist groß, ganz von den andern Fingern getrennt und nach hinten gerichtet, fast wie bey den Vögeln. Er hat keinen Nagel, und die beyden folgenden Finger sind durch Haut bis zum vordersten Gelenke verbunden, daher der Name Phalanger.

Eigentliche Phalanger. Phalangista. Cuv. Balantia. Illig.

Die Haut an den Seiten ist nicht ausgedehnt, die 4 vordern Backenzähne zeigen in 2 Reihen jeder 4 Spitzen, vor diesen steht ein dicker kegelförmig zusammengedrückter Zahn, zwischen diesen und dem Eckzahn stehen zwey kleine spitzige, denen unten drey kleine entsprechen. Der Schwanz ist ein Wickelschwanz.

Diejenigen, welche einen größtentheils schuppigen Schwanz haben, leben auf den Molucken auf Bäumen von Insekten und Früchten. Wenn sie einen Menschen sehen, so hängen sie sich an den Schwanz auf, sieht man sie lange an, so werden sie müde und fallen zu Boden. Sie verbreiten einen unangenehmen Geruch, dennoch ißt man ihr Fleisch.

1. Der Kuskus. Phalangist. orientalis. Schreber CLII.

Wahrscheinlich sind mehrere Arten unter dieser Benennung mit einander verwechselt, es giebt weißlichte, grau und schwarz gefleckte, rothbraune mit braunem Rücken-

ſtreif (das gemeinſte); braune mit weißem Hinterrücken. Oken ſtellt drey Arten davon auf.

Der kleine. Ph. minor.

Grau oder weiß.

Der braune. Ph. fusca.

Graurothlicht.

Der geſchäckte. Ph. variegata.

So groß wie eine Katze. Weiß und ſchwarz geſchäckt. Die Neuholländiſchen Arten haben einen Schwanz, der bis ans Ende mit kurzen Haaren bedeckt iſt.

2. Fuchsartiger Phalanger. Phalang. vulpina.

White voy. 27. 8. Wha Tapoua Roo.

So groß wie eine ſtarke Katze, oder gar wie ein Waſchbär, graubraun unten bläßer, der gröſte Theil des Schwanzes ſchwarz.

Auf Botanybay.

3. Phalanger von Cook. Phalang. Cookii.

Kleiner als eine Katze, graurothlicht, unten weiß, die Seiten weißgelb, gegen das Ende des Schwanzes weiß, der übrige Theil braun. Ein Fleck hinter dem Ohr weiß, ſehr lange ſchwarze Bartborſten. Die Ohren abgerundet. An der Nordküſte von Neuholland.

4. Rollender Phalander. Phal. convolutor.

Schnauze ſpitzig, lange Schnurrbärte, das Haar lang, dicht, weich, oben grau und braun, unten weiß. So groß als eine Katze, rollt ſich im Schlafe in eine Kugel zuſam-

Digitized by Google

men, beym Freſſen aber ſitzt es aufrecht. Lebt blos von Pflanzen.

In Neuholland bey der Adventure Bay. Ob hieher gehörig?

Fliegende Phalanger. Petaurus. Shaw. Phalangista. Illig.

Die Seitenhaut mehr oder weniger ausgedehnt und zwiſchen den Beinen zu einer Schleuderhaut wie bey den fliegenden Eichhörnchen gebildet, dieſes erlaubt ihnen, ſich einige Augenblicke in der Luft zu erhalten und ſehr weite Sprünge zu thun. Einige haben unten kleine Eckzähne, die obern Eckzähne und die drey erſten Backenzähne oben und unten ſind ſehr ſpitzig; die vordern Backenzähne haben jeder vier Spitzen.

1. Kleiner fliegender Phalanger. Phalang. pygmaea. Shaw.

Shaw, gen. Zool. pl. CXIV.

Farbe und Größe einer Maus, das Haar des Schwanzes ſteht zu beyden Seiten auswärts, wie die Bärte an einer Feder.

Die folgenden haben unten keine Eckzähne, die obern ſind ſehr klein. Die vier vordern Backenzähne haben ebenfalls vier, aber etwas halbmondförmig gekrümmte Spitzen, ſie gleichen den Backenzähnen der Wiederkauer. Vor dieſen ſtehen oben zwey und unten ein einfacher Zahn. Dieſer Bau macht ſie zu mehr pflanzenfreſſenden Thieren als alle vorhergehenden.

Digitized by Google

2. Der große fliegende Phalanger. Phalang. petaurus.

Shaw pl. CXII. White voy. 288.

Gleicht in der Größe dem Galeopithecus, sein Pelz ist weich und stark behaart, der Schwanz lang und glatt. Die Farbe variirt in verschiedenem braun, es giebt gefleckte und weißlichte. Der Zitzensack ist groß.

In mehreren Gegenden Neuhollands.

3. Langschwänziger fliegender Phalanger. Phal. macroura.

White.

Oben dunkelbraun, unten weiß, von der Größe der Wanderratte, der Schwanz sehr lang, dünne und behaart.

4. Eichhornartiger fliegender Phalanger. Phal. sciurea.

Hepoona Roo. White.

Leib wie beym europäischen Eichhorn, flach und breit, der Schwanz sehr lang, buschig behaart, vorn fünf Zehen mit scharfen Nägeln, hinten auch fünf ohne abgesonderten Daum, alle mit spitzen Nägeln. Pelz sehr dicht langhaarig, braun, ins olivengrüne spielend, Bauch weiß. Augen groß, Ohren breit und dünne. Schleudert sehr weit von einem Baum zum andern. Neu-Süd-Wallis *).

*) Das schwarze fliegende Opoßum Oken, glänzend schwarz mit grauem Schimmer, unten weiß, gehört wohl hieher, und desselben penicillatus zu Dasyurus, überhaupt scheinen mehrere Arten mit einander verwechselt zu werden. A. d. U.

Digitized by Google

Die dritte Abtheilung hat die Vorderzähne und die obern Eckzähne wie die vorigen gebaut, eben so zwey Zehen an den Hinterfüßen vereinigt, aber sie haben hinten keinen Daum und keine untern Eckzähne. Sie enthält nur eine Gattung.

Kenguruh-Ratte. Hypsiprymnus. Illig.

Sie haben noch einige allgemeine Charaktere mit den Raubthieren gemein, ihr Zahnbau gleicht im Allgemeinen dem der Phalanger, sie haben oben noch einen spitzigen Eckzahn, die mittlern obern Vorderzähne sind länger als die andern; unten haben sie nur zwey vorwärts stehende Vorderzähne. Vorn haben sie einen langen schneidenden gezähnelten Backenzahn, dann folgen vier andere mit vier stumpfen Höckern versehene. Was sie aber besonders auszeichnet, sind ihre sehr langen Hinterbeine, an denen kein Daum sich findet, die beyden ersten Finger sind bis zum Nagel verbunden, so daß man beym ersten Anblick glaubt, es seyen nur drey Zehen, wovon der innere einen doppelten Nagel habe, vorhanden. Sie gehen oft auf den Hinterfüßen, und bedienen sich dann ihres langen und starken Schwanzes zur Unterstützung des Körpers. Sie haben die Gestalt und Gewohnheiten der Kenguruhs, von denen sie nur der obere Eckzahn unterscheidet. Sie fressen Pflanzen, der Magen ist groß und bildet zwey Säcke, und ist mit mehreren Wulsten versehen. Der Blinddarm ist mittelmäßig und abgerundet.

Digitized by Google

1. Mauseartige Kenguruh-Ratte. Hypsipr murinus. Illig.

Poto Roo White voyag. Macropus minor Shaw.

Von der Größe eines kleinen Kaninchens, mausegrau Aus Neusüdwallis.

Die vierte Unterabtheilung unterscheidet sich nur durch den Mangel der Eckzähne von der vorigen.

Kenguruh. Halmaturus, Illig. Macropus. Shaw.

In Hinsicht des Körperbaues gleichen sie fast ganz der vorigen Gattung, ausgenommen daß außer dem Mangel der Eckzähne, auch die mittlern Vorderzähne die übrigen an Länge nicht übertreffen. Die Ungleichheit der Füße ist noch größer, und sie können nur mit Mühe auf allen Vieren gehen, desto besser aber durch ihre langen Hinterfüße springen. Der Nagel an der Mittelzehe der Hinterfüße ist sehr groß, stumpf, dreyeckig, sie vertheidigen sich auch damit, sie stützen sich auf einen Fuß und auf den dicken Schwanz, und theilen dann mit dem freyen Fuß tüchtige Schläge aus. Es sind übrigens sehr sanfte Thiere, welche von Gras leben. Ihre Backenzähne haben auch gefurchte Kronen, es stehen in jeder Kinnlade zehn, die beyden vordern fallen im Alter aus und so bleiben nur noch sechs. Der Magen hat die Gestalt eines langen Sacks mit Ausbügen, wie am Dickdarm. Der Blinddarm ist groß und bucklicht; die Schiene am Vorderam ist einer vollständigen Drehung fähig. Die Ruthe ist nicht gablicht, so wenig als die Clitoris; die weiblichen Theile sind aber übrigens wie bey allen Beutelthieren gebildet.

Digitized by Google

1. Das große Kenguruh. Hal. giganteus.

Macropus major. Shaw. Didelphis gigantea. Schreb. CLIV. Geoff. et Cuvier mammif. Livr. 11.

Zuweilen an sechs Fuß lang; das größte Säugethier von Neuholland, durch Cook im Jahr 1779 entdeckt, man hat es nach Europa verpflanzt und zähmt es auch in Neu-Südwallis. Sein Fleisch soll dem Hirschfleisch ähnlich seyn. Die Jungen sind kaum ein Zoll lang, wenn sie geboren werden, und bleiben im Beutel, bis sie selbst Gras fressen können; dies thun sie oft, indem sie, während die Mutter selbst weidet, den Kopf zum Beutel herausstrecken. Das Weibchen hat nur vier Zitzen, im Beutel findet man selten mehr als ein Junges, dieses ist nackt, wenn es schon die Größe einer Katze erreicht hat. Es wird bis zu 140 Pfund schwer. Sie leben in Truppen von 30 bis 40 Stücken, welche von alten Männchen angeführt werden. Sie machen unglaubliche Sprünge. Wahrscheinlich giebt es mehrere Arten, welche mit einander verwechselt werden, Geoffroy unterscheidet:

a. Das Kenguruh mit dem Schnurrbart. Hal. mat. labiatus. Geoff.

Kanguroo à moustaches.

Graubraun, am Rücken am dunkelsten, Seiten, Vorderarme, Hinterbeine und der untere Theil des Schwanzes grau überlaufen. Bauch weißlichtgelb. Lippen gelbweiß, mit schwarzem Schnurrbart.

In Neuholland.

Digitized by Google

b. Graurothes Kenguruh. Halm. griseorufus. Geoff.

Durchaus rothgrau. An der Stirne, Unterrücken, Oberseite des Schwanzes, Wangen dunkler, Hals Brust und Bauch weißüberlaufen.

In Neuholland.

c. Rothhalsiges Kenguruh. Halm. ruficollis Geoff.

Braungrau, die Haare am Grunde aschgrau und haben dunkelbraune und weiße Ringe und dunkelbraune Spitzen. Der Nacken rothbraun. Bauch und innere Schenkel weißgrau.

Insel King.

2. Das gestreifte Kenguruh. Halm. fasciatus. Macropus elegans. Peron voy. LXXVII.

Von der Größe eines Haasen, graulichtweiß, röthlicht mit braunen Querstreifen.

Das einzige Thier, aber in ganzen Schwärmen auf den Inseln Bernier, Doree und Dirkhartogh, aber auf keinem Theil des festen Landes von Neuholland. Sehr furchtsam und schüchtern, in dicken Gebüschen. Das Fleisch wie Kaninchenfleisch, man kann sie zähmen *).

3. Das Kenguruh von Arde. Halm. Bruinii. Didelphis Bruinii. Schreb. CLIII.

Schon lange bekannt, von der Größe eines ausgewachsenen Haasen, schmalem fuchsähnlichem Kopf, spitzen Ohren,

*) Auf der Insel Rotneſt lebt eine andere noch nicht bestimmte Art. A. d. U.

Digitized by Google

oben braun, unten falb. Lebt auf der Insel Aroe, nahe bey Banda und auf Solor.

Die fünfte Unterabtheilung hat in der Unterkinnlade zwey lange Vorderzähne ohne Eckzähne, in der obern zwey lange Vorderzähne in der Mitte, einige kleine zu beyden Seiten und zwey kleine Eckzähne. Sie umfaßt nur eine Art.

Der Koala. Koala. Cuvier. Lipurus.

Der Körper untersetzt, die Beine kurz, gar kein Schwanz; von den Vorderfüßen fünf Zehen, in zwey Gruppen getheilt, zum Faßen bequem, der Daum und der Zeigefinger machen eine Abtheilung, die drey andern die entgegengesetzte. Der Daum mangelt am Hinterfuß, dessen beyden ersten Zehen wie bey den vorigen vereinigt sind.

1. Der graue Koala. Lipurus cinereus.

Mit grauem Haar, klettert geschickt auf Bäume und gräbt sich an ihren Wurzeln Löcher. Die Mutter trägt ihr Junges lange Zeit auf dem Rücken.

Vaterland. Neuholland.

Die sechste Unterabtheilung enthält die Gattung

Wombat. Phascolomys. Geoffroy.

Es sind wahre Nager in Hinsicht auf den Zahnbau sowohl als auch in Hinsicht der Eingeweide; mit den Raubthieren haben sie nichts gemein als die Einlenkung der Unterkinnlade; man könnte sie daher ohne den Beutel wohl den Nagern beyzählen, zu welchen sie den Uebergang machen, und an welche überhaupt die Beutelthiere sich reihen, durch die Phalangers und Kenguruhs und endlich durch den Wombat, dessen Geschlechtstheilbau ihn ganz den Beutelthieren beygesellt.

Digitized by Google

Der Wombat ist ein langsames träges Thier, mit großem plattem Kopf, kurzen Füßen und etwas eingedrücktem Körper. An den Vorderfüßen sind 5 Zehen, an den hintern nur vier mit einer Daumwarze, die Klauen sind stark und lang, zum Graben geschickt. Sie gehen auf der ganzen Sohle. In jeder Kinnlade sind zwey sehr breite, vorn abgeplattete Vorderzähne, welche Krone auf Krone auf einander passen, wie bey den Backenzähnen. In jeder Kinnlade stehen ferner zehn Backenzähne, über welche in der Mitte eine Querfurche lauft. Sie leben von Gras, der Magen ist birnförmig, der Blinddarm kurz und weit und mit einem Wurmfortsatz versehen, wie beym Menschen und Orang Utang. Das männliche Glied ist gespalten.

1. Bärenartiger Wombat. Phascolomys ursinus.

Peron voyag. pl. XXVIII. Geoff. et Cuv. mammif. Livr. 10.

Graubraun, grobhaarig, an der Oberlippe ein starker Schnurrbart. Die Zunge ist sanft, wenig ausdehnbar. Der Schwanz ist kaum einige Linien lang. Die Größe etwas kleiner als ein Dachs. Der Wombat läßt sich leicht zähmen. Sein Fleisch ist sehr gut. Auf der Insel King *).

*) Die Gattung amblotis Illiger, ein von Baß in Neuholland entdeckte Gattung, welche er auch Wombat nennt, soll sechs Vorderzähne, zwey Eckzähne und sechs Backenzähne haben, wenn das Thier wirklich so viele Zähne hat, so bildet es eine eigene Gattung, welche der Gattung Perameles zur Seite steht.

Digitized by Google

Vierte Ordnung der Säugethiere.

Nager. Glires.

Schon bey den Phalangern der vorigen Ordnung waren die Eckzähne so klein, daß sie kaum als solche betrachtet werden konnten; auch besteht die Hauptnahrung jener Thiere aus Pflanzenkost; ihr Darmkanal ist lang, der Blinddarm weit; und die Kengurus, welche ganz von Pflanzen leben, haben gar keine Eckzähne. Der Wombat macht den wahren Uebergang zu den Nagern, deren Kauorgane noch etwas einfacher sind.

Zwey große Vorderzähne in jeder Kinnlade stehen durch einen ziemlichen Raum von den Backenzähnen getrennt, und machen das Thier zum Festhalten einer Beute und zum Zerreißen von Fleisch ungeschickt; sie können die Nahrungsmittel nicht einmal zerbeißen, allein sie bedienen sich ihrer Zähne um dieselben zu zerfeilen und ganz zu zernagen, daher der Name der Ordnung Nagethiere. Mit ihren Zähnen können sie auf diese Art selbst sehr harte Körper zernagen, und manche nähren sich von Holz und Rinde. Diese Zähne sind nur von der äußern Seite mit Schmelz versehen, und die innere Seite nutzt sich schneller ab, sie bilden vorn eine schräge Fläche, wie ein Dreheisen; und sie wachsen um so viel nach, als sie sich abnutzen, diese nachwachsende Kraft ist so stark, daß wenn ein solcher Zahn verloren geht oder zerbricht, so wächst der entgegengesetzte, den nun nichts im Wachsthum hindert, oft zu einer monstrosen Größe an. Der Gelenkkopf des Unterkiefers ist der Länge nach eingelenkt, und liegt viel höher als die Zähnekrone, die Bewegung ist daher nach hinten und nach vorn

Digitized by Google

ganz frey, nach den Seiten eingeschränkt; diese Einrichtung ist zum Nagen sehr bequem; die Backenzähne haben flache breite Kronen, welche quer liegen und so zur horizontalen Bewegung den Gegensatz machen, so daß das Zermalmen leicht von statten geht. Die Gattungen, wo die Vorragungen der Backenzähne einfache Linien und die Kronen fast eben sind, sind vorzüglich körnerfressend; diejenigen dagegen, deren Kronen mehr höckerig sind, fressen mancherley, die kleine Zahl derjenigen, welche zackige Backenzähne haben, fallen selbst andere kleine Thiere an und nähern sich den Raubthieren in etwas.

Im Allgemeinen sind die Hinterfüße länger und folglich der Körper hinten höher als vorn, so daß sie mehr hüpfen als laufen; dieser Bau ist bey einigen Gattungen fast so vorstechend als bey den Kenguruhs. Der Darmkanal ist sehr lang; der Magen einfach oder doch wenig getheilt, der Blinddarm oft sehr weit, zuweilen weiter als der Magen. Nur die Gattung der Schläfer (Myoxus) hat gar keinen Blinddarm. Das Hirn ist fast glatt und hat nur undeutliche Windungen; die Augenhöhlen sind von den Schläfengruben nicht getrennt, welche wenig Tiefe haben; die Augen liegen fast ganz seitwärts; die kleinen und nach unten gebogenen Jochbogen sind ein Beweis von schwachen Kinnladen; die Vorderschenkel können sich am Ellenbogen nicht drehen, und die beyden Knochen, woraus sie bestehen, sind oft mit einander verwachsen; überhaupt zeigt die ganze Organisation, daß diese Thiere auf einer etwas tiefern Stufe stehen als die bisher betrachteten. Sie werden fast alle blind geboren. Die meisten Gattungen aben starke Schlüsselbeine und sind in ihren Bewegungen

Digitized by Google

behende, sie bedienen sich auch ihrer Vorderfüße um die Speisen zum Munde zu bringen. Diese kann man füglich in die erste Abtheilung bringen.

Bieber. Castor. Linn.

Als Unterscheidungszeichen des Biebers kann der schuppichte, fast eiförmige glatte Schwanz angenommen werden. An jedem Fuße sind fünf Zehen, die an den Hinterfüßen sind durch eine Schwimmhaut vereinigt. Die Zehe nach dem Daum hat einen doppelten und querstehenden Nagel. Die Backenzähne, deren 8 in jeder Kinnlade sind, haben ganz flache Kronen und stellen eine Reihe gleichgebildeter Knochen vor, wovon die obern an der innern Seite eine Ausschweifung und drey ähnliche an der äußern haben, bey den untern ist es gerade umgekehrt.

Die Bieber sind die gröſten Thiere der ganzen Ordnung, sie leben meist im Wasser, Schwanz und Füße sind für dieses Element gebildet und dienen vortreflich zum Schwimmen. Da sie meist von Baumrinde und andern harten Pflanzentheilen leben, so sind ihre Vorderzähne besonders stark und wachsen immer umsoviel nach als sie vorn sich abnutzen, sie bedienen sich ihrer auch, alle Arten von Bäume abzunagen und sie auf diese Art zu fällen. Groſe Drüsensäcke, welche an der Vorhaut sich öffnen, erzeugen eine starkriechende Schmiere, welche unter dem Namen des Biebergells in der Arzneykunde gebraucht wird. In beyden Geschlechtern münden die Zeugungstheile in das Ende des Mastdarms, so daß nur eine einzige äußere Oeffnung vorhanden ist.

Digitized by Google

Der gemeine Bieber. Castor. fiber.

Schreber CLXXV. Geoff. et Cuv. mammif. Livr. 6.

Rothbraun einfärbig, bald heller, bald dunkler bis zum schwarzen, es giebt auch ganz helle, selbst weiße. Der Schedel ist niedergedrückt, die sehr großen Vorderzähne sind von den Lippen nicht ganz bedeckt. Bey der genausten Vergleichung kann nicht ausgemittelt werden, ob der Amerikanische und Europäische Bieber von einander specifisch verschieden seyen. Der amerikanische Bieber ist größer, bis zu vier Fuß lang und kann an 60 Pfund schwer werden, je kälter die Gegend ihres Aufenthalts, desto dunkler der Pelz. Der Europäische ist kleiner, graulichtrothbraun.

Der Bieber ist unter allen Säugethieren dasjenige, welches am meisten Kunsttriebe hat, und in ganzen Gesellschaften vereinigt künstliche Wohnungen sich baut. Zu Anlegung eines solchen wird ein tiefes, meist laufendes Wasser, welches nicht bis auf den Grund zufriert, gewählt. Sie schneiden das Holz am Ufer so ab, daß es ins Wasser fällt und vom Wasser dahin getrieben wird, wo sie es haben wollen. Sie legen Dämme an, welche aus Aesten bestehen, welche sie durch Steine und Lehm in den Boden zu befestigen wissen, und alle Jahre verstärken, dadurch wird das Wasser in gleicher Höhe gehalten. Die Aeste schlagen oft aus und so bildet sich nach und nach ein wahres Zaun. Auf diese Dämme werden aus zwey Stockwerken bestehende Wohnungen gemacht, deren jede für zwey bis drey Familien dient; das obere Stockwerk liegt trocken und dient zur Wohnung, das untere ist zum Theil unter dem Wasser und dient zur Aufbewahrung von Rin-

den, als Vorrath auf den Winter, nur dieſes hat auch einen Ausgang unter dem Waſſer, um ſich zu retten. Auch dieſe Wohnungen beſtehen aus Baumäſten, welche in einander geflochten und mit Lehm bekleidet ſind. Neben dieſen Bauten graben die Bieber noch mehrere Löcher längs dem Ufer, in welche ſie ſich flüchten, wenn ſie angegriffen werden. Sie bewohnen ihre Baue nur im Winter, im Sommer zerſtreuen ſie ſich und leben paarweiſe. Die europäiſchen Bieber, welche man an der Donau, an der Elbe, der Weſer, der Salza, der Rhone, der Seine antrift, bauen ſelten, doch findet man auch kleine Baue zuweilen an der Elbe, wo ſie noch ziemlich zahlreich ſind.

Das treffliche Pelzwerk, welches der Bieber liefert, hat ihm viele Verfolgungen zugezogen, ſo daß ſeine Art ſich auch in Amerika ſehr vermindert hat, wo oft in einem Jahr 60 bis 80000 getödtet wurden. In Europa ſind ſie ehemals viel häufiger geweſen. Vieles, was von der Geſchicklichkeit im Bauen, vom Fällen der gröſten Bäume u. ſ. w. erzählt wird, iſt gewiß übertrieben. Die Begattung geſchieht im Frühjahr, der Wurf erſtreckt ſich höchſtens auf viere. Sie leben von den Rinden des Bieberbaums (Magnolia), der Weiden, Eſpen und anderer Bäume.

In den Steinkohlenflötzen findet man nicht ſelten neben den Ueberbleibſeln der untergegangenen Art Maſtodon, auch Zähne und Knochen eines bieberartigen Thieres *).

*) Hier iſt wohl auch Molinas Bieber aus Chili, den Illiger unter dem Namen Castor Huidobrius anführt, einzureihen, er hat keinen breiten ſchuppigen Schwanz, ſondern einen ſtark behaarten mit breitem Rücken, und etwas zuſammengedrückt, lang. Die Ohren kurz, die Augen klein, kein Biebergeil. Er

Die meisten der nun folgenden Thiere wurden von Linneus und Pallas unter dem gemeinschaftlichen Namen Maus (Mus) begriffen, darunter gehören alle Nagethiere, welche Schlüsselbeine haben, und sich durch äußere Merkmale nicht leicht von einander deutlich unterscheiden lassen, da besonders der Bau der Vorderzähne, das charakteristische Kennzeichen der ganzen Ordnung, sich ziemlich gleich ist, nur die untern sind bald mehr, bald weniger spitzig, und dies unterscheidet die Gattungen; deutlicher sind die Gattungen der Maulwurfsmäuse und Springhasen durch ihren Körperbau getrennt, die übrigen unterscheiden sich dann auch durch den Bau der Backenzähne ziemlich bestimmt in mehreren Gattungen, und so bilden sich drey kleine Gruppen.

1. Nagethiere mit prismatischen Backenzähnen, die Krone ist platt und mit Querstreifen von Schmelz durchzogen, welchen Bau man auch bey den Meerschweinchen, bey den Hasen, und sogar bey den Elephanten findet. Man kann sie mit dem gemeinschaftlichen Namen der Feldmäuse Arvicola (Campagnols) bezeichnen, alle haben 12 Backen-

---

findet sich in den tiefsten Stellen der Seen und Flüsse Chilis, kann lange unter dem Wasser aushalten, ohne zu athmen, soll Fische und Krebse fressen. Aus dem grauen, unten weißlichten Pelz macht man Hüte, welche denen aus Bieberhaaren nichts nachgeben. Alles dieses berechtigt dazu, dieses Thier zu einer eignen Gattung zu erheben, wenn es wirklich so ist, wie es Molina beschreibt, und nicht etwa ein Otter?

A. d. U.

Digitized by Google

Backenzähne, von denen jeder aus fünf oder sechs oder gar aus acht dreyeckigen Prismen besteht, welche abwechselnd zwey Linien bilden.

Ondatra. Fiber. Cuv. et Illiger.

Feldmäuse mit Schwimmfüßen, langem zusammengedrucktem schuppigem Schwanz. Es ist nur eine Art bekannt.

1. Die Zibetmaus. Fiber Zibeticus.

L'Ondatra, Rat musqué du Canada. Schreb. CLXXVI.

Größe fast wie eine Katze, oder großes Kaninchen; der Pelz grauröthlicht. Baut im Winter oft unter dem Schnee eine Erdhütte aus Binsen und Lehm, mit mehreren Ausgängen, auch unter das Eis. Die Form der Hütten ist wie ein Bienenkorb. Leben im Sommer von Kräutern, im Winter von Wurzeln, besonders der Seeblumen, des Kalmus und anderer Wassergewächse. Wenn die Kälte die Ausgänge verstopft, sollen sie zuweilen einander auffressen. Die Gewohnheit zu bauen, nähert sie den Biebern. Vor dem Schaambein inwendig bey beyden Geschlechtern sind zwey birnförmige Balgdrüsen mit Ausführungsgängen, welche eine milchartige starkriechende Feuchtigkeit absondern. Die Eichel soll vier kleine Knöchelchen haben. Der Pelz ist weich und gut.

In Canada.

Gemeine Feldmäuse. Arvicolae. Lacep. Hypudaeus. Illig. (compagnols.)

Der Schwanz kurz behaart, fast von der Länge des Körpers.

1. Wasserratte. Hypudaeus amphibius. Schreb. CLXXXVI.

Von der Größe der Hausratte, dunkel graubraun. Der Schwanz von der Länge des Körpers. Lebt mehrentheils am Ufer der Flüsse und Bäche, und gräbt sich im sumpfigen Boden Löcher; sie schwimmt ordentlich, tauchet aber schlecht. Sie lebt von Pflanzenwurzeln der Wasserpflanzen, auch von den Larven der Wasserinsekten. Oft trift man sie auch weit vom Wasser an, schlaft nicht im Winter, und schadet sehr den Gartengewächsen.

Im mittlern Europa.

2. Erdmaus. Hyp. terrestris.

Kleiner als die vorige und ganz bestimmt von ihr verschieden, mehr der Wurzelmaus verwandt. Die Ohren kurz, rund im Pelz verborgen, die Augen sehr klein, vornen vier, hinten fünf Zehen. Der Schwanz etwa ein Drittheil so lang als der Körper, die Farbe graurothlicht, unten grau. Sie bewohnt hauptsächlich die Wiesen und Gärten, gräbt sich tief ein, mehrere Gänge führen zum Hauptzimmer; in einer Nebenhöhle sammelt sie bedeutende Wintervorräthe von Nüßen, Wurzeln und dergleichen, macht Erdhaufen wie der Maulwurf, wird daher Stoßmaus oder Reutmaus genannt, wirft jährlich zweymal sieben bis neun Junge, und thut an Gartengewächsen und jungen Bäumen, deren Wurzeln sie benagt, großen Schaden.

Sie findet sich allenthalben in der Schweiz, wo die eigentliche Wasserratte wahrscheinlich nicht gefunden wird.

3. Wurzelmaus. Hyp. oeconomus.
Schreb. CXC.

Größer als die kleine Feldmaus, ihr sonst sehr ähnlich, oben röthlichtgrau, unten weißgrau; bewohnt Erdlöcher in Form eines Backofens, mehrere enge Gänge laufen unter dem Rasen zur Hauptkammer, in einer zweyten Höhlung legt sie ihren Wintervorrath an. Sie macht oft Wanderungen in ganz ungeheuren Schaaren. Man findet sie in ganz Sibirien. Eine ähnliche Maus findet sich in der Schweiz und in einigen Gegenden Frankreichs, sie scheint aber von der Erdmaus wenig verschieden zu seyn.

4. Kleine Feldmaus. Hyp. arvalis.
Compagnol. Schreb. CXCI. Springmaus.

So groß wie eine Hausmaus, rothgrau, der Schwanz kürzer als der Körper. Lebt in Feldern in Löchern, mit vielen obeflächlichen Gängen, sammelt Wintervorräthe, vorzüglich Getraide, an welchem sie sehr großen Schaden thut und zur Landplage werden kann.

In ganz Europa.

5. Reutmaus. Hyp. gregalis. Pall.
Schreb. CLXXXIX.

Kleiner als die Hausmaus, Schwanz und ein Drittheil des Leibes braunroth, unten weißlicht.

Nördliches Europa.

6. Röthlichte Maus. Hyp. rutilus. Pall.
Schreb. CLXXXVIII.

Schwanz halb so lang als der Körper, dunkel. Pelz gelbroth, unten weißlicht, an den Seiten gelblicht.

Digitized by Google

Im nördlichen Sibirien, vom Obi bis Kamtschatka, auch in Daurien.

7. Zwiebelmaus. Hyp. alliarius. Pall. Schreb. CLXXXVII.

Grau ins röthlichte spielend, Füße und Schwanz unten weiß, die Ohren etwas groß. Lebt von Zwiebeln.

In Sibirien am Jenisey und andern Flüssen.

8. Tulpenmaus. Hyp. socialis. Pall. Schreb. CXCII.

Der Schwanz kurz, Ohrränder und Füße weiß, das Haar weich, oben blaß graugelblicht, unten weißgrau.

Auf den Steppen an der Wolga, am Caspischen Meer.

9. Schwertelmaus. Hyp. Lagorus. Pall. Schreb. CXCIII.

Kleiner als die Feldmaus, der Schwanz dick und sehr kurz, graugelb, unten weiß, ein schwärzlichter Streif über den Rücken von der Schnauze an.

Im Sand am Irtisch, Jenisey, Jaick.

10. Sandmaus. Hyp. glareolus. Pall. Schreb. CXC. B.

Zimmetbraun, unten grau.

Im Sand auf der Insel Laland *).

---

*) Molina führt drey Arten Mäuse an, welche vielleicht hieher gehören, wenn diesem Schriftsteller überhaupt zu trauen ist, nemlich:

Graublaue Maus. Mus cyanus.

Oben grauröthlichblau, unten weiß. In Chili in Höhlen, soll Wintervorrath machen.

Digitized by Google

11. Lemming. Hyp. Lemnus. Schreb. CXCV. A.

Von der Größe einer Ratte, der Pelz rothgelb ſchwarzgefleckt und geſtreift oben, unten gelbweiß, Füße ſehr kurz. Dieſe Art iſt wegen ihrer Wanderungen ſehr berühmt, welche ſie von Zeit zu Zeit, jedoch nicht regelmäßig in unzählbaren Schaaren beginnen. Sie gehen dann immer in gerader Richtung über Flüße und Seen, über Felſen und Berge, und laſſen ſich durch nichts von ihrem Wege abbringen; auf ihrem Wege freſſen ſie alles Grüne weg. Sie bewohnen die Gebirge Lapplands und die Gegenden längs dem Eismeer.

12. Wandermaus. Hyp. migratorius. Illig. Schreb. CXCV. B.

Rothgelb ungefleckt. Im rußiſchen Lappland und im nördlichſten Sibirien, vom weißen Meer bis an den Obi, wandern vom Ural gegen den Jeniſey.

Wollige Maus. Mus laniger.

Aſchfarb, ſehr langhaarig, das Haar wollig und fein, kann geſponnen werden. Dieſe Maus lebt unter der Erde im nördlichen Chili von Zwiebeln.

Große Chiliſche Waldmaus. Mus maulinus.

Doppelt ſo groß als ein Murmelthier, mit ſpitzigen Ohren, Farbe und Haare wie beym Murmelthier, die Schnauze länglicht, Schwanz lang und haarig. In der Provinz Maule in Chili (chinchilla).

Digitized by Google

12. Uralmaus. Hyp. torquatus. Pall.
Schreb. CXCIV.

Oben roſtfarben, mit weißem Halsband, ſchwarzem Rückenſtreif, weißem Unterleib, vorn fünf Klauen. Am Obi, wandern wie der Lemming.

Scharrmaus. Georhychus. Illig.

Die Vorderzähne meiſelförmig, vorn breit, Backenzähne auf jeder Seitt drey gleich große. Die Schnauze vorn abgeſtumpft, die Naſe breit und knorplig. Die Augen klein, entweder keine äußern Ohren, oder blos undeutliche Ränder um den Gehörgang, die Füße fünffingerig.

Am Cap.

1. Maulwurfs-Scharrmaus. Georych. talpinus.
Schreb. CCIII.

Von der Größe der Waſſerratte, vorn ſtarke Grabfüße, Pelz rothgelb. Nahrung Wurzeln. Im gemäßigten Rußland, von der Oka bis nach Aſtrakon.

2. Der Zokor. Georych. aspalax.
Schreber CCV.

Hell graurothlicht, die drey mittlern Nägel an den Vorderfüßen lang und gebogen, zuſammengedrückt und ſchneidend zum Ausgraben der Wurzeln; die Füße ſehr kurz, der Schwanz ſehr klein. Lebt immer unter der Erde wie der Maulwurf, und nährt ſich von Zwiebeln der verſchiedenen Liliengewächſen.

In Sibirien.

Digitized by Google

3. Hutſoniſche Scharrmaus. Georych. Hudsonius.

Schreb. CXCVI.

Hat ſtatt dem Daum nur eine Daumwarze am Vorderfuß. Hellperlgrau, ohne Schwanz und äußere Ohren. Die mittlern Zehen am Vorderfuß ſind wie mit doppelten Nägeln bewaffnet, da die Haut an der Spitze der Zehe ſchwielig iſt, eine Bildung, welche man an keinem andern Thier bemerkt hat. Sie hat die Größe einer Ratte und lebt in Nordamerika *).

Mäuſe, deren Backenzähne ſich an ihrer Baſis in Wurzeln theilen, deren platte Krone aber immer noch abwechſelnde erhöhete und vertiefte Längslinien zeigen. Sie freſſen hauptſächlich Getreide.

Stachelratte. Echimys Geoff. Loncheres. Illiger.

Vier Backenzähne auf jeder Seite, die untern zeigen auf ihrer Krone vier Längslinien, von denen zwey und zwey vereinigt ſind, die obern haben nur drey Linien, zwey ſind vereinigt. Es ſind amerikaniſche Thiere, die Form gleicht unſerer Ratte, ſie haben rauhe, platte, breite Haare, welche mit einer harten Spitze ſich endigen, und ſo wahre platte Stacheln, wie Degenklingen geſtaltet, bilden. Die Oberlippe iſt geſpalten.

---

*) Herr Cuvier zählt dieſe Mäuſe zu den Lemmings, denen ſie nahe verwandt ſind, führt aber beym Lemming den Namen Georychus Illiger an, welcher den Lemming zu Hypudaeus reihet. A. d. U.

Digitized by Google

1. Gelbgeschwänzte Stachelratte. Loncher. chrysur.

Hystrix chrysurus. Schreb. CLXX. B.

Fast so groß wie ein Kaninchen, kastanienbraun, der Bauch weiß, über den Rücken längere Haare, auf dem Kopf ein weißer Streif, die Hälfte des Schwanzes gelb.

In Gujana.

2. Rothbraune Stachelratte. Lonch. rufus.

Rat épineux Azara.

So groß als eine Ratte, graurothbraun, Schwanz kürzer als der Körper. In Paraguay und Gujana. Es gräbt lange unterirdische Röhren.

3. Strohgelbe Stachelratte. Lonch. paleacea. Illiger.

Oben und unten bräunlicht okergelb, Schnauze und eine Binde am Kopf weiß. Der Schwanz so lang als der Körper, langhaarig, an der Wurzel braun.

In Brasilien. (Berliner Museum).

4. Abweichende Stachelratte. Loncher. anomala. Kuhl.

Loncher myosurus. Lichtenstein.

Der Schwanz länger als der Körper, an der Schwanzspitze ein Büschel borstiger Haare. Oben schwarzgelblicht, mitten auf dem Rücken braun ins purpurfarbe spielend, unten weißlicht. Auf dem Rücken stachlig, am Bauche haarig. Ohren länglicht. Brasilien?

Digitized by Google

Schlafmäuse. Myoxus.

Sie haben ebenfalls vier Backenzähne, durch Längsstreifen auf ihren Kronen bezeichnet; aber das Haar ist weich, nicht stachlig, der Schwanz behaart, bey einigen langhaarig. Sie leben auf Bäumen, nähren sich von Früchten, und bringen in unserm Clima den Winter in einem erstarrenden Schlafe zu. Sie haben keinen Blinddarm, wie sonst alle Arten von Nagern.

1. Siebenschläfer. Bilch. Myoxus glis. Le Loir. Schreber CCXXV.

Von der Größe einer Ratte, oben schön aschgrau, unten weiß, um die Augen dunkler. Die Ohren rund, ziemlich groß, der Schwanz stark behaart, die Haare zu beyden Seiten getheilt wie beym Eichhörnchen. Er lebt in den Wäldern des mittlern und wärmern Europa, klettert geschickt auf Bäume, schläft im Winter in Baumlöchern, und legt Magazine an, da er im Winter bey warmer Witterung erwacht, wird im Herbst sehr fett, und in Italien häufig gegessen; die Alten mästeten das Thier ordentlich in eigenen Gebäuden.

2. Große Haselmaus. Myox. Nitela. Lerot. Schreb. CCXXVI.

Oben rothbraun graulicht, durch die Augen geht ein schwarzer Streif bis unter die Ohren und nach der Schulter, um die Augen ein schwarzer Kreis, unten graulicht, der Schwanz dünne, nur am Ende stark behaart, und dort schwarz, mit weißer Spitze.

Im wärmern und mittlern Europa, kleiner als der Bilch.

Digitized by Google

3. Eichelschläfer. Myox. Dryas.
Schreb. CCXXV. B.

Fast in der Farbe wie der vorige, durch die Augen geht der schwarze Strich, bis oben an die Ohren, der Schwanz schwärzlicht und buschig, wenig vom vorigen verschieden.

Im nördlichen Asien an der Wolga bis nach Georgien.

4. Haselschläfer. Myox. muscardinus.
Muscarden. Schreb. CCXXVII.

Etwas größer als die Hausmaus, gelbroth mit langem haarigem Schwanz, großen schönen Augen. In Haselgebüschen im mittlern Europa, lebt hauptsächlich von Haselnüssen und Sämereyen, ist sehr empfindlich für die Kälte, und erstarrt selbst mitten im Sommer bey kühlen Nächten. Baut ein artiges Nestchen von Laub und Moos.

? 5. Der Degu. Myox. Degus. Molina.

So groß wie eine Ratte, braungelb, Schwanz buschig, von den Schultern bis zum Ellbogen eine schwarze Linie. In Chili in Gebüschen unter der Erde, leben von Wurzeln und Früchten; erstarren nicht. (Ungewisse Art).

Mäuse, deren Backenzähne mehr oder weniger höckerig sind, und nicht so reguläre Streifen haben. Sie sind nicht so bestimmt an Pflanzennahrung gebunden und bilden mehrere Gattungen.

Schwimmmaus. Hydromys.

An den hintern Füßen sind die drey innern Zehen mit einer Schwimmhaut verwachsen, die äußere Zehe ist frey. Die Krone der Backenzähne bildet ein schiefes Viereck und ist in der Mitte wie ein Löffel ausgehöhlt.

Digitized by Google

1. Der Coypu. Hyd. Coypus. Molina.
Quouiya Azara.

Faſt von der Größe des Fiſchotters. Der Schwanz dick, ſchuppig, faſt nackt, der Pelz kaſtanienbraun, Seiten rothbraun, unten hellgrau, Schnauze und Schnurrbart weiß, Vorderzähne wachsgelb. Lebt in Erdhöhlen, an den Ufern der Flüſſe in Chili und einem großen Theil des wärmern Amerika, ſein Pelz mit langen weichen und kürzern ſehr feinen Wollhaaren bekleidet, wird zu tauſenden nach Europa gebracht und die Haare zu Hüten benutzt; er gleicht in der Geſtalt und Farbe in etwas dem Capywara. Lebt von Wurzeln und Waſſerpflanzen, wird leicht zahm.

2. Weißbauchige Schwimmmaus. Hydr. leucogaster. Geoff.

Doppelt ſo groß als die Wanderratte, braun, unten ſchmutzig weiß, hinten halbe Schwimmhaut, Schwanz zum Drittheil weiß.

Inſel Maria in Neuholland.

3. Goldbauchige Schwimmmaus. Hyd. chrysogaster. Geoff.

Der Pelz kaſtanienbraun mit kurzen ſehr weichen Haaren, der Bauch ſchön gelb, Schwanz an der Wurzel ſchwarz, am Ende weiß, mit kurzen ſteifen Haaren. Auf den Inſeln im Canal Entrecaſteaux in Neuholland *).

*) Cuvier giebt als das Vaterland bey der Gujana an, Oken nennt als ſolches Neuholland, das letztere ſcheint richtig zu ſeyn. Der Coypu iſt vielleicht cast. huidobrius Illig? A. d. U.

Digitized by Google

Maus. Ratte. Mus.

Drey Backenzähne mit stumpfen Höckern auf jeder Seite, der vordere ist der gröste; der Schwanz ist lang und schuppig. Diese Thiere schaden unserer Oekonomie durch ihre Gefräßigkeit, mit welcher sie alle Arten von Nahrungsmitteln verzehren, und durch ihre außerordentliche Vermehrung.

1. Die Hausmaus. Mus musculus. Linn. Schreber CLXXXI.

Graurothlicht, fast in der ganzen Welt verbreitet und allgemein bekannt, nicht selten weiß, seltener gescheckt.

2. Die Hausratte. Mus Ratus. Linn. Schreb. CLXXIX.

Eben so bekannt, eben so weit verbreitet, den Alten soll sie unbekannt gewesen und erst im Mittelalter nach Europa gekommen seyn. Sie ist beynahe dreymal so groß als die Hausmaus, dunkelgrau, lebt gesellschaftlich, und vermehrt sich wie die Hausmaus sehr stark, sie ist in sehr viele Länder erst durch europäische Schiffe gekommen, z. B. nach dem Vorgebirg der guten Hoffnung und nach Südamerika, in Nordamerika sollen sie einheimisch gewesen seyn.

3. Wanderratte. Mus decumanus. Linn. Surmulot. Schreb. CLXXVIII.

Hat sich aus ihrem Vaterland wahrscheinlich Indien oder Persien gegen die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts über ganz Europa verbreitet, die kältesten Gegenden ausgenommen. Die Wanderratte ist fast um ein Drittheil größer als die Hausratte und noch viel gefräßi-

Digitized by Google

ger und schädlicher, im Sommer auf den Feldern und an den Ufern der Flüsse und Bäche, im Winter ziehen sie sich in die Häuser. Die Farbe braunröthlicht.

4. Der Karako. Mus Caraco. Pall. Schreb. CLXXVII.

Der Kopf ist schmal und ungewöhnlich lang, die Ohren groß und eiförmig. Größer als die Wanderratte, der Schwanz etwas kürzer, die Kinnladen stärker, die Farbe heller. Im östlichen Sibirien und China.

5. Große Indische Maus. Mus giganteus. Hardwicke. Linnean Trans. VII. XXVIII.

So groß wie ein Murmelthier, außerdem ganz die Gestalt der Ratte, bräunlichtschwarz. In Ostindien.

6. Waldmaus. Mus sylvaticus. Linn. Schreb. CLXXX. Mulot.

Von der Größe der Hausmaus, oben brandgelb, Seite und Bauch weiß. In Feldern, Wäldern und Häusern des mittlern Europa.

7. Brandmaus. Mus agrarius. Pall. Schreb. CLXXXII.

Etwas kleiner als die vorige. Das Haar fein und weich rothgelb, der Schwanz halb so lang als der Leib, dichter behaart als an der Hausmaus.

Hin und wieder in Feldern im mittlern Deutschland, häufiger in Rußland.

Digitized by Google

8. Zwergmaus. Mus minutus. Pall.
Schreb. CLXXXIII.

Halb so groß als die Hausmaus, die Ohren sehr klein, oben brandgelb, unten graulicht weiß.

Häufig in Rußland.

9. Rüßelmaus. Mus soricinus. Hermann.
Schreb. CLXXXIII. B.

Die Schnauze spitzig, der Schwanz fast so lang als der Körper, halb so groß als die Hausmaus, oben grauröthlicht, unten weiß, die Ohren hervorragend mittelmäßig.

Selten im mittlern Deutschland.

10. Streifmaus. Mus vagus. Pall.
Schreb. CLXXXIV. Fig. 2.

Etwas größer als die Rüßelmaus, die Ohren ziemlich groß und kahl, der Rücken hellgrau mit schwarzen Haaren vermengt, ein schwarzer Streif über den Rücken, der Schwanz länger als der Körper. Unterkörper und Füße weißlicht.

In Sibirien zwischen dem Jaik, Irtisch und Obi auf Steppen.

11. Birkmaus. Mus betulinus. Pall.
Schreb. CLXXXIV. Fig. 1.

Von der Größe der Zwergmaus, oben braungelb mit einem schwarzen Rückenstreif, der Schwanz viel länger als der Leib.

In Birkengehölzen in Sibirien.

Digitized by Google

12. Perlmaus. Mus striatus. Pall.

Halb so groß als die Hausmaus, bräunlicht, mit zwölf weißen punktirten Linien längs dem Rücken, unten weißlicht, der Schwanz so lang als der Leib, fast kahl.

Ostindien? (Unbestimmte Art).

13. Gestrichelte Maus. Mus barbarus. Linn.

Kleiner als Hausmaus, dunkelbraun mit zehn weißen Linien auf dem Rücken, unten weißlicht.

14. Klippmaus. Mus saxatilis. Pall.

Schreb. CLXXXV.

Größer als Hausmaus, die Ohren eiförmig vorstehend, oben dunkelbraun gelblich überlaufen, Seiten heller, Unterleib weißgrau, Schwanz kaum halb so lang als der Leib.

Oestliches Sibirien.

15. Kleine Maus. Mus pumilio.

Von der Größe der Zwergmaus, graubraun, Kopf schwarz, vier schwarze Rückenlinien. In Afrika. (Nicht ganz bestimmte Art).

16. Malabarische Maus. Mus malabaricus.

Fast wie die Wanderratte, aber viel plumper, Ohren rund und nackt, Pelz grau, die äußere Zehe an den Hinterfüßen kürzer. Nicht mit völliger Gewißheit bestimmt.

Ostindien.

Digitized by Google

17. Maus von Cairo. Mus cahirinus. Geoff. Hat auf dem Rücken Stacheln statt der Haare. Egypten *).

Rothnasige Maus. Mus pyrrhorhinos. Princ. Max.

Sie ähnelt der großen Feldmaus, ist aber größer, der Körper ist 4 Zoll 6 Linien lang, der Schwanz $7\frac{3}{4}$ Zoll. Die Ohren sind beynahe nackt, roströthlicht, der lange Schwanz schuppig, an den Ringen mit Borsten besetzt. Der Körper oben graugelblicht gemischt, unten weiß, die Nasenspitze lebhaft rostroth fast bis zum Auge.

In Brasilien bey Bahia.

Die Bubo-Maus. Mus dosytrichos. Pr. Max. Rato bubo.

Körper dicht behaart, besonders der etwas dicke Kopf, der Schwanz kürzer als der Körper, mit Schuppenringen und Borsten. Der Körper 3 Zoll 2 Linien, der Schwanz $2\frac{1}{2}$ Zoll. Augen klein, Ohren kurz abgerundet, ziemlich behaart und im Pelz fast versteckt, die Farbe schwarzbraun, unten

*) Alle übrigen von Illiger unter diesem Geschlecht angeführten Arten, nemlich americanus, colonus, virginianus, mexicanus, capito, buccinatus, physodes, rutilans, nigripes, laucha aus Amerika, pilorides und indicus aus Asien, sind in Hinsicht der Gattung, wozu sie gehören, noch unbestimmt, Oken rechnet mexicanus (weißlicht rothgestreift, und virginianus (ganz weiß) laucha (braungrau, unten weißlicht), zu Hypudaeus. A. d. U.

unten blaßröthlicht graugelb. Das Haar sehr dicht, sanft und lang. Die untern Vorderzähne zugespitzt.

In Brasilien, wie die vorige vom Prinz von Neuwied entdeckt.

Hamstermäuse. Cricetus.

Sie haben denselben Zahnbau wie die Mäuse, aber der Schwanz ist kurz behaart, daneben haben sie Backentaschen, wie einige Affen, in welchen sie Körner verbergen können, um dieselben in ihre Magazine zu tragen. Sie erstarren im Winter; doch nicht alle Arten.

1. Gemeiner Hamster. Cric. vulgaris.

Schreb. CXCVIII. A. B. Geoff. et Cuv. Livr. 8.

Etwas größer als eine Ratte, oben rothbraun, Unterleib schwarz; eben so die Seiten mit drey weißlichten Flecken, die Füße weiß, unter der Gurgel und an der Brust ein weißer Fleck, zuweilen ganz schwarz, Ohren rund, die Daumwarze mit kurzem Nagel. Die Backentaschen bilden zwey große Blasen, gehen bis hinter die Mitte des Halses, öffnen sich vorn gegen die Backenzähne durch ein Loch. Eine Blase hält an drey Loth Körner. Dieses sehr schädliche Thier lebt in ungeheurer Menge in den ebenern Gegenden Sachsens, Thüringens, aber auch in Polen, Ungarn, Sklavonien. Grabt unter der Erde seine Vorrathskammern und seine Wohnung, und legt große Magazine von allerley Getreide an, es vermehrt sich ganz außerordentlich und ist eine wahre Landplage. Es ist ein sehr beißiges zorniges Thier, lebt mit keinem andern Geschöpf im Frieden, nicht einmal, außer der Begattungszeit, mit seinem

Weibchen, sie kämpfen auf Leben und Tod und das Ueberwundene wird vom Ueberwinder aufgefressen. Ihr Winterschlaf ist eine wahre Erstarrung, in welcher sie die ganze kalte Jahreszeit durch liegen, sie tritt jedoch nur dann ein, wenn das Thier vor der äußern Luft geschützt in seiner Höhle begraben liegt, in Zimmern dagegen niemals vollkommen. Alle Verrichtungen, selbst die Circulation, scheinen in diesem Zustand stille zu stehen, und der Zustand der Erstarrung sich sogar auf die Haare auszudehnen, welche steif werden.

2. Der Blasenhamster. Cric. bursarius. Shaw. Linnean Transact. Saccophorus bursarius. Kuhl.

Größer als der Hamster, grau, seine Backentaschen sollen, wenn sie voll sind, aus dem Maule heraustreten und größer als der Kopf seyn. Er hat vorn fünf Zehen, die drey mittlern sind sehr lang und zum Graben geschickt, hinten auch fünf, der Schwanz ist kurz, wenig behaart.

In Canada *). Im Pariser Museum.

3. Der fleckige Hamster. Cric. songarus. Pall. Schreber CCI.

Etwas größer als eine Hausmaus, der Schwanz sehr

*) Hierher gehört wahrscheinlich der Hamster aus Virginien. Cric. virginianus Demarest. Halb so groß als eine gemeine Ratte, und von derselben Farbe. Die Nase kurz, mit kleinen Bartborsten, Backentaschen. Die vordern Füße fast wie am Maulwurf mit mehr als Zoll langen Nägeln, der Schwanz kurz, fast nackt. Der Pelz stark behaart mit langen Haaren. Lebt unter der Erde in Georgien, wirft Hügel auf und genießt nichts als Wurzeln.

Digitized by Google

kurz, grau, ein schwarzer Rückenstreif läuft vom Nacken an über den Rücken, die Seiten sind weißlicht gefleckt, braun eingefaßt. Kein Daumennagel, leben von Wurzeln.

In Steppen am Irtisch.

4. Die Reißmaus. Cric. Phaeus. Pall. Schreb. CC.

Größer als die vorige, oben hellgrau mit eingemengten schwarzen Haaren, Unterleib und Füße weiß, der Schwanz sehr kurz. Daum ohne Nagel.

In den Sibirischen Steppen und in Gilan.

5. Die Sandmaus. Cric. arenarius. Pall. Schreb. CXCIX.

Von der Größe der vorhergehenden, oben heller grau, Seiten, Bauch und Füße weiß, der Schwanz fast dreymal so lang als bey der Reißmaus.

In den sandigen Steppen am Irtisch.

6. Die Jaikmaus. Cric. accedula. Pall. Schreb. CXCVII.

Der Leib kurz und dick, die Füße kurz, die vordern mit vier Zehen und einer Daumwarze, die hintern fünfzehig, die Ohren abgerundet, hinten ausgeschweift. Der Mund weiß, die Ohren bräunlicht, der Rücken gelbgrau, unten weißgrau.

Am Jaik.

7. Die Obmaus. Cric. Furunculus. Pall. Schreb. CCII.

Oben röthlichtgrau, über den Rücken ein schwarzer

Streif, unten weiß, der Schwanz grau, etwa ein Viertheil des Körpers lang.

Am Ob und in Dauurien.

Springmaus. Dipus. (gerboises).

Sie haben denselben Zahnbau wie die Mäuse, der Schwanz ist lange, am Ende dicht behaart, der Kopf breit, die Augen groß und vorspringend, die Hinterschenkel außerordentlich lang wie bey den Kengurus, die Vorderfüße sehr kurz, daher hat man sie auch Zweyfüße genannt. Sie bewegen sich auch meist blos durch die Hinterfüße durch Sprünge oder Hüpfen. Die Vorderfüße haben fünf Zehen, der Mittelfuß der drey Mittelzehen des Hinterfußes bildet einen einzigen Knochen, wie bey den Vögeln; bey einigen Arten finden sich zwey kleine Seitenzehen, der Unterkiefer viel kürzer und schmäler, Backenzähne vier, bey einigen unten nur drey. Die Lippe gespalten, die Ohren lang oder kurz. Säugewarzen zwey bis vier. Sie leben in Erdhöhlen und fallen in erstarrenden Winterschlaf.

1. Der Gerboa. Dip. bipes.

Oben mausefahl, unten weiß, von der Größe einer Ratte, der Schwanz neun Zoll, der Leib drey und einen halben Zoll. Hinten drey Zehen, der Schwanzbusch weiß. Die Ohren sehr lang, doppellappig und kahl, die Augen groß. Die Fußwurzel nackt, an den Hinterfüßen ein kleiner Sporn. Lebt in Erdhöhlen in der ganzen Barbarey, bis Egypten.

Digitized by Google

2. Der asiatische Gerboa. Dip. sagitta *).

Sechs Zoll lang, der Schwanz so lang als der Leib, das Haar lang, gelblichtweiß, die Schwanzquaste schwarz, die Spitze weiß, die Ohren haasenartig.

Am Caspischen Meere und bis nach Sibirien und Europa.

3. Der Sibirische Springer. Dip. jaculus. Pall. Alaktaga. Schreb. CCXXVIII.

Hat an den Hinterfüßen zwey kleine Seitenzehen, die Ohren sind länger als am vorhergehenden, die Farbe fast eben so. Pallas hat solche gesehen von der Größe eines Kaninchens, bis zur Größe einer Ratte. Vielleicht verschiedene Arten?

In Sibirien.

4. Der Canadische Springer. Dip. canadensis.

Die Ohren kurz, hinten fünf Zehen, die äußern sehr kurz. Pelz gelblicht, etwas größer als die Hausmaus. Ist sehr lebhaft und macht gewaltige Sprünge bis zu zwölf Fuß. Ueberwintert in der Erde in einem Lehmballen und schläft vom Oktober bis May. Der Schwanz hat keine Quaste. In Canada.

---

*) Cuvier bringt diesen und den folgenden zu einer Art, allein Jäger und Oken trennen sie mit Recht von einander. Ersterer führt auch noch unter den asiatischen Arten Dipus halticus, und unter den afrikanischen Dipus abyssinicus und Locusta als eigenen Arten auf, und trennt dann ferner Dipus pygmaeus von Dipus Jaculus. Es herrscht noch viele Verwirrung bey dieser Gattung. Dipus indicus gehört wohl eher zu Meriones.

Digitized by Google

5. Indischer Springer. Dip. indica.

Linnean transactions Tom. VIII. p. 279.

Vorn vier, hinten fünf Zehen, der Schwanz lang, am Ende mit brauner Quaste, der Körper rothgelb, mit braunen Linien. In Hindostan.

Schenkelthier. Meriones.

Backenzähne sechs in jeder Kinnlade. Die Schnauze spitzig, die Lippe gespalten. Die Ohren halb so lang als der Kopf, der Schwanz mittelmäßig, etwas geringelt mit anliegenden Haaren. Die Vorderfüße viel kürzer, mit vier Zehen und einer Daumwarze mit Nagel, die Hinterfüße dreymal so lang als die Vorderfüße, stärker, fünfzehig. Die Nägel gebogen, mittelmäßig lang.

1. Dünnschwänziges Schenkelthier. Meriones meridianus. Pall.

Schreb. CCXXXI.

So groß wie eine Hausmaus, der Schwanz dünne, von der Länge des Körpers. Pelz röthlicht graugelb, unten weißlicht.

Am Caspischen Meere und in Egypten.

2. Tamariskenmaus. Merion. tamaricinus. Pall.

Schreb. CCXXXII.

Größer als eine Ratte. Oben gelbgrau, an den Seiten blässer, unten weiß, eben so um Nase und Ohren. Die Ohren haben eine Klappe, der Hodensack groß. Der Schwanz ist dunkler und heller geringelt.

Am Caspischen Meere, wo es viele Tamarisken giebt.

Digitized by Google

3. Der Gerbillus. Mer. gerbillus.

Von der Größe der Hausmaus, vorn und hinten fünf Zehen, oben gelblich, unten weiß.

Egypten.

4. Hudsonisches Schenkelthier. Mer. hudsonius.

Größer als Hausmaus, oben dunkelbraun, unten weiß, vorn kein Daumennagel.

An der Hudsonsbai und in Labrador.

5. Schenkelthier mit weißer Schwanzspitze. Mer. apicalis. Illig.

Mit sehr kurzen Ohren. Das Haar glänzend, oben bräunlicht, unten gelbweiß, der Schwanz bis zur Mitte braun, an der Spitze weiß, zugespitzt, mit groben anliegenden Haaren besetzt. Von der Größe der Wanderratte. Aus Ostindien. (Im Berliner Museum).

6. Mausartiges Schenkelthier. Mer. musculus. Kuhl.

Gleicht den Mäusen und macht von den Schenkelthieren den Uebergang zu diesen, von der Größe der Hausmaus, oben rothgelb, unten weißgraulicht, die Ohren groß, wenig behaart, Schwanz so lang als der Körper und buschig.

Aus Brasilien. (Berliner Museum).

Blindmaus. Spalax. Güldenstedt.

Der Zahnbau ist wie bey den Hamstern und Springmäusen, aber die Vorderzähne sind so groß, daß sie von den Lippen lange nicht bedeckt werden, die untern sind meisselförmig, mit geradliniger Schneide. Die Füße ha-

Digitized by Google

ben fünf kurze Zehen und fünf platte stumpfe Nägel; der Schwanz fehlt, die äußern Ohren ebenfalls. Sie leben unter der Erde, graben wie die Maulwürfe, obschon ihre Füße dazu weniger geschickt sind, sie werfen Haufen auf wie diese, nähren sich aber blos von Wurzeln, das Auge ist so klein, daß man es von außen nicht sieht.

1. Die Blindmaus. Spalax Typhlus. Pall.

Zemni, Slepez, Rat-Taupe aveugle. Schreb. CCVI.

Hat von außen gar keine sichtbare Oeffnung für das Auge, wenn man aber die Haut wegnimmt, so bemerkt man ein sehr kleines schwarzes Kügelchen, welches das Auge ausmacht, welches aber nicht sehen kann, da die Haut keine Spalte hat, und an der Stelle der Augen ganz so behaart ist, wie an andern Orten des Gesichts. Dieses sonderbare Thier bekommt durch seinen großen an den Seiten eckigen Kopf, durch seine kurzen Füße, durch den Mangel des Schwanzes ein sehr unförmiges Ansehen. Es ist fast so groß wie eine Ratte, der Pelz röthlichtgrau. Es lebt im östlichen Europa und dem angrenzenden Asien bis nach Persien.

Sandgräber. Bathyergus. Illiger. Orycteré. Cuvier.

Gestalt, Füße und abgestutzte Vorderzähne wie bey der Blindmaus, aber oben und unten stehen acht Backenzähne, die hintern tief an der äußern Seite ausgeschweift; das Auge, obwohl klein, ist sichtbar, und sie haben einen kurzen Schwanz.

Digitized by Google

1. Der Sandmoll. Bath. maritimus. Schreb. CCIV. B.

Grauweißlicht, von der Größe eines Kaninchens, der Schwanz zweyzeilig behaart, gräbt tief und unterhöhlt den Boden sehr weit, so daß Menschen und Vieh einsinken. Sie leben hauptsächlich von Zwiebelgewächsen am Cap.

2. Der Bleßmoll. Bath. capensis. (Georych. capensis. Illig.)

Schreb. CCIV. Die Färbung ist aber ganz falsch.

Gesicht, ein Punkt um die Augen und Ohrengegend weiß oder weißgrau, Stirn und Hinterkopf schwarz, der übrige Körper röthlichtgrau, der Bauch grau, der Schwanz sehr kurz. Das Thier ist etwa 6 Zoll lang.

Am Cap.

Hüpfer. Helamys. F. Cuvier. Pedetes. Illig. Lievres sauteurs.

Sie gleichen sehr den Springmäusen (Dipus) durch den breiten Kopf, großen Augen, langen Schwanz, kurzen Vorderfüßen und sehr langen Hinterfüßen, obschon die Ungleichheit weniger auffallend ist als bey den wahren Springmäusen. Sie haben acht Backenzähne in jeder Kinnlade, welche gefaltet sind und aus zwey Theilen zu bestehen scheinen, an den Vorderfüßen fünf gleich lange Finger mit sehr langen spitzigen Nägeln, an den Hinterfüßen vier, alle getrennt, selbst die Knochen des Mittelfußes, und mit breiten stumpfen Nägeln, fast hufenähnlich versehen. Diese Zahl der Zehen ist gerade im umgekehrten Verhältniß als bey den meisten Mäusen. Die untern Vorderzähne sind meisselartig, nicht spitzig, wie bey den wahren Springmäu-

Digitized by Google

ſen und allen übrigen Mäuſen, den Maulwurfsmäuſen ausgenommen.

1. Capiſcher Hüpfer. Helamys. cafer. Schreber CCXXX.

So groß wie ein Kaninchen, oben hellrothgelb, der Schwanz etwas länger als der Körper, ſehr langhaarig, buſchig, mit ſchwarzem Ende. Soll zwanzig bis dreyßig Fuß weit ſpringen. Frißt Wurzeln, Getreide, ſchläft in der naſſen Jahreszeit, kann gezähmt werden und wird gegeſſen. Am Cap.

Murmelthiere. Arctomys. (Marmottes).

Die untern Schneidezähne ſind wie bey andern Mäuſen ſpitzig, in der obern Kinnlade ſind fünf, in der untern vier mit Spitzen verſehenen Backenzähne: einige Arten genießen auch Fleiſch und Inſekten ſo gerne als Kräuter. Der Schwanz iſt kurz oder mittelmäßig lang und behaart, die Füße kurz, der Kopf breit und platt. Sie fallen im Winter in erſtarrenden Schlaf, wie die Hamſter, und vergraben ſich dazu in tiefe Löcher, deren Eingang ſie mit Steinen und Erde verſtopfen. Sie ſind geſellſchaftlich und werden leicht zahm.

1. Alpen Murmelthier. Arct. Marmotta. Schreber CCVII.

So groß wie ein Haſe, der Schwanz kurz, ſtark behaart, der Pelz graubrandgelb, im Nacken mehr grau, auf dem Kopf ſchwarz. Man findet dieſes Thier auf den höchſten europäiſchen Alpen, nahe an der Linie des ewigen Schnees. Es iſt furchtſam, wachſam, ſcheu, läuft nicht ſehr ſchnell, gräbt vortreflich, genießt die beſten Alpenkräuter. Lebt

Digitized by Google

in tiefen Höhlen zu fünf bis fünfzehn Stücken, trägt Heu zum Winterlager ein, und verschläft oft acht Monate des Jahres. Es verschmähet auch Fleisch nicht, fällt wenigstens in der Gefangenschaft zuweilen kleine Thiere an, wird im Herbst sehr fett, und häufig ausgegraben und gegessen.

2. Polnisches Murmelthier. Bobac. Arct. Bobac.
Schreb. CCIX.

So groß wie das vorige, graugelblicht, gegen den Kopf hin röthlicht. Bewohnt die niedrigen Gebürge und Hügel von Pohlen bis nach Kamtschatka, und gräbt mit Leichtigkeit selbst in den harten Boden.

3. Virginisches Murmelthier. Arct. Monax.
Schreb. CCIX.

Größe eines Kaninchens, die Schnauze spitzer, auf dem Rücken dunkelbraun, Seiten und Bauch heller. Der Schwanz halb so lang als der Körper, langhaarig und schwarz, die Füße schwarz.

In Pensilvanien, den Bahama-Inseln, Maryland und Virginien.

4. Canadisches Murmelthier. Arct. Empetra.
Schreb. CCXX.

An Größe steht es zwischen dem Alpenmurmelthier und Ziesel, etwa wie ein Kaninchen. Der Schwanz kurz, der Pelz braunschwarz gemischt, Bauch und Füße rostfarb. Vorn nur vier Zehen, ohne Daumenspur.

In Canada, an der Hudsonsbai.

Digitized by Google

5. Bereiftes Murmelthier. Arct. pruinosa.

Von der Größe des Canadiſchen, das Haar lang, rauh und grau, wie bereift. Dieſem oder dem Empetra gleicht ſehr arctomys melanopus. Kuhl.

Auch aus Canada.

6. Der Gundi. Arct. Gundi.

Faſt ſo groß als ein Kaninchen, die Ohren abgeſtutzt, nur vier Zehen an allen Füßen, geht auf der Sohle. Farbe ziegelroth. In Afrika.

7. Zieſel. Arct. Citillus.

Schreb. CCXI. A.

Von der Größe einer Ratte, Geſtalt ganz nach dem Murmelthier gleich, oben graubraun, ſchwarz gemiſcht, wodurch ein gewelltes Anſehen entſteht. Sie leben in Erdhöhlen und tragen Wintervorrath ein, leben aber nicht geſellſchaftlich unter einander, ſondern ſind zänkiſch, beißen ſich, und freſſen einander wohl gar auf; auch Mäuſe und Vögel fallen ſie an und freſſen ſie, daneben aber genießen ſie allerley Wurzeln, Gras, Getreide.

In Pohlen, Böhmen, Oeſterreich, durch ganz Rußland bis nach Perſien.

8. Geperlter Zieſel. Arct. guttatus *).

Schreb. CCXI. B.

Gräulichtbraun, mit weißlichen Flecken auf dem Rücken, unten weißgelblicht, der Schwanz kürzer. Hat daſſelbe Vaterland, ſcheint bloße Varietät.

---

*) Zur Gattung Arctomys rechnet Illiger auch Viscaccia aus Amerika. Die Art iſt aber unbeſtimmt. A. d. U.

Digitized by Google

Beyde Arten sollen oft fast die Größe des Murmelthiers erreichen, in den wärmern Gegenden giebt es noch eine dritte gelbliche Varietät.

Eichhörnchen. Sciurus. (Écureuils).

Die untern Schneidezähne sind sehr zusammengedrückt, spitzig. Oben fünf, unten vier Backenzähne, der obere vorderste ist sehr klein und fällt oft aus und alle sind höckerig. An den Vorderfüßen sind vier Zehen mit einer Daumenwarze, an den hintern fünf, die Nägel sind gekrümmt und spitzig. Der Schwanz lang, die Haare stehen nach beyden Seiten, wie die Bärte an einer Feder. Es sind muntere lebhafte Thiere, welche meist auf Bäumen leben und sich von Kernen und öhlichten Früchten nähren, sie machen Wintervorräthe, legen ordentliche Nester auf den Bäumen an. Der Kopf ist dick, die Augen groß und lebhaft. Die Arten zahlreich.

1. Das europäische Eichhorn. Sc. vulgaris. Schreb. CCXII.

Im mittlern Europa in gemischten Wäldern häufig, die gewöhnlichste Farbe ist ein lebhaftes rothgelb, der Bauch weiß, es giebt aber eben so häufig rothbraune, graue, schwarze, oft aus einem Neste, seltener weiße und noch seltener geschäckte. Die Ohren sind mit langen Haarbüscheln versehen. Je tiefer nach Norden, desto mehr fällt der Pelz ins Graue, diese liefern das Grauwerk der Kürschner (petit-gris). Dieses lebhafte Thierchen läuft und springt mit der größten Geschicklichkeit auf Bäumen, und von einem Baume zum andern, im Herbst wandert es oft ziemlich weit nach Haselnüssen und Wallnüssen umher.

Digitized by Google

Schläft im Winter oft mehrere Tage, wirft zweymal im Jahr Junge, die sich leicht zähmen lassen.

2. Das graue Eichhorn. Sc. cinereus. Schreb. CCXIII.

Größer als das europäische, silbergrau mit weißem Bauche, ohne Haarbüschel an den Ohren

In Carolina, Virginien.

3. Das schwarze Eichhorn. Sc. niger. Schreb. CCXV.

Ganz schwarz mit einem weißen Halsband.

In Nordamerika.

4. Das graue Eichhorn mit schwarzem Kopf. Sc. capistratus.

Ecureuil à masque. Schreb. CCXIII. B.

Grau, mit schwarzem Kopf, Schnauze, Ohren und Bauch weiß. In Nordamerika. Alle drey Arten variren in der Farbe und sind bald heller, bald dunkler, das letzte ist das größte fast noch einmal so groß als das graue.

5. Das labradarische Eichhorn. Sc. hudsonius. Schreb. CCXIV.

Pelz braunroth, grau überlaufen, an den Seiten eine schwärzliche Linie, der Bauch grau. Der Schwanz kürzer.

Labrador, Hudsonsbai *).

*) Sciurus felinus scheint eine Abart von cinereus, und Sc. carolinensis Abart von hudsonius, auch vulpinus scheint Abart zu seyn; überhaupt ist hier noch viel zu sichten, daher oft Fragepunkte. A. d. U.

Digitized by Google

6. Braſiliſches Eichhorn. Sc. aestuans.

Dunkelgrau, unten gelb, der Schwanz kürzer als der Körper, wenig behaart. Braſilien. Gujana.

7. Perſiſches Eichhorn. Sc. persicus.

Grau, unten gelb, Seiten weiß, Schwanz ſchwarzgrau, weißgeringelt, ohne Pinſel.

In Gilan.

8. Georgiſches Eichhorn. Sc. anomalus. Güldenstedt.

Schreb. CCXV. C.

Größer als gemeines, ohne Pinſel, rothbraun, unten heller. Naſenſpitze ſchwarz, Umfang des Mundes weiß.

Georgien.

? 9. Paradies-Eichhorn. Sc. paradisiacus.

Hellrothgelb, die Seitenlinien gelb. In Java auf Piſang- und Tamarindenbäumen.

? 10. Gingiſches Eichhorn. Sc. ginginianus.

Kleiner als das europäiſche, braungrau, Seitenlinie und Augenring weiß, Schwanz ſchwarz. In Indien.

11. Javaniſches Eichhorn. Sc. bicolor. Schreb. CCXVI.

Oben ſchwarz ins röthlichte ſpielend, eben ſo die äuſſern Theile der Schenkel, Kehle, Unterleib und der gröſte Theil des Schwanzes hellroth, Schwanzende ſchwarz.

Java.

Digitized by Google

12. Rothbauchiges Eichhorn. Sc. erythraeus.

Mit Ohrbüschel, oben gelb und braun gemischt, unten dunkel rothbraun, so auch der Schwanz.

Indien.

13. Namaquisches Eichhorn. Sc. namaquensis.

Schwarz, unten braun, Seitenstreif weiß.

Afrika.

14. Borstenhaariges Eichhorn. Sc. setosus.

Größer als europäisches, röthlichtgelb, unten weiß, Seitenstreif weiß, Haare wie Borsten, Schwanz stark und fein behaart.

In Afrika.

? 15. Abyßinisches Eichhorn. Sc. abyssinicus.

Dreymal größer als das europäische, oben schwarz ins rostfarbe spielend, unten grau.

Abyßinien.

16. Malabarisches Eichhorn. Sc. maximus. Schreb. CCXVII. B.

Vorn fünf Zehen, der Daum vorn mit flachem Nagel. Fast so groß als eine Katze, oben schwarz, Seiten und Scheitel lebhaft kastanienbraun; der übrige Kopf und der untere Theil des Körpers blaßgelb, hinter der Backe ein kastanienbrauner Streif. Lebt hauptsächlich auf Palmen und nährt sich von der Milch der Kokosfrüchte, welche es am Baum zernagt.

In Malabar.

? 17. Lang-

? 17. Langschwänziges Eichhorn. Sc. macrourus.

Schreb. CCXVII.

Der Schwanz doppelt so lang als der Körper, oben schwarz, unten gelb, fast so groß als das vorige, der Kopf geschäckt, gelb und schwarz.

In Ceylan und Malabar. Herr Cuvier glaubt, es sey eine Abart des Vorigen.

? 18. Eichhorn aus Bombay. Sc. indicus.

Schmutzig purpurfarb, unten gelb, Schwanzspitze hochgelb. Bombay, Hindostan.

19. Eichhorn aus Madagascar. Sc. ater.

So groß wie das malabarische, der Schwanz länger, kurzhaarig und endet spitzig. Oben glänzend schwarz, Ohren, Nase und Unterleib weiß.

Madagascar.

20. Gelbes Eichhorn. Sc. flavus.

Nur halb so groß als das gemeine, allenthalben fünf Zehen. Daum kurz mit flachem Nagel, röthlichtgelb, die Haare mit weißer Spitze, Ohren rund ohne Pinsel.

In Südamerika.

21. Der Coquallin. Sc. variegatus.

Schreb. CCXVIII.

Ohne Ohrpinsel, Kopf kastanienbraun, Maul und Ohren weißlicht. Oben auf dem Rücken schwarz und falb gestreift, eben so der Schwanz. Größer als das gemeine.

Meriko.

Digitized by Google

22. Palmeichhorn. Sc. palmarum. Schreb. CCXX.

Röthlichtbraun, auf dem Rücken drey weiße Streifen, unten weiß, etwas größer als das gemeine Eichhorn, der Schwanz bräunlicht, an der Spitze weißlicht.

Auf Palmen in Afrika und Asien.

? 23. Livorei-Eichhorn. Sc. getulus. Schreb. CCXXI.

Rothgrau mit gelblichen über den Schwanz sich hinziehenden Bändern, Unterleib weiß; von der Größe des Gemeinen. Afrika.

24. Levaillantisches Eichhorn. Sc. Levaillanti. Kuhl.

Sehr kleine Ohren. Die Haare hart, stachlicht, oben okergelbröthlicht schwarz. An den Seiten ein weißer Streif, die Augenbraunen und Bauch ebenfalls weiß. Die Nägel gerade, lang. Der Schwanz ein Drittheil des Körpers lang, mit harten, langen, roth- weiß- und schwarzgeringelten Haaren. Südafrika.

(In verschiednen Museen in Holland).

25. Eichhorn aus Congo. Sc. congicus. Kuhl.

Oben schwarz, grünlichtgelb überlaufen, mit weißen Seitenlinien, welche nach unten schwarz gerandet sind, der Bauch gelblichtweiß, der Schwanz schwarz und gelb gemischt. Die Ohren klein, behaart, ohne Büschel.

Aus Congo. (Im Brittischen Museum).

Digitized by Google

26. Carthageniſches Eichhorn. Sc. granatensis.

Dem rothbauchigen Eichhorn an Größe und Farbe faſt gleich. In Südamerika, in Granada und Carthagena, vom Gelben ſehr verſchieden *).

Von den Eichhörnchen trennen ſich durch Backentaſchen, wie die Mäuſe von den Hamſtern, einige Arten, welche man den Eichhörnchen beygeſellt hat, ſie leben ſtatt auf Bäumen in der Erde. Illiger hat ſie unter dem Namen

Backenhörnchen. Tamias

bezeichnet. Der Zahnbau iſt wie beym Eichhorn, die Lippe geſpalten. Die Ohren abgerundet, kurz und faſt nackt. Weite Backentaſchen. Der Schwanz faſt ſo lang als der Körper, ſtark behaart, rundlicht. Die Vorderfüße vierzehig, mit einer Daumwarzel mit Nagel, die hintern fünfzehig.

1. Geſtreiftes Backenhörnchen. Tam. striata.

Sciurus striatus. Schreb. CCXIX.

Braun, mit fünf ſchwarzen und zwey weißlichten Streifen. Die Länge fünf und ein halber Zoll, des Schwanzes vier Zoll. Man findet ſie im ganzen nördlichen Aſien und dem angrenzenden Theil von Europa, auch in Nordamerika, vorzüglich in Fichten- und Arvenwäldern. Sie klettern zwar leicht auf Bäume, leben aber mehr auf der Erde und wohnen in Löchern. Freſſen auch Fleiſch **).

---

*) Noch unbeſtimmte Arten ſind Sciurus olivaceus, mexicanus und lineatus aus dem warmen Amerika, und Xanthius aus dem wärmern Aſien. Dann Sciurus griseus und rubricatus aus Nordamerika. A. d. U.

**) In Afrika am Cap iſt eine neue Art, welche Illiger Tamias

2. Amerikaniſches Erdeichhorn. Tam. americana. Kuhl.

Mit zwey weißen und drey ſchwarzen Linien, die unpaarige läuft mitten über den Rücken. Die weiße Linie iſt röthlicht gerandet. Der Kopf ſchwarzroth. Der Hals vorn weiß, der Bauch röthlichtweiß. Der Schwanz behaart, rund, roſtfarb, ſchwarz und weiß gemengt. Die Ohren kurz und rund.

Aus Nordamerika. (Im Büllokiſchen Muſeum).

Die Guerlinguels. Büffon Supp. VII. LXV. LXVI. machen wahrſcheinlich auch eine vom Eichhorn verſchiedene Gattung aus, obſchon ſie denſelben Zahnbau haben, ſie haben einen langen, faſt runden Schwanz, einen ſehr großen und hängenden Hodenſack. Okens

Guerlinguet. Sciurus Gerlingus.

Hat die Geſtalt des gemeinen Eichhorns, der Körper iſt acht Zoll lang, der Schwanz gleichlang; Pelz roſtfarben, unten gelblicht, Schwanz gedrückt, verdünnt, dunkel geringelt. Lebt in Gujana auf Bäumen, von Früchten meiſt auf Palmen. Es ſoll noch eine kleinere Art geben.

Flughörnchen. Pteromys. Cuv. (Polatouches).

Zahnbau wie beym Eichhörnchen, der Körperbau ebenſo, allein eine Verlängerung der Seitenhaut, verbindet als Flughaut die Vorder- und Hinterbeine, und giebt ihnen das Vermögen, ſich einige Augenblicke ſchwebend er-

---

sublineata nennt von ihm angeführt, aber ungewiß, ob es hierher gehört. Cuvier zählt auch das hudſoniſche oder labradoriſche Eichhorn Nr. 5. hieher. A. d. U.

halten, und sehr große Sprünge machen zu können. Die Füße haben lange knöcherne Anhänge, welche einen Theil der Flughaut beym Ausspannen unterstützen.

1. Europäisches Flughörnchen. Pterom. volans.
Schreber CCXXIII.

Oben aschgrau, unten weiß, von der Größe einer Ratte, der Schwanz nur halb so lang als der Körper. Lebt einsam in den Birkenwäldern des Nordens von Europa und Sibirien, nährt sich besonders von Birkenkätzchen und Fichtenknospen.

2. Hudsonisches Flughörnchen. Pt. hudsonius.
Farbe und Größe fast wie beym gemeinen Eichhorn, der Pelz dicht und die Haare lang, der Schwanz runder.
Nordamerika.

3. Der Aßapan. Sc. volucella.
Schreb. CCXXII. Geoff. Cuv. mammif. Livr. 8.
Der Leib fünf Zoll lang, der Schwanz vier, zugespitzt, vorn auch fünf Zehen, oben röthlichtgrau, unten weiß. Lebt in Gesellschaft im mittlern Amerika von Virginien bis Mexiko. Geht meist des Nachts aus seinem Neste, läßt sich zähmen.

4. Der Taguan. Pt. Petaurista. Pall.
Schreb. CCXXIV.
Der Kopf kleiner als an den vorigen Arten. Die Ohren klein, spitzig, mit sehr kurzen Haaren. Oben ist der kleine Finger sehr verlängert, oder vielmehr statt dessen ein dünner Knochen, der zum Ausspanen der Flughaut

dient. Der Schwanz buschig. Die Farbe oben kastanienroth, unten heller, zuweilen auch oben schwarzroth, unten grau. Achtzehn Zoll lang.

Auf dem indischen Archipel.

5. Kleines Flughörnchen. Pter. Sagitta.

Oben dunkelbraun, unten weiß, wie beym Taguan macht die Flughaut am Vorderfuß einen vorspringenden Flügel, mit sehr spitzem Winkel. Indien.

Aye-Aye. Cheiromys. Cuv.

Die untern Vorderzähne sind noch mehr zusammengedrückt und an der Wurzel breiter, vorn aber spitziger als bey den Eichhörnchen, sie gleichen fast einer Pflugschaar. Sie haben an allen Füßen fünf Zehen, von denen vier an den Vorderfüßen sehr lang sind, der mittlere ist viel dünner als die übrigen; an den Hinterfüßen ist ein entgegensetzbarer Daum mit flachem Nagel, so daß diese Familie sich zu den Nagern verhalten, wie die Beutelratten zu den Raubthieren.

1. Aye-Aye aus Madagascar, Cheir. madagascariensis.

Sciurus madagascariensis. Lemur Psilodactylus. Schreb. XXXVIII. D.

So groß wie ein Hase, Pelz braun mit gelb gemischt. der Schwanz lang und buschig von langen schwarzen Haaren, die Ohren groß und nackt, der Kopf rundlicht. Es sind nächtliche Thiere, von trägem Naturel, leben unter der Erde, sind sanft, scheu und furchtsam, nähren sich von

Digitized by Google

Früchten und Getreide, bringen ihre Nahrung mit den Vorderfüßen zum Munde.

In Madagascar.

Die zweyte Hauptabtheilung der Nager begreift diejenigen, welche kein vollkommnes Schlüsselbein, sondern nur eine Spur desselben haben.

Stachelthiere. Hystrix.

Sie unterscheiden sich durch die langen und spitzigen Stacheln, mit welchen der obere Theil ihres Körpers bedeckt ist, von derselben Substanz wie bey den Igeln. Sie haben vier fast gleichgroße cylindrische Backenzähne, mit flachen gefurchten Kronen. Die Zunge ist mit scharfen spitzigen Schuppen bedeckt. Vorn sind vier, hinten fünf mit scharfen Nägeln bewaffnete Zehen. Sie leben unter der Erde und gleichen in ihrer Lebensart sehr den Kaninchen. Sie nähren sich von Wurzeln und Früchten. Ihre grunzende Stimme, verbunden mit ihrer dicken und abgestutzten Schnautze, hat Anlaß gegeben, sie mit Schweinen zu vergleichen, daher der Name Stachelschwein.

1. Das gemeine Stachelthier. Hyst. cristata. Schreb. CLXVII.

Viel größer, als ein Hase, der Rücken ist allenthalben mit harten langen schwarze und weißlich hornfarben Stacheln besetzt, welche wie Federkiele hohl sind: auf dem Kopf steht eine Mähne von längern Haaren, der untere Theil des Körpers ist schwarz behaart, der Schwanz kurz, hat an seiner Spitze offene Stachelkiele, welche auf dünnen Stielen stehen, und so wie die auf dem Rücken ein starkes Geklapper machen, wenn das Thier dieselben sträubt

Digitized by Google

und an einander schlägt. Die Oberlippe ist gespalten. Die Nasenbeine sind sehr groß, und haben zellige Höhlen, wie das Stirnbein, sie öffnen sich in die Nase. Die Geschlechtstheile sind nahe am After, von außen sind beyde Geschlechter schwer zu unterscheiden. Das Männchen hat keinen Hodensack, einen Ruthenknochen und harnt nach hinten. Die Saamenbläschen sind sehr groß und zackig. Die Ohren sind nackt. Es grunzt wie ein Schwein, ist leicht zu zähmen und wohnt in Erdhöhlen in Afrika und Ostindien. Auch in Italien und Griechenland, doch dorthin nur verpflanzt.

2. Stachelschwein mit Wickelschwanz. Hyst. prehensilis.

Schreb. CLXVIII. Cuendu. Hoitz la guatzin.

Mit einem langen Wickelschwanze, und kurzen Stacheln, zwischen vielen Haaren. Die Farbe dunkelbraun, die Stacheln schwärzlicht hornfarben. Keine Hasenscharte, klettern auf Bäume. In Südamerika.

3. Der Urson. Hyst. dorsata.

Schreb. LXIX.

Mit mittelmäßigem Schwanz, die Stacheln kurz und meist in den Haaren verborgen. Gestalt und fast die Größe des Bibers, die Haare weich und braun. Ohren kurz. In Nordamerika, an der Hudsonsbay. Lebt von wilden Früchten, Wachholderbeeren u. s. w. Die Stacheln haben feine Wiederhäckchen und fallen leicht aus.

4. Mexikanisches Stachelthier. Hyst. mexicana.

Die Größe des Opoßum, mit sehr langen Stacheln,

Digitized by Google

dazwiſchen weiße und ſchwarze Haare; Stacheln weiß und braun, Spitzen ſchwarz. Der Schwanz mittelmäßig.

In Meriko.

5. Stachelthier aus Paraguay. Hyst. paraguyensis.

Couiy Azara.

Die Länge des Körpers iſt zwanzig Zoll, des Schwanzes neun Zoll, dieſer iſt an der Wurzel ſehr dick und ſtark. Die Stacheln ſind etwa ein Zoll lang, auf dem Kopf, dem Hinterrucken und Schwanz nicht mit Haaren vermengt, an andern Stellen zwiſchen längern braunen Haaren. Es klettert gut auf Bäume, lebt von Obſt und andern Früchten, iſt ſehr träge, kann ſeinen Schwanz als Wickelſchwanz brauchen. In Paraguay.

6. Braſiliſches Stachelthier. Hyst. brasiliensis.

Cuandu Ouricou cachiero.

So groß als eine Katze, der Schwanz ſiebenzehen Zoll lang. Die Stacheln ſind drey bis vier Zoll lang, oben nicht mit Haaren vermiſcht, an der Wurzel gelb, an der Spitze ſchwarz. Die Füße vierzehig, die Nägel ſehr lang, mit Daumwarze. Die untern und Seitentheile des Körpers behaart. Klettert geſchickt auf Bäume, und hilft ſich beym Abſteigen mit dem Schwanz. Träge und nächtlich.

In Braſilien, Guyana bis Chili *).

---

*) Hieher gehören auch die von Illiger angeführten Arten volubilis, rutila, pollicaris, tortilis, alle aus Südamerika, und nicht gehörig beſtimmt. A. d. U.

Digitized by Google

7. Stachelthier mit dem Pinselschwanze. Hyst. fasciculata.

Mit langem aber schlaffem Schwanz, der sich in einen Bündel von Stacheln endigt, welche ganz platt sind, wie Pergament-Schnitzel. Es ist 15 Zoll lang, der Schwanz fünf Zoll. Die Haare zackig mit kurzen Stacheln, der Schwanz bis an sein Ende schuppig. Die Stacheln sind flach gefurcht, schwarz mit weißer Spitze. In Malaka.

? 8. Langschwänziges Stachelthier. Hyst. macroura.

Schreb. CLXX.

Der Schwanz so lang als der Leib, schlaff, am Ende mit einem Büschel ganz knotiger Stacheln, welche silberglänzend sind. Der Körper dick und kurz, mit nadelförmigen kurzen, bald grünlich bald röthlich schillernden Stacheln; Augen groß; Ohren klein und rund auf Celebes. So groß wie das gemeine.

9. Listiges Stachelthier. Hyst. insidiosa. Lichtenst.

Von der Größe des Murmelthiers, mit zerstreuten an der Wurzel strohgelben, an der Spitze braunen Stacheln, die sehr spitzig, und keinen Zoll lang sind. Lange zottige, blaßgraue Haare bedecken diese Stacheln. Der Schwanz mit Borsten besetzt. Südamerika. (Berlin. Mus.)

10. Schwarzes Stachelthier. Hyst. nycthymera. Lichtenst.

Oben ganz schwarz, die Stacheln aufstehend, sehr

Digitized by Google

ſpitzig, an der Wurzel weiß, an der Spitze ſchwarz, unter langen Haaren verſteckt. Aus Amerika. (Berlin. Muſ.)

11. Halbſtacheliges Stachelthier. Hyst. subspinosa. Licht.

Mit gewellten Stacheln, wie gedreht, oder wie die Bartborſten am Seehund, am vordern Theil des Körpers kurz und dick, am hintern ſehr lang und dünne, am Bauche ſind ſie ſehr dünne, gerade. Die Farbe iſt gelbgraulich. Amerika. (Berliner Muſeum.)

Haſen. Lepus.

Der unterſcheidende Charakter dieſer Gattung beſteht darin, daß ihre obern Vorderzähne doppelt ſind, indem nemlich hinter jedem derſelben noch zwey ganz kleine ſtehen, daher nennt Illiger dieſe Familie doppelzähnige. Sie haben in beyden Kinnladen zehen Backenzähne, welche aus zwey Knochenplättchen beſtehen, welche parallel mit einander verbunden ſind, oben findet ſich noch ein ſehr kleiner einfacher Backenzahn auf jeder Seite, alſo eigentlich zwölf. An den Vorderfüßen ſind fünf, an den hintern vier Zehen; der Blinddarm iſt ſehr groß, fünfmal bis ſechsmal größer als der Magen, und inwendig mit ſpiralförmiger Vorragung verſehen, welche der ganzen Länge nachläuft. Der innere Theil der Lippen und die Fußſohlen, ſind wie der übrige Körper mit Haaren verſehen.

Wahre Haſen. Lepus.

Mit langen Ohren, kurzem Schwanz, die Hinderfüße viel länger als die vordern, die Schlüſſelbeine unvollſtändig, der Raum vor der vordern Augenhöhlenwand iſt im Scelet netzförmig durchbort.

Digitized by Google

Die Arten sind zahlreich und gleichen einander sehr, daher schwer zu unterscheiden.

1. Furchtsamer Hase. Lepus timidus.

Schreber CCXXXIII. A. Lievre commun.

Rothgraulich, die Ohren ein Zehentheil länger als der Kopf, hinten graulich, an der Spitze schwarz, der kurze Schwanz weiß, oben mit einer schwarzen Linie.

Dieses durch ganz Europa und das nördliche Asien verbreitete allgemein bekannte Thier, dessen Fleisch beliebt ist, und dessen Haar zu verschiedenen Kleidungsstücken verarbeitet wird, lebt einsam in Wäldern und Feldern, nicht unter der Erde, läuft, wenn es gejagt wird in großen Kreisen, ist äußerst fruchtbar, und kann nicht zum Hausthier gewöhnt werden.

Die Hasen um Gibraltar sollen nach Natterers Untersuchungen etwas kleiner seyn, am Oberleibe mit untermischten weißen Haaren, Vorderfüße und Schenkel ockerfarb, Kehle weiß; vielleicht eine neue Art?

2. Veränderlicher Hase. Lepus variabilis.

Schreb. CCXXXV. A. B.

Etwas kleiner, als der gemeine Hase, im Sommer dunkler von Farbe, mehr ins braune spielend, im Frühjahr fast silbergrau, der Schwanz länger und graulich, der Bauch weiß; im Winter reinweiß, mit schwarzen Ohrspitzen. Die Hinterschenkel sind länger und die Zehen sind sehr weit gespalten, und weit stärker behaart. In Sitten und Aufenthalt weicht er vom gemeinen Hasen sehr ab. Er lebt auf den höchsten Alpen von Europa, der Schweiz, Tyrols u. s. w. und im Norden, es scheint aber fast, daß

Digitized by Google

der nordiſche weiße Haſe von dem unſrigen verſchieden ſey, indem er ſich durch ſeine Wanderungen, welche er in groſſen Geſellſchaften macht, gar ſehr von ihm auszeichnet, in Grönland ſoll er auch im Sommer ganz weiß bleiben. Sein Fleiſch iſt wenig verſchieden vom gemeinen Haſen, wenigſtens in der Schweiz.

Der grönländiſche weiße Haſe, den Leach, Eishaſe. Lepus glacialis nennt, ſoll im Sommer weiß ſeyn, Scheitel und Rücken mit zerſtreuten ſchwarzbraunen, weißgeringelten Haaren beſetzt, Hals und Seiten ſchwarz und weiß gemiſcht, die Ohren an der Spitze ſchwarz. Man findet ihn nur in den Polarländern.

3. Kaninchen Haſe. Lep. Cuniculus. Schreb. CCXXXVI. A. B. C.

Kleiner als der Haſe, die Ohren etwas kürzer als der Kopf, und der Schwanz ebenfalls, graugelblich, auf dem Nacken ein roſtfarber Fleck, Kehle und Bauch weißlich, die Ohren grau oben ſchwarz, auf dem Schwanz braun. Dieſes Thier urſprünglich wahrſcheinlich aus Spanien, hat ſich über ganz Europa, die kältern und die gebirgigten Gegenden ausgenommen verbreitet. Es lebt in Geſellſchaft in Erdhöhlen, wohin es ſogleich flieht, wenn es verfolgt wird. Sein Fleiſch iſt weiß und ſehr von dem des Haſen verſchieden. Es vermehrt ſich in der Freiheit, noch mehr aber im zahmen Zuſtande gar ſtark, und nimmt zahm ſehr viele Farben an.

Einige ausländiſche Arten ſind ſchwer vom Kaninchen zu unterſcheiden, wie

Digitized by Google

4. Das sibirische Kaninchen. Lep. Tolai.
Schreb. CCXXXIV.

In Hinsicht der Verhältniße der Glieder steht der Tolai zwischen dem Kaninchen und Hasen, ist aber größer als der Hase. Der Kopf ist länger und schmäler, die Schnauze aber dicker, die Ohren kürzer als der Kopf, der Schwanz länger als am veränderlichen, kürzer als am gemeinen Hasen. Kopf und Rücken blaßgrau mit braun gemischt, Kehle, Unterleib und Schwanz weiß. Lebt nicht unter der Erde, aber in Felslöchern und andern Höhlen.

In Dauurien, und der Mongolei.

5. Das amerikanische Kaninchen. Lepus nanus.
Schreb. CCXXXIV. B.

Von der Größe unsers Kaninchens, auch die Farbe ist ähnlich, die Füße röthlich, die Ohren haben so wenig als der Schwanz etwas schwarzes; er wohnt in hohlen Bäumen, und klettert sogar in ihrer Höhlung oft bis zu den Zweigen. Sein Fleisch ist unschmackhaft und weich. In ganz Nordamerika; soll im Winter in den nördlichern Theilen weiß werden.

? 6. Der capische Hase. Lep. capensis.

Die Ohren sind ein Fünftheil größer als der Kopf, Farbe und Größe fast wie beym europäischen Hasen, die Füße röthlicht und etwas länger. Fast in ganz Afrika.

? 7. Der brasilische Hase. Lep. Tapeti *).

Farbe und Größe wie beym Kaninchen, der Schwanz

*) Ob das Thier, welches Azara Lepus pampa nennt, zu den

kürzer, die Ohren größer, oben grau, Lippen und Unterleib weiß, Füße, Steiß, Hals zimmetbraun.

In Paraguay und Meriko in Wäldern. Herr Cuvier hält ihn für eine Art mit Lepus nanus.

Kurzöhrige Hasen.

Hasenmaus. Lagomys.

Die Ohren sind mittelmäßig lang abgerundet, die Hinterfüße nur wenig länger, obern Nagezähne gefurcht und doppelt, die Schlüsselbeine fast ganz, das Loch an der obern Augenwandhöhle einfach, kein Schwanz: Sie lassen oft eine durchdringende Stimme hören, und leben in Sibirien, wo sie Pallas entdeckt hat.

1. Kleine Hasenmaus. Lag. pusillus.
F. Pallas.
Schreb. CCXXXVII.

Graubraun, von der Größe einer Wasserratte, lebt in kleinen Höhlen, in bebauten Gegenden, von Früchten, Laub, Rinden.

2. Sand Hasenmaus. Lag. Ogotona. Pall.
Schreb. CCXXXIX.

Sehr blaßgrau, die Füße gelblich, etwas größer als der vorige, in Steinhaufen und Felsenlöchern, oder auch in nicht tiefen Höhlen, welche sie mit Gras füttern. Auf

---

Hasen oder vielmehr zu den Cavien gehört ist ungewiß, letzteres wahrscheinlich, der Pelz ist weich, oben allenthalben falb, weißlich gemischt, nach hinten dunkler, auf dem Kreuz eine schwarze Linie, hier ist die Farbe sehr dunkel. Der Schwanz kurz, wenig behaart. Es findet sich in Brasilien u. s. w.

Digitized by Google

den Winter sammeln sie Heu ein, und machen davon vor ihren Höhlen etwa Fuß hohe Haufen, daher giebt ihnen auch Illiger den Namen Schoberthier.

3. Stein Hasenmaus. Lag. alpinus Pall. Schreb. CCXXVIII.

Von der Größe eines Meerschweinchens, rothgelblich. Bewohnt die höchsten Gebirge, sammelt im Sommer solche Heuhaufen, wie die vorige, macht aber solche von fünf bis sechs Fuß hoch: die Zobeljäger sammeln dieses Heu für ihre Pferde ein.

In Sibirien, vom Altai bis Kamtschatka und den Aleuten.

? 4. Kleinste Hasenmaus. Lag. minimus.

Der Kuy. Wenig größer als eine Maus, vorn vier, hinten fünf Zehen, die Ohren klein, nicht abgerundet und behaart, die Schnauze lang, der Pelz fein und braun. In Chili. Wird gezähmt und gegessen, wirft jeden Monat sechs bis acht Junge.

Savien. Cavia.

Unter diesem Namen vereinigt Linneus und Pallas mehrere verschiedene amerikanische Nagethiere, welche hauptsächlich das gemein haben, daß ihre Schlüsselbeine unvollkommen sind, sie sind aber in ihrer Lebensart und Körperbau so verschieden, daß man sie nothwendig unter mehrern Gattungen bringen muß.

Capyvara. Hydrochoerus. Illig. (Cabiais).

Vorn vier, hinten drey Zehen, alle mit breiten Nägeln und durch eine Haut verbunden, sie haben acht Backen-

ckenzähne in jeder Kinnlade, von denen die hintern längern aus einfachen parallellaufenden Knochenplättchen zusammengesetzt sind; die vordern bestehen aus gabelförmigen Plättchen, deren Spitzen oben nach dem äußern, unten nach dem innern Zahnrand laufen. Nur eine Art.

Das Flußschwein. Hydroch. Capybara.

Schreb. CLXXIV. Cavia capybara. Capiygoua Azara. Cabiai. Buff.

So groß, wie ein siamisches Schwein, mit sehr dicker Schnauze, kurzen Füßen, grobem Haar, braungelblich von Farbe, ohne Schwanz. Lebt in Gesellschaften in den Flüssen von Guyana, Brasilien, am Amanzonenstrom und in Paraguay, schwimmt und taucht gut, frißt Gras, Kräuter, Früchte, soll auch Fische fangen? Schreit sehr stark, wie ein Esel; wird sehr fett; gezähmt und gegessen. Ausser dem Bieber das größte Nagethier.

Meerschweinchen. Cavia. Illig. Anoema. F. Cuvier.

Cobayes, cochon d'Inde.

Stellen fast kleine Capyvaras vor, aber ihre Zehen sind getrennt, und ihre Backenzähne haben nur ein einfaches und ein gegabeltes Knochenplättchen, dessen Grundlinie oben von außen nach innen, unten umgekehrt geht.

1. Gemeines Meerschweinchen. Cav. cobaya. Pallas.

Aperea. Schreb. CLXXIII. Preya in Brasilien.

Der Kopf dick, oben platt, die Schnauze kurz, vorn abgerundet, die Oberlippe gespalten, aber geschlossen. Der Pelz grauröthlich. Gezähmt ist es über ganz Europa ver-

breitet worden, und varirt als Hausthier, so daß es meist weiß, roth oder schwarz gefleckt erscheint. Ist sanftschüchtern, sehr fruchtbar, trägt aber doch neun Wochen. Leben von Gras, Obst, Kohl, Rüben, Heu; fressen auf den Hinterbeinen sitzend.

In Brasilien und Paraguay in Wäldern.

Der Aperea, Cavia aperea Gmel. hat folgende Zeichnung, Rücken und Seiten gelbröthlichbraun. Die Haare glänzend, dicht, seidenartig, lang, am After kürzer, an der Basis grau, an der Spitze schwarzbraun und rothbraun geringelt, am Bauche rostfarbweiß, an den Vorderfüßen silberfarb. Die Nägel lang. Kein Schwanz (Temminks Museum).

2. Felsen-Meerschweinchen. Cav. rupestris.

Neuwied.

Moco in Brasilien.

Schlanker und größer, als das gemeine; die Mahlflächen der Backenzähne stellen zwey spitzwinklichte an einander liegende Dreyecke dar. In der Gestalt gleicht es dem Aperea, der Kopf ist länglichter und schlanker gebaut, die ganze Länge von der Nase bis zur Schwanz-Stelle etwas zu dreyzehen Zoll, der Kopf fast vier und ein halber Zoll. Das Haar dicht, kurz, glatt und weich, wie bey den Mäusen, etwas glänzend, oben aschgrau, schwärzlich und gelbröthlich gemischt, auf dem Rücken mehr schwärzlich. Gegend um Nase und Augen, und die äußere Seite der Füße hellgelb überlaufen. Unterseite des Kopfs bis zur Kehle weißlich, am Hals graugelblich, Unterleib weiß, After und Hinterseite der Schenkel hell rost-

Digitized by Google

farb. Lebt in Steintrümmern und Felsenhöhlen in manchen Theilen von Brasilien, von Prinz Neuwied entdeckt.

Aguti's. Dasyprocta. Illig. Chloromys. F. Cuv.

Vorn vier, hinten drey Zehen, nebst zwey sehr kurzen Warzen, acht Backenzähne in jeder Kinnlade mit einfachen, fast gleichen Kronen, welche platt und unregelmäßig gefurcht sind, ihr Umfang ist rund, der innere Rand an den obern, der äußere an den untern ausgeschweift. Sie gleichen in Sitten und Fleisch unsern Hasen und Kaninchen, deren Stelle sie auf den Antillen und andern warmen Ländern Amerikas vertreten.

1. Gemeines Aguti. Dasyp. Aguti. Schreb. CLXXII.

Der Kopf hasenartig, die Oberlippe gespalten, die Größe eines Kaninchens, die Ohren rund, der Unterkiefer kürzer, die Hinterfüße lang, die Unterschenkel an allen Füßen sehr dünne; die Haare am ganzen Leib kurz, rauh, glänzend, auf dem Kreuze sind die Haare viel länger und borstenartig. Statt dem Schwanz nur eine Warze. Die Farbe braun ins olivengrüne übergehend. Es lauft schnell, gräbt nicht, läßt sich zähmen und lebt nur von Pflanzen.

In Paraguay, Brasilien, Gujana.

2. Akuschi. Dasyp. Acuchi. Schreb. CLXXI. B.

Hat einen Schwanz von sechs bis sieben Wirbeln, das Haar ist oben braun, unten rothgelb; kleiner als der Aguti. In Gujana.

Digitized by Google

3. Patagoniſches Aguti. Dasyp. Patagonum.

Größer und dicker als unſer Haſe, bis auf dreißig Zoll lang, der Schwanz acht Zoll, davon ein Drittheil nackt. Die Ohren ſind lang, breit, eiförmig, etwas zugeſpitzt, der Kopf groß, die Schnauze ſtumpf. Vorn vier, hinten drey Zehen, unter den Füßen ein ſchwilliger Ballen, der ſehr hart iſt, auf welchen das Thier beym Gehen auftritt, nicht auf die Zehen. Das Haar ſanft und gleichlang, ſchön braun, der Unterleib und das Innere der Schenkel weiß, die Kopfſeiten ſchwarz. Dieſes Thier lebt in Höhlen mit vielen Zugängen. Von Paraguay bis Patagonien.

? 4. Biſam Aguti. Dasyp. moschata.

Die Größe wie ein Kaninchen, der Schwanz kurz, rundlicht, Pelz oben gelbbraun, unten weiß. Riecht ſtark nach Biſam. Auf den Antillen in Erdlöchern.

Paka. Coelogenus. F. Cuv.

Der Zahnbau faſt wie beym Aguti, am innern Theil des Vorderfußes ſitzt eine ſehr kleine Zehe mehr, als beym Aguti, und ebenſo zu beyden Seiten des Hinterfußes, ſo haben ſie alſo fünf Zehen an jedem Fuß. Unter dem Jochbein iſt ein Beutel, der ſich nach außen öffnet, und nebſtdem noch große Backentaſchen, das Jochbein iſt ſehr vorſpringend und das Geſicht ſehr breit. Ihr Fleiſch iſt gut.

1. Rothgelbes Paka. Coelog. rufa.

Pelz hellröthlich, mit gelbweißen Flecken an den Seiten, Unterleib weiß.

2. Braunes Paka. Coelog. brunnea. Schreb. CLXXI.

Dunkelbraun, ebenso wie das vorige gefleckt. Beyde leben in Brasilien und Gujana und scheinen bloße Varietäten, es soll auch ganz weiße geben. Sie wohnen in Erdlöchern, und genießen Pflanzen.

Fünfte Ordnung der Säugethiere.

Zahnlose Thiere. Edentata.

Die Thiere dieser Ordnung haben keine Schneidezähne, und bilden die letzte Abtheilung der Klauenthiere. Außer diesem blos negativen Charakter, haben sie noch mehrere Aehnlichkeiten unter sich, vorzüglich die großen und starken Klauen an ihren Füßen, welche schon den Nagelscheiden sich nähern: Sie zeichnen sich ferner durch Trägheit und Langsamkeit in ihren Bewegungen aus, welches von der Lage der Glieder abzuhängen scheint; allein dessen ungeachtet unterscheiden sie sich doch so sehr von einander, daß man wohl füglich drey Zünfte oder Familien aus ihnen bilden kann.

Faulthiere. Tardigrada.

Sie bilden die erste Zunft. Das Gesicht ist rund und abgestumpft. Sie haben ihren Namen von der großen Langsamkeit, mit welcher alle ihre Bewegungen vor sich gehen. Die Natur scheint sich darin gefallen zu haben, in ihnen etwas sonderbares, man darf nicht sagen fast unvollkommnes zu erschaffen.

Digitized by Google

Faulthier. Bradypus.

Die Backenzähne sind cylindrisch, neben diesen stehen etwas längere und spitzige Eckzähne. Zwey Säugewarzen an der Brust; die Zehen sind durch die Haut mit einander verbunden, und ihre Trennung ist äußerlich nur durch sehr große zusammengedrückte und krumme Klauen zu erkennen, welche immer gegen die Hand oder Fuß zurückgebogen stehen. Die Hinterfüße artikuliren mit dem Unterschenkel seitwärts, und treten blos mit dem äußern Rand auf; die Zehenglieder sind durch straffe Gelenke befestigt, und die hintersten verwachsen sogar in einem gewissen Alter mit den Knochen der Mittelhand oder des Mittelfußes, und verbinden sich endlich ganz mit einander, da sie nicht gebraucht werden. An diese sonderbare Verbindung der Bewegungsorgane, knüpfen sich noch andere Sonderbarkeiten in Hinsicht ihrer Verhältniße. Die Aerme und Vorderärme sind viel länger, als die Hinterschenkel, so daß, wenn sie gehen wollen, sie genöthigt sind, auf den Ellenbogen gleichsam zu rutschen. Das Becken ist so breit, und die Schenkelköpfe sind dadurch so sehr auseinandergerückt, daß sie die Knie nicht zusammenbringen können. Ein höchst langsamer und mühseliger Gang ist die Folge dieser Bildung. Herr Carlisle hat die Beobachtung gemacht, daß die Pulsadern der Extremitäten sich anfangs in eine große Menge kleiner Zweige theilen, welche sich nachher wieder in einen Stamm vereinigen, aus welchem dann wieder Zweige auslaufen. Dieser Bau soll auch bey den Loris, denen man auch langsame Bewegung zuschreibt, vorkommen. Alle Thiere mit langsamer Bewegung, der Orang-Utang, der Coaita, die Loris zeichnen sich durch

lange Vorderärme aus. Die Faulthiere leben auf Bäumen, deren Blätter ihre Nahrung ausmachen. Einen Baum verlassen sie nicht eher, als bis sie alle Blätter abgefressen haben, da es ihnen so schwer fällt, einen andern zu besteigen; sie sollen sich sogar herabfallen lassen, um sich das Herabsteigen zu ersparen. Sie gebären nur ein Junges, welches sie auf dem Rücken tragen.

Der innere Bau der Faulthiere zeigt nicht weniger Merkwürdigkeiten, als der äußere. Der Magen ist in vier Säcke getheilt, fast wie bey den Wiederkauern, hat aber keine Falten oder vorragende Theile an der innern Haut; der Darmkanal ist dagegen sehr kurz, der Blinddarm fehlt, da sonst bey allen grasfressenden Thieren der Darmkanal sehr lang ist.

1. Dreyzehiges Faulthier. Ai. Brad. tridactylus.

Schreb. LXIV.

Er hat drey Klauen an jedem Fuß; der Daum und der kleine Finger sind bloße Warzen, welche unter der Haut verborgen und mit dem Mittelfuß verbunden sind; auch das Schlüsselbein besteht nur aus einem Rudiment und ist mit dem Oberarm verbunden. Der Arm ist doppelt so lang als der Hinterschenkel; das Haar auf dem Scheitel, dem Rücken und an den Extremitäten ist lang, grob und schlaff, wie dürres Gras, dies alles giebt dem Thier ein trauriges Ansehen. Die Farbe ist schmutzig, graubräunlich, zuweilen auf dem Rücken braun und weiß gefleckt: bey einigen bemerkt man zwischen den Schultern einen lebhaft falben Fleck, durch welchen eine schwarze Längslinie

Digitized by Google

läuft. Vielleicht ist dies eine eigene Art? Der Schwanz ist sehr kurz und dick, die Größe die einer Katze. Es ist das einzige Säugethier, welches 9 Halswirbel hat. An Langsamkeit und Unbehilflichkeit übertrift es alle andern Thiere. Dagegen hat es ein sehr hartes Leben, kann sehr lange ohne Speise zubringen, ist sehr unempfindlich gegen Schmerz, kann sich aber mit seinen Klauen vertheidigen. Seine Stimme ist Ai. In Brasilien.

2. Der Ueno oder Unau. Bradyp. didactylus. Schreb. LXV. Cholaepus Illig.

Hat nur zwey Klauen an den Vorderfüßen, und gar kein Schwanz; es ist etwas weniger kläglich von Gestalt, als der Ai. Seine Arme sind weniger lang, das Schlüsselbein vollständig; die Knochen der Zehenglieder sind freyer, seine Schnauze etwas länger. Er ist nur halb so groß als der Ai, graubraun einfärbig, zuweilen etwas röthlich. Das Haar ist lang und weich. Ist nicht so langsam, als das vorige.

3. Halsband Faulthier. Brad. torquatus. Illiger.

Gleicht in Gestalt und Bildung viel dem Ai, die Farbe ist eine Mischung von grau und röthlich, der Kopf mehr ins röthlichte fallend und weißlich gemischt, auf dem Oberhals ein großer Flecken von langen schwarzen Haaren. Drey Klauen. In Brasilien.

In diese Klasse gehörte ein Thier der Vorwelt, welches Cuvier

nennt. Kopf und Backenzähne gleichen dem Faulthier, aber Vorder- und Eckzähne mangeln; die Zehen ſind von ſehr ungleicher Länge, und mit ſtarken Klauen bewaffnet, faſt wie bey den Ameiſenfreſſern.

Man kennt bis jetzt zwey Arten dieſer foſſilen Thiere. Das eine war 12 Fuß lang und 6 Fuß hoch, und wurde in Paraguai gefunden; das andere, welches Jefferſon Megalonix nennt, iſt etwa ein Drittheil kleiner und wurde in Virginien entdeckt. Beyde finden ſich näher beſchrieben in Cuviers Werk. Os foſſiles. Tom. IV.

Die zweyte Zunft der zahnloſen Thiere begreift diejenigen mit ſpitziger Schnauze, einige haben noch Backenzähne, ſolcher ſind zwey Gattungen.

Gürtelthiere. Dasypus. Linn.

Dieſe Thiere zeichnen ſich durch die harte und ſchuppige Schale aus, womit ihr Körper bedeckt iſt, dieſe Schale beſteht aus kleinen Knochenſtücken, welche an einander paſſen und den Kopf, den Rücken, oft auch den Schwanz bedecken: Dieſe Subſtanz bildet auf der Stirne einen Schild, einen zweyten ſehr großen und ſtark gebogenen auf den Schultern, und einen dritten auf dem Kreuz, zwiſchen dieſen beyden letztern laufen mehrere parallele und bewegliche Reifen, von derſelben Subſtanz, und geben dem Körper die Kraft ſich zu biegen. Der Schwanz iſt entweder mit immer kleiner werdenden Ringen bekleidet, oder aber auch nur wie die Füße, mit verſchiedenen einzelnen Plättchen belegt, welche keinen förmlichen Schild bilden. Die Ohren ſind groß, die Klauen an den Füßen

Digitized by Google

ſtark und groß, an den Vorderfüßen bald vier bald fünf, hinten immer fünf. Die Schnauze iſt ſpitzig; die Backenzähne ſind cylindriſch, ſtehen abgeſondert, an der Zahl ſieben oder acht auf jeder Seite, auf der innern Fläche ohne Glaſur, die Zunge glatt, wenig ausdehnbar. Zwiſchen den Schuppen oder auf den nackten Theilen, ſtehen einzelne Haare. Sie leben in der Erde, graben Höhlen, und nähren ſich meiſt von Pflanzen, aber auch von Inſekten und Aas. Der Magen iſt einfach, der Blinddarm fehlt. Sie leben alle im warmen Amerika. Sie vermehren ſich ſehr ſtark, ihr Fleiſch wird gegeſſen; ſie ſind leicht zu fangen, da ſie nicht ſchnell laufen.

1. Der Apara. Dasyp. tricinctus. Linn. Schreb. LXXI. Tolypeutes globulus. Illig.

Hat in der Mitte drey Gürtel, der Schwanz ſehr kurz, platt mit körnigten Schildern bedeckt, an allen Füßen fünf Zehen *). Von allen Gürtelthieren iſt dies das einzige, was ſich vollkommen in eine Kugel zuſammenrollen und ſich ganz unter ſeinen Schild verbergen kann. Es iſt 14 Zoll lang, der Schwanz 3 Zoll. Die Füße ſind ſchwächer und weniger zum Graben geſchickt, als an andern Arten. In Braſilien, Paraguay. Man findet dieſe Art am weiteſten nach Süden.

2. Tatu mit ſechs Gürteln. Das. sexcinctus. Schreb. LXXII. Encoubert. Buff. Cirquinſan. Tatou Poyou. Azara.

Hat 6 bis 7 Gürtel, mit glatten, großen und eckigen

*) Oken ſagt vorn 4, hinten 5? A. d. U.

Schildchen, der Schwanz mittelmäßig, nur an der Wurzel geringelt, allenthalben 5 Zehen, der hintere Schild ist gezähnelt. Die nicht schuppigen Theile sind mit längern und dichtern Haaren besetzt, als bey andern Arten. Die Zunge schmal, kurz und spitzig.

Häufig in Paraguay.

3 Schwarzer Tatu. Das. niger.

Tatou noir Az. Tatouhou. Dasyp. novemcinctus, octocinctus, septemcinctus. Schreb. LXXIII. und LXXIV.

Hat 9 Gürtel. Der Schwanz fast so lang als der Körper, über zwey Drittheile geringelt, am Ende schuppig, die einzelnen Schildchen klein und rundlicht, vorn vier Finger, die mittleren sehr lang. Die Schale, besonders auf dem Rücken, schwärzlich. Er ist sehr gemein in Brasilien und Paraguay. Zuweilen soll er nur 6, 7, 8 Gürtel haben, wird 15 bis 16 Zoll lang und der Schwanz fast ebenso.

4. Tatu mit zwölf Gürteln. Das. unicinctus. Linn.

Tatouay. Az. Schreb. LXXV. Cabassou. Buff.

Mit 12 Gürteln, der Schwanz lang und höckerig, die Verbindungspunkte der Gürtel und der viereckigen Schilder, sind mehr breit als lang, vorn 5 Zehen, von denen die beyden mittlern mit sehr großen, am Rande schneidenden Klauen bewaffnet sind. Er wird groß.

5. Der große Tatu. Das. gigas. Cuv.

Grand Tatou Az. deuxieme cabassou. Buff.

Hat 12 bis 13 Gürtel, der Schwanz lang, mit ziegelförmigen Schuppen bedeckt, die Schildchen sind vier-

Digitized by Google

eckig, breiter als lang. Dieses ist das größte Gürtelthier, wird oft drey Fuß lang ohne den Schwanz.

In Paraguay.

6. Sammthaariger Tatu. Das. villosus. Illig.

Tatou velu. Az.

Länge 19 Zoll, des Schwanzes 5 Zoll. Sechs bis sieben Gürtel. Auf dem Kreuzschild 10 Reihen, und am Schulterschild 6 Reihen Schuppen. Der Rand des Kreuzschildes endigt sich mit scharfen starken Spitzen, welche denselben wie einen Kranz umgeben. Die Schuppen sind rechtwinklicht, und durch zwey Längsfurchen getheilt. Die Ohren sind sehr breit. In jeder Kinnlade stehen 8 Backenzähne. Die Füße fünfzehig. Die Haare sind weich sammetartig und braun. Er wohnt nicht in Höhlen, sondern in den Pampas, auf der Südseite des Plata-Stromes.

7. Nacktschwänziger Tatu. Dasyp. Gymnurus.

Etwa 1½ Fuß lang, der Schwanz 7 Zoll, nackt. Hat bis 13 Gürtel, die Schilder viereckig. In jedem Schildchen zwey Furchen. In Brasilien.

8. Der Tatu Pichii. Das. undecimcinctus. Pichiy. Az.

Er ist 14 Zoll lang, der Schwanz 4 Zoll, die Ohren sind klein und spitzig: Er hat an allen Füßen fünf Zehen, 6 bis 7 Gürtel, Schild und Gürtel sind mit langen Haaren besetzt, die Farbe ist dunkel.

Digitized by Google

*) In den Pampas von Buenos Aires bis nach Patagonien.

Ameiſenſcharrer. Orycteropus. Geoffr.

Man hat ſie lange mit den Ameiſenfreſſern vereinigt, weil ſie dieſelbe Nahrung genießen, dieſelbe Form des Kopfes haben, und ihre Zunge auch etwas ausſtreckbar iſt; ſie unterſcheiden ſich aber durch das Daſeyn der Backenzähne und dadurch, daß ihre Nägel platt und nicht ſchneidend, daher zum Graben geſchickt ſind. Der Zahnbau iſt von dem, aller andern Säugethiere verſchieden; es ſind ſtarke Cylinder, welche wie Rohrhalmen ihrer Länge nach, von einer Menge Furchen durchzogen ſind, und aus Röhrchen beſtehen, zu denen Blutgefäſſe gehen, ſolcher Backenzähne ſind fünf oder ſechs, die vordern fallen leicht aus. Der Magen iſt einfach, gegen den Pförtner hin muskulos, der Blinddarm klein und ſtumpf.

1. Capiſcher Ameiſenſcharrer. Orycter. capensis. Pall.

Buff. Supp. VI. XXXI.

Die Holländer nennen dieſes Thier Erdſchwein, es hat die Größe eines Dachſes, iſt niedrig auf den Füßen,

*) Bis jetzt ſind die Arten der Gürtelthiere noch nirgends richtig beſtimmt, ſie ſcheinen ſehr ſchwer zu unterſcheiden. Außer den angeführten, nennt Illiger noch den gilvipes, wahrſcheinlich sexcinctus, fimbriatus, auritus quadricinctus, octocinctus und octodecimcinctus, aber ſelbſt aus Azaras Beſchreibungen kann man ſich ſchwer finden, auch die Abbildungen in den mammiferes Geoff. et Cuvier ſind nicht beſtimmt.

A. d. U.

Digitized by Google

das Haar ist kurz, graubräunlich, auf dem Rücken am kürzesten, an den Seiten grob; unten rothbraun, die Ohren dünne und hängend, der Schwanz kürzer als der Körper, auch kurzhaarig; vorn sind vier, hinten fünf Zehen. Er lebt unter der Erde, in welche er sich mit bewunderungswürdiger Schnelligkeit eingräbt. Meist nur des Nachts geht er aus, und lebt von Ameisen. Sein Fleisch wird sehr gerne gegessen.

Man findet ihn vom Kapland einwärts bis zum Orangefluß *).

Die nun folgenden Gattungen der zahnlosen Thiere, haben wirklich gar keine Zähne.

Ameisenfresser. Myrmecophaga.

Die Schnauze ist lang und endigt sich mit einem kleinen Mund, die Zunge ist lang wurmförmig ausdehnbar, und wird vom Thiere in die Ameisenhaufen oder Termitengebäude gesteckt, ist dieselbe dann mit Insekten bedeckt, so zieht er diese mit zähem Schleime bedeckte Zunge wieder ein. Das Haar ist weich und lange. Die Klauen der Vorderfüße sind lang und schneidend, sie wechseln in der Zahl nach den Arten, dienen ihnen zum Aufscharren der Ameisenhaufen und zur kräftigen Vertheidigung. In der Ruhe sind die Klauen immer unterwärts zurückgebogen und entsprechen einer Schwiele am Hinterfuß, so daß der Fuß auf den Klauen und der Schwiele steht, und seitwärts ruht.

*) Auf Zeylon findet sich nach Strachans Nachrichten ein Ameisenfressendes Säugethier, der Talgai, es ist aber nicht bestimmt, ob es zu einer bekannten Gattung gehöre. A. d. U.

Digitized by Google

Der Magen ist einfach und gegen den Pförtner muskelartig. Der mittelmäßig lange Darm hat keinen Blinddarm. Sie leben alle im warmen Südamerika.

1. Großer Ameisenfresser. Myrmecocph. jubata.

Tamanoir Buff. Schreb. LXVII. Gnouroumi ou Yoqoui. Azara.

Sehr kurzbeinig, so daß der Leib fast den Boden berührt. Er ist mehr als 4 Fuß lang, der Schwanz 2 Fuß, mit langen gerade stehenden Haaren. Der Pelz ist graubraun, von der Schulter geht ein anfangs breiter, dann schmäler werdender Streif nach hinten, diesem gleichlaufend, oben und unten ein weißer, der untere ist breit und nimmt die Vorderseite bis zu den Schenkeln ein. Dieses ist der größte Ameisenfresser, er lebt in niedern Gegenden, geht auch wohl in die Wälder, steigt aber nicht auf Bäume. Sein Gang ist langsam; mit seinen Klauen soll er sich selbst gegen den Jaguar vertheidigen.

In Brasilien und Paraguay.

2. Mittlerer Ameisenfresser. Myrmec. Tamandua.

Myrmec. tridactyla et tetradactyla. Cagouaré. Schreb. LXVIII. Tamandua. Buff.

Fast die Hälfte kleiner als der vorige; der Schwanz hat kurze Haare, ist ein Greifschwanz und am Ende unten nackt, er bedient sich desselben, um sich an die Baumzweige aufzuhängen. Die Farbe ist graugelblich oder gelblich, mit einem Querstreif auf der Schulter, der nur durch den Glanz sich auszeichnet, es giebt auch ganz rothgelbe

Digitized by Google

mit schwarzem Streif, Kreuz und Bauch ganz schwarz. Man weiß noch nicht, ob dies nur Varietäten oder verschiedene Arten sind. Die Vorderfüße haben vier Zehen, die innere ist aber sehr klein, die mittlere sehr lang, an den Hinderfüßen fünf Zehen, welche sehr kurz sind.

In Brasilien und Paraguay.

3. Zweyzehiger Ameisenfresser. Myrm. didactyla. Linn.

Schreb. LXVI.

So groß wie ein Eichhörnchen, mit röthlichtem etwas wolligem Haar, über den Rücken lauft eine rothbraune Linie, der Schwanz ist ein Greifschwanz, es klettert auf Bäume, hat vorn nur zwey Zehen, wovon einer sehr groß, hinten vier. In Brasilien.

Alle drey Arten sollen nur ein Junges werfen, und dasselbe auf dem Rücken tragen, alle sind langsame und träge Thiere.

Schuppenthier. Manis.

Pangolin. Diable de Formosa.

Keine Zähne, die Zunge lang und ausdehnbar, lebt von Ameisen und Termiten, wie die Ameisenfresser, aber der ganze Körper, außer am Bauche, ist mit dicken und an den Seiten schneidenden Schuppen bedeckt, welche wie Ziegel über einander liegen, sie können sie aber aufrichten, wenn sie sich zusammenkugeln oder sich vertheidigen. Sie haben an allen Füßen fünf Zehen. Der Magen ist in der Mitte leicht getheilt: Sie haben keinen Blinddarm. Man findet sie nur in der alten Welt.

1. Kurz-

1. Kurzzehiges Schuppenthier. Manis brachyura.

Schreb. LXIX. Pangolin à queue courte. Buff.

Drey bis vier Fuß lang *), der Schwanz kürzer als der Körper, der Bauch behaart, röthlichbraun, zwischen den Schuppen, welche groß und rundlich sind, stehen Borsten. Der Kopf ist klein, die Ohren rundlich.

In Ostindien.

2. Breitgeschwänztes Schuppenthier. Man. laticaudata. Illig.

Ueber drey Fuß lang, der Schwanz breit, am Ende spitzig, vorn fünf, hinten vier Zehen, die Schuppen sehr hart. In Tranquebar.

3. Langschwänziges Schuppenthier. Man. macroura.

Le Phatagin. Buff. Schreb. LXX.

Zwey bis drey Fuß lang, der Schwanz noch einmal so lang als der Körper, die Schuppen spitzig.

Am Senegal und in Guinea.

Die letzte Zunft der zahnlosen Thiere umfaßt diejenigen, welche Geoffroi mit dem Namen der Monotremes bezeichnet, weil sie, wie die Vögel nur eine Oeffnung für den Urin, die Exkremente und den Saamen haben. Die Zeugungstheile sind also sehr abweichend; obschon sie kei-

*) Nach Illiger wird das kurzgeschwänzte ostindische Schuppenthier nur 1½ Fuß lang, in Guinea finde sich ein anderes von 4 Fuß Länge, dieses nennt er Manis gigantea? A. d. U.

nen Beutel haben, so ist doch derselbe überzählige Knochen am Schaambein vorhanden, wie bey den fleischfressenden Beutelthieren. Die ausführenden Saamengänge münden in die Harnröhre, welche sich an der Basis des männlichen Gliedes öffnet, dieses Glied ist nicht durchbohrt, ja es zeigt nicht einmal eine Furche um den Saamen auszuführen. Staat des Uterus sind nur zwey Kanäle oder Trompeten, welche sich jeder für sich in die Harnröhre öffnen, und diese mündet in die Cloake. Da man endlich bis dahin noch keine Säugewarzen an diesen Thieren entdeckt hat, so weiß man selbst noch nicht einmal, ob diese sonderbaren Geschöpfe eierlegend oder lebengebärend sind. Auch der Scelet ist sehr merkwürdig, besonders wegen einer Art von Schlüsselbein, welches beyden Schultern gemein ist, und unter den gewöhnlichen Schlüsselbeinen steht, es entspricht dem Gabelknochen der Vögel. Endlich außer den fünf Klauen an allen vier Füßen, haben die Männchen am Hinterfuß eine Art von Sporn am Sprungbein, welchen man mit dem Sporn der Hühner vergleichen kann. Sie haben keine äußere Ohrmuschel, und die Augen sind sehr klein.

Die Monotremes finden sich nur in Neuholland, in den dortigen englischen Besitzungen.

Ameisenigel. Echidna. Cuvier. (Tachyglossus Illig.).

Die Schnauze ist verlängert, und am Ende derselben sitzt der kleine Mund; die Zunge ist wurmförmig und ausdehnbar wie bey den Ameisenfressern und den Schuppenthieren. Sie leben von Ameisen, haben keine Zähne, da-

Digitized by Google

gegen ist der Gaumen mit verschiednen Reihen nach hinten stehender Stacheln besetzt. Die kurzen Füße haben fünf mit sehr langen Klauen bewaffnete Zehen, welche ihrer Stärke wegen zum Graben vortrefflich dienen. Der obere Theil des Körpers ist stachlich, wie beym Igel. Wahrscheinlich können sie sich bey Gefahr auch so zusammenrollen. Der Schwanz ist sehr kurz, der Magen weit und rundlich, der Blinddarm mittelmäßig lang; das männliche Glied hat am Ende vier Höcker, und mündet in die Cloake.

1. Stachlichter Ameisenigel. Echid. Hystrix.

Ornithorhynchus Hystrix. Home. Myrmecophaga aculeata Shaw.

Mit kurzen braunen Haaren und 2½ Zoll langen Stacheln besetzt, die Augenöffnung rund, keine Nickhaut, kein äußeres Ohr, nur eine Spalte, Nasslöcher am Ende der Schnauze. Die Länge 16 Zoll. Die Zunge 8 Zoll lang, ist hinten stachlich. Die Stacheln sind weißgelb, schwarz gefleckt. Die Haare an den untern Theilen sind borstenartig und braun. In Neu-Südwallis.

2. Borstiger Ameisenigel. Echid. setosa.

Ornithorhynchus setosus. Home.

Mit über die Stacheln gehenden Haaren bedeckt, so daß diese nicht ganz gesehen werden. Krallen gefurcht.

Adveneturebai in Neuholland.

Schnabelthier. Ornithorhynchus. (Platypus. Shaw).

Die Schnauze verlängert, breit und platt, gleicht sehr einem Entenschnabel, selbst seine Seiten sind mit kleinen

Zahnplättchen versehen, wie bey den Enten. Keine Zähne, nur hinten im Munde stehen auf jeder Seite zwey Zähnchen ohne Wurzel, mit platter Krone, und wie beym Ameisenscharrer aus Röhrchen bestehend. Die Zehen der Vorderfüße werden durch eine Schwimmhaut verbunden, welche selbst weit über die Nägel vorgeht, an den Hinterfüßen findet sich eine ähnliche Haut, welche aber nur bis zur Nagelwurzel reicht, an der Ferse ist ein Sporn, der aber nur in der Haut steckt, und einen Stachel enthält, mit welchem das Thier sticht, und die Wunde vergiftet, der Schwanz ist platt, diese Bildung bezeichnet das Schnabelthier als Wasserthier. Die Zunge ist gleichsam doppelt, eine befindet sich im Schnabel, mit haarartigen Stacheln besetzt, an der Wurzel dieser Zunge befindet sich eine dickere, vorn mit zwey kleinen Fleischwarzen besetzte. Der Magen ist klein, ablang, Pförtner und Magenmund sind nahe beysammen. Der Blinddarm klein: in den Gedärmen finden sich viele starke parallele Falten. Das männliche Glied hat nur zwey Höcker. Der Schnabel ist mit einer wie bey den Enten sehr empfindlichen Haut bedeckt, die Lippen bilden an der Wurzel des Schnabels einen Lappen, und der Schnabel gleicht einer Saugröhre, und ist nur vorn offen. Die Augen sind sehr klein, mit einer Nickhaut. Lebt in Sümpfen und Teichen von Neuholland, und sucht seine Nahrung auf dem Boden stehender Wasser, was er genießt ist unbekannt.

1. Rothes Schnabelthier. Ornith. rufus.

Blumenbach naturhistorische Abbildungen 41. Perron voyag. pl. XXXIV.

Mit rothem kurzem und glattem Haar. Von der Größe eines Fischotters.

2. Braunes Schnabelthier. Ornith. fuscus.

Die Haare braunschwärzlich, etwas platt und kraus, vielleicht nur eine Altersvarietät. 1 Fuß 9 Zoll lang, das Haar kurz, dicht, sehr glänzend. Der Schwanz 5 Zoll lang und 2 breit, oben mit kurzen straffen sich kreuzenden Haaren bedeckt, unten fast nackt, die Nasenlöcher stehen vorn in der Mitte des Oberschnabels.

Insofern das Panzerthier (Pamphractus Illig.), wirklich unter die Säugethiere gehört, wie es sehr wahrscheinlich ist, so gehört es vermuthlich zu dieser Abtheilung. Bontius hat uns mit diesem Thiere zuerst bekannt gemacht. Der Körper ist mit Schuppen bedeckt, zwischen welchen Borsten stehen, in den Kiefern stehen spitzige Seitenzähne, der Bauch ist haarlos, glatt ohne Bauchschild, der Kopf ist klein und nackt, schlangenartig, der Oberkiefer etwas länger, die Augen klein, keine Ohrmuscheln, die Füße sehr kurz und plump, die Zehen verwachsen, die Krallen lang. Der Leib ist sehr breit und platt. Es schwimmt gut, frißt Fische, und gräbt in die Erde am Ufer Löcher. Nur eine Art. (Pamphractus squamosus in Java).

Sechste Ordnung der Säugethiere.

Vielhufige Thiere. Pachydermes.

Die zahnlosen Thiere stehen am Ende der Ordnungen der Klauenthiere, aber schon haben einige von ihnen Klauen, welche so groß sind, daß sie den Hornscheiden sich nähern,

Digitized by Google

doch haben sie noch die Fähigkeit die Zehen um verschiedene Körper zu biegen, und dieselben mit mehr oder weniger Geschicklichkeit und Kraft festzuhalten, eine Fähigkeit, welche den Thieren mit Hufen oder Hornscheiden mangelt, diese können sich ihrer Füße allein als Waffen bedienen, sie haben niemals Schlüsselbeine; ihre Vorderfüße bleiben immer in derselben Biegung, sie sind dazu bestimmt, Pflanzen zu fressen, ihre Bildung, wie ihre Lebensart, ist viel gleichartiger, als bey den Klauenthieren; man kann aus ihnen nur zwey Abtheilungen bilden, zu der einten gehören diejenigen, welche wiederkauen, und zu der zweyten die, welche nicht wiederkauen, nur die letztern werden mit dem Namen der Vielhufer bezeichnet, und theilen sich in mehrere Familien.

Erste Familie der Vielhufer, mit einem Rüßel und Hauzähnen oder Rüßelthiere.

Sie haben fünf Zehen an allen Füßen, welche am Scelet vollkommen gebildet erscheinen, allein sie sind so von der dicken und schwieligen Haut umwickelt, daß man sie äußerlich nur durch die Klauen unterscheidet, welche an dieser Art von Hufen festsitzen. Die Eckzähne und eigentlichen Schneidezähne mangeln, aber an der Stelle, an welcher oben die Eckzähne stehen, kommen zwey Hauzähne hervor, welche weit aus dem Munde vorragen und oft eine außerordentliche Größe erreichen. Die nothwendige Ausdehnung, welche die Zahnhöhlen haben müssen, um solche Hauzähne zu fassen, machen die obere Kinnlade sehr hoch, und verkürzen die Nasenknochen so, daß die Nasenlöcher am Scelet ganz oben am Gesicht sich finden; allein im lebenden Thiere verlängert sich die Nase in einen cylin-

Digitized by Google

drischen Rüßel, welcher aus mehrern tausenden kleiner Muskeln besteht, welche mit ihren Fasern nach allen Richtungen gehen, dieses merkwürdige Organ äußerst beweglich, und zum feinsten Gefühl sehr geschickt machen; am Ende desselben findet sich eine fingerförmige Verlängerung oder Anhang. Dieser Rüßel giebt dem Elephanten beynahe soviel Geschicklichkeit, als die Hand dem Affen giebt, er bedient sich desselben um alle Gegenstände, selbst sehr kleine damit zu fassen; er füllt seine Höhlung mit Getränk an, und bringt dieses nachher durch ihn zum Munde, indem er dieses wunderbare Glied verkürzt. Durch Verlängerung und Verkürzung des Rüßels ersetzt er einen langen Hals, den ihm die Natur versagt hat, da ein solcher den großen Kopf und die schweren Hauzähne kaum hätte tragen können; überdies finden sich im Knochengewebe des Schedels große Höhlen, welche den Kopf noch leichter machen; die untere Kinnlade hat keine Vorderzähne. Der Darmkanal ist sehr lang, der Magen einfach, der Blinddarm sehr groß, die Eiter zwey an der Zahl, liegen unter der Brust. Das Junge saugt mit dem Munde, nicht mit dem Rüßel. In der jetzigen Schöpfung hat diese Familie nur eine Gattung.

Elephanten. Elephas Linn.

Der Elephant ist das größte Landthier. Die Geschicklichkeit, mit welcher er sich seines Rüßels bedient, ist bewundernswürdig, es ist zugleich Organ des Geruchs und des feinen Gefühls, von großer Beweglichkeit und Stärke, und steht im Gegensatz mit dem plumpen Ansehen, und der Unbehülflichkeit der übrigen Glieder. Seine Physiognomie ist ausdrucksvoll, und dies verbunden mit jener

Geschicklichkeit, hat wahrscheinlich Anlaß gegeben, die Verstandesfähigkeiten dieses berufenen Thieres, in zu günstigem Lichte darzustellen, allein nach Herrn Cuviers langen Beobachtungen, erreicht seine intellectuelle Entwicklung kaum die des Hundes oder einiger anderer Raubthiere. Sein Charakter ist übrigens sanft, und in der Freiheit leben sie in Heerden, welche immer von alten Männchen geleitet werden. Das unterscheidende Kennzeichen der Gattung zeigt sich im Bau der Backenzähne, deren Körper aus scheitelrecht stehenden Knochenblättern zusammen gefügt ist, welche mit Schmelz bedeckt sind, und durch eine dritte Substanz, welche man Rindensubstanz nennen kann, zu einem Ganzen verbunden werden, sie gleichen gar sehr dem Bau der Zähne bey den Meerschweinchen, und andern Nagern. Diese Backenzähne ersetzen sich nicht so, daß der untere den obern wegstößt, wie z. B. beym Menschen, sondern durch Vorrücken des Hintern nach vorn, so daß, wenn ein Zahn sich abnutzt, so stößt ihn der hintere immer vorwärts, so daß der Elephant bald nur einen, bald zwey Backenzähne auf jeder Seite, in allem also bald nur vier, bald acht Backenzähne, je nach dem Alter hat. Die ersten Zähne haben wenig Plättchen, die folgenden immer mehr. Man glaubt, daß einige Elephanten die Backenzähne wohl achtmal ändern, die Hauzähne aber ändern sie nur einmal. Die Elephanten fressen nichts als Pflanzen. Die Elephanten der jetzigen Welt, sind mit einer schwieligen Haut bekleidet und nur mit wenig Haaren bedeckt, sie bewohnen blos die warmen Gegenden der alten Welt, und bilden nur zwey Arten. Der Elephant wächst bis zum fünf und zwanzigsten Jahre, und wird viel über

Digitized by Google

hundert Jahre alt. Er wirft nur ein Junges und trägt ein und zwanzig Monate.

1. Der oſtindiſche Elephant. Eleph. indicus Cuv.

Buff. XI. 1. et Supp. III. LIX. Menagerie du Musée.

Mit ablangem Kopf, ausgehöhlter Stirne, die Krone der Backenzähne bildet querlaufende wellenförmige Bänder, welche aus den Abſchnitten der Knochenplättchen, welche den Zahn zuſammenſetzen beſtehen, und durch das Kauen abgenutzt ſind. Der aſiatiſche Elephant hat kleinere Ohren, und an den Hinterfüßen nur vier Nägel. Das Vaterland dieſes Thiers iſt Oſtindien, vom Indus bis zum oſtindiſchen Meere, und die großen Inſeln im Süden von Indien. Seit den älteſten Zeiten wurden dieſe Thiere eingefangen, um ſie abzurichten und zum Tragen und Ziehen zu brauchen, die meiſten Elephanten werden durch mancherley Mittel eingefangen, und nur ſelten begatten ſie ſich in der Gefangenſchaft, doch hat man in ihrem Vaterlande viele Beyſpiele davon. Die Begattung geſchieht im Stehen, wie beym Pferde. Der junge Elephant ſäugt mit dem Munde, drückt aber dabey mit dem Rüßel auf die Eiter der Mutter. Die Weibchen haben nur ſehr kleine Hauzähne, welches oft auch bey den Männchen der Fall iſt. Er erreicht etwa eine Höhe von 10 bis 11 Fuß, ein neugeborner iſt faſt 4 Fuß hoch. Leben in großen Heerden beyſammen.

Digitized by Google

2. Afrikaniſcher Elephant. Eleph. africanus. Cuv.

Mit rundlichem Kopf, gewölbter Stirn, großen Ohren, die Knochenplättchen der Backenzahnkronen bilden Rauten. Er hat am Hinterfuß nur drey Klauen. Dieſe Art bewohnt Afrika vom Senegal bis zum Cap, man weiß aber nicht gewiß, ob ſie nicht an der Oſtküſte von Afrika durch den Indiſchen erſetzt wird, oder ob es dieſelbe Art iſt, welche ſich dort findet. Die Weibchen haben eben ſo große Hauzähne als die Männchen und dieſe Zähne ſind im Allgemeinen bedeutend größer als am Oſtindiſchen, man hat ſolche das Stück zu 120 Pfund. Sie leben in großen Truppen bis zu hundert und noch mehr, werden heut zu Tage nicht gezähmt, es iſt aber wahrſcheinlich, daß die Elephanten, welche die Carthaginenſer in ihren Kriegen brauchten, afrikaniſche waren; dies bewieſe alſo, daß ſie ſich auch zähmen ließen. Nur um der Hauer willen werden ſie verfolgt, das Fleiſch ſoll viel härter ſeyn, als das der Indiſchen.

Man findet faſt in allen Theilen der Erde die Knochen einer untergegangenen dem indiſchen Elephanten ſich nähernden Elephantenart, allein die Bänder der Backenzähne ſind ſchmäler und gerader, und die Zahnhöhlen für die Hauzähne ſind nach Verhältniß viel länger, und die Unterkinnlade ſtumpfer. Man hat ſogar in neuern Zeiten am Eismeere unter dem Eiſe noch ſolche Thiere mit Haut und Haar gefunden, das Haar ſchien dicht zu ſtehen und von zweyerley Art geweſen zu ſeyn; ſo daß es möglich iſt, daß dieſe Art wirklich in einem kältern Klima gelebt ha-

Digitized by Google

den mag, übrigens ist diese Art längst von unserer Erdkugel verschwunden. (Siehe Cuvier recherches sur les ossements fossiles. Tom. II.)

Mastodonten. Mastodon. Cuv.

Die ganze Gattung gehörte der Vorwelt an, und keine Art hat sich in der Jetztwelt vorgefunden. Füße, Hauzähne, Rüßel und anderes, scheinen sie mit den Elephanten gemein gehabt zu haben; die Backenzähne dagegen sind im Bau sehr verschieden, die Krone ist mit starken kegelförmigen Spitzen versehen, welche über das Zahnfleisch hervorragten, nach Verhältniß der Abnutzung zeigen sie mehr oder minder breite Kreise, welche die Abschnitte der Spitzen darstellen; diese Bildung der Zähne, welche man auch bey den Flußpferden und Schweinen findet, brachte einige auf den Gedanken, die Mastodonten seyen fleischfressende Thiere gewesen, allein dies ist gewiß nicht der Fall. Diese Zähne folgten sich ebenfalls fortrückend von hinten nach vorn, wie beym Elephanten, und zeigten um so mehr Spitzenpaare, als das Thier älter war.

1. Großes Mastodon. Mastodon Giganteum. Cuv. *).

Die Spitzenabschnitte der Zähne bilden Rauten, dies ist die berühmteste Art unter dem Namen des Ohiothieres,

*) Ein Aufsatz im Philosophical Magazine sagt bestimmt. Man meldet aus den Staaten vom Mißißippi, daß der Mastodon an den öden Gegenden im Westen von Nordamerika noch lebend sich finde. Er nährt sich von Pflanzenblättern, besonders von den Blättern, selbst von der Rinde und dem Holz eines Bau-

Digitized by Google

Mammuth oder fleischfressenden Elephanten bekannt, das größte Landthier der Urwelt. Man findet seine wenig verwitterten Knochen fast an allen Theilen von Nordamerika zerstreut, in den übrigen Theilen der Erdoberfläche sind sie viel seltener. Seine Größe und Plumpheit übertraf unsere Elephanten.

2. Schmalzähniger Mastodon. Mast. Angustidens. Cuv.

Die Backenzähne sind schmäler als beym Vorigen, und zeigen durch das Abreiben kleeförmige Scheiben, man hat daher die Zähne mit denen des Flußpferdes verwechselt; das Thier war etwa ein Drittheil kleiner als das große Mastodon, und viel niedriger auf den Füßen. Man hat Ueberreste dieses Thieres fast in ganz Europa und in Südamerika gefunden. In einigen Gegenden sind die Zähne mit einer Eisenmasse durchzogen, und nehmen, wenn sie durch Feuer behandelt werden, eine schöne blaue Farbe an, dann kommen sie unter dem Namen des abendländischen Türkis vor *).

Die zweyte Familie der Vielhufer begreift diejenigen, welche viel, drey oder nur zwey Zehen an den Füßen haben.

---

mes daselbst. Er soll in seinem Aeußern viel einem wilden Schweine gleichen, 15 Fuß hoch seyn, der Körper mit Haaren bedeckt. Er soll nie liegen, sondern an einen Baum gelehnt schlafen: In wie fern diese Nachricht wahr sey, wird sich wohl in nicht langer Zeit entwickeln.

*) Man hat noch einige weniger verbreitete fossile Arten entdeckt, das Deutsche, das Französische, das Chilische, und das aus Paraguay.

Digitized by Google

Diejenigen, deren Zehen gepaart sind, haben gleichsam gabelförmige Füße, ihr Scelet gleicht in einiger Beziehung dem der Wiederkauer, selbst der Bau des Magens hat Aehnlichkeit.

Flußpferd. Hippopotamus. Linn.

An allen vier Füßen vier Zehen, fast gleich lang, durch kleine Hornscheiden bedeckt; auf jeder Seite sechs Backenzähne, davon die drey vordern kegelförmig, die drey hintern dagegen mit zwey Paar Spitzen versehen, welche durch das Abreiben die Form eines Kleeblatts annehmen. In jeder Kinnlade stehen vier Vorderzähne, die obern sind kurz, kegelförmig und einwärts gebogen, die untern lang, cylindrisch, spitzig, vorwärtsliegend, auf jeder Seite stehen die Eckzähne, die obern sind gerade, die untern dick, rückwärts gebogen, sie reiben sich an einander ab.

Der Körper ist unförmlich dick, die Haut ohne Haar, die Beine sehr kurz, der Bauch berührt fast die Erde, der Kopf sehr groß, die Schnauze breit und aufgeschwollen um das starke Gebiß zu bedecken, der Schwanz kurz, Augen und Ohren klein. Der Magen hat mehrere Abtheilungen. Sie leben in Flüssen, schwimmen sehr gut, gehen aber auch aufs Land und fliehen bey Gefahren ins Wasser, sie sind scheu, dabey aber zeigen sie wenig intellectuelle Fähigkeiten; sie genießen Gras und Wurzelgewächse.

1. Afrikanisches Flußpferd. Hippop. Amphibius.

Schreb. der Kopf CCCVIII. das Thier selbst CCCXVIII.

In den Flüssen des mittäglichen Afrikas, vom Cap

Digitized by Google

landeinwärts; in Egypten, wo sie in alten Zeiten im Nil häufig waren, finden sie sich nicht mehr. Die Haut ist schwarzgrau mit wenigen Borsten bedeckt, sehr dick. Wird auf 2000 Pfund schwer, 7 Fuß hoch, 12 Fuß lang und 10 Fuß im Umfang. Schwimmt und taucht sehr gut, und hält oft nur die Nasenlöcher aus dem Wasser um zu athmen, geht auf dem Grunde des Wassers fort, kommt auch ans Land und thut in Reis- und Getreidefeldern großen Schaden. Die Zähne sind so hart, daß sie am Stahle Funken geben, und werden daher zu künstlichen Zähnen gebraucht, da sie nicht wie Elfenbein gelb werden.

Foßile Flußpferde findet man häufig im Arnothale in Toskana, sie scheinen derselben Art angehört zu haben; in Frankreich hat man dagegen die Reste einer kleinern untergegangenen Art gefunden *).

Schweine. Sus.

An den Füßen zwey große Mittelzehen, mit starken Hornscheiden, zwey andere kleinere und kürzere stehen höher und berühren den Boden nicht ganz. Die Schneidezähne sind in der Zahl veränderlich, aber die untern stehen immer vorwärts gerichtet, die Eckzähne ragen aus dem Munde vor, und biegen sich nach aufwärts und hinten. Die Schnauze endigt sich in einen abgestutzten Rüßel ge-

*) Hierher müßte wohl auch Nieuhofs Thier aus Java, der Sukotpro gehören, von der Größe eines Ochsen, Schweinsschnauze, lange rauhe Ohren, langem haarigem Schwanz, und neben den Augen zwey Backenzahnhörner, allein das ganze Thier ist noch zweifelhaft. A. d. U.

Digitized by Google

schickt in der Erde zu wühlen, der Magen ist wenig getheilt.

Die eigentlichen Schweine haben 24 bis 28 Backenzähne, die hintern mit höckerichter Krone, die vordern mehr oder weniger zusammengedrückt, und 6 Vorderzähne.

1. Das wilde Schwein. Sus. Scrofa. Linn.

Schreb. CCCXX und CCCXXII.

Die Stammrasse des Hausschweins und seiner Varietäten. Die Hauzähne sind prismatisch auswärts und etwas aufwärts gekrümmt, der Körper plump, die Ohren gerade, das Haar struppig, schwarz; die Jungen heißen Frischlinge, und sind schwarz und weiß gestreift. In ganz Europa in großen Heerden in Wäldern, auch in Asien von Syrien bis zum Baikal. Thut auf den Feldern großen Schaden, frißt Gras, Wurzeln, Aas, Schlangen, Insekten.

Das Hausschwein varirt an Größe, an Höhe der Beine, Richtung der Ohren und an Farbe, es ist bald weiß, bald schwarz, bald roth, bald gefleckt, und wird seines Nutzens wegen allenthalben gehalten. Auf den Inseln der Südsee war es einheimisch, ehe die Europäer hinkamen. Kein Säugethier ist so fruchtbar wie dieses, so daß es 12—14 ja 16 Junge auf einmal werfen kann, die Sau trägt nur 4 Monate und wirft zweymal im Jahr. Das Schwein wächst fünf bis sechs Jahre, kann aber schon am Ende des ersten sich fortpflanzen und wohl zwanzig Jahre leben. So streitsüchtig die Schweine auch sind, so leben sie doch gesellig, und vertheidigen sich auch gemeinschaftlich gegen die Wölfe, indem sie sich in einen Kreis stellen, und allenthalben die Hauer dem Angriffe

Digitized by Google

entgegensetzen. Immer grunzend sind sie sehr gefräßig, und verschonen selbst zuweilen ihre Jungen nicht und fressen sie auf. Sie sind über die ganze Erde verbreitet, und bekanntlich den Juden und Mahomedanern zu essen verboten. Hauptvarietäten sind

Das sinesische Schwein. Sus sinensis.

Der Rücken fast nackt, die Beine so niedrig, daß der Bauch fast am Boden schleppt. Wird im wärmern Europa und in Asien als Hausthier gehalten.

Das guineische Schwein. Sus porcus. Linn.

Nur am Rückgrath Borsten, das übrige Haar weich, der Schwanz hängt fast am Boden, ihm gleich das Siamische.

2. Das Maskenschwein. Sus larvatus. Cuv.

Sus africanus Schreb. CCCXVII. Sanglier de Madagascar.

Die Hauzähne sind wie bey unserm Schweine, aber zu beyden Seiten der Hauzähne steht oben ein großer Höcker in der Form einer Weiberbrust, dessen Basis ein Knochenvorsprung bildet, welches dem Thier eine sonderbare Gestalt giebt.

In Madagascar und Südafrika.

3. Der Hirscheber. Sus Babirussa. Schreb. CCCXXVIII.

Die Füße sind höher, und das ganze Thier ist schlanker als bey andern Schweinen, die Hauzähne sind dünne, aber sehr lang, und die obern krümmen sich spiralförmig nach hinten. Im südlichen Asien, wild nur auf der kleinen

Insel

Insel Boero bey Amboina, zahm auf vielen indischen Inseln. Sie schwimmen leicht, und wühlen weniger, als die gemeinen Schweine.

Friedrich Cuvier trennt von den Schweinen die Warzenschweine unter dem Namen Phacochoerus, deren Backenzähne aus Cylindern bestehen, welche zusammen durch eine Rindensubstanz, wie die Knochenblätter bey den Zähnen des Elephanten verbunden sind, die Zähne wachsen auch auf gleiche Art von hinten nach vorn. Der Schedel ist sehr breit, die Hauzähne abgerundet, sowohl seitwärts als aufwärts gerichtet, von außerordentlicher Größe über jede Backe hängt eine fleischerne Lappe, welche das Gesicht noch häßlicher macht, sie haben oben nur zwey Vorderzähne, unten sechs. Diejenigen, welche man vom grünen Vorgebirge erhält, haben die Schneidezähne immer vollständig, diejenigen, welche vom Cap kommen beynahe niemals, nur findet man ihre Spur am Zahnfleisch; vielleicht hängt dies nur vom Alter ab, und die fehlenden Zähne sind abgenutzt, vielleicht sind es verschiedene Arten, welches um so eher seyn kann, als die vom Cap ein wenig breiter und kürzer sind, dahin gehört

4. Der Emaallo. Sus aethiopicus.
Schreb. CCCXXVI.

Ein wildes, schnelles, selbst dem Menschen gefährliches Thier, von wiedrigem Ansehen und großer Stärke. Der Schwanz ist nackt, die Farbe schwärzlich graurothlich. Vom Cap landeinwärts bis nach Congo.

Noch mehr unterscheiden sich von den Schweinen

Die Pecaris. Dicotyles. Cuv. (Bisamschweine).

Die Vorderzähne und Backenzähne sind fast wie bey

Digitized by Google

den Schweinen, aber die Hauzähne stehen wie bey andern Säugethieren, und stehen nicht aus dem Mund vor, es mangelt ihnen auch die äußere Zehe am Hinterfuß, sie haben keinen Schwanz, in der Kreuzgegend ist ein Drüsensack, in welchem eine starkriechende Feuchtigkeit abgesondert wird, und beständig aussickert. Die Mittelfußknochen der beyden großen Zehen sind miteinander verwachsen, wie bey den Wiederkauern; auch der Magen ist in drey Abtheilungen getheilt, und nähert sie ebenfalls den Wiederkauern, die Speiseröhre geht in die mittlere, die zweyte hat zwey lange Blindsäcke, und die dritte endigt in dem Zwölffingerdarm. Sehr häufig soll man an der Aorta Pulsadergeschwülste finden. Der Blinddarm ist kurz, aber weit. Linne hat beyde bekannte Arten unter dem Namen Tajaßu verbunden.

1. Bisamschwein mit dem Halsbande. Dicot. torquatus.

Taytetu Azar. Caytetu in Brasilien. Geoff. et Cuv. mammif. Livr. V.

Das Haar ist grau und braun geringelt, ein weißliches Halsband geht vom Winkel der Unterkinnlade bis zur Schulter; ist um die Hälfte kleiner als der wilde Eber. In Heerden in den Wäldern Brasiliens.

2. Der Tagnicati. Dicat. labiatus.

Porco de Queixada branca oder Porcodo do mato verdadeiro an der Ostküste Brasiliens. Tagnicati in Paraguay. Sus albirostris Illig.

Größer, braun von Farbe, mit weißen Lippen. In Brasilien und Paraguay.

Digitized by Google

Hieher gehörte die untergegangene Gattung der Vorwelt.

Anaplotherium. Anaplotherium. Cuv.

Dieſe Thiere hatten viel ähnliches mit mehrern Familien der Vielhufern, und machen faſt den Uebergang zu den Wiederkauern. Sie haben ſechs Vorderzähne in jeder Kinnlade, die Eckzähne gleichen den Vorderzähnen und ſind nicht länger, und acht und zwanzig Backenzähne. Alle dieſe lagen in einer ununterbrochenen Reihe an einander, welches nur beym Menſchen ſonſt vorkommt, die 16 hintern Stockzähne gleichen denen des Nashorns, des Klippſchliefers und des Paläotheriums, ſind oben viereckig, unten bilden die Knochenplättchen doppelte oder dreyfache Halbmonde. Die Füße haben wie bey den Wiederkauern zwey große Zeben, welche aber am Scelet getrennt ſind. Die Verbindung der Fußwurzelknochen iſt wie beym Kameel.

Die Knochen dieſer Gattung wurden bis jetzt nur in den Gypsbrüchen von Paris gefunden. Es wurden fünf Arten entdeckt, eine größere wie ein kleiner Eſel, (A. commune) aber ſo niedrig und mit ſo langem Schwanz wie ein Fiſchotter; die Vorderfüße hatten am innern Theil eine kleine Nebenzehe. Eine von der Größe und dem leichten Bau einer Gazelle (A. medium); eine von der Größe eines Haſen, mit zwey Nebenzehen, und eine von der Größe eines Meerſchweinchens. (V. Cuv. recherches sur les oss. foss. T. III.)

Die Vielhufer, welche keine gegabelten Füße haben, können ebenfalls unter drey Gattungen gebracht werden,

Digitized by Google

deren Backenzähne sich sehr gleichen, indem sie auf jeder Seite oben sieben solche mit viereckiger Krone, unten ebenfalls sieben mit doppelt sich kreuzenden Linien haben, der letzte mit dreifach gekreuzten, aber die Vorderzähne sind verschieden.

Nashorn. Rhinoceros.

Sie variren unter sich im Bau der Zähne. Es sind sehr große Thiere, deren Füße drey Zehen haben. Die Nasenknochen sind sehr dick, und bilden eine Art von Gewölbe; auf der die Nase bedeckenden Haut sitzt ein festes faserichtes Horn, welches so aussieht, als ob es aus zusammengebackenen Haaren bestünde. Ihr Naturell ist dumm und wild; sie lieben nasse und sumpfige Gegenden, leben von Kräutern und Baumzweigen, haben einen einfachen Magen, einen sehr langen Darmkanal, und sehr weiten Blinddarm. Die Haut ist haarlos.

1. Das ostindische Nashorn. Rh. indicus. Cuv.

Hat außer seinen 28 Backenzähnen, zwey starke Schneidezähne in jeder Kinnlade, zwey andere kleine zwischen den untern und zwey noch kleinere außer den obern. Es hat nur ein Horn, und seine sehr dicke Haut bildet vorn und quer über die Schultern tiefe Falten, und ebenso vor und quer über das Kreuz. Dieses Thier ist mehrmals nach Europa gekommen. Lebt in Bengalen, Siam, Java Sumatra in Wäldern und Sümpfen.

2. Sumatrisches Nashorn. Rh. Sumatrensis. Cuv.

Hat dieselben großen Schneidezähne, wie das vorige,

aber beynahe keine Hautfalten, und hinter dem erſten Horn noch ein zweytes kleines.

In Sumatra.

3. Afrikaniſches Nashorn. Rh. africanus Cuv. Buff. Supl.

Hat zwey Hörner wie das vorige, keine Hautfalten, keine Schneidezähne, die Backenzähne ſtehen der ganzen Länge der Kinnlade nach.

In Afrika.

? 4. Stumpfnaſiges Nashorn. Rh. Simus. Burchel.

Mit abgeſtumpfter breiter Schnauze, mit zwey Hörnern, faſt noch einmal ſo groß, als das bekannte afrikaniſche Nashorn, vier Männer waren nicht im Stande, den abgeſchnittenen Kopf von der Erde aufzuheben. Die Haut ohne Falten. Frißt Baumzweige. Im Innern von Afrika. (Zweifelhaft als Art.)

Man hat in Sibirien und an einigen Orten Deutſchlands, die Knochen eines zweyhörnigen Nashorns gefunden, deſſen Schedel viel länger iſt als der der lebenden Arten, auch unterſcheidet ſich dieſer Schedel durch eine knöcherne verticale Naſenſcheidewand. Dieſe Knochen gehören einem untergegangenen Geſchlechte; und ein faſt noch ganzer Körper, welchen man unter dem Eiſe am Ufer der Willui in Sibirien gefunden hat, zeigt, daß es dicht behaart war, es ſcheint daher wie der foßile Elephant dort gelebt zu haben.

Auch in Toskana und in der Lombardey hat man

Digitized by Google

Knochen gefunden, welche einer dem afrikaniſchen Nashorn ähnlichen Art angehört zu haben ſcheinen.

Noch unbeſtimmt iſt das Abyßiniſche Nashorn, welches Brune beſchreibt.

Klippſchliefer. Hyrax.

Linne und andere haben dieſe Thiere unter die Nager gezählt, wegen ihrer ſehr geringen Größe, aber wenn man ſie genauer unterſucht, ſo wird man finden, daß ſie das Horn beyſeite geſetzt, das Nashorn im Kleinen ſind, die Backenzähne ſind ganz ähnlich; aber die Oberkinnlade hat zwey ſtarke zurückgebogene Schneidezähne und in der Jugend zwey kleine Eckzähne; in der Unterkinnlade aber finden ſich vier Vorderzähne und keine Eckzähne. An den Vorderfüßen ſind vier, an den Hinderfüßen drey Zehen, alle mit dünnen abgerundeten Hornſcheiden, nur die innere Zehe des Hinterfußes hat einen ſpitzigen Nagel. Die Schnauze und Ohren ſind kurz, der Körper iſt mit Haaren bedeckt, nur eine Schwanzwarze ſtatt des Schwanzes. Der Magen iſt in zwey Säcke getheilt; außer dem weiten Blinddarm, und mehreren Erweiterungen des Grimmdarms, finden ſich gegen die Mitte dieſes Eingeweides zwey Anhänge, wie die beyden Blinddärme bey den Vögeln.

1. Capiſcher Klippſchliefer. Hyrax capensis. Schreb. CCXL.

Groß wie ein Kaninchen, von graulicher Farbe, faſt in ganz Afrika, in Felſenlöchern. Der in Aſien wohnende ſyriſche Klippſchliefer (Hyrax syriacus Schreb. CCXL. B.) ſcheint nicht verſchieden zu ſeyn. Dies Thier lebt von

Gras, lauft nicht ſchnell, iſt furchtſam, läßt ſich zähmen, und wird am Cap gegeſſen. In Aſien wohnt es häufig am Horeb, Sinai, am Libanon *).

Palăotherium. Palaeotherium. Cuv.

Eine Thiergattung der untergegangenen Schöpfung. Die Backenzähne ſind wie beym Klippſchlieſer, ſechs Vorderzähne und zwey Eckzähne in jeder Kinnlade, wie beym Tapir, und drey ſichtbare Zehen an jedem Fuß, ſie hatten wahrſcheinlich auch, wie die Tapire, einen kurzen fleiſchigen Rüßel. Zur Befeſtigung der Muskeln dieſes Organs, waren die Naſenknochen abgekürzt, und zeigen oberhalb zwey ſtarke Ausſchweifungen. Die Knochen dieſer Thiere findet man mit denen des Anaplotherium vermiſcht, in den Gypsbrüchen von Paris, und in einigen andern Gegenden Frankreichs. Man hat ſchon elf oder zwölf Arten entdeckt; in der Gegend von Paris fanden ſich fünf, eine davon hatte die Größe eines Pferdes, zwey die des Tapirs, zwey andere die Größe eines Schafes. Bey Orleans findet man die Knochen einer Art, die beynahe ſo groß, wie das Nashorn war. Dieſe Thiere ſcheinen die Ufer der Seen und ſumpfigen Gegenden bewohnt zu haben, da die Steine, welche ihre Gebeine verſchließen, auch Schalthiere des ſüßen Waſſers enthalten. (Cuv. sur les oss. fossil. Tom. III.)

---

*) Ob Hyrax hudsonius, aus welchem Illiger ſeine Gattung Lipura macht, hieher gehöre, oder wohin, oder was es für ein Thier ſey? iſt nicht gewiß auszumitteln, da man nur ein einziges Exemplar in einer Sammlung kennt. Schreb. CCXL.

Digitized by Google

Tapir. Tapirus.

Die 26 Backenzähne haben alle ehe sie abgenutzt sind, zwey rechtlinige und querliegende Hügelchen: in jeder Kinnlade stehen sechs Vorderzähne und zwey Eckzähne, welche durch einen leeren Raum von den Vorderzähnen getrennt sind. Die Nase verlängert sich in einen kurzen fleischigen Rüßel; die Vorderfüße haben vier, die hintern drey Zehen.

1. Der amerikanische Tapir. Tapirus americanus.

Anta. Schreb. CCCXIX.

Von der Größe eines Esels, mit brauner fast nackter Haut, mittelmäßig langem Schwanze. Der Hals ist dick und bildet auf dem Nacken eine Art von Kamm. Der Anta ist häufig in Brasilien und andern Theilen Südamerikas, an den Ufern der großen Flüsse, er schwimmt sehr gut Es ist übrigens ein furchtsames und harmlo es Thier, welches allein von Pflanzen lebt; die Jungen sind weißgefleckt, wie junge Hirsche. Man ißt sein Fleisch.

2. Der Maiba. Tapirus orientalis.

Geoff. et Cuvier mammiferes. 4.

Der Rüßel ist beym erwachsenen Männchen 7 bis 8 Zoll lang, schwarz, die Ohren weißgerändelt, Kopf, Hals, Schultern und Vorderfüße schwarz, Kreuz, Bauch und Seiten weiß, der Schwanz sehr kurz, und so wie die Hinterschenkel und Hinterbacken schwarz. Er tritt mit der ganzen Sohle auf. Jung ist er weiß und braungefleckt. In Sumatra und Malacca.

Die dritte Familie der hufigen nicht wiederkauenden Thiere bilden

Die Einhufigen. Solipeda.

Sie haben keine Zehen, sondern der ganze Fuß wird mit einem dicken hornartigen Schuh umfaßt, sie tragen aber auf der Haut, zu beyden Seiten des Mittelfußes Anhänge, welche zwey Nebenzehen vorstellen.

Pferd. Equus.

In jeder Kinnlade stehen sechs Vorderzähne, deren Kronen beym jungen Thier eine Grube haben, auf jeder Seite stehen sechs Backenzähne mit viereckiger Krone, welche durch Schmelzplättchen bezeichnet sind, die sich in dieselbe vertiefen, und vier Halbmonde bilden, an den obern zeigt sich am inwendigen Rand eine kleine Scheibe. Die Männchen haben in der Oberkinnlade zwey kleine Eckzähne, zuweilen auch unten, den Weibchen fehlen diese meistentheils. Zwischen Eckzähnen und dem ersten Backenzahn bleibt eine Lücke, welche dem Lippenwinkel entspricht, in welchem das Mundstück des Gebisses angelegt wird, durch dessen Hilfe allein der Mensch im Stande ist, diese starken Thiere zu leiten. Der Magen ist einfach, von mittelmäßiger Größe; aber der Darmkanal ist sehr lang, und der Blinddarm sehr groß. Die Eier stehen zwischen den Hinterschenkeln.

1. Das Pferd. Eq. Caballus. Linn.

Dieses edle Thier, welches der Mensch auf der Jagd, im Kriege, und zu den Geschäften des Ackerbaues und Handels benutzt, und unter allen Hausthieren am besten wartet, scheint nirgends mehr im Zustand der Freiheit zu leben, als da, wo man ehemals gezähmte Pferde hat verwildern lassen, wie in der Tartarey und in Amerika, wo

Digitized by Google

ſie in Truppen leben, welche von alten Hengſten geführt und vertheidigt werden. Die jungen Hengſte, welche, ſo bald ſie mannbar geworden, von der Heerde fortgejagt werden, folgen derſelben ſo lange nach, bis ſie junge Stuten an ſich gelockt haben. Das Junge des zahmen Pferdes ſaugt ſechs bis ſieben Monat; man trennt die Geſchlechter im zweyten Jahr, und bindet ſie an, und wartet ſie bis zum dritten Jahr, ehe man ſie arbeiten läßt, erſt im vierten Jahre werden ſie zur Arbeit angehalten und erſt dann darf man ihnen die Begattung geſtatten, wenn es ihnen nicht ſchaden ſoll. Die Stute trägt elf Monat.

Das Alter des Pferdes erkennt man an den Vorderzähnen; die Milchzähne kommen vierzehn Tage nach der Geburt zum Vorſchein; nach zwey und einem halben Jahr ſind die mittleren neu hervorgewachſen; nach drey und einem halben Jahr die beyden folgenden, und nach vier und einem halben Jahre die äußerſten. Alle dieſe Zähne haben anfangs eine vertiefte Krone, allein die Vertiefung verliert ſich nach und nach durch die Reibung, und nach dem ſiebenden oder achten Jahre iſt ſie ganz verſchwunden, und die Zähne bieten keine Alterszeichen mehr dar. Die untern Eckzähne erſcheinen nach drey und einem halben Jahr, die obern im vierten, ſie bleiben ſpitzig bis zum ſechsten, dann fangen ſie an ſich abzuſtumpfen. Das Alter des Pferdes überſteigt kaum dreißig Jahre.

Die zahmen Pferde variren bekannt in Geſtalt und Farbe. Die Hauptraſſen zeigen bedeutende Unterſchiede im Bau des Kopfes und in den Verhältniſſen der Glieder, und eine jede derſelben hat beſondere Vorzüge zu einzelnen Geſchäften. Die leichtfüßigſten und ſchnellſten Pferde ſind

Digitized by Google

die arabiſchen, durch welche die ſpaniſche Raſſe verbeſſert worden iſt, und beyde zuſammen haben die engliſche Raſſe verbeſſert; die ſtärkſten und dauerhafteſten Pferde kommen von den Küſten der Nordſee, die kleinſten ſind die aus dem nördlichen Schweden und aus Corſika. Die wilden Pferde haben einen dicken Kopf, wolliges Haar und keine ſchönen Formen. (Schreb. CCCIX.)

2. Der Halbeſel. Eq. hemionius. Pall. Schreb. CCCXI. Dſchiggetai.

Dieſes Thier macht in Hinſicht der Verhältniſſe ſeiner Glieder eine Mittelart zwiſchen Eſel und Pferd, (wahrſcheinlich der wilde Mauleſel der Alten), er lebt in Heerden in den großen tartariſchen und mongoliſchen Steppen. Die Hauptfarbe iſt iſabellgelb, Mähne und Rückenſtreif, ſchwärzlich, Naſe, Bauch, Aſtergegend, inneres der Schenkel weiß, am Schwanze der bis zum Knie geht, ein Haarbüſchel. Ein ſcheues, ſehr ſchnelles, unbändiges und ſchwer zu zähmendes Thier. Die Hengſte führen etwa fünf bis ſechs Stuten mit ſich. Die Mongolen eſſen das Fleiſch.

3. Eſel. Equus. Asinus et Onager. Kulan. Schreb. CCCXII. und CCCXIII.

Die langen Ohren und der Haarbüſchel am Schwanze, ſind für dies Thier bezeichnend, auf den Schultern iſt ein ſchwarzes Kreuz, welches bey den folgenden Arten in Streifen ſich zeigt. Der Eſel bewohnt in ſeinem wilden Zuſtand unter dem Namen Kulan, die Gebirge der Tartarey bis nach Perſien in ſehr großen Heerden, welche nach der Jahrszeit unter Anführung der Hengſte von Norden

Digitized by Google

nach Süden und umgekehrt wandern. Der wilde Esel ist silberweiß, an den Seiten röthlichbraun, größer als der zahme, schön, schlank, muthig und schnell im Laufe. Wird jetzt noch gezähmt; und aus der Vermischung mit den zahmen, kommen die schönen Reiteſel des Morgenlandes, welche theurer als Pferde sind, da sie schnell laufen, dauerhaft und leichtfüßig sind.

Der zahme Esel ist meist grau von Farbe und allenthalben bekannt, gedeiht aber im hohen Norden nicht gut. In den wärmern Gegenden Europas aber ist er eines der nützlichsten und geduldigsten Lastthiere. Das Schreyen des Esels wird durch zwey eigene kleine Seitenhöhlen am Grund des Luftröhrenkopfes bewirkt. Eben so bekannt sind seine Bastarde; das Maulthier vom Eſelhengst und Pferdestute, von ausdauerndem Bau, zur harten Arbeit geschickt, aber pflanzt sich selten fort; und der Maulesel vom Pferdehengst und der Eſelstute zum Lasttragen vorzüglich zu gebrauchen. Beyde Arten werden mehr im wärmern Europa erzeugt, auch häufig in Südamerika, wo die Maulthiere selbst verwildert gefunden werden.

4. Zebra. Eq. Zebra. Linn.
Schreb. CCCXVI.

Von der Form und Größe des Esels, allenthalben mit regelmäßigen, schwarz und weißen Streifen bezeichnet. Es bewohnt das ganze mittägliche Afrika, ist schnell und lebt in großen Heerden, welche meist mit den Straußheerden umherirren. Bis jetzt hat man dies Thier nie ganz zähmen können, doch hat man Bastarde von einem weiblichen Zebra und einem Pferd und Eſelhengst erzeugen sehen.

Digitized by Google

5. Quagga. Eq. Quagga. Linn. Schreb. CCCXVII.

Gleicht in Form und Bau mehr dem Pferde als dem Zebra. Das Haar an Hals und Schultern iſt braun, mit Querſtreifen; das Kreuz iſt grauröthlich, Schwanz, Bauch und Schenkel weißlich. Der Name Quagga drückt ſeine Stimme aus, welche beynahe dem Bellen des Hundes gleicht. Sie leben in denſelben Gegenden von Afrika in Heerden. Leichter zu zähmen, als das Zebra, aber muthig und ſchnell.

Siebende Ordnung der Säugethiere.

Wiederkauer. Ruminantia. Pecora.

Dieſe Ordnung iſt wohl unter allen die natürlichſte und beſtimmteſte, alle dazu gehörigen Thiere ſind gleichſam nach demſelben Bilde geformt, nur die Kameele machen eine unbedeutende Abweichung von derſelben.

Der erſte Hauptcharakter iſt, der Mangel an Schneidezähnen in der Oberkinnlade, in der Unterkinnlade aber finden ſich faſt immer acht Schneidezähne, ſtatt dieſer findet ſich in der Oberkinnlade ein harter Wulſt. Zwiſchen den Vorderzähnen und Backenzähnen iſt ein leerer Raum, nur bey einigen Gattungen finden ſich ein oder zwey Eckzähne. Die Backenzähne, deren immer ſechs auf jeder Seite ſind, ſind mit einem doppelten Halbmonde bezeichnet, deſſen Hörner oben auswärts, unten einwärts gerichtet ſind. An den Füßen befinden ſich immer zwey Zeben, welche mit einer Hornſcheide bedeckt ſind, welche da, wo ſie an einander

Digitized by Google

ſtoßen, platt ſind, ſo daß ſie faſt einem Hufen gleichen, der geſpalten iſt; man nennt daher dieſe Füße geſpaltene. Hinter dieſen Hufen ſtehen zuweilen zwey kleine Spornen, als Seitenzehen. Die zwey Knochen der Mittelfüße ſind mit einander verwachſen, und bilden einen Knochen, welchen man die Röhre nennt.

Der Name Wiederkauer bezeichnet die ſonderbare Eigenſchaft dieſer Thiere, die ſchon heruntergeſchluckten Pflanzen wieder in Mund zu bringen, und dieſelben zum zweytenmal zu kauen, eine Eigenſchaft, welche mit dem Bau des Magens zuſammenhängt. Sie haben eigentlich vier Magen, die drey erſten ſind ſo eingerichtet, daß die Nahrungsmittel nach Belieben in einen derſelben gehen können, da die Speiſeröhre mit allen zuſammenmündet. Der erſte iſt der größte und heißt der Panzen; in denſelben gelangt die ganze Menge des nur einfach gekauten und grob zerſtückelten Graſes; aus dieſem geht es in den zweyten oder die Mütze, deſſen innere Haut ſo gefaltet iſt, daß die Falten Bienenzellen gleichen. Dieſer Magen iſt klein und rundlich, in demſelben wird das Gras erweicht, und zu kleinen Ballen zuſammengedrückt, welche nur nach und nach in den Mund wieder rückwärts gehen, um nochmals gekaut zu werden. Beym Wiederkauen iſt das Thier immer ruhig, es dauert ſo lange, bis alles Gras, welches in den Panzen gelangte, gehörig verkleinert iſt, alles gekaute geht nun in den dritten Magen oder Pſalter, deſſen innere Wand mit breiten der Länge nach laufenden Platten, wie die Blätter eines Buchs bedeckt ſind, und aus dieſem endlich gelangen ſie in den Labmagen, welcher dicke runzlichte Wände hat, in dieſem geht eigentlich die Verdauung oder

Digitized by Google

Auflösung vor, wie in dem einfachen Magen der übrigen Thiere. So lange die Wiederkauer saugen, und nichts als Milch genießen, ist der Lab der größte Magen. Der Panzen entwickelt sich erst nach und nach und erhält seine vollständige Größe, wenn das Thier Gras genießt. Der Darmkanal ist sehr lang; hat aber im Dickdarm nur wenig Buklen. Der Blinddarm ist lang und glatt. Das Fett der Wiederkauer wird beym Erkalten härter als das anderer Säugethiere, ja selbst brüchig, dieses heißt Unschlitt oder Talg. Die Eiter liegen zwischen den Hinterschenkeln.

Die Wiederkauer sind für den Menschen die allernützlichsten Thiere, er hat sehr viele von ihnen zu Hausthieren gemacht, das Fleisch derselben ist das vorzüglichste von allen, und einige Völker dürfen nur dieses genießen; aus ihnen hat er sich Lastthiere geschaffen; andere nutzen durch ihre Milch, Talg, Leder, Hörner und andere Theile.

Die meisten Gattungen der Wiederkauer tragen Hörner, wenigstens die männlichen Thiere, vielen weiblichen fehlen sie, nur zwey Gattungen haben keine Hörner, und diese führen wir zuerst an.

Kameel. Camelus.

Die Kameele nähern sich mehr, als die übrigen der vorhergehenden Ordnung, sie haben nicht nur immer zwey Eckzähne in beyden Kinnladen, sondern noch überdies zwey spitzige Zähne im Schneidezahnbein; in der untern Kinnlade sind sechs Schneidezähne, und Backenzähne besitzen sie zwanzig oder achtzehen, alles Eigenheiten, welche sie von den übrigen Wiederkauern auszeichnen, das Kahnbein und Würfelbein des Fußes ist getrennt. Die Hörner

Digitized by Google

fehlen. Statt der großen Hornscheide, welche bey den übrigen Wiederkauern an der innern Seite abgeplattet ist, und den ganzen untern Theil der Zehe bekleidet, wodurch die gespaltene Hufe gebildet wird, haben die Kameele nur eine kleine, das letzte Gelenk des Fingers einhüllende und an beyden Zehen gleich beschaffene Hornbedeckung, wie bey den Vielhufern. Die Lippen sind aufgeschwollen und gespalten. Der lange Hals, die vorspringenden Augenhöhlenränder, die Schwäche des Kreuzes, das unangenehme Verhältniß der Schenkel und Füße, geben der ganzen Gestalt etwas häßliches; aber die Eigenschaft mit sehr wenig Nahrung leben, und mehrere Tage ohne Trinken aushalten zu können, machen sie zu den nützlichsten Thieren, für die heißen und trockenen Gegenden, in welchen sie leben, und nur mit ihrer Hilfe ist der Mensch im Stande, jene Wüsten zu durchreisen, wo wegen Dürre und Sand die vegetabilische Natur ganz erstorben ist. Die Eigenschaft, so lange ohne Getränk leben zu können, rührt wahrscheinlich von der großen Menge Zellen her, welche die Seiten des Panzen bedecken, in welchen sich immer Wasser aufhält oder Feuchtigkeit sich erzeugt. Bey den übrigen Wiederkauern findet sich nichts ähnliches.

Die Kameele harnen zwar nach hinten, aber die männliche Ruthe ändert ihre Richtung bey der Begattung, welche sehr mühsam geschieht, und während welcher das Weibchen eine sitzende Stellung hat. Die Eichel der Ruthe ist hackenförmig in einem Halbkreis nach unten gebogen, und die Vorhaut leitet den Harn nach hinten, da sie aber bey der Begattung sich zurück zieht, so geht der Saame doch vor-

vorwärts. Zur Brunſtzeit, wo die Männchen oft unlenkbar werden, ſchwitzt am Kopfe ein ſtinkender Saft hervor.

Eigentliche Kameele.

Die Zehen ſind unten, faſt bis zu ihrer Spitze, durch eine verbindende Sohle vereinigt, und auf dem Rücken ſind Fetthöcker. Es ſind große Thiere den warmen Gegenden des alten Feſtlandes eigen; man kennt zwey Arten, beyde Hausthiere. Es ſoll zwar, wie Pallas von den Bucharen und Tartaren gehört hat, in den an China grenzenden Steppen wilde Kameele geben, welche viel größer ſeyn ſollen, allein da die Kalmucken nach Religionslehren allen ihren Hausthieren die Freiheit geben, ſo iſt es ungewiß, ob es urſprünglich wilde, oder nur verwilderte Kameele ſeyen.

1. Das Kameel mit zwey Höckern. Cam. bactrianus. Linn.

Schreb. CCCIV. Menagerie du Musée.

Stammt aus Mittelaſien, und geht nicht ſo weit nach Süden als das folgende. Der hintere Höcker iſt größer als der vordere, der Hals dick. Dieſes beſonders ſoll wild Heerdenweis zwiſchen Indien und China in den Steppen leben; zahm im ganzen Orient, nicht in Afrika und Arabien, wird mehr zum Reiten, als zum Tragen gebraucht. Trägt ein Jahr, und verbaſtardet ſich mit dem folgenden. Es findet ſich auch in Turkeſtan, Thibet, bey den Mongolen, Chineſen und ſelbſt im warmen Theil Sibiriens.

Digitized by Google

2. Das Dromedar. Cam. Dromedarius. Linn.

Schreb. CCCIII. Menagerie du Musée.

In Arabien, Nord-Afrika, Syrien, Persien. Dieses Thier, wegen seiner Fähigkeit durch die Wüsten zu gehen, von den Arabern das Schiff der Wüste genannt, ist das nützlichste Thier jener Gegenden. Das Kameel ist mehr für feuchte Gegenden geschaffen; das Dromedar für trockene. Zur Zeit des Haarwechsels, verliert es fast alles Haar. Es bedarf äußerst wenig Nahrung, und ist dabey schnell im Laufen und trägt schwere Lasten. Fleisch und Milch beyder Arten sind vortrefflich, aus den Haaren verfertigt man Kleider, und den Mist benutzt man zur Feurung. Das Haar kraus, der Schwanz mit langen harten Haaren besetzt, die Ohren sind kurz, der Kopf klein. An der Brust und den Beinen finden sich harte Schwielen, zwischen Flechse und Fett, unter denselben befindet sich eine eiterartige Schmiere. Ein Männchen reicht für zwanzig bis dreißig Weibchen hin. Trägt 11½ Monate, und wirft nur ein Junges.

Schaafkameele. Lamas. Auchenia. Illig.

Haben getrennte Hufen und keine Höcker. Auch von diesen kennt man nur zwey mit systematischer Bestimmtheit unterschiedene Arten, beyde in der neuen Welt, viel kleiner, als die eigentlichen Kameele, einige andere Arten auch daselbst sind von Molina und Vidaure angedeutet worden, aber noch nicht recht bekannt.

Digitized by Google

1. Das Lama. Auch. Llacma. Linn.

Wild heißt es Huanako. Schreb. CCCVI. Menagerie du Musée.

Etwa so groß wie ein Hirsch, das Haar ist grob, kastanienbraun, die Farbe verändert sich durch die Zähmung in weiß, grau und gefleckt. Ein Brusthöcker, der beständig ein gelbes Fett ausschwitzt; die Ohren lang und spitzig, der Hals lang, Kopf klein. War das einzige Lastthier in Peru, als dieses Land erobert wurde; es trägt etwa 150 ℔, macht aber kleine Tagreisen. Sie haben unter der Haut eine starke Fettlage.

Ob der Guanaco, Auch. Huanacus Illiger wirklich die wilde Stammrace sey, daran ist noch sehr zu zweifeln, da außer der Antipathie, welche beyde Thiere in Hinsicht der Begattung gegen einander haben, noch manche Verschiedenheit statt hat. Dem Guanaco fehlt der Brusthöcker, er hat einen etwas krummen Rücken, die Hinterfüße sind viel kürzer als die vordern. Die Größe ist wie die des Pferdes, die Ohren sind spitzig. Der Pelz ist langhaarig, am Hals und auf dem Rücken gelb, am Bauche weißlich. Sie finden sich auf den Anden von Chili und Peru, im Winter aber kommen sie auf die Ebene herab, in Truppen von ein bis zweyhundert, sie laufen sehr schnell.

2. Die Vicunne. Auch. Vicunna. Schreb. CCCVII.

Von der Größe eines Schafes, mit einer gelbröthlichen Wolle bedeckt, welche so fein, wie die schönste Seide ist, am Bauche ist sie weiß und länger, die Schnauze

ſtumpf, der Schwanz kurz, aufrechtſtehend. Sie wohnen auf den Klippen der Anden von Chili in ſehr großen Heerden, ſind ſchwer zu zähmen. Aus ihrem Haar wird ſehr feines Zeug gemacht.

? 3. Die Pako. Auch. Paco. Illig.

Dieſes Thier ſoll ebenfalls nur eine Varietät des vorigen ſeyn, allein auch dies iſt, wenn Molinas Nachrichten zu trauen iſt, nicht richtig. Sie ſind kleiner als die Vicunna, die Schnauze länglich, das Haar länger aber gröber, man findet es gezähmt und wild, und es begattet ſich nicht mit der Vicunna. Die Wolle beym wilden Thiere iſt oben röthlich ins purpurfarbe ſpielend, unten weiß, beym zahmen ſchwarz oder auch weiß und braun. Es findet ſich in Peru, nicht in Chili, die Peruaner haben zahlreiche Heerden davon.

? 4. Das Hueque. Auch. araucana. Illig.

Zahm bey den Araucanern, es gleicht dem Widder in etwas, hat aber höhere Beine, und längern Hals, lange weiche Wolle. Die alten Chileſen brauchten es zum Laſtthier *).

*) Die Gattungsverwandtſchaft des Hueque, ob es zur Gattung des Schafes oder des Schafkameels gehöre, iſt noch nicht beſtimmt. Ohne Zweifel gehört auch der Huemul (Equus bisulcus Molina) nicht unter die Pferde, ſondern unter die Schafkameele, es iſt ſchnell und wild, und hält ſich auf den höchſten Klippen in Chili auf. Auf Molina läßt ſich übrigens ſehr wenig trauen. A. d. U.

Digitized by Google

Bisamthiere. Moschus. Linn.

Sie weichen weit weniger von den übrigen Wiederkauern ab, als die Kameele, nur der Mangel der Hörner, und der lange Hauzahn auf jeder Seite der Oberkinnlade, der dem Männchen aus dem Munde vorragt, unterscheidet sie, auch zeigt sich am Scelet ein dünnes Wadenbein, welches den Kameelen fehlt. Es sind niedliche, schöne und schnelle Thiere.

1. Das wahre Bisamthier. Mosch. moschiferus.

Schreb. CCXLII. A. und B. Le Musc.

Von der Größe eines Rehes, fast ohne Schwanz, das Haar ist so grob und so brüchig, daß man es beynahe stachlicht nennen möchte. Die Farbe des alten Thieres ist braunschwärzlich, die Kehle weiß, in der Jugend hellbraun, schwärzlich und gelblich gescheckt und gestreift. Vor dem rothen Hodensack des Männchens ist ein Beutel, gerade vor der Vorhaut des Gliedes, in diesem Beutel bildet sich jene starkriechende bröcklichte Materie, die man Bisam nennt, welche als Arzneymittel und als wohlriechende Substanz sehr theuer verkauft wird. Das Bisamthier lebt in rauhen und felsigten Gegenden, auf den wilden Gebirgen zwischen Sibirien, China und Thibet, in welchen die großen Flüße Asiens entspringen. Es ist ein sehr schüchternes nächtliches Thier von schnellstem Lauf, ganz für die Alpengegenden gebaut, klettert und schwimmt leicht. Es ist sanft, doch schwer zu zähmen. Die Jagd ist schwierig. Der thibetanische und tunquinesische Bisam ist der beste, der nördliche riecht weit weniger.

Digitized by Google

2. Kleines Bisamthier. Moschus. pygmaeus et indicus. Linn.

Schreb. CCXLIV.

Wie die übrigen ohne Bisamsack. Das kleinste wiederkauende Thier, nur ein Fuß lang, oben braun, unten weiß, etwa von der Größe eines Kaninchen nur etwas höher, sehr zart und niedlich. In Indien und Java, werden gezähmt.

3. Der Meminna. Mosch. Meminna.

Schreb. CCXLIII.

Graulich ins olivengrüne übergehend, unten weißlich, Seiten und Schenkel weißlich und gelblich gefleckt und gestreift, der Schwanz sehr kurz. 1½ Fuß lang. In Ceylon und Java *).

Alle nunmehr folgenden Wiederkauer haben, wenigstens die Männchen, zwey Hörner, oder zwey, mehr oder weniger lange, Hervorragungen des Stirnbeins, welche sich bey keiner andern Thierfamilie finden. Bey den einen sind die Hörner mit einer elastischen Scheide bedeckt, welche fast so aussieht, wie wenn sie aus zusammengebackenen Haaren bestünde; diese Scheiden wachsen schichtweise, und das ganze Leben durch; diese Substanz heißt eigentlich Horn, und diese Thiere bilden die Familie mit hohlen Hörnern. Auch der Knochenkern des Hornes wächst ebenfalls das ganze Leben durch und fällt niemals ab, solche

*) Das javanische Bisamthier gehört wahrscheinlich zu Mosch. pygmaeus. Buff. Suppl. VI. XXX. A. d. U.

Digitized by Google

Hörner haben die Gattungen des Ochsen, der Ziege, des Schafs und der Antilope.

Bey andern, sind die Hörner nur mit einer haarigen Haut umhüllt, welche von der Kopfhaut herstammt, und immer bleibt, die einzige Giraffe hat solche Hörner.

Bey noch andern, den Hirschen sind die Hörner nur während einer gewissen Zeit mit einer haarigen Haut bedeckt, welche eben so aussieht, wie die übrige Kopfhaut. An der Wurzel der Hörner steht ein knöcherner, höckeriger Ring, welcher durch sein Wachsthum die nährenden Gefäße dieser Haut verschließt, daher sie dann nach und nach trocken und abgerieben wird. Nach einer bestimmten Zeit löst sich das nackte Horn an seinem Knochenwulst, mit dem es auf der Stirn festsitzt, los und fällt ab, so daß das Thier eine Zeitlang ohne Vertheidigungswaffe ist, allein bald wächst ein neues Horn nach, welches gewöhnlich seinen Vorgänger an Größe und Stärke übertrift, aber nach der bestimmten Zeit auch wieder abfällt. Diese Hörner bestehen ganz aus Knochenmaterie, und tragen den Namen der Geweihe.

Hirsch. Cervus.

Hirsche heißen die mit Geweihen gezierten Wiederkauer, bey allen, ausgenommen bey der Art des Rennthieres, sind die Weibchen ungehörnt. Die Substanz der ganz ausgebildeten Hörner ist ein dichter Knochen, ohne Poren oder Gruben; seine Gestalt ist nach den Arten verschieden, und bey jeder Art nach dem Alter. Sie haben Thränenhöhlen oder unter jedem Auge eine Oeffnung in der Haut, welche einer Grube im Knochen entspricht, in die-

Digitized by Google

ser Höhle sitzen Drüsen, welche eine fettige Schmiere, wie Ohrenschmalz absondern, die mit Haaren vermischt ist, nach und nach vertrocknet und abfällt. Mit den Geschlechtstheilen steht die Erzeugung der Hörner in Verbindung, so bald die Geschlechtstheile verletzt sind, treiben die Hörner nicht mehr nach. Die Hirsche sind sehr schnellfüßige Thiere, leben im Allgemeinen in Wäldern von Laub, Gras, Baumknospen und auch von Getreide.

Man unterscheidet die Arten, deren Hörner ganz oder zum Theil platt sind, und die mit runden Hörnern.

1. Elennhirsch. Cerv. Alces. Linn.

Schreber CCXLVI. A. bis D.

So groß, oft noch größer als ein Pferd, mit langen Beinen, die Schnauze ist knorplig und aufgeschwollen, am Kinn sitzt eine Art von Kropf oder Beutel, an welchem ein Bart sitzt; das Haar lang und grob, am Halse eine kurze Mähne, die Farbe mehr oder weniger dunkelröthlichgrau. Das Geweih des Männchens, beym ersten Ausbruch ein Spieß, wird nachher sehr breit, und bildet eine dreyeckige Schaufel mit Zacken, welche auf einem runden Stiele steht, dies geschieht etwa im fünften Jahr, es wächst bis ins Alter, und erreicht zuweilen ein Gewicht von fünfzig bis sechzig Pfund, und bis auf vierzehen Zacken an jedem Horn. Die Hörner stehen seitwärts und geben dem Kopfe ein breites unförmliches Ansehen. Das Elenn ist scheu, schnell im Laufen, wehrt sich durch das Schlagen der Vorderfüße, fällt zuweilen mitten im Laufe plötzlich nieder. Wirft anfangs ein, dann zwey Kälber, und trägt neun Monate. Es lebt in beyden Welten, in

Digitized by Google

Europa findet man es noch in Preußen, Lithauen und durch das nördliche Asien, in Amerika, wo es Moosthier oder Orignal heißt, in Kanada; man findet es in kleinen Truppen in sumpfigen Wäldern. Seine Haut ist zur Sämischgerberei sehr gesucht.

2. Rennhirsch. Cerv. Tarandus. Linn. Schreb. CCXLVIII. A. bis È.

Von der Größe des Hirsches, aber die Beine kürzer und dicker; beyde Geschlechter haben Geweihe, welche sich in mehrere Aeste theilen; bey jungen sind sie dünne und spitzig, im Alter bekommen sie hingegen breite und gezähnte Schaufeln, statt der Zinken; im Sommer ist die Farbe des dichten, weichen Pelzes braun, im Winter wird sie dagegen fast ganz weiß, es giebt auch reinweiße. Der Schwanz ist kurz, der Bauch ist dunkler, an der Kehle ein Haarbüschel, und an der Luftröhre ein Sack, welcher mittelst einer Oeffnung zwischen Zungenbein und Schildknorpel mit dem Kehlkopf in Verbindung steht, wodurch die Stimme verstärkt wird: Dieses Thier bewohnt die nördlichsten Gegenden beyder Welten, und ist der Reichthum der Lappen, welche davon große Heerden haben, welche sie im Sommer in die Gebirge des Landes treiben, um wegen der Rennthierbremse, deren Larve Löcher in die Haut des Thiers macht, und sich unter derselben verwandelt, dieselben zu beschützen; sie sind treffliche Last- und Zugthiere; Fleisch, Milch, Haut, alles ist brauchbar. Auch diese Thiere machen beym Laufen mit ihren Hufen ein weittönendes Geklapper. Es ist das einzige Thier aus der Hirschgattung, welches gezähmt, als Hausthier ge-

Digitized by Google

braucht wird. Es giebt aber auch noch wilde, welche in großen Heerden umherziehen und sich wie die zahmen, hauptsächlich von Rennthiermoos ernähren.

3. Dammhirsch. Cerv. Dama. Linn *).
Schreb. CCXLIX. A. B.

Etwas kleiner, als der Edelhirsch, im Winter braunschwärzlich, im Sommer gelb, weißlich gefleckt, die Hinterbacken sind weiß, zu beyden Seiten mit einem schwarzen Streif begränzt, der Schwanz länger als am Edelhirsch, oben schwarz, unten weiß. Das Geweihe des Männchens ist rundlicht, an der Wurzel mit einem spitzen Ende, an der Spitze platt, und der ganzen Länge nach gezackt; hat der Hirsch ein gewisses Alter erreicht, so wird die Schaufel kleiner und theilt sich unregelmäßig in mehrere Riemen. Diese Art, welche die Alten platyceros nannten, ist im größten Theil von Europa zu Hause; und lebt in Wäldern in kleinen Rudeln, geht aber nicht weit nach Norden; man findet zuweilen ganz schwarze ungefleckte, auch ganz weiße.

Die Hirsche mit runden Geweihen sind zahlreicher, diejenigen, welche die gemäßigten Gegenden bewohnen, ändern im Winter mehr oder minder die Farbe.

4. Edelhirsch. Cerv. Elaphus. Linn.
Schreb. CCXLVII. A. bis E.

Der Pelz im Sommer ist gelbbraun, mit einer schwärzlichten Linie, und zu beyden Seiten längs dem Rückgrath

*) Am Mißuri soll es einen langschwänzigen Dammhirsch geben, dessen Art aber noch nicht bestimmt ist. A. d. U.

Digitized by Google

eine Reihe blaßfalber Flecken; im Winter einfärbig graubraun; Kreuz und Schwanz zu allen Jahrszeiten blaßfalb. Der Hirsch bewohnt die Wälder von ganz Europa, ausgenommen die kältesten Gegenden, auch in Asien findet er sich im gemäßigten Theile. Das Geweihe des Männchens ist rund und sproßt im zweyten Jahr zuerst als Spieße, nachher bekommt es mit jedem zweyten Jahre mehr Zacken und Perlen, und die Krone breitet handförmig mehrere Spitzen aus. Der sehr alte Hirsch wird schwärzer, die Haare am Hals länger und struppiger, Aristoteles nennt solche Hirsche Hippelaphi. Das Geweihe fällt im Frühjahr ab, bey alten Hirschen zuerst, und wächst den Sommer durch nach, so lange dieses währt, leben die Hirsche einsam, sonst in Rudeln oder Heerden. Im September beginnt die Brunstzeit, welche drey Wochen dauert, während dieser Zeit, sind die sonst sanften Hirsche wild, wüthend, und kämpfen fürchterlich mit einander, nach dieser Zeit aber begeben sie sich wieder in Rudel zusammen. Die Hirschkuh trägt 8 Monat, und wirft im May ein bis zwey Kälber, welche weiß gefleckt sind. Die Hirschjagd wird für die edelste gehalten, und jeder Theil des Hirsches in der Jägersprache hat eine eigene Benennung, ganz verschieden von der gewöhnlichen.

5. Canadischer Hirsch. Cerv. Canadensis.

Cerv. Strongyloceros. Schreb. CCXLVI. a. CCXVII. F. et G.

Größer als der europäische Edelhirsch, von derselben Farbe, die Hörner ebenfalls rund aber länger und ohne Krone, erscheint nur eine Varietät des Edelhirsches zu seyn.

Digitized by Google

Er bewohnt alle gemäßigten Theile von Nordamerika. Die Amerikaner nennen ihn Elk oder Elan *).

6. Virginischer Hirsch. Cerv. virginianus. Gmel.

Der Dammhirsch der Amerikaner, der Mazame der Mexikaner. Der Cariacu ist sein Weibchen. Cuv. et Geoff. mammif. Liv. 2.

Kleiner als der unsrige und schlanker, mit spitzigerer Schnauze, hellfalb im Sommer, rothgrau im Winter, Gurgel und Schwanz weiß. Das Geweih rund, glatt und weißlich, spreitet sich in der Mitte aus, und macht oben einen Bogen vor- und einwärts; er hat nie mehr als drey Enden. In Virginien bis Mexiko.

Die Arten der warmen Länder, verändern die Farbe im Winter nicht.

7. Ganges-Hirsch. Cerv. Axis. Schreb. CCL.

Falb, schön weiß gefleckt, Gurgel- und Schwanzgegend weiß, Schwanz falb, oben weiß gestreift, Geweihe rund, werden mit dem Alter sehr groß, haben niemals mehr, als eine Zacke an der Wurzel. Eigentlich in Bengalen, pflanzen sich aber leicht bey uns fort.

8. Das Reh. Cerv. capreolus. Linn. Schreb. CCLII. A. B.

Im Winter grau, im Sommer roth, die Hinterbacken weiß, keine Thränenhöhlen. Die Hörner kurz, gerade an

*) Auch der Wapiti, scheint dieser Hirsch zu seyn, nach neuen Beobachtungen. A. d. U.

Digitized by Google

der Spitze gegabelt; mit einem Zacken vorn an der Stange. Das Reh lebt Paarweise in den höhern Wäldern des gemäßigten Europa. Der Bock wirft sein Geweihe im December ab, und setzt es während dem Winter wieder auf. Die Brunstzeit ist im November, das Weibchen trägt fünf und einen halben Monat, und wirft meist zwey Junge. Sein Fleisch ist weit zärter, als das des Hirsches, es ist schneller und leichter als der Hirsch. In Rußland giebt es keine.

9. Tartarisches Reh. Cerv. Pygargus. Pall. Schreb. CCLIII.

Dem europäischen ähnlich, aber das Geweih ist an der Wurzel zackiger, das Haar länger; es hat fast die Größe und Gestalt des Dammhirsches. Lebt in den Steppen an der Wolga.

10. Indisches Reh. Cerv. Muntiac. Schreb. CCLIV.

Kleiner als das europäische, mit einem Schwanz, mit Thränenhöhlen und kleinen Eckzähnen, wie beym Hirsch, die Geweihe sind tief gegabelt, sehr kurz, stehen aber auf langen Knochenvorsprüngen, zwischen welchen die Haut gefaltet, elastisch und schmierig ist. Es lebt in kleinen Truppen in Ceylon und Java. Seine Haare, weiß an der Wurzel, braun an der Spitze, geben ihm ein graues Ansehen.

11. Schweinshirsch. Cerv. porcinus. Pennant Schreb. CCLI.

Braun, Steiß und Bauch grau, der Rücken weißge-

Digitized by Google

fleckt, Geweih dreiendig. Vaterland Bengalen, Borneo. Blos nach einem Exemplar im Pariser Museum bekannt *).

12. Mexikanischer Hirsch. Cerv. dichotomus. Illig.

Guasupuku. Azar.

Vor der Stirn erheben sich zwey walzenförmige Erhöhungen, sechs Linien hoch, mit Haut bedeckt, unter diesen liegen die Rosen. Das Geweihe beträgt über 14 Zoll, etwa in 4 Zoll ob der Rose theilt sich das Geweih in eine zweyzackige Gabel, wovon die eine Zacke nach vorn gerade ausgeht, und sich wieder in eine Gabel theilt, die andere Zacke theilt sich etwas nach hinten gedreht in einer Höhe von 3 Zoll wieder in zwey Enden, dessen hinteres viel kürzer ist; zuweilen giebt es mit fünf Enden. Die Augenlieder sind schwarz mit weißer Einfassung, welche rings um den Mund lauft, inneres Ohr und Untertheil des Kopfs weiß, eben so Unterbrust, und die Gegend zwischen den Hinterfüßen, alles übrige braunroth, Untertheil des Schwanzes schwarz, so auch ein längs der Brust laufender Streif. Die Jungen sind ungefleckt.

In Paraguay.

---

*) Die Arten Cervus niger, moschatus, subcornutus, hamatus, malaccensis, nach Geweihen und Köpfen in Museen, von Blainville aufgestellt, und wahrscheinlich in Asien zu Hause, können noch nicht als Arten aufgestellt werden, so wenig als der große Axis, albicornis, chinensis und unicolor, und der kleine Axis. A. d. U.

Digitized by Google

13. Feldhirsch. Cerv. campestris.

Gouazouti Azara. Wahrscheinlich Cerv. mexicanus. Linn. Gmel.

Von der Größe unsers Rehbocks. Das Geweihe ist dreyendig, das unterste Ende steht in der Höhe von etwa 2 Zoll ob der Rose, geht gerade aus und krümmt sich dann etwas aufwärts, etwa 4 Zolle höher macht das Horn eine Gabel, der eine Zacken geht wie der untere, der andere dreht sich etwas mehr rückwärts, das Geweih bald glatt, bald sehr höckerig. Dieser Hirsch ist der leichteste und schlankste, und bewohnt die freyen Felder von Paraguay, bis zu den Pampas von Buenos-Ayres. Untertheil, Schwanzende und Unterkopf, Augengegend und Hinterbacken schön weiß, das übrige röthlichbraun, im innern Ohr und zwischen den Beinen länger. Vielleicht nicht verschieden von Cerv. virginianus.

14. Rother Hirsch. Cerv. rufus.

Gouazupita. Azara.

Hochgelblichroth, Lippen, Untertheil des Kopfes, Schwanzes, Hinterbauch und Hinterbacken weiß. Das Geweihe entsteht auf einem höckerigen Ringe, ist ganz glatt, gerade, spitzig ohne Aeste. In Paraguay und Brasilien *).

*) Der Moschus americanus des Systems, soll das Weibchen, und Moschus delicatulus. Schreb. CCXLV. das Junge seyn? A. d. U.

Digitized by Google

15. Hirsch mit einfachen Hörnern. Cerv. simplicicornis. Illig.

Gouazoubira. Azara.

Die Hörner, wie beym vorigen einfach, die Physiognomie mehr schafähnlich, die Ohrspitze etwas rundlich. Augenkreis, Inneres der Vorderschenkel, Brust und Bauch weiß. Das lange Haar der Hinterbacken, der obere Theil des Schwanzes zimmetbraun, das übrige des Körpers braun, ins bläuliche ziehend, das Geweih sehr stark, aber nur 1½ bis 2 Zoll lang *).

Giraffe. Camelopardalis.

Beyde Geschlechter haben kegelförmige, immer mit einer behaarten Haut besetzte Hörner, welche niemals abfallen. Ueberdies ist dies Thier sehr merkwürdig durch den sehr langen Hals, durch die viel längern Vorderbeine, und durch einen Knochenhöcker auf der Stirne, dieser ist pyramidenförmig und steht vor den Hörnern, auf der Mitte der Stirn.

1. Ge-

*) Der Cariacou. Cerv. Cariacou. Ill. (nemorivagus dict. des so. nat.) ist kaum von diesem Hirsche verschieden, vielleicht auch mit dem Veado gualhera oder Cacuapara der Brasilianer und mit dem großen Hirsch der Anden einerley? doch ist dies nicht bestimmt anzugeben; auch der Pudu (Capra Pudu. Molina) scheint hierher und nicht zu den Ziegen zu gehören, wie Illiger zu beweisen sucht. Von unbekanntem Vaterland ist Cervus coronatus Geoffroi, nach einem Kopfe im Museum bestimmt. A. d. U.

Digitized by Google

1. Gefleckte Giraffe. Camelop. Giraffa. Linn. Schreb. CCLV.

Dieſes iſt das höchſte aller bekannten Säugethiere, denn es erreicht vorn bis auf achtzehen Fuß Höhe von den Füßen bis zum Kopf, daher der Rücken nach hinten abſchüßig; keine Thränengruben, das Schwanzende mit einem Büſchel, der Kopf pferdartig. Die ganze Länge von der Schnauze bis zum After 12 Fuß, der Hals allein mißt über 6 Fuß. Die Stachelfortſätze an der Schulter, betragen über einen Fuß. Der Pelz iſt kurzhaarig, grau, allenthalben mit unregelmäßigen eckigen falben oder bräunlichen Flecken dicht überſäet, eine kurze, grau und falbe Mähne, vom Hinterkopf bis zum Kreuz. Es iſt ein ſanftes und furchtſames Thier, vertheidigt ſich durch Ausſchlagen, lauft ſchnell, aber ſeines Baues wegen ſehr ſonderbar, es lebt mehr von Baumblättern, als von Gras, welches es ſeiner Höhe wegen nur mühſam abreißen kann. Man findet die Giraffe in kleinen Geſellſchaften von 3 bis 5 Stücken im ſüdlichen Afrika, vom Kap ziemlich weit landeinwärts, bis gegen den Senegal und Aethiopien. Seit den Zeiten der Römer, welche ſie zu ihren Spielen benutzten, ſind keine Giraffen in Europa geſehen worden.

Wiederkauer mit hohlen Hörnern. Cavicornia. Illig.

Sie machen die größere Zahl der Wiederkauer aus, die Gattungskennzeichen ſind ſchwer zu beſtimmen, man hat ſie von der Form der Hörner hergenommen, und die Proportion ihrer einzelnen Verhältniße dabey berückſichtigt: Geoffroi hat mit Vortheil die Verſchiedenheit des

Baues der Stirnfortsätze und des Knochenkernes der Hörner zur Eintheilung benutzt.

Gazellen. Antilope. Linn.

Die Substanz des Knochenkerns der Hörner ist fest, ohne Löcher oder Höhlen, wie das Geweih des Hirsches. Sie gleichen den Hirschen auch durch die Thränenhöhlen, durch den leichten Körperbau, und die Schnelligkeit ihres Laufes. Es ist eine sehr zahlreiche Gattung, welche man nach der Form der Hörner in Unterabtheilungen gebracht hat. Auch der Bau des Körpers ist sehr verschieden.

A. Geringelte Hörner, mit doppelter oder dreyfacher Krümmung, die Spitze vorwärts, einwärts oder aufwärts.

1. Gazelle. Antilop. Dorcas, Linn. et Pall.

Schreb. CCLXIX. Gazelle Buffon. Hierher gehört nach der Meinung Lichtensteins

Antilop. Revella. Der Revel, Schreb. CCLXX. und

Antilop. Corinna. Die Corinne, Schreb. CCLXXI.

Mit runden, dicken, schwarzen Hörnern; sie hat die Größe und angenehme Form des Rehes; oben hellrothgelb, unten weiß, längs den Seiten lauft ein brauner Streif, an jedem Knie steht ein Haarbüschel, auf jeder Schaamleiste ist eine tiefe Sackdrüse. Im nördlichen Afrika in unzählbaren Heerden, wenn sie angegriffen werden, bilden sie einen Kreis, und weisen von allen Seiten die Hörner. Sie sind die gewöhnlichste Beute der Löwen und Panther. Die Sanftheit ihres Blickes gab zu vielen Vergleichungen, in der schönen Poesie der Araber Anlaß.

Digitized by Google

Die Hörner des Kevels sind an der Wurzel zusammengedrückt, und haben zahlreichere Ringe, man findet ihn in Arabien, Sirien und Persien.

Die Hörner der Corinne sind viel dünner.

Auch die Gazelle mit kleinem Kropf (Antilop. subgutturosa. Schreb. CCLXX unterscheidet sich sehr wenig von der Dorkas, doch sind die Hörner bedeutend größer und die Farbe fällt mehr ins Graue, und an der Gurgel ist eine kropfige Vorragung. Sie findet sich in Persien. Lichtenstein hält sie eher für eine der Kropfgazelle verwandte Art.

2. Die Kropfgazelle. Antilop. gutturosa. Pall.

Schreb. CCLXXV. Djeren der Mongolen. Hoang-Yang der Chinesen.

Fast dieselbe Farbenvertheilung wie bey der Dorkas, aber sie hat die Größe eines Dammhirsches, der Kehlkopf bildet einen Kropf, und am Bauche ist ein Sack, fast wie beym Bisamthier. Das Weibchen hat keine Hörner. Diese Gazelle lebt in Heerden in den Steppen der Tartarey, Tibet und China, sie findet sich weder in feuchten noch waldigen Gegenden.

3. Der Springbock. Antilop. Euchore. Pall.

Schreb. CCLXXII. Pronkbock. Marsupialis. Zimmerm. Pygarga. Blumenb.

Größer als die Gazelle, von derselben Form und Farbe, sie zeichnet sich durch eine Hautfalte auf dem Kreuze aus, welche mit weißen Haaren umgeben ist, bey

Digitized by Google

jedem Sprunge, den das Thier macht, öffnet sich diese Falte und wird breiter. Sie lebt in großen Heerden in Südafrika. Die Hörner sind stark, an der Spitze einwärts gekrümmt, die Seitenlinie ist oben gelbroth, unten kastanienbraun.

4. Der Phalla. Antilop. Melampus. Lichtenstein.

Lichtensteins Reise in Afrika. Theil 2.

Mit langen leyerförmigen runzlichten Hörnern. Sie erreicht eine Länge von 4½ Fuß, und bis zu den Schultern eine Höhe von 3 Fuß. Oben ist sie rostfarb, mit schwarzem Rückenstreif, der Bauch weiß. Vom schwarzen Rückenstreif zieht sich ein glänzend schwarzer Streif, halbmondförmig am hintern Rande der Keule herunter, ob den Hufen ist ein schwarzer Fleck.

Im Lande der Betschuanen in Afrika in kleinen Rudeln.

5. Der Bleßbock. Antilop. Pygarga. Pall. *). Schreb. CCLXXIII.

Fünf Fuß lang, von schönem seidenartig glänzendem, anliegendem Haar, auf dem Rücken, Hals, Unterkopf und

*) Nach Pygarga gehört wahrscheinlich Blainvilles Antil nasomaculata, ihr Wuchs ist fast wie bey einer großen Ziege. Beine stark, dick, ziemlich kurz, mit Bürsten an den Knöcheln; die ziemlich langen Hörner biegen sich anfangs nach vorn und außen, darauf in ihrem übrigen und größten Theil nach innen und vorn, die Ringe sind ziemlich deutlich daran. Der Körper oben braun, unten weiß, der Kopf und die Hörner

Digitized by Google

an den Keulen ſchön kaſtanienbraun, Stirne, Geſicht, Bauch, Hinterbacken und Füße weiß. Im ſüdlichen Afrika am Kap in kleinen Rudeln.

6. Die Hirſchantilope. Antilop. Cervicapra. Pall.

Schreb. CCLXVIII.

Vielleicht die eigentliche Gazelle der Alten; die Hörner ſind groß und haben drey Windungen, die Farbe, wie bey der Gazelle. Man macht aus den Hörnern Waffen, indem man zwey und zwey mit entgegengeſetzten Spitzen mit einander verbindet.

7. Die Saiga. Antilop. Saiga. Pall.

Schreb. CCLXVIII.

Groß wie ein Dammhirſch, im Sommer rothgelb, im Winter grauweißlich. Die Schnauze iſt knorpelig, groß, wulſtig, die Naſenlöcher ſehr groß und weit offen, die Hörner leyerförmig, aber gelblich und durchſcheinend. Sie weidet rückwärtsgehend; wenn ſie trinkt, ſo ſteckt ſie die ganze Schnauze ins Waſſer, und ſauft durch die Naſe. Sie lebt in großen Heerden in Polen, Ungarn, klein Rußland. Bis zu den altaiſchen Gebirgen und hat ein ſchwaches Leben.

Unter dieſe Abtheilung gehört auch der Koba. Ant.

---

wurzel lebhaft rothbraun, eine große, weiße Querbinde mitten durch die Geſichtsfirſte unter den Augen, der Schwanz kurz und ſpitzig, braun, kurzhaarig, die Füße weiß. Vaterland wahrſcheinlich Afrika.

Digitized by Google

senegalensis, von dem man aber blos die Hörner kennt, welche denen der Gazelle gleichen, aber doppelt so lang sind.

B. Antilopen mit geringelten Hörnern und doppelter Krümmung, welche aber die Spitze nach hinten kehren.

8. Der Bubalis, Antilop. Bubalis, Pall.

Schreb. CCLXXVII. Hartebeest.

Lichtenstein rechnet dazu die eben angeführte Kob und Koba. Ant. senegalensis et lervia.

Der Körperbau ist im Ganzen gröber und schwerer als bey andern Antilopen, der Kopf lang, groß und schmal, die Augen stehen sehr hoch, die Stirn ist enge und zwischen den Hörnern steht ein Haarbüschel. Stirn und Gesicht schwarzbraun, die übrige Farbe gelbbraun, an der Außenseite der Schenkel schwarze Streifen, der Bauch weiß. Die Basis der Hörner liegt in einer Ebene mit dem Nasenrücken. Die Hörner sind an der Basis geringelt, machen dann eine halbmondförmige Biegung nach vorn, und dann wieder eine solche nach hinten, sie laufen spitzig aus.

In ganz Afrika, vom Kap bis zur Barbarei. Von diesem trennt Cuvier.

9. Den Kaama. Antilop. Caama, Cuv. *).

Cap-Hirsch der Holländer.

Dem vorigen ähnlich, aber die Krümmung der Hörner ist eckiger; der Umfang ihrer Wurzel, ein Streif auf dem Rücken der Schnauze, eine Linie am Hals, ein Längsstreif

*) 8 und 9 bilden die Sippe Alcelaphi von Blainville.

an jedem Schenkel, und das Schwanzende schwarz. Sie ist gemein am Cap, aber kaum von der vorigen verschieden?

C. Geringelte aber gerade wenig gekrümmte Hörner.

10. Der Gemsbock. Antilop. Oryx. Schreber CCLVII.

Von der Größe des Hirsches; mit dünnen, aber zwey bis drey Fuß langen Hörnern, welche ganz gerade, spitzig, und am untern Drittheil geringelt sind; beym Weibchen sind sie kleiner. Die Farbe des Haares ist aschgrau, der Kopf weißlich, schwarz gefleckt, über den Rücken, und an den Seiten ein schwarzer Streif; auf Schultern und den Schenkeln ein tief kastanienbrauner Fleck; der Schwanz lang, schwärzlich. Das Rückenhaar steht aufwärts gegen den Nacken. Aelian nennt dies Thier Oryx, wahrscheinlich hat ein solches, welches ein Horn verloren, die Sage vom Einhorn verursacht, welche so viel besprochen wurde. Der Gemsbock ist die einzige Antilope, welche sich mit ihren Hörnern den Hunden entgegensetzt, und wirklich zu fürchten ist. Die Klauen sind länger, als bey den übrigen Arten, dadurch erhält es die Fähigkeit, leicht über Felsen klettern zu können, er zieht daher bergichte Gegenden den Ebenen vor. Man findet diese schöne Antilope häufig im südlichen Afrika.

11. Der weiße Gemsbock. Antilop. leucoryx. Pall. Schreb. CCLVI. B.

Milchweiß, ein Fleck auf der Nase, einer auf den Augen, einer an den Hörnerwurzeln, kleinere an den Ohren

Digitized by Google

und Kniebänder an den Vorderbeinen roſtfarb, die Hörner weißlich. Ob eine eigene Art, oder nur eine Varietät, iſt ungewiß, da man die Beſchreibung nur nach einem Gemälde, welches in Perſien verfertigt wurde, wo ſie ſich finden ſoll, gemacht hat *).

12. Der Klippſpringer. Antilop. Oreotragus. Forst.

Schreb. CCLIX.

Die Hörner gerade, pfriemförmig, an der Wurzel runzlicht, vorwärts gerichtet. Das Haar des Körpers iſt ſehr dick, elaſtiſch, ſpiralförmig gewunden, an den Spitzen nicht rund, ſondern platt gedrückt, an der Wurzel weiß, an der Spitze gelb und braun geringelt. In Afrika auf Klippen und Felſen, wo das Thier ſehr geſchickt klettert. Größe des Rehes.

13. Der Grysbock. Antilop. Tragulus. Forst.

Die Hörner gerade, vorwärts ſchauend, rund, ſehr glatt, pfriemförmig, mit kurzen anliegenden Haaren. Varirt 1) die Hauptfarbe röthlichgrau, die Ohren auswendig ſchwarz. Die Thränenhöhlen ſchwarz (Grysbock der Holländer). Von der Größe einer Ziege. 2) Die Hauptfarbe hellröthlich, faſt iſabellfarb, über den Augen ein weißer Fleck. (Steenbock der Coloniſten). Hieher gehört

*) Wahrſcheinlich gehört hierher die Bezoargazelle Lichtenſteins, die man bald zu Oryx, bald zu Leucoryx gerechnet hat, und welche im Allgemeinen ſo gut, wie unbekannt iſt. Wahrſcheinlich erzeugen mehrere Gazellen den Bezoar. A. d. U.

Digitized by Google

wahrscheinlich Antilop. scoparia. Schreb. CCLXI. 3) Die Farbe heller. (Bleekbock).

Am Cap.

14. Grimmische Gazelle. Antilop. grimmia. Pallas.

Schreber CCLX. Ducker der Colonisten.

Von der Größe der Rehgeiß, röthlichgrau, die untern Theile weißgrau, ein Streif über die Stirne, und Schwanz schwarz. Die Hörner gerade, etwas rückwärts gebogen, an der Wurzel runzlichgeringelt, spitzig, kurz und schwarz, zwischen denselben ein Haarbüschel. Duckt sich bey Gefahr ins Gras nieder, daher der Name.

15. Zwergegazelle. Antilop. pygmea. Pall.

Nunnetie der Colonisten.

Die kleinste Gazelle selten bis zu einem Fuß hoch. Die Hörner gerade, rund, an der Wurzel geringelt, glänzend schwarz, der Körper braunroth. In Wäldern an der Südküste von Afrika. Diese vier Arten leben nicht in Gesellschaften, sondern paarweise.

16. Reh-Gazelle. Antilop. capreolus. Forst.

Die Hörner rund, ganz gerade, an der Wurzel geringelt, das Haar wollig, rothgrau, unten weiß, weich, dicht und lang. Die Länge 4 Fuß, 4 Zoll. An der Südküste von Afrika in Rudeln von fünf bis sechs Stück.

D. Geringelte Hörner, mit einfacher Krümmung, die Spitze nach hinten gerichtet.

Digitized by Google

17. Der Blaubock. Antilop. leucophaea. Pall. Schreb. CCLXXVIII.

Die Hörner sind rundlich und runzlich, sichelförmig nach hinten gekrümmt. Etwas größer als der Hirsch, blaugrau, die Hörner sind bey beyden Geschlechtern groß und gleichförmig gekrümmt, mit mehr als zwanzig Ringen. Kein Thränensack, der Schwanz quastig, Bauch und Füße und ein Fleck unter den Augen weiß. Afrika.

18. Pferdantilope. Antilop. equina. Geoffr.

So groß wie ein Pferd, grauröthlich, der Kopf braun, unter jedem Auge ein weißer Fleck, am Halse eine Mähne. Afrika?

E. Geringelte Hörner, mit einfacher Krümmung, die Spitze vorwärts.

19. Die Algazelle. Ant. Gazella.

Geoff. et Cuv. mammifer. Livr. 3.

Mit langen spitzigen bogenförmig gekrümmten Hörnern, an ihrer untern Hälfte geringelt. Thränenhöhlen. Kopf weiß, mit zwey grauen Flecken. Hals und Brust dunkelfalb, die Seiten heller. Bauch und innere Schenkel weiß, der Schwanz weiß, schwarzbräunlich an seinem Ende. Sie gehört zu den großen Arten. Lebt am Senegal. (Menagerie de Paris.)

20. Der Nanguer. Antilop. Dama. Pall. Schreb. CCLXIV.

So groß wie ein Reh, falb, Hals, Untertheil des Körpers und Hintertheil weiß, die Hörner runzlich vorwärts gebogen. Am Senegal.

Digitized by Google

21. Der Nagor. Antilop. redunca. Pall. Schreb. CCLXV.

Zimmetfarben, die Hörner wenig runzlich, vorwärtsgebogen, das Haar etwas wollig. In Afrika.

22. Der Ritbock. Antilop. Eleotragus. Pall. *). Schreb. CCLXVI. Antilop. arundinacea.

Mit runden spiralförmig geringelten, vorwärtsgekrümmten Hörnern, das Haar wollig, grau, unten weiß. Afrika.

F. Die Hörner spiralförmig gewunden.

---

*) Hieher gehören die von Blainville angeführten Arten.

? Vierhörnige Antilope. Ant. quadricornis. Blainville.

Hoorma-Dabad.

Mit vier Hörnern, die beyden vordern glatt, ziemlich dick, etwas dreieckig, nach hinten ein wenig gekrümmt, die hintern dünner, höher, kegelförmig, fast gerade, mit einfacher vorderer Bieguna. Diese Species, von welcher Blainville nur den Kopf sah, soll in Indien zu Hause seyn.

? Spitzhörnige Antilope. Ant. acuticornis. Blainv.

Auch von dieser Art kennt man nur die Hirnschale und Hörner, ohne das Thier oder sein Vaterland.

? Saltische Antilope. Ant. saltiana. Blainv.

Mit konischen Hörnern, sie sind schwarz, fast zwey Zoll lang, mit sechs bis sieben Ringen, die Ohren groß, keine Thränenhöhle; der Kopf ist mit feinen, gedrängten, kurzen, oben ganz fahlen, unter dem Unterkiefer weißen Haaren bedeckt, die Hinterfüße haben sehr lange Hufen. Sie findet sich nach Salt in Abyssinien und nähert sich der Ant. grimmia und pygmea.

Digitized by Google

23. Der Canna. Antilop. Oreas. Pall.
Schreb. CCLVI. Elanot der Coloniſten.

Die Hörner gerade, wenig rückwärts gebogen, glatt, eine Gräthe lauft ſpiralförmig um ſie, das Haar iſt grau längs dem Rückgrath iſt eine kurze Mähne, und am Hals eine Art vom Wamme, der Schwanz endigt in einen Pinſel. Sie iſt größer als ein Pferd, erreicht ein Gewicht von 800 — 1000 ℔. die Hörner höchſtens 1½ Fuß.

Im ſüdlichen Afrika.

24. Der Guib. Antilop. scripta. Pall.
Schreb. CCLVIII. Bontebock der Coloniſten.

Mit rundlichen faſt geraden gewundenen Hörnern, die Farbe kaſtanienbraun, mit weißen Streifen.

In Südafrika bis zum Senegal.

25. Die Waldantilope. Antilop. Sylvatica. Sparrm.
Schreb. CCLVII. B. Boſchbock.

Die Hörner beynahe gerade, etwas gewunden, geringelt, oben dunkelbraun, unter dem Auge und in der Kreutzgegend weiße rundliche Flecken, Bauch und Füße weiß.

In waldigen Gegenden an der Südküſte und Südoſtküſte von Afrika.

26. Der Kudu. Antilop. Strepsiceros. Pall.
Schreb. CCLXVII. Kudu der Coloniſten.

Mit zuſammengedrückten langen gekerbten, ſpiralförmig gewundenen Hörnern. Von der Größe des Hirſches, graubraun, auf dem Rücken ein weißer Streif, und vier Querſtreifen, am Geſicht ebenfalls ein doppelter weißer

Digitized by Google

Streifen, die Hörner ſind glatt in die Quere gekerbt, dreimal gekrümmt mit einer ſpiralförmigen Längsgräthe, unter dem Kinn ein kleiner Bart, und auf dem Rücken eine kurze Mähne. Im ſüdlichen Afrika, nicht in Rudeln. Außerhalb der Colonie.

G. Mit glatten Hörnern.

27. Der Nylgau. Antilop. Tragocamelus. Pall.

Schreb. CCLXII. und Antilop. picta. Schreb. CCLXIII. A. B.

Von der Größe des Hirſches oder etwas größer, mit kurzen vorwärts gekrümmten Hörnern; mitten am Halſe ſteht ein Bart; die Farbe iſt grau; an den Füßen ſind weiße und ſchwarze Ringe. Das Weibchen ungehörnt. Auf dem Rücken ein Höcker. Der Schwanz lang, mit einer Quaſte. In Bengalen und Oſtindien.

28. Schwarze Gazelle. Antilop. interscapularis. Pennant.

Schwarz, die Hörner rund, an der Wurzel geringelt zurückgebogen, walzenförmig, auf der Schulter eine langhaarige, weißliche Mähne, Schwanz mittelmäßig.

Im ſüdlichen Aſien.

29. Die Gemſe. Antilop. rupicapra. Linn. Schreb. CCLXXIX.

Die Hörner glatt, anfangs gerade, dann in einem Bogen rückwärts gekrümmt, bilden einen Hacken. Der Kopf iſt ſchmutzigweiß, durch die Augen geht ein ſchwärzlicher Streif; hinter jedem Ohr iſt ein Sack unter der Haut,

Digitized by Google

der sich nach außen durch ein kleines Loch öffnet. Die Haare der Gemse sind grob, lang, im Frühjahr weißgrau, im Sommer rothbräunlich, im Winter oft fast ganz schwarz, die Aftergegend gelb, der Schwanz kurz, lang behaart. Die Größe gleicht der Ziege, aber stärker, der Körper stärker und schwerer. Die Füße stark gespalten, und die Kanten der Hufe rauh. Die einzige Antilopen-Art des mittlern Europa. Ein Thier, welches die Alpen nie verläßt, und auf den schweizerischen, tyrolischen, savoyischen und salzburgischen Alpen wohnt, mit der größten Leichtigkeit über die steilsten Felsen und Klippen lauft, in Heerden von zwanzig bis vierzig Stück gesellschaftlich lebt, sehr scheu und furchtsam ist, und nur im Winter in die Waldungen der mittlern Alpen herabsteigt. Die Brunstzeit ist im November, wo die Böcke hitzig kämpfen, die Ziege trägt 22 Wochen und wirft im April und May ein, selten zwey Junge. Fleisch und Haut sind sehr geschätzt *).

*) Blainville macht aus der Gemse eine eigene Sippe Rupicapra und setzt noch ein anderes Thier hierher, unter dem Namen der amerikanischen Gemse. Rupicapra americana. Dieses ist ein Thier von der Größe einer mittelmäßigen Ziege, der Körper gestreckt, kurzbeinig und ganz mit langen, hängenden, ungekräuselten Haaren bedeckt, welche seidenartig und ganz weiß sind, der Kopf ziemlich lang, die Ohren mittelmäßig, die kurzen, ziemlich dicken, schwarzen, etwas quergeringelten Hörner rund, fast gerade nach hinten gerichtet, und in eine stumpfe Spitze auslaufend. Die Beine kurz und dick, mit kurzen scharfen Hufen. Das Thier steht in der Sammlung der Linneischen Gesellschaft in London, und ist in Nordamerika zu Hause.

Digitized by Google

30. Der Gnou. Antilop. Gnou. Zimmerm. Schreb. CCLXXX. Wilde Beest der Coloniſten.

Der Körper und das Kreuz iſt pferdeähnlich; das Haar braun, der Schwanz langhaarig, wie beym Pferd und weiß, auf dem Hals ebenfalls eine lange, hängende Mähne, an der Wurzel weiß, an der Spitze ſchwarz. Die Hörner ſind an ihrer Wurzel nahe an einander und breit, wie beym Büffel, gehen vorwärts und biegen ſich dann nach hinten um; die Schnauze iſt breit, platt, und durch einen Kreis aufſtehender Haare bezeichnet; unter der Gurgel an der kurzen Wamme iſt eine zweyte Mähne von ſchwarzer Farbe. Die Füße ſind ſchlank und leicht, wie beym Hirſch. Beyde Geſchlechter haben Hörner. Das Gnou lebt im ſüdlichen Afrika in gebirgichten Gegenden.

Schon die Alten ſcheinen es gekannt zu haben *).

---

*) Hierher gehört die neue Gattung, welche Ord aufgeſtellt hat, unter dem Namen der Gazellenziege. Antilocapra. Die Hörner ſind durch einen dichten Hornzapfen geſtützt, in eine Gabel getheilt, zuſammengedrückt; der Schwanz ſehr kurz; die Schnauze haarig; keine Thränenhöhlen, keine Haarbüſchel an den Knieen. Geſtalt und Sitten der Antilopen. Die einzige bis jetzt bekannte Art. Antilocapra americana. Hat Hörner mit vielen Streifen, ſie ſind ſchwach in die Quere gefurcht und warzig, etwas nach außen geneigt; am obern Theil glatt, rückwärtsgebogen, die Spitze nach innen gehend; etwas pfeilförmig, die Augen groß, ſehr hoch unter dem Grunde der Hörner. Die Ohren ſpitz, Beine ſchlank. Geſicht und Naſe dunkelkaſtanienbraun, Hals und Beine röthlichbraun, Bruſt, Bauch, Kreuz, Kopf oben, und inneres der

Digitized by Google

Die nun folgenden drey Gattungen haben einen Knochenkern ihrer Hörner, der größtentheils mit Zellen durchzogen ist, welche mit den Stirnhöhlen in Verbindung stehen. Die Richtung der Hörner wird zum Grunde der Eintheilung genommen.

Ziege. Capra.

Die Hörner sind nach oben und hinten gerichtet; das Kinn hat einen Bart, und die Lippen sind gewölbt. Beyde Geschlechter sind gehörnt.

1. Die Bezoarziege. Capra. Aegagrus. Gm. Schreb. CCLXXXII. Menag. du Mus.

Diese Ziege ist wahrscheinlich die Stammziege, von der unsere Hausziegen herkommen, sie hat große Hörner mit schneidendem Rücken. Bey der Ziege sind sie kleiner als beym Bock, zuweilen mangeln sie. Die Farbe rothbraun. Sie ist größer als die Hausziege, stärker gebaut, und der Bock hat viel größere Hörner, als der stärkste zahme. Sie leben in Heerden auf den Gebirgen Persiens, wo sie unter dem Namen Paseng bekannt sind. Der orientalische Bezoar ist eine kalkartige Masse, welche man in ihrem Magen findet. Auf den schweizerischen Alpen finden sie sich zuverläßig nicht wild, wohl ist es möglich, daß es dort zuweilen verwilderte Ziegen geben möchte und solche waren es wohl, welche man aus Savoyen nach Paris

---

Schenkel weiß, der Hals und eine starke Mähne, dunkelumberfarb, hinter jedem Ohr ein weißer Fleck. Das Haar sehr dick, grob, wollig. Die Länge der Hörner 12 Zoll. In Nordamerika.

Paris brachte, und welche nachher im Musée de Menagerie abgebildet wurden. Die Hausziegen variren gar sehr nach dem Klima, in Hinsicht auf Größe, Farbe, Länge und Feinheit der Haare; Größe und Zahl der Hörner.

Die angorische Ziege. Bouc de cachemir. Geoffr. et Cuvier, mammif. Livr. 6. Ist in Hinsicht der Haare, welche so fein wie Seide sind, und zu kostbaren Schaals verarbeitet werden, die berühmteste.

Die mambrische Ziege. Schreb. CCLXXXV. ist sehr klein, die Hörner sind ganz nach hinten gebogen und liegen dem Kopf nach.

Die Ziege von Juda hat einen kurzen Körper, ist niedrig und die Hörner winden sich mehrmal um sich selbst herum, die Ohren sind hängend, das Haar fein und wollig so fein als das von der Cachemir-Ziege. Cap. hircus reversa. Schreb. CCLXXXVI.

Die Zwergziege Capra hircus depressa, hat kurze Füße, kurze, dicke, dreieckige Hörner, das Haar struppig, lange Halsklunkern. In Afrika. Schreb. CCLXXXVII.

Die Ziege von Oberegypten. Geoff. et Cuvier, mammiferes. Livr. 10 und 12. Besonders merkwürdig, wegen der sehr gebogenen Schnauze, welche am Ende so platt ist, daß die untere Kinnlade mehr als um ein Zoll höher steht, und von der Stirne an die Schnauze ganz platt wird, so daß die Nasenlöcher dadurch sehr verengert werden. Die Ohren sind so lang als der Kopf und hängend, wie schmale Riemen. Die Haare lang und kastanienbraun, bilden am Rückgrath eine Mähne.

Digitized by Google

Es giebt auch vierhörnige Ziegen. Bey beyden Geschlechtern finden sich an der Kehle zwey behaarte Fleischanhängsel, die man Glöckgen nennt. Alle Ziegen sind muntere, launige Thiere, welche das Umherschweifen sehr lieben, in Gebirgsgegenden befinden sie sich am besten, klettern gerne über die Felsen, und nähren sich von Gras und Streuchern, den Wäldern sind sie sehr schädlich. Man ißt meist nur die Ziege, selten den Bock, der unerträglich riecht. Ein einziger reicht für 100 Ziegen hin; im sechsten oder siebenten Jahr hört die gehörige Zeugungskraft schon auf. Die Ziege trägt fünf Monat, gewöhnlich wirft sie zwey Junge. Die Ziegenmilch ist in vielen Krankheiten sehr nützlich.

2. Der Steinbock. Capra Ibex. Linn.

Meißner, Museum der Naturgeschichte Helvetiens. 1ster Band. Die Schreberische Abbildung ist unter aller Kritik.

Die Hörner des Steinbocks sind sehr groß, oben breit, mit vorspringenden Ringen versehen, deren Zahl mit den Jahren zunimmt, ohne jedoch das Alter zu bezeichnen, man hat Hörner von 16 Pfund und 20 — 22 Knoten. Die Hörner sind halbmondförmig nach hinten gebogen. Der Bart fehlt oder ist nur sehr unbedeutend. Die Farbe ändert vom röthlichgrauen bis zum Dunkelgrau nach der Jahrszeit, das Haar ist im Winter lang und grob. Der Steinbock bewohnt im mittlern Europa nur noch die zwischen Wallis und Piemont liegenden, schroffen und hohen Gebirge, in der Kette des Montblanc und Monte Rosa.

Digitized by Google

Die Ziege hat kleine Hörner. Die Begattungszeit fällt in den Januar, die Steinziege trägt 5 Monate, und wirft gewöhnlich nur ein Junges. Der Bock erhält ein Gewicht von 200 und mehr Pfunden Sowohl Steinbock als Gemse begatten sich zuweilen mit Ziegen, die Jungen sind fruchtbar.

3. Der sibirische Steinbock. Capr. caucasica. Güldenstädt.

Schreb. CCLXXXI. B.

Er ist eben so groß wie der schweizerische Steinbock. Die Hörner schwarzgrau, groß, dreieckig, stumpf, nicht viereckig vorn, aber knotig wie beim vorigen, das Ende glätter und zusammengedrückter. Der Schwanz kurz, aber lang behaart. Die Farbe dunkelbraun, im Alter schwarz. Das Männchen hat einen sehr starken Bart. In Sibirien auf den höchsten Gebirgen bis nach Kamtschatka.

4. Der afrikanische Steinbock. Capra aethiopica.

Danielis, Africa Scenerys. pl. XXIV.

Am Halse mit einer langen Mähne und langem Bart, die Hörner nicht so groß, als am europäischen, aber auch knotig, wenig gebogen. Die Hauptfarbe grauweiß, die Mähne schwarz. In den hohen Gebirgen Afrikas.

Schaf. Ovis.

Die Hörner stehen nach hinten, und krümmen sich mehr oder minder schneckenförmig, die Schnauze ist im Allgemeinen rundlicht, ihnen mangelt der Bart. Sie sind

Digitized by Google

mit den Ziegen so nahe verwandt, daß sie fruchtbare Bastarde zeugen. Es giebt, wie bey den Ziegen, mehrere in einander beynahe übergehende Arten.

1. Der sibirische Argali. Ovis Ammon. Pall. Schreb. CCXXXVIII.

Die Hörner sehr groß, an der Wurzel dreieckig, mit abgerundeten Ecken, an der Spitze platt, quergestreift, beym Weibchen klein, zusammengedrückt, sichelförmig. Das Haar im Sommer kurz, graufalb, im Winter dicht, lang, grauröthlich, die Schnauze weiß oder weißlich, eben so Gurgel und Bauch, in beyden Kleidern ist die Schwanzgegend gelblich; der Schwanz sehr kurz. Dieses Thier bewohnt die hohen Gebirge von Mittelasien und Nordasien, hat die Größe des Dammhirsches, ist schnell, scheu und flüchtig, klettert wie die Gemse leicht auf Felsen, und seine Jagd ist sehr gefährlich und mühsam.

2. Der sardinische Mouflon. Ovis Musimon. Illig.

Geoff. et Cuvier mammiferes.

Unterscheidet sich hauptsächlich durch die geringere Größe, wobey indeß der Körper verhältnißmäßig schwerer zu seyn scheint, das Weibchen hat selten oder dann sehr kleine Hörner. Man findet sie in Sardinien, Korsika und Creta. Es giebt eine schwarze und eine andere fast weiße Varietät.

Digitized by Google

3. Der amerikaniſche Argali. Ov. moutana. Geoff.

Schreb. CCXIV. D. Annal. du Mus. 11. pl. LX.

Hochbeiniger und leichter gebaut, als der Argali der alten Welt. Die Hörner groß und dick, und bilden eine vollkommnere Spirallinie als beym Argali, die Farbe braungraulich, Schnauze und Hinterbacken weiß. Das Thier lebt auf den hohen Gebirgen von Nordamerika. Ob es aus der alten Welt herüber gekommen, iſt doch wohl zweifelhaft?

4. Der afrikaniſche Argali. Ovis. tragelaphus. Cuv.

Das Haar iſt röthlich und weich, am Halſe eine lange, hängende Mähne, an der Fußwurzel ſtehen ebenfalls lange Haare; der Schwanz kurz. Dieſes Thier ſcheint eine eigene Art auszumachen, und bewohnt die gebirgigten Gegenden der ganzen Barbarey, Geoffroy hat es auch in Egypten beobachtet.

Ob von dieſem, vom Mouflon oder vom ſibiriſchen Argali unſere Schafe abſtammen, iſt wohl ſchwer zu ſagen? Aeußerſt zahlreich ſind die Varietäten dieſer Hausthiere. Man hat große und kleine Raſſen, mit großen und kleinen Hörnern, welche bald bey beyden Geſchlechtern ſich vorfinden, bald dem Weibchen mangeln, oder auch ſelbſt den Männchen. Die merkwürdigſten Varietäten ſind.

Das ſpaniſche Schaf (Ovis aries hispanica), mit feiner und dichter Wolle, das Männchen hat ſpiralförmige

Hörner, diese Rasse hat sich fast durch ganz Europa verbreitet.

Das englische Schaf (Ov. aries anglica), mit langer feiner Wolle.

Das langschwänzige Schaf (Ov. macroura). Schreb. CCXCIII. im südlichen Rußland gemein, mit sehr langem Schwanz.

Das guineische Schaf (Ov. aries guineensis). Schreb. CCXCIV. A. B. C. Hochbeinig, langschwänzig, die Nase sehr gebogen, die Ohren hängend, ohne oder mit sehr kleinen Hörnern, und kurzes Haar statt der Wolle.

Die Schafe des nördlichen Europas und Asiens, sind meist klein und kurzschwänzig.

Die persische, tartarische und chinesische Rasse, hat gar keinen Schwanz (Ov. aries steatopygos). Schreb. CCXCII. er hat sich ganz in einen Fettklumpen verwandelt, die syrischen und barbarischen Schafe haben einen langen, aber eben so fetten Schwanz. Bey beyden sind die Ohren hängend, die Hörner beym Widder groß und dick, mittelmäßig beym Schaf, die Wolle mit Haaren gemischt.

Der isländische Widder hat oft drey bis vier Hörner, das ungarische und wallachische Schaf (Ovis aries strepsiceros), Schreb. CCXCI. A. B. hat lange aufwärtsstehende, gewundene Hörner, fast wie der Kudu.

Allenthalben wird das Schaf seines Fleisches, seiner Milch, seiner Haut, seiner Wolle, und selbst seines sehr treibenden Dunges wegen sehr geschätzt, der durch das Pferchen auf Wiesen und Aecker gebracht wird, da aber

das Schaf im Freyen waiden muß, so kann seine Zucht im Großen nie in sehr bevölkerten und angebauten Gegenden betrieben werden, da hier die Waiden fehlen. Das Lamm entwöhnt sich nach zwey Monaten, man verschneidet die Böcke, welche man nicht zur Zucht ziehen will, im sechsten Monat. Die Milchzähne wechseln vom ersten bis zum dritten Jahr. Nach Verlauf eines Jahrs ist das Schaf zur Fortpflanzung fähig, und dies dauert bis zum zehenten oder zwölften Jahre; die Tragezeit ist fünf Monat, es wirft zwey Junge. Der Widder ist im achtzehnten Monat zur Fortpflanzung geschickt, einer ist für dreißig Schafe genug: gegen das achte Jahr werden sie fett gemacht.

Ochsen. Bos.

Die Hörner stehen zur Seite und ihre Spitze aufwärts oder vorwärts, in Form eines Halbmondes; es sind große Thiere mit breiter Schnauze, dickem Körper und starken Gliedern.

1. Der Hausochse. Bos Taurus. Linn.

Der eigene Charakter dieses Thiers ist die platte Stirne, und die runden Hörner, welche an der vorspringenden Linie entspringen, welche die Stirn vom Hinterhaupt trennt. Bey den foßilen Köpfen, welche dem wilden Stier angehört zu haben scheinen, krümmen sich diese Hörner nach vorn und unten, bey den vielen Varietäten des jetzigen zahmen Ochsen, ist Form, Größe und Richtung der Hörner sehr verschieden, zuweilen mangeln sie sogar. Die Rassen der heißen Zone, haben einen Fetthöcker auf den Schultern, wie beym Zebu, (Bos Zebu oder indicus

Schreb. CCXCVIII.) es giebt auch solche Arten, welche kaum ein großes Schwein an Größe übertreffen. Es ist wohl nicht nöthig, den mannigfaltigen Nutzen dieses Thiers, als Last- und Zugthier, als Milchvieh und so weiter, aus einander zu setzen. Die Kuh trägt neun Monat und ist bis zum achtzehnten Jahre zur Fortpflanzung tüchtig. Man verschneidet gewöhnlich die Ochsen, welche man nicht zur Zucht braucht, ein einziger Stier reicht für achtzig bis hundert Kühe hin. Merkwürdig ist es, daß dieses Thier weder in Südamerika noch in Neuholland vorgefunden wurde, wohin es die Europäer jedoch jetzt verpflanzt haben.

2. Der Auerochse. Bos Urus. Linn.

Schreb. CCXCV.

Man hält dieses Thier, vielleicht mit Unrecht? für den Stammvater unsers Hausochsen, er unterscheidet sich durch die gewölbte Stirn, welche breiter, als hoch ist, und dadurch, daß die Hörner hinter der Hinterhauptsgräthe entspringen, durch die Höhe seiner Schenkel, durch ein Paar Ribben, welche er mehr hat, durch das lange, wollige, struppige Haar, welches Kopf und Hals des Männchens bedeckt, und unter dem Kinn einen Bart bildet; die Stimme ist grunzend. Die Hörner sind kurz, aber dick und stark. Der Auerochse ist viel größer und stärker als der Hausochse, die Länge eines großen Stiers ist von der Schnauze bis zum After zehen Fuß, die Höhe vorn bis zum Rücken sechs Fuß. Die Kuh kleiner, sieben Fuß lang, die Höhe bey den Schultern kaum fünf Fuß, aber vorn auch zottig wie der Stier, nur nicht so langhaarig. Die Farbe schwarzgrau. Der Auerochse ist ein wildes und schwer zu bändi-

Digitized by Google

gendes Thier, doch werden sie zahm. Er findet sich in den großen Wäldern von Preußen, Lithauen, den Carpathen und am Caucasus in sumpfigen Gegenden; ehemals lebte er auch im übrigen Theil des gemäßigten Europa. Nach dem Nashorn und der Giraffe, ist es das größte Landthier.

3. Amerikanischer Auerochse. Bos Bison.

Schreb. CCXCVI. Geoff. et Cuv. Livr. 12.

Dieser Ochse ist noch nicht hinlänglich mit dem europäischen verglichen worden, um mit unbedingter Gewißheit denselben als eigene Art aufstellen zu können, Schwanz und Füße sind kürzer, dagegen die Haare am Hals und Bart länger, auf der Schulter ein Fetthöcker. Viel größer als der Hausochse, wird zwanzig bis zwey und zwanzig Centner schwer. In Heerden in den sumpfigen Gegenden von Mexiko und Louisiana. Es soll schon vor Entdeckung von Amerika gezähmt und als Hausthier gebraucht worden seyn?

4. Ochse mit der Stirnbinde. Bos frontalis.

Linnean Transsections. T. VII. p. 57.

Die Farbe ist schwarz ins bläuliche fallend, an der Stirn eine graue Binde, die Hörner dick, aus einanderstehend und kurz, der Schwanz dünn, fast nackt, am Ende flockig. Das Haar am übrigen Körper weich. Keine Mähne. Die untere Lippe ist an der Spitze weiß, mit stachlichten Haaren besetzt. Die Hörner sind blaß.

In Ostindien.

Digitized by Google

5. Der Büffel. Bos Bubalus. Linn.

Schreb. CCC.

Urſprünglich aus Indien, von wo aus er nach Egypten, Griechenland und Italien kam, doch erſt im Mittelalter, die Alten kannten ihn nicht. Die Stirn iſt gewölbt, länger als breit, die Hörner ſind ſeitwärts gerichtet, und vorn mit einer vorſpringenden Gräthe bezeichnet. Der Büffel iſt zwar gezähmt, aber doch unbändig und wird leicht zornig, iſt aber ſehr ſtark. Er liebt ſumpfige Orte, und harte Pflanzen, welche dem Ochſen nicht zuträglich ſind. Seine Milch iſt gut, ſein Leder vortrefflich, das Fleiſch ſchlecht.

? 6. Der Rieſenbüffel. Bos Arni.

Dieſer Büffel wird bis zur Hörnerſpitze 14 Fuß hoch, und die Hörnerſpitzen ſtehen ſeitwärts bis 10 Fuß aus einander, er wird bis auf vierzig Centner ſchwer. Die Hautfarbe iſt ſchwarz, die Stirnkrauſe roth. Von dieſem ſcheinen die verſteinerten Knochen in Sibirien zu ſtammen. Er lebt im gebirgigten Hindoſtan. Nach Cuviers Meinung vom Büffel nicht verſchieden?

7. Afrikaniſcher Büffel. Bos Caffer. Sparrmann.

Schreber. CCCI.

Die Hörner ſind an der Wurzel ſehr breit, richten ſich mit der Spitze ſeitwärts und unterwärts, am Ende wieder aufwärts, ſie bedecken mit ihrer Wurzel faſt die Stirne, und laſſen an derſelben nur einen dreyeckigen Fleck offen.

Digitized by Google

Es sind sehr wilde Thiere, welche den Menschen selbst angreifen und in den Wäldern des südlichen Afrika leben.

8. Bisamthier. Bos moschatus.

Schreb. CCCII. B.

Die Hörner stehen an der Wurzel einander so nahe wie beym vorigen, und sind eben so gebogen, aber die Spitze hinterwärts, sie bilden auf der Stirne eine gerade Linie, beym Weibchen sind sie kleiner und stehen weiter aus einander, er hat niedrige Beine, ist mit dichten, langen, fast auf die Erde hängenden Haaren bedeckt. Der Schwanz sehr kurz. Der Bisamgeruch, der fast allen Arten gemein ist, ist sehr stark. Dies Thier findet sich in den kältesten Gegenden von Nordamerika. Zuweilen scheint sein Gerippe durch das Eis bis nach Sibirien zu gelangen. Die Eskimaux machen aus seinem Schwanz Mützen, dessen Haarquaste, indem sie das Gesicht bedeckt, sie vor den Stichen der Moskiten schützt.

9. Der grunzende Ochse. Bos grunniens. Pall.

Schreb. CCXCIX. A. B.

Diese Art ist von kleiner Statur, der Schwanz ist durchaus mit langen Haaren, wie beym Pferde bedeckt, auf dem Rücken eine Mähne, die ebenfalls aus langen Haaren besteht; sein Kopf gleicht etwas dem Büffel, er ist aber noch nicht genau beschrieben. Dieses Thier kannte schon Aelian, und nannte es Bos poephagus, der ganze Körper ist mit weichen, seidenartigen, langen Haaren besetzt. Auf dem Rücken hat der Stier einen Buckel, wel-

Digitized by Google

cher der Kuh fehlt. Sie werden bey den Kalmucken und Kirgisen als Hausthiere gehalten, und sind wie alle Hausthiere auf mancherley Art gefärbt, schwarz, mit weißer Mähne und Schweif, röthlich, weiß, und so weiter. In Tibet soll dieses Thier auch noch wild vorkommen. Die Schwänze werden als Standarten gebraucht, und sind bey den Türken und Chinesen sehr im Gebrauche, als Auszeichnung höherer Offiziere.

Achte Ordnung der Säugethiere.

Fischartige Säugethiere, Fischzitzthiere.

Cetacea.

Diese Ordnung begreift die Säugethiere ohne Hinterfüße, der Leib endigt sich in einen dicken Schwanz, der eine wahre horizontale Floße ist, der Kopf vereinigt sich mit dem Körper, durch einen so kurzen und so dicken Hals, daß man keine Verengerung bemerkt, er ist aus kleinen Nackenwirbeln zusammengesetzt, die zum Theil unter sich verwachsen sind. Die vordern Extremitäten haben verkürzte Knochen, sie sind abgeplattet und in eine sehnige Membran eingehüllt, so daß auch sie zu wahren Floßen werden. Im Allgemeinen also haben sie die Gestalt der Fische, nur daß der Schwanz waagerecht steht: Sie leben auch beständig im Wasser; da aber alle wallfischartigen Thiere wahre Lungen haben, so sind sie gezwungen, den Kopf oft über das Wasser zu strecken, um Luft athmen zu können. Ihr Blut ist warm, die Ohren haben eine äußere Oeffnung, die zwar sehr klein ist. Sie sind le-

Digitized by Google

bend gebärend, erzeugen in ihren Brüsten Milch, und saugen ihre Jungen. Dies und ihr ganzer innerer Körperbau, unterscheidet sie hinlänglich von den Fischen. Das Hirn ist groß, seine Halbkugeln wohl entwickelt; das Felsenbein, welches die Gehörorgane enthält, ist vom übrigen Kopfe getrennt, und hängt nur durch Bänder mit ihm zusammen. Sie haben nie ein äußeres Ohr, und keine Haare. Die Gestalt ihres Schwanzes nöthigt sie, ihn von oben nach unten zu biegen, um vorwärts zu kommen, er hilft ihnen aber sehr zum Steigen, aus der Tiefe in die Höhe.

Den Gattungen, welche man früher den Wallfischen zuzählte, ist hier noch ein Thier zugesellt, welches Linne unter die Wallrosse zählte. Es bildet die erste Familie.

Wallfische, welche Gras fressen.

Die Zähne haben platte Kronen, dieses Merkmal bezeichnet schon ihre Lebensart, ihre Nahrung zwingt sie oft aus dem Wasser zu gehen, und am Ufer umher zu kriechen und zu waiden; sie haben zwey Eiter an der Brust und an der Schnauze Haare und Bartborsten, zwey Umstände, welche ihnen von Ferne, wenn sie ihren Vorderleib aus dem Wasser gerade emporstrecken, einige Aehnlichkeit mit einem Weibe oder Manne giebt, und vielleicht zu der Sage der Tritonen und Sirenen Anlaß gegeben haben mag. Ob schon die knöchernen Nasenlöcher-Kanäle sich im Schedel aufwärts begeben, so durchdringen sie die Haut erst am Ende der Schnauze.

Digitized by Google

Die Manatis. Manatus Cuvier.

Trichechus Manatus. Schreb.

Mit ablangem, walzenförmigem Körper, der sich in eine eiförmig verlängerte Floße endigt; die Backenzähne, deren acht auf jeder Seite sind, haben eine viereckige Krone, welche durch zwey Längshügel bezeichnet ist; die alten haben weder Schneide- noch Eckzähne, bey den Jungen findet man dagegen zwey sehr kleine Vorderzähne im Zwischenkieferknochen, welche aber bald ausfallen. Man bemerkt Spuren von Nägeln an ihren Floßfüßen, welcher sie sich mit ziemlicher Fertigkeit zum Klettern ans Ufer, und zum Tragen ihrer Jungen bedienen; man hat daher diese Organe mit Händen verglichen, und dem Thier den Namen manatus (Handthier) gegeben. Der Magen hat mehrere Säcke, der Blinddarm theilt sich in zwey Aeste, das Kolon ist bucklicht; alles Kennzeichen eines grasfressenden Thieres. Man nannte sie auch wohl Seekühe oder Meerfräulein.

1. Amerikanischer Manati. Manat. americanus. Illig.

Le Lamantin.

An zwanzig Fuß lang, bis 8000 Pfund schwer, die Haut grau, hin und wieder einzelne Haare, das Maul klein. In den amerikanischen Meeren bey den Antillen, an der brasilischen Küste u. s. w.

2. Fluß Manati. Manat. fluviatilis. Illig.

In den großen Flüssen, Oronoko, Amazonenfluß, und ihren Mündungen, waidet Gras am Ufer, kommt aber nicht auf dasselbe.

Digitized by Google

3. Neuholländischer Manati. Manat. australis. Illig.

An der Nordwestküste Neuhollands, von Dampier entdeckt.

4. Afrikanischer Manati. Manat. Sphaerurus. Illig.

Der Kopf kurz, Unterkiefer gebogen, die Nasengrube viel länger als breit, etwa 15 Fuß lang *).

Dugong. Halicore. Illig.

Die Backenzähne sind wie aus zwey Kegeln zusammengesetzt, welche sich an der Seite vereinigen, die Vorderzähne am Zwischenkieferknochen sind bleibend, und werden zu spitzigen Fangzähnen, bleiben aber größtentheils durch die fleischigen, mit harten Bartborsten versehenen Lippen bedeckt. Der Körper ist verlängert, und der Schwanz endigt in eine halbmondförmige Floße.

1. Wallfischartiger Dugong. Halic. cetacea. Illig.

In den Meeren des südlichen Asiens, Afrikas und Australiens. Das Fleisch ist gut zu essen, und schmeckt wie Rindfleisch.

Borkenthier. Rytina. Illig. Stelleres. Cuv.

Sie haben wahrscheinlich auf jeder Seite nur einen einzigen zusammengesetzten Backenzahn, mit platter und

*) Stellers Seeaffe, den er unweit Kamtschatka sah und als behaart beschreibt, war etwa 5 Fuß lang und gehört wahrscheinlich zur Gattung Manatus, Illiger nennt ihn M. Simia.

A. d. U.

mit Schmelzleiſten verſehener Krone. Ihre Floßen haben keine Nagelſpuren mehr. Nach Steller, welcher ſie zuerſt beſchreibt, iſt ihr Magen auch einfacher.

1. Stelleriſches Borkenthier. Rytina. Stelleri.
Rytina cetacea. Illig.

Die Haut iſt riſſig wie Eichenrinde, haarlos. Es wird bis auf 24 Fuß lang, und nährt ſich von Seetang. Im Norden des ſtillen Meeres.

Eigentliche Wallfiſche.

Sie unterſcheiden ſich von den vorigen, durch den ſonderbaren Apparat, der ihnen allen den Namen der Blaſer oder Spritzer verſchafft hat. Sie verſchlucken nehmlich mit ihrer Beute, eine große Menge Waſſer, welche in den weit geſpaltenen Mund eintritt, und haben daher einen Kanal nöthig, dieſe Menge Waſſer wieder fortzuſchaffen: das Waſſer dringt in die Naſenlöcher, durch eine eigene Einrichtung des Gaumenſegels, und ſammelt ſich in einem Sack, am äußern Ende der Naſenhöhle, aus welchem es durch die Naslöcher mit großer Kraft ausgetrieben wird. Die Oeffnung der Naſenlöcher iſt ſehr eng und ſteht oben auf dem Kopf. Schon von weitem bemerkt der Schiffer das Ausſpritzen des Waſſers. Die Naſenlöcher, welche beſtändig mit Salzwaſſer gefüllt ſind, konnten mit keiner ſehr empfindlichen Riechhaut bekleidet ſeyn: die vorſpringenden Kanäle und Muſcheln der andern Säugethiere fehlen; der Riechnerve iſt ſehr klein, und wenn ſie wirklich Geruch haben, ſo kann er nicht ſtark ſeyn. Der Kehlkopf

iſt

ist pyramidenförmig, und wird durch den hintern Theil der Naslöcher durchbohrt, so kann Luft in die Lungen kommen, ohne daß das Thier nöthig hat, seinen Kopf aus dem Wasser zu heben; im Kehlkopf sind ebenfalls keine vorspringenden Plättchen, die Stimme ist daher ein einfaches Brüllen. Sie haben keine Spur von Haaren, aber der ganze Körper ist mit einer weichen Haut bedeckt, unter welcher jener dichte, öhlige Speck ist, dessen Gewinn hauptsächlich die Verfolgung dieser Thiere verursacht.

Die Eiter liegen nahe am After, und mit ihren Floßen können sie nichts fassen. Der Magen hat fünf, oft sogar sieben bestimmte Abtheilungen; statt einer Milz, haben sie mehrere kleine rundlichte. Diejenigen, welche kegelförmige Zähne haben, haben alle Zähne von derselben Form; sie kauen nicht, sondern verschlucken schnell alles. Zwey kleine Knochen im Fleische, nahe am After steckend, sind die einzigen Spuren der Hinterfüße. Mehrere haben auf dem Rücken eine sehnige Floße, ohne Knochen. Die Augen sind platt und haben eine dicke starke Haut; die Zunge ist weich und glatt.

Man kann sie noch in zwey kleine Familien theilen, diejenigen, deren Kopf im Verhältniß mit dem Körper steht, und solche, bey denen er sehr groß ist; die erste begreift die Delphine und die Einhornfische.

Die Form ist immer walzenförmig, keine äußern Ohren, die Ohrkanäle schließen sich durch Muskeln, wodurch das Eindringen des Wassers gehindert wird.

Digitized by Google

Delphine. Delphinus. Linn.

Haben in beyden Kinnladen sehr viele ganz einfache Zähne, meist von Kegelform. Sie sind am meisten fleischfressend, und verhältnißmäßig ihrer Größe sehr grausame Thiere. Sie haben keinen Blinddarm.

Wahre Delphine. Delphinus. Cuvier.

Die Schnauze bildet noch vorn eine Art von Schnabel, der dünne auslauft.

1. Der Delphin. Delph. Delphis. Linn.

(vulgaris Lacep.). Schreb. CCCXLIII.

Mit zusammengedrücktem Schnabel, auf jeder Seite der Kinnlade stehen vierzig bis zwey und vierzig dünne, etwas gebogene, spitzige Zähne. Er ist oben schwarz, unten weiß, acht bis zehen Fuß lang. Dieses Thier ist in allen Meeren verbreitet, lebt in großen Schaaren, und ist durch die Geschicklichkeit und Schnelligkeit seiner Bewegungen bekannt, so daß es sich oft auf das Verdeck kleiner Schiffe oder auf das Ufer herauf schnellt. Er scheint der Delphin der Alten zu seyn. Die ganze Organisation des Hirnes zeigt, daß er wirklich die Fähigkeiten besitzt, die man ihm zuschreibt. Der Magen hat sieben Blindsäcke, er lebt von kleinen Fischen.

2. Dünnschnabliger Delphin. Delph. rostratus.

Dauphin a bec mince.

Der Kopf ist mehr gewölbt, der Schnabel zusammengedrückter, dünner, mit 21—32 kegelförmigen Zähnen auf

Digitized by Google

jeder Seite; die Farbe ist blässer, daher heißt er auch der weiße Delphin. Er soll in den amerikanischen Gewässern vorkommen.

3. Der große Delphin. Delph. Tursio. Schreb. CCCXLIV.

Mit kurzem, breitem, zusammengedrücktem Schnabel, mit ein und zwanzig bis drey und zwanzig Zähnen, welche konisch, zuweilen abgestumpft sind. Sie erreichen oft eine Länge von mehr als fünfzehn Fuß. Er scheint im Mittelmeere und im Ocean vorzukommen.

5. Der Nordkaper. Delph. Orca. Lacep. Schreb. CCCXL. Le paulard. Butzkopf.

Körper und Schwanz verlängert, der Schedel wenig erhaben; die Schnauze rundlich und kurz; die obere Kinnlade etwas länger als die untere, welche dagegen etwas breiter ist; die Zähne ungleich, kegelförmig, etwas rückwärts gebogen, stumpf. Die Rückenfloße ist ungefähr in der Mitte des Körpers. Im atlantischen Meere bis zum Nordpol, und im Ocean bis zum Aequator.

6. Der Streiter. Delph. gladiator. Lacep. Le gladiateur.

Der Kopf sehr erhaben, die Schnauze sehr rund und kurz; die Kinnladen gleich lang; die Zähne spitzig und rückwärts gekrümmt; die Rückenfloße nahe am Nacken, viel länger, als beym Nordkaper. Er wird bis zu dreißig und vierzig Fuß lang, schwimmt in Schaaren, und greift den Wallfisch an, wenn er noch jung ist, und soll besonders ihm die Zunge ausreißen. Er verschlingt ganze Tun-

Digitized by Google

nen Heeringe. Man findet ihn vorzüglich in den sehr nördlichen Meeren. Cuvier vereinigt ihn mit dem Nordkaper *).

7. Der Nesarnac. Delph. Nesarnack. Lacep.

Körper und Schwanz lang. Der Kopf rund, die Schnauze platt, wie ein Gänseschnabel, die untere Kinnlade länger, in jeder sind 40 bis 42 Zähne, welche schmal und fast walzenförmig sind. Die Rückenfloße ist nicht breit. Die Farbe schwärzlich, mit einigen dunklern Seitenstreifen. Man fängt ihn mit Mühe, da er selten den Küsten sich nähert. Er findet sich im nördlichen Theil des atlantischen Oceans.

? 8. Zweyzähniger Delphin. Delp. Bidens. Lacep.
Schreb. CCCXLVI.

Der Körper kegelförmig verlängert, der Kopf oben erhaben; die Schnauze lang und sehr platt; in der Unterkinnlade stehen nur zwey spitzige Zähne ganz vorn; die Rückenfloße ist lanzenförmig und steht nahe am Schwanz. Oben braunschwärzlich. Soll nach Cuvier nicht vom folgenden Hyperoodon verschieden seyn.

? 9. Der Feres. Delp. Feres. Bonnaterre.

Die Schnauze kurz und abgerundet, die Zähne ungleich, eiförmig aber gespalten und gegen die Spitze abgestumpft. Im Mittelmeer, gehört vielleicht zu Tursio?

---

*) Auch der großbauchige Delphin. Delp. ventricosus. Lacep. Schreb. CCCXLI. soll nur der Orca seyn, der zu verderben angefangen hat, daher aufgeblasen ist.

Digitized by Google

10. Duhamels Delphin. Delph. Duhamelii. Lacep.

Leib und Schwanz verlängert, Zähne lang. Der Rachen sehr weit, die Augen fast bey der Brustflosse. Die Rückenflosse dem After gegenüber; Kehle und Bauch weiß. An der Mündung der Loire gefangen.

11. Perons Delphin. Delp. Peronii. Lacep.

Der Rücken blauschwärzlich; Bauch, Seiten, Schnauze, Spitzen der Flossen und des Schwanzes blendend weiß. In der Südsee. Ist Delph. leucoramphus. Illig.

12. Kommersons Delphin. Delp. Commersonii. Lacep.

Der Rücken und fast die ganze Oberfläche des Thiers silberweiß; die Flossen und der Schwanz schwärzlich. In der Südsee bey Diemensland.

13. Das Meerschwein. Delp. Phocaena. Lacep. Schreb. CCCXLII.

Die Zähne zusammengedrückt, schneidend, abgerundet, zwanzig bis fünf und zwanzig auf jeder Seite, oben schwärzlich, unten weiß. Wird nicht über fünf Fuß lang, und ist das kleinste Thier unter den Wallfischarten. Es ist sehr gemein im Mittelmeer und in andern Meeren, und schwimmt in Schaaren.

14. Rundköpfiger Delphin. Delp. globiceps.

An zwanzig Fuß lang, schwarz, unten ein weißes Längenband, Rückenfinne kurz, Brustflossen sehr zugespitzt.

Digitized by Google

Kopf fast rund. An der Nordwestküste von Frankreich gefangen.

? 15. Schwarzer Delphin. Delph. niger. Lacep.

Die Schnauze sehr platt und verlängert; auf jeder Seite der beyden Kinnladen mehr als 12 Zähne; die Rückenfloße sehr klein, und der Schwanzfloße näher, als den Brustfloßen; die Hauptfarbe schwarz; die Gegend um die Luftlöcher, der Rand der Rücken- und Schwanzfloßen weißlich. In den japanischen Meeren.

? 16. Gekrönter Delphin. Delph. coronatus. Freminville.

Länge, zehen bis zwölf französische Metres. Der Kopf klein; die Kinnladen bilden einen langen Schnabel, die untere ist länger und hat 48, die obere nur 30 Zähne. Die Rückenfloße halbmondförmig, näher am Schwanz, als am Kopf; der Schwanz halbmondförmig. Die Brustfloßen mittelmäßig. Die Farbe oben und unten schwarz. An der Stirn zwey gelbe Cirkul. Im Eismeere gemein.

Delphine ohne Rückenfloße.

17. Weißer Delphin. Delph. Leucas. Beluga.

Die Mundöffnung klein; die Zähne stumpf, neun auf jeder Seite, wird gegen 15 Fuß lang, lebt von Schollen, Weichfischen, in den nordischen Meeren von Grönland und Spitzbergen. Giebt nicht viel Thran.

Digitized by Google

18. **Der Senedette.** Delphinus Senedetta. Lacep.

Mular, Sénedette, Capidelio. Delphinapterus Senedetta. Lacep.

Dieſes Thier wird ſehr groß, ſein Mund iſt ſehr weit; die Zähne ſpitzig, wenigſtens acht auf jeder Seite. Er findet ſich im Mittelmeer und im Ocean *).

Butzwall. Hyperoodon. Lacep. Uranodon. Illiger.

Zwey ſpitzige Zähne in der obern Kinnlade, und am Gaumen viele zahnartige Höcker. Körper und Schnauze faſt wie bey den Delphinen, die Zähne ſieht man von außen nicht immer.

1. **Der Butzkopf.** Hyperood. retusus.

Hyperoodon Butzkopf. Lacep. Delph. edentulus. Schreb. CCCXLVII.

Wird zwanzig bis fünf und zwanzig Fuß lang oder noch größer, man fängt ihn im Kanal und in der Nordſee; man nennt ſie oft geſchnabelte Wallfiſche. Die allgemeine Farbe iſt braun oder ſchwärzlich.

Narwall. Monodon. Cuvier. Ceratodon. Illig. Diodon. Storr.

Sie haben keine eigentlichen Zähne, aber lange, gerade, ſpitzige Stoßzähne im Zwiſchenkieferknochen, welche

*) Illiger führt noch unter den aſiatiſchen Delphinen an: Delphinus chinensis et gangeticus, welche den Meeren dieſer Gegend eigen ſind, ferner Delphinus dorsalis unter den in Auſtralien vorkommenden, näher ſind ſie nicht beſchrieben.

Digitized by Google

gerade aus stehen. Die Gestalt des Körpers und des Kopfs gleicht sehr der des Meerschweins. Keine Rückenflosse.

1. Der Einhornfisch. Monod. monoceros. Linn.

Schreb. CCCXXX. Narwalus vulgaris. Lacep. Licorne de mer.

Die Form des Körpers ist im Ganzen eiförmig; die Länge des Kopfs gleicht dem vierten Theil der Länge des ganzen Körpers; die Stoßzähne sind spiralförmig gefurcht, der eine Zahn ist meist sehr viel kleiner, als der andere, welcher oft mehrere Klafter lang wird, gewöhnlich ist es der linke Zahn, welcher sich entwickelt, der andere bleibt immer in der rechten Zahnhöhle. Die Farbe ist braun und weiß marmorirt. Keine Rückenflosse, aber eine erhabene Gräthe längs dem Rücken. Das Spritzloch oben auf dem Kopf. Das Maul ist klein und steht unten. Der Leib mit dem Kopf 18—30 Fuß lang. Dieses Thier, welches im höchsten Norden sich aufhält, ist der Feind der Wallfische, die er verfolgt und mit seinem Horn tödtet, daneben frißt er Schollen, Schalthiere auch Meergras. Wird wegen des Specks und dem Zahn gefangen.

Weniger bekannt und bestimmt sind

? 2. Andersonischer Narwall. Monod. andersonii. Lacep.

Soll sich durch glatten Zahn auszeichnen. Nördliche Meere.

Digitized by Google

3. Kleinköpfiger Narwall. Monod. microcephalus. Lacep.

Sehr lang, kegelförmig, der Kopf viel kleiner als am gemeinen Narwall. Häufiger trifft man bey diesem beyde Zähne von gleicher Länge an, doch zuweilen auch nur einen. Auch dieses Thier lebt in den nördlichen Meeren, und erreicht lange nicht die Größe des gemeinen Narwalls.

Hackenwall. Ancylodon. Illig. Anarnacus. Lacep.

In der obern Kinnlade zwey kleine vorstehende Zähne, welche etwas gebogen sind, unten keine. Nur ein Spritzloch. Der Körper ablang. Die Rückenfloße groß. Keine Bauchfloßen.

1. Der Anarnak. Ancyl. Anarnac.

Monod. spurius. Fabric.

Schwärzlich, lebt in den Meeren um Grönland. Fleisch und Thran sollen purgiren. Oken hält ihn für das Junge des andersonischen Narwalls? der aber keine Rückenfloße hat.

Die nun folgenden Walle haben einen so dicken und großen Kopf, daß er den Drittheil oder gar die Hälfte der Körperlänge hat; allein weder der Schedel noch das Hirn, nehmen Theil an diesem Mißverhältniß, welches blos aus der großen Menge fleischiger Theile entsteht, welche die Gesichtsknochen bedecken.

Digitized by Google

Pottwall. Cachelot. Physeter. Linn. Catodon. Lacep.

Diese Thiere haben einen sehr großen Kopf, der außerordentlich aufgedunsen ist, die obere Kinnlade hat weder Zähne noch Barten, oder doch nur zwey kleine, wenig vorspringende Zähne; in der untern Kinnlade, welche schmal und verlängert ist, und in eine Furche an der Oberkinnlade paßt, steht auf jeder Seite eine Reihe cylindrischer oder kegelförmiger Zähne, welche in Löcher der obern Kinnlade passen, wenn der Mund geschlossen ist. Der obere Theil des ungeheuer großen Kopfs, besteht in großen Höhlen, welche durch Knorpel getrennt sind, diese Höhlen sind mit einer Materie angefüllt, welche beym Erkalten fest wird, diese kommt unter dem Namen Wallrath im Handel vor, und wird so gesucht, daß ihre Gewinnung ein Hauptgrund ihrer Verfolgung und ihres Fanges ist, da der Körper weniger Fett hat, als bey den Wallen; allein diese Höhlen sind sehr verschieden vom eigentlichen Schedel, dieser ist klein, und unter dem hintern Theil der Höhlen liegend und enthält das Hirn. Es ist wahrscheinlich, daß Kanäle, welche mit Wallrath gefüllt sind, sich in mehrere Theile des Körpers ausbreiten und mit denen im Kopf in Verbindung stehen, sie finden sich selbst zwischen dem Speck unter der Haut.

Die wohlriechende Substanz, welche unter dem Namen des grauen Ambra bekannt ist, scheint sich in den Eingeweiden der Pottfische zu bilden, aber in einem krankhaften Zustande des Fisches, vorzüglich im Blinddarm. Die Arten der Pottfische sind noch nicht gehörig bestimmt.

Digitized by Google

1. Großköpfiger Pottwall. Phys. macrocephalus. Linn.

Schreb. CCCXXXVII. Catodon. macrocephalus. Lacep.

Der Schwanz sehr schmal und kegelförmig; eine länglichte, harte Erhöhung oder falsche Floße, dem After gegenüber. Die Unterkinnlade hat auf jeder Seite zwanzig bis drey und zwanzig Zähne, und in der Oberkinnlade sind kleine, kegelförmige Zähne unter dem Zahnfleisch verborgen; das Spritzloch ist einfach, liegt mehr auf der linken Seite und endigt sich oben auf der Schnauze, das linke Auge ist auch viel kleiner als das rechte, daher die Fischer das Thier immer auf der linken Seite anzugreifen suchen. Dieser Pottwall ist in vielen Meeren verbreitet, wenn von ihm der meiste Wallrath und Ambra kommt, denn man bezieht diese Substanzen aus Norden und Süden. Man hat auch solche Cachelote ohne Rückenfloße im adriatischen Meere gefangen. Er wird fünfzig und mehr Fuß lang, man kann bis auf fünfzig Tonnen Thran von einem beziehen; der Rachen ist so weit, daß er klafterlange Hayfische verschlingt.

2. Der Trumpo. Physet. Trumpo. Illig.

Catodon. Trumpo. Lacep et Bonnaterre.

Der Kopf länger, als der Körper; die Zähne gerade und spitzig; Körper und Schwanz lang; etwas oberhalb der Schwanzwurzel eine rundlichte Erhabenheit. Cuvier glaubt, er sey vom vorigen nicht verschieden. Die Farbe ist grauschwärzlich.

Digitized by Google

?3. Der kleine Pottwall. Phys. Catodon. Linn.
Catodon Swinewal. Lacep.

Die Zähne gekrümmt und vorn rundlich, oft platt; auf dem Rücken ein schwieliger Höcker. Lebt in Schaaren in den nördlichen Meeren und gehört unter die kleinen Arten, möchte vielleicht ein junger macrocephalus seyn *).

Pottwalle mit Rückenfinnen. Physeteres. Cuvier.

Es sind Cachelote mit einer wahren Rückenflosse, man unterscheidet besonders

4. Den Tummler. Phys. Tursio.
Cachalot mular. Physeter mular. Lacep.

Die Rückenflosse steht ganz gerade, ist spitzig und so lange, daß man sie mit einem Segelbaume verglichen hat, dies beweißt wenigstens, daß das Organ sehr groß sey: Ueberdies sind noch drey Höcker auf dem Rücken. Das Thier lebt im nördlichen Ocean.

5. Kleinäugichter Pottwall. Phys. microps. Lacep.
Cachalot microps. Bonnater. Schreb. CCCXXXIX.

Dieses Thier ist einer der größten, der grausamsten und gefährlichsten Meerbewohner, wird über fünfzig Fuß lang, der Kopf sehr groß, hat zwey und zwanzig Zähne auf jeder Seite, welche spitzig und krumm sind, verschluckt Hayfische, verfolgt die Seehunde bis aufs Land. Die

*) Der weiße Cachelot Physeter albicans ist wahrscheinlich die Beluga, die obern Zähne sind frühe ausgefallen.

Digitized by Google

Augen sind klein, die Rückenfinne scharf zugespitzt, das Spritzloch doppelt. Die jungen Wallfische, und trächtige Weibchen werden ihm oft zur Beute. Er bewohnt die nördlichen Meere, kommt aber auch in andern Meeren vor.

6. Geradzahniger Pottwall. Physet. Orthodon. Lacep.

Mit geraden, spitzigen Zähnen. Gmelin und Bonnaterre, halten ihn für eine Varietät des vorigen, oder des Trumpo, seine Brustflossen sollen aber viel kleiner seyn. Auch dieser wird sehr groß, vor der Rückenflosse hat er einen Höcker, die Haut ist sehr dünne, das Fleisch aber so fest, daß es oft einer Harpune wiedersteht.

7. Höckeriger Pottwall. Physet. cylindricus.

Le Physale cylindrique. Physet. gibbosus. Schreb. CCCXXXVIII.

Keine Rückenflosse, das Spritzloch ganz vorn auf der Nase, der Kopf fast Leibeshälfte, statt der Finne ein Höcker; oben 3—4 Backenzähne, vorn die gewöhnlichen Gruben für die untern Zähne, deren er 50 hat, wird an sechzig Fuß lang. Bey Grönland.

8. Gefurchter Pottwall. Physet. sulcatus. Lacep.

Die Rückenflosse ist konisch, nach hinten gebogen, den Brustflossen, denen sie an Länge gleich ist, vorüberstehend; die Zähne spitzig und gerade, an der Unterkinnlade schiefe Furchen. Japanische Meere.

Digitized by Google

Wallfiſche. Walle. Balaena. Linn.

Sie gleichen den Pottwallen in Hinſicht auf die Geſtalt und verhältnißmäßige Größe des Kopfs, ob ſchon derſelbe vorn weniger aufgedunſen iſt; aber ſie haben gar keine Zähne. Die obere Kinnlade hat auf ihren Seiten dünne und enganeinander liegende Querblätter, welche man Barten nennt, ſie beſtehen aus einer Art faſeriger Hornmaſſe, und ſind an ihren Enden ausgefaſert, um die kleinen Thierchen aufzufangen, von denen dieſe ſehr großen Thiere ſich nähren. Der Gaumen iſt kielförmig und die Bartenblätter liegen ziegelförmig aufeinander. Die untere Kinnlade wird von zwey Knochen, welche nach außen und oben ſich bogenförmig biegen, unterſtützt, und umhüllt, ohne irgend eine Bewaffnung, die dicke und fleiſchige Zunge, und das innere der obern Kinnlade mit den Barten.

Dieſe innere Einrichtung des Mundes erlaubt den Wallen nicht, ſich von großen Thieren zu nähren, wie man glauben ſollte, wenn man ihre erſtaunenswürdige Maſſe betrachtet. Sie leben von Fiſchen, Weichthieren, Würmern und Pflanzenthieren, vorzüglich ſollen ſie von ſehr kleinen Thieren leben, welche in den Barten und ihren Faſern ſich fangen. Sie haben einen kurzen Blinddarm.

1. Der gemeine Wallfiſch. Bal. mysticetus. Schreb. CCCXXXII.

Der Körper dick und kurz; der Schwanz kurz, keine Rückenfloße, der ungeheure Kopf iſt vorn abgeſtumpft, faſt ſo hoch als lang. Das größte aller bekannten Thiere, welches achtzig bis hundert Fuß lang wird. Unter der

Haut bildet sich oft mehrere Fuß dicker Speck, welcher eine große Menge Oel giebt, dies ist die Ursache, warum dies Thier jedes Jahr durch ganze Flotten verfolgt wird. Ehemals fand man den Wallfisch in den europäischen Meeren, allein die Verfolgungen haben ihn gezwungen, sich nach und nach bis in die nördlichsten Meere zurückzuziehen, wo seine Menge sich immer mehr vermindert. Außer dem Oele werden auch die Barten als ein vorzüglicher Handelsartikel benutzt, und sind unter dem Namen des Fischbeins bekannt, und oft acht bis zehen Fuß lang, bey jedem Thier findet man acht bis neunhundert auf jeder Seite des Gaumens. Dieses Thier nährt sich nur von kleinen Weichthieren und Meerwürmern, welche in den Meeren seines Aufenthalts häufig sind, und doch erreicht es die angegebene Länge und einen eben so großen Körperumfang. Der Mund hat zwanzig Fuß Oeffnung, und eben so lang ist das neugeborne Thier. Ein mittelmäßiger Wall giebt 120 Tonnen Trahn; an seiner harten Haut setzen sich Schalthiere fest, und vermehren sich, wie an den Felsen; ja einige aus der Familie der Entenmuscheln, dringen sogar in die Haut ein. Die Exkremente des Walls sind schön roth, man kann Zeuge damit färben.

Diese Gattung ist weit in den Meeren verbreitet, so weit man nach Norden gekommen ist, hat man dieses Thier gefunden. Die Brustflossen haben zehen Knochen. Aus den Spritzlöchern können sie das Wasser zu vierzig Fuß hoch treiben. Das Gewicht eines Walls kann 300,000 Pf. betragen. Der Thran der Zunge allein, kann auf drey Tonnen kommen. Sie leben immer gesellschaftlich. Die Farbe der Haut schwarz.

Digitized by Google

2. Der Nordkaper. Bal. glacialis. Klein.

Balaena Nordcaper. Lacep.

Eben so groß, aber nicht so dick, der Kopf spitziger, hat viel weniger Speck, schwimmt schneller, und ist daher schwerer zu fangen; man geht daher nur dann auf seinen Fang aus, wenn man keine Wallfische bekommt. Er ist gemein an der norwegischen Küste und am Nordcap, daher sein Name; er verschlingt eine Menge Fische.

3. Japanischer Wallfisch. Balaena japanica. Lacep.

Die Luftlöcher stehen etwas vor den Augen, die Schwanzfloße ist groß; auf der Schnauze stehen drey unebene Höcker der Länge nach. Der Rücken schwarz, der Bauch reinweiß, schwarz eingefaßt; die Kinnladen, Brustfloßen und Schwanzfloße sind weiß gesäumt; die Gegend um die Augen weiß, mit schwarzen, feinen Wellenlinien; an der untern Kinnlade stehen einzelne Gruppen kleiner, weißer Flecken, deren man an der ganzen Schnauze findet.

In den Meeren von Japan.

4. Wallfisch mit halbmondförmigen Flecken. Balaena lunulata. Lacep.

Die Luftlöcher stehen etwas hinter den Augen, die Kinnladen sind mit steifen Stachelhaaren von schwarzer Farbe besetzt. Die Hauptfarbe ist grünlich, und auf Kopf, Körper und Floßen mit einer großen Menge weißer, halbmondförmiger Flecken besetzt. In den japanischen Meeren.

Walle

Walle mit einem oder mehrern Höckern.

5. Der Knotenwall. Bal. nodosa.

Auf dem Kreuz und dem Kopf ein Höcker, Bruſtfloßen ſehr lang und weiß. Bey Neu-England. Wird wenig geſchätzt, die Barten ſind aber ſehr gut.

6. Höckerwall. Bal. gibbosa. Linn.

Hat auf dem Rücken fünf bis ſechs Höcker oder Erhabenheiten, die Barten ſind weiß. Ebenfalls bey Neu-England.

Walle mit Rückenfloßen. Baleinopteres. Cuv. et Lacep.

A. Mit glattem Bauch.

7. Der Finnfiſch. Balaen. Physalus. Linn.

Baleinoptere gibbar. Lacep.

So lang als der Wallfiſch aber ſchlanker, ſehr gemein in denſelben Gegenden, aber von den Fiſchern gefürchtet, weil er wenig Speck hat, ſehr wild, und ſchwer zu fangen iſt, und kleinen Fahrzeugen gefährlich wird, da er mit dem Schwanze fürchterlich um ſich ſchlägt, wenn er angegriffen wird.

B. Mit runzlichtem Bauche.

Die Haut an der Kehle und der Bruſt iſt runzlich, und durch tiefe Längsfurchen eingeſchnitten, daher iſt ſie ſehr ausdehnbar, wozu dieſe Einrichtung dem Thiere dient, iſt unbekannt.

? 8. Punktirter Wallfisch. Balaen. punctulata. Lacep.

Auf dem Kopfe eine Längsreihe von fünf bis sechs Höckern; die Rückenfloße klein; Körper- und Brustfloßen schwarz, weiß getüpfelt. Japanische Meere.

? 9. Schwarzer Wallfisch. Balain. nigra. Lacep.

Auf dem Kopfe vier Höcker in einer Längsreihe; die obere Kinnlade schmal, vor den Augen wulstig vorstehend. Schwanz, Floßen und Kinnladen weißgesäumt. Japanische Meere.

? 10. Blauer Wallfisch. Balain. coerulescens. Lacep.

Die obere Kinnlade schmal, und ihr Rand vor den Augen sich wulstig erhebend; an der untern Kinnlade zwölf und mehr Furchen auf den Seiten; die Rückenfloße klein, dem Schwanz näher als dem After. Die Hauptfarbe graubläulich. Japanische Meere.

? 11. Gefleckter Wallfisch. Balainop. maculata. Lacep.

Die untere Kinnlade vor der obern vorstehend, und abgerundet; die Luftlöcher etwas hinter den Augen, welche sehr nahe bey ihrer Oeffnung stehen; die Rückenfloße fast in der Mitte zwischen Brust- und Schwanzfloße; die Farbe schwärzlich; einige blendend weiße, fast runde, unregelmäßig zerstreute Flecken, stehen an den Seiten. Japanische Meere.

Digitized by Google

12. Das Ochſenauge. Bal. boops. Linn.

Baleinoptere Jubarte. Lacep. Schreb. CCCXXXIV.

Er ſoll die Größe des Wallfiſches erreichen, gewöhnlich iſt er etwa 50 Fuß lang, Bauch weiß, die Schnauze ſchnabelförmig, ſtumpf. Die Rückenfinne zwey Fuß hoch. An der Küſte von Grönland.

13. Das Breitmaul. Bal. musculus. Linn.

Baleinoptere Rorqual. Lacep. Schreb. CCCXXXV.

Oben ſchwarz, unten weiß, wird an 80 Fuß lang, der Unterkiefer iſt ſehr breit, der Rachen ungeheuer, Barten ſchwarz, nur drey Fuß lang. Längs der Gaumennath eine knöcherne Scheidewand, gegen welche die Barten ſtoßen, welche am Kieferrand angewachſen ſind. In den nördlichen Meeren bis Schottland.

14. Der Entenſchnabel. Bal. rostrata.

Baleinoptere acuto rostrata. Lacep. Schreb. CCCXXXVI.

Nur an zwanzig Fuß, ſchwarz, unten weiß, Schnauze ſehr ſpitzig, Oberkiefer kürzer, die Barten weiß. In Menge um Grönland, Island und Norwegen *). Beyde dieſe Arten glaubt Cuvier, unterſcheiden ſich nicht vom Boops.

*) Ungeachtet Lacepede ſich viele Mühe gegeben hat, ſo iſt doch die Naturgeſchichte dieſer ſchwer zu beobachtenden Thiere noch ſehr verwirrt, und die ganze Abtheilung der Cetacea bedarf noch Berichtigungen. Illiger führt noch eine Balaina duplicata aus der Südſee an, ohne die Quelle anzugeben, woher er die Art aufgeſtellt hat. Eben ſo hat Lacepede acht neue Arten von Cetaceen nach Beſchreibungen aufgeſtellt, welche aber noch näherer Richtung bedürfen. A. d. U.

Digitized by Google

Eierlegende Wirbelthiere im Allgemeinen.

Ob schon die drey Klassen, aus welchen die eierlegenden Wirbelthiere bestehen, unter einander sehr verschieden sind, vorzüglich in Hinsicht auf die grössere oder geringere Ausbildung der Athmungsorgane und aller darauf Bezug habenden Verrichtungen, besonders der Bewegungskraft und der Stärke der Sinne, so zeigen sich doch einige ihnen allen gemeinsame Charaktere, wenn man sie mit den Säugethieren oder den lebendgebärenden Wirbelthieren vergleicht.

Das Hirn hat sehr kleine Halbkugeln, welche durch keinen Markbalken verbunden sind; die Hügelchen, welche man nates nennt, sind sehr entwickelt, und enthalten eine Höhle, sie sind nicht von den Halbkugeln bedeckt, ragen daher deutlich unten oder zur Seite des Hirnes hervor. Die Schenkel des kleinen Hirnes bilden keine sogenannte varolsche Brücke: Die Nasenöffnungen sind einfach; das Ohr hat weniger Knöchelchen, welche bey einigen ganz fehlen; die Schnecke, wenn sie da ist, ist ganz einfach. Die Unterkinnlade besteht immer aus mehrern Stücken, und verbindet sich durch eine ausgehöhlte Fläche, mit einer Hervorragung des Schläfenbeins, welche aber vom Felsenbein getrennt ist: Die Schedelknochen bestehen aus mehrern Stücken oder bleiben länger getrennt, ob schon sie beziehungsweise dieselbe Stelle einnehmen und dieselben Verrichtungen haben; so besteht das Stirnbein aus fünf oder sechs Stücken. Die Augenhöhlen sind nur durch ein Knochenplättchen vom Flügelbein getrennt, auch wohl nur

durch eine Haut. Wenn dieſe Thiere an der Vorderſeite ihres Körpers äußere Bewegungsorgane haben, ſo ſtützt ſich das Schulterblatt auf das Bruſtbein durch einen ſehr verlängerten und breiten Knochenfortſatz, und überdas bildet das Schlüſſelbein mit dem der andern Seite einen zuſammenhängenden Knochen, welcher die Gabel heißt. Der Luftröhrenkopf iſt viel einfacher und hat keinen Kehldeckel; die Lungen ſind nicht von der Bauchhöhle getrennt, wenigſtens durch kein vollkommnes Zwergfell. Eine nähere Enthüllung der einzelnen Theile des Körpers würde dies deutlicher machen, allein ſie wäre hier zu weitläufig, es iſt genug geſagt worden, um zu zeigen, wodurch die eierlegenden Thiere einander gleichen, und daß ſie eher mit einander verbunden werden können, als mit den Säugethieren, von denen alle ſehr abſtehen.

Die Erzeugung durch Eierlegen beſteht darin, daß das Junge durch keinen Mutterkuchen mit dem Leibe der Mutter verbunden iſt, weder mit dem Uterus noch mit dem Eiergang, ſondern ganz getrennt in ſeinen Hüllen eingeſchloſſen ſich entwickelt. Die Nahrung des Jungen iſt ſchon vor demſelben vorhanden, und in einem Sack eingeſchloſſen, der bey der Entwicklung ſich mit dem Darmkanal des Embryo in Verbindung ſetzt: ſie iſt unter dem Namen des Dotters oder Eigelb bekannt, der Embryo iſt gleichſam ein Anhang des Dotters, und wird dadurch ernährt und vergrößert, daß er die Flüßigkeit deſſelben in ſich aufnimmt. Die eierlegenden Thiere, welche durch Lungen athmen, beſitzen im Ei eine Haut, welche ſehr gefäßreich iſt, und welche ihnen wahrſcheinlich zum Athmen dient; ſie tritt mit der Urinblaſe in Verbindung, und ent-

Digitized by Google

ſpricht der Allantois der Säugethiere. Man findet ſie bey den Fiſchen und bey denjenigen Reptilien nicht, deren Junge in der erſten Zeit, wie die Fiſche durch Kiemen athmen.

Sehr viele kaltblütige Eierleger geben ihre Jungen erſt dann von ſich, wenn ſie ſchon ihrer Eiſchalen oder der übrigen Hüllen ſich entledigt haben; ſie ſind alſo auf eine Art lebendgebärend, doch ſehr verſchieden von den Säugethieren, man nennt ſie daher ſcheinbar lebendgebärende.

Zweyte Klaſſe der Wirbelthiere.

Vögel.

Vögel ſind eierlegende Wirbelthiere mit warmem Blute und doppelten Kreislauf, mit Flugwerkzeugen verſehen.

Die Lungen ſind nicht in Lappen getheilt, und an die Rippen befeſtigt, ſie ſind in eine Haut eingehüllt, welche große Löcher hat, durch welche die Luft in mehrere Höhlen der Bruſt, des Bauches, der Achſeln, und ſelbſt in das Innere der Knochen treten kann, ſo daß dieſelbe nicht blos mit der Oberfläche der Lungengefäſſe in Berührung tritt, ſondern auch mit einer ſehr großen Maſſe anderer Gefäſſe im übrigen Körper. So athmen die Vögel in gewiſſer Hinſicht, durch die Aeſte der Aorta eben ſo gut, wie durch die Aeſte der Lungenarterie, und die Kraft ihrer Reitzbarkeit ſteht im Verhältniß mit der Menge der eingeathmeten Luft, und ihr ganzer Körper hat Theil an dieſer größern Kraft *).

*) Nach Lavoiſiers Verſuchen verbrauchen zwey Sperlinge eben

Die vordern Extremitäten zum Flug bestimmt, können weder beym Stehen, noch zum Greifen angewandt werden, alle Vögel sind daher Zweyfüßer, und nehmen ihre Speise mit dem Schnabel von der Erde auf; einige bedienen sich derselben indeß auch als einer unvollkommnen Hand, wie die Papageien; der Körper steht mehr nach vorn, der Ruhepunkt der Schenkel ist fast unter den Achseln, und die Zehen verlängern sich, um dem Körper eine feste Grundlage zu geben. Das Becken ist sehr lange, um den Muskeln, welche den Körper mit den Schenkeln verbinden und tragen helfen, zur Anlage zu dienen, die Sehnen einiger Muskeln des Beckens gehen sogar bis zu den Zehen, und gehen beym Kniegelenk und der Fußwurzel vorbey, so daß das bloße Gewicht des Vogels die Zehen ausstreckt, sie können daher auch auf einem Beine feststehend schlafen; die Muskeln des Steißbeins und der Schaambeine, verlängern sich nach hinten, und breiten sich aus, um dem Ei zu seiner Entwicklung den nöthigen Raum zu lassen.

Der Hals und Schnabel sind verlängert, um damit leicht die Erde berühren zu können; überdas ist der Hals so beweglich, daß er sich leicht nach hinten biegen kann, wenn der Vogel stille steht; dazu besteht er aus vielen Wirbeln. Der Körper, bestimmt die Flügel in ihrer Wirkung zu unterstützen, durfte weniger beweglich in seinen einzelnen Theilen seyn; das Brustbein, an welchem sich die Muskeln befestigen, welche die Flügel abwärts ziehen, um beym Fliegen die Luft zu schlagen, hat eine breite

---

so viel Sauerstoff in einer gewissen Zeit, als ein Meerschweinchen.

Oberfläche, welche noch durch eine vorspringende Firste in der Mitte vergrößert wird. Es besteht aus fünf Stücken; einem Mittelstück mit jener Firste versehen, zwey vordern Seitenstücken zur Anlage der Ribben, und zwey hintern Seitenstücken zur Vergrößerung der Oberfläche. Die stärkere oder geringere Verknöcherung der letztern bezeichnet die größere oder geringere Gewalt, welche der Vogel beym Fliegen anwenden kann. Der Gabelknochen bildet sich durch Vereinigung beyder Schlüsselbeine, und stützt zugleich mit zwey starken Knochenbogen, welche die Rabenschnabelfortsätze bilden, die breiten Schultern. Der Flügel besteht aus dem Oberarmknochen, dem Vorderarm und der verlängerten Hand, und zeigt einen Finger und die Spuren zweyer anderer: Seiner ganzen Länge nach, ist er mit einer Reihe elastischer Federn besetzt, welche seine Oberfläche so sehr vergrößern, daß der Vogel damit die Luft schlagen kann. Die Federn, welche an der Hand sich befinden, und deren Zahl immer zehen beträgt, bilden die erste Reihe; diejenigen des Vorderarms die zweyte, ihre Zahl ist veränderlich: Weniger starke Federn sind am Oberarmknochen befestigt und heißen Schulterfedern; der Knochen, der den Daum vorstellt, trägt auch noch einige Federn, welche Bastardfedern heißen.

Der knöcherne Theil des Schwanzes ist sehr kurz, aber es befestigen sich daran eine Reihe starker Federn, welche, wenn sie sich verbreiten, viel dazu beytragen, den Vogel in der Luft zu erhalten; die Zahl der Schwanzfedern ist gewöhnlich zwölf, zuweilen vierzehn, bey den Hühnerarten sogar achtzehn.

Digitized by Google

Das Bein besteht aus dem Oberschenkel, dem Schenkel, und dem Lauf oder Schienbein, welche letztere mit dem Oberschenkel durch ein elastisches Gelenk verbunden sind, dessen Ausdehnung sich ohne große Muskelkraft erhält. Fuß und Vorderfuß, werden aus einem einzigen Knochen gebildet, der nach vorn drey rollenförmige Höcker zeigt. Gewöhnlich stehen drey Zehen noch vorn, der Daum nach hinten; dieser mangelt zuweilen; bey den Seglern ist er nach vorn gerichtet. Bey den Klettervögeln steht der Daum und die äußere Zehe nach hinten. Die Zahl der Zehenglieder wächst bey jeder Zehe, vom Daum anfangend, dieser hat zwey Gelenke, die äußere Zehe dagegen hat fünf.

Alle Vögel sind mit Federn bekleidet, als derjenigen Decke, welche am meisten geschickt ist den Vogel gegen die schnelle Abwechslung der Lufttemperatur zu schützen, welcher seine rasche Bewegung ihn aussetzt. Die Lufthöhlen im innern des Vogelkörpers, welche sogar in den Knochen sich finden, da mehrere Knochen statt Mark Luft enthalten, vermehren ungemein die Leichtigkeit des Körpers. Die Brustbeinverbindung mit den Ribben sowohl, als auch die Verbindung mit den Wirbeln sind knöchern, um der Ausdehnung der Brust mehr Kraft zu geben.

Das Auge der Vögel ist so gestellt, daß es die entfernten und nahen Gegenstände beynahe gleich gut unterscheiden kann; eine gefaltete und gefäßreiche Membran, begiebt sich vom hintern Theil des Augapfels an den Rand der Crystallinse und scheint durch ihre Wirkung die Lage der Linse verändern zu können. Der vordere Theil des Augapfels ist durch einen aus Knochenstücken bestehen-

Digitized by Google

den Ring verstärkt; neben den beyden Augenliedern ist am innern Augenwinkel noch ein drittes befestigt, und durch einen bemerkenswerthen Muskelapparat geschickt, sich über das Auge, wie ein Vorhang vorzuziehen. Die Hornhaut ist sehr erhaben, die Linse aber platt und der Glaskörper klein.

Das Ohr der Vögel hat nur ein Knöchelchen zwischen dem Trommelfell und dem eirunden Fenster; die Schnecke bildet einen kaum gebogenen Kegel; aber die halbcirkelförmigen Gänge sind groß, und liegen in einem Theil der Schedelhöhle, wo sie allenthalben mit Lufthehältern umgeben sind, welche mit der Trommelhöhle in Verbindung stehen. Die nächtlichen Vögel allein haben eine bedeutende äußere Ohrmuschel, welche aber keinen Vorsprung hat, wie bey den Säugethieren: Diese Oeffnung ist im Allgemeinen mit Federn bedeckt, deren Bärte weniger dicht stehen, als bey andern.

Das Geruchsorgan liegt in der Schnabelwurzel verborgen, und hat gewöhnlich nur knorplige Muscheln, drey an der Zahl, welche in Hinsicht ihrer Windungen verschieden sind; es scheint sehr scharf zu seyn, obgleich seine Höhlen nicht in die Schedelknochen eindringen. Die Breite der knöchernen Oeffnung der Nasenlöcher bestimmt die Form des Schnabels, und die Knorpel, die Häute, die Federn, oder andere Bedeckungen, welche diese Oeffnung verengern, haben Einfluß auf die Stärke des Geruchs, und auf die Art der Nahrung.

Die Zunge hat wenig muskelartige Substanz, und befestigt sich an einem Vorsprung des Zungenbeins, sie scheint bey den meisten Vögeln wenig zum Geschmack beyzutragen.

Digitized by Google

Die Flaumfedern ſowohl, als die eigentlichen Federn, die von jenen blos durch die Größe ſich unterſcheiden, beſtehen aus einem an ſeiner Wurzel hohlen Kiele, und aus Bärten, welche ſelbſt wieder kleinere Bärtchen tragen; ihr Gewebe, ihr Glanz, ihre Stärke, ihre Geſtalt variren ins Unendliche. Das Getaſte kann in allen mit Federn bedeckten Theilen nicht ſehr fein ſeyn; und da auch der Schnabel immer hornartig und wenig mit Gefühl verſehen iſt, die Zehen aber oben mit Schuppen, unten mit einer ſchwieligen Haut verſehen ſind, ſo kann überhaupt der Sinn des Gefühls bey den Vögeln wenig ausgebildet gedacht werden.

Die Vögel verlieren wenigſtens einmal im Jahr ihre Federn, ſehr viele, vielleicht die Mehrzahl mauſern zweymal: Bey vielen iſt das Gefieder im Sommer von dem im Winter verſchieden, und eben ſo ſind die Farben der Federn beym Weibchen gewöhnlich weniger lebhaft, und die Jungen beyderley Geſchlechtes, gleichen vor der erſten Mauſer allemal den Weibchen. Wenn aber die ausgefiederten Eltern beyderley Geſchlechts in den Federn ſich nicht von einander unterſcheiden laſſen, ſo haben oft die Jungen ein eigenes, gefleckte oder geſtreiftes Federkleid, welches ſie nach der erſten Mauſer verlieren.

Das Hirn der Vögel gleicht im Allgemeinen dem der übrigen eierlegenden Wirbelthiere, aber es zeichnet ſich durch ſeine bedeutende Größe aus, welche ſogar oft die Größe dieſes Organs bey einigen Säugethieren übertrift, dieſes rührt hauptſächlich von den Höckern her, welche den geſtreiften Körpern entſprechen, und nicht von den Halbkugeln, welche ſehr klein und ohne Windungen ſind. Das

Digitized by Google

kleine Hirn ist auch ziemlich groß, beynahe ohne Seitenlappen, und besteht fast nur aus dem wurmförmigen Fortsatz.

Die Luftröhre der Vögel besteht aus ganzen Ringen, da, wo sie sich in die Bronchien theilt, ist sie meist mit eigenen Muskeln versehen, und heißt der untere Luftröhrenkopf; hier bildet sich die Stimme der Vögel. Die sehr große Menge Luft, welche in den Luftbehältern enthalten ist, trägt viel zur Verstärkung der Stimme bey, und eben so kann der verschiedene Bau und die Bewegung der Luftröhre, viel an der Stimme ändern. Der obere Luftröhrenkopf, ist ganz einfach und scheint zur Stimme wenig beytragen zu können.

Das Gesicht wird eigentlich aus dem Oberschnabel gebildet, und dieser besteht hauptsächlich aus den Zwischenkieferknochen, und verlängert sich nach hinten in zwey Bogen, von denen der innere aus den Gaumenknochen sich bildet, der äußere aus den Kinnladen und Jochbeinknochen, beyde aber stützen sich auf das Trommelfellbein, welches beweglich ist, und gewöhnlich der viereckige Knochen genannt wird; oben ist der Schnabel mit dem Schedel durch elastische Plättchen vereinigt oder eingelenkt, so daß demselben immer einige Beweglichkeit bleibt.

Die Hornsubstanz, welche die beyden Kinnladen bekleidet, dient statt der Zähne und ist zuweilen wirklich zahnartig gezackt; die Gestalt des Schnabels variirt ganz ausserordentlich, je nachdem die Nahrungsmittel beschaffen sind, welche der Vogel bedarf.

Die Verdauungskraft der Vögel steht im Verhältniß mit der großen Lebensthätigkeit, und der hohen Entwick-

lung ihrer Athmungsorgane. Der Magen besteht aus drey Theilen; dem Kropf, dieser ist eine Erweiterung des Schlundes; dem Vormagen, welcher in seinem Zellengewebe eine große Menge Drüsen hat, deren Saft die Nahrungsmittel einweicht; und dem Fleischmagen, welcher mit zwey starken Muskeln umgeben ist, welche durch zwey sehnige Bänder verbunden sind, und eine Höhle bilden, die innerlich durch eine harte, fast knorplige Haut bekleidet ist. Die Nahrungsmittel zerreiben sich um so eher, als diejenigen Vögel, welche harte Nahrungsmittel genießen, zugleich kleine Steinchen verschlucken, um die Reibung stärker zu machen. Bey denjenigen Arten, welche von Fleisch oder Fischen leben ist die innere Haut und die Muskelbekleidung sehr schwach, und Vormagen und Fleischmagen sind nur unvollkommen zu unterscheiden; eben so mangelt der Kropf mehrern Vögeln.

Die Leber ergießt ihre Galle durch zwey Gänge in den Darmkanal, welche zwischen den zwey oder drey Gängen, durch welche die Bauchspeicheldrüse ihren Saft dahin führt, sich einmünden. Die Bauchspeicheldrüse ist groß; die Nieren sind klein, die Netze mangeln, und werden zum Theil durch die Scheidewände der Luftbehälter ersetzt; zwey blinde Darmanhänge finden sich am Anfange des Mastdarmes, nicht weit vom After, und sind mehr oder weniger lang, je nach der Nahrung des Vogels. Die Reiher haben nur einen kurzen Blinddarm; andere Gattungen, wie die Spechte haben gar keinen.

Kloake heißt eine Erweiterung am After, in welche der Mastdarm, die Harn- und Saamengänge sich münden, und bey den Weibchen die Eiergänge; sie öffnet sich äußer-

Digitized by Google

lich durch den After. Die Vögel haben keine Urinblase, der Urin mischt sich mit den dicken Exkrementen. Die Strauße allein haben eine so weite Kloake, daß der Urin darin sich ansammeln kann.

Bey den meisten Gattungen geschieht die Begattung blos durch Annäherung des Afters beyder Geschlechter; die Strauße und mehrere Schwimmvögel haben eine wirkliche männliche Ruthe, welche eine Furche bildet, durch welche der Saame ausfließt. Die Hoden liegen innerhalb des Leibes ob den Nieren, nahe an den Lungen; die Weibchen haben nur einen Eierstock und einen Eierleiter. Das Ei, von dem man im Eierstock nur das Gelbe sieht, reißt sich los und erhält im obern Theil des Eiergangs das Eiweiß, im untern Theil des Kanals aber bekleidet es sich mit der Eischale. Das Brüten entwickelt das Küchelchen im Ei, selbst in den heißen Klimaten reicht die Wärme der Sonne nicht ganz hin, und die Strauße, von denen man sagte, daß ihre Küchelchen durch die bloße Sonnenwärme sich entwickeln, brüten wenigstens des Nachts. Das Küchelchen spaltet vermittelst eines knöchernen Schnabelanhangs die Schale, dann aber verliert sich dieser Anhang einige Tage nach der Geburt.

Allgemein bekannt ist es, wie viel Kunst, Mühe und Sorgfalt die Vögel auf den Bau ihres Nestes verwenden, und wie zärtlich und sorgfältig sie die Eier und Jungen behandeln; diese Sorgfalt und Kunst macht die vorzüglichste Aeußerung ihres Instinkts aus.

Die Schnelligkeit, womit die Vögel die verschiedenen Luftregionen durchreisen, und die lebhafte Einwirkung, welche die Luft auf ihren Körper ausübt, geben ihnen das

Digitized by Google

Vermögen, die bevorstehenden Veränderungen der Athmosphäre voraus zu empfinden, in einem Grade, daß wir davon keinen Begriff haben, daher der Aberglaube in den ältesten Zeiten, den Vögeln die Wissenschaft zuschrieb, die Zukunft voraus zu wissen. Sie haben sowohl Gedächtniß als Einbildungskraft, sie träumen sogar; sie lassen sich daher leicht zähmen, zu verschiedenen Künsten abrichten, und ahmen Gesänge und Worte nach.

Eintheilung der Vögel in Klassen und Ordnungen.

Unter allen Thierklassen ist keine von der Natur so genau bezeichnet, als die Vögel, bey keiner gleichen sich die Arten so sehr, keine Klasse steht so abgesondert für sich da, dies macht ihre Eintheilung schwierig. Sie beruhet wie bey den Säugethieren auf den Mundtheilen oder hier auf der Bildung des Schnabels, und auf der Form der Greiforgane oder der Füße.

Auffallend zeichnen sich die Schwimmfüße aus, bey welchen die Zehen durch eine Haut verbunden sind, durch solche unterscheiden sich die Schwimmvögel. Die Lage ihrer Füße nach hinten, die Länge des Brustbeins, bey einigen ein langer Hals, um die Stellen unter dem Wasser ergründen zu können, ein dicht anschließendes, glänzendes, für das Wasser undurchdringliches Gefieder, machen diese Thiere zu vortrefflichen Schwimmern. Bey andern Vögeln finden sich ähnliche Verbindungen der Zehen, doch von geringerem Umfange, oft nur zwischen den äußern Zehen, dabey aber ist der Lauf lang, die Beine sind nach

Digitized by Google

unten nackt, der Körper schlank und verlängert; sie sind also gebildet, um in Moräſten und an den Ufern umherzuwaden, und da ihre Nahrung zu suchen, welche meist aus Insekten, Schalthieren und Fischchen besteht, sie heißen, ob schon einige auch auf trockenem Boden leben, doch Sumpfvögel oder Stelzenfüße.

Unter den eigentlichen Landvögeln haben die Hühnerarten, wie unser Haushahn einen schweren Körper, einen ungeschickten Flug, mittelmäßig langen Schnabel, wovon die obere Kinnlade gewölbt ist, die Nasenlöcher sind zum Theil durch eine weiche Schuppe bedeckt und aufgeblasen, die Zehen sind fast immer am Rande gefranzt, und die vordern durch eine kurze Haut an der Wurzel verbunden. Sie leben meist von Körnern.

Die Raubvögel haben einen krummen Schnabel, mit scharfer Spitze und nach unten gebogen, die Nasenlöcher gehen durch eine Haut, welche die Schnabelwurzel bekleidet; die Füße sind mit scharfen Klauen bewaffnet. Sie leben von Fleisch, verfolgen andere Vögel; meist haben sie einen schnellen Flug. Sehr viele haben eine kleine Verbindungshaut zwischen den äußern Zehen.

Die Sperlingsartigen Vögel besaſſen eine weit größere Zahl von Arten, als alle andern Familien; aber ihr Bau ist so ähnlich, daß sie sich schwer unterscheiden lassen, ob schon sie an Größe und Stärke sehr abweichen. Die äußern Zehen sind an der Wurzel verbunden, zuweilen selbst in einer bedeutenden Länge.

Endlich hat man den Namen Klettervögel denjenigen gegeben, deren äußere Zehe wie der Daum nach hinten

steht,

Digitized by Google

ſteht, der gröſste Theil von ihnen iſt ſo gebaut, daſs ſie der Länge der Baumſtämme nach klettern können.

Jede dieſer Ordnungen hat wieder Familien und Gattungen, beſonders durch den Schnabelbau bezeichnet.

Erſte Ordnung der Vögel.

Raubvögel. Accipitres.

Der krumme Schnabel und die krummen und ſpitzen Klauen ſind die Hauptcharaktere dieſer Abtheilung, es ſind die mächtigen Waffen, mit welchen dieſe Vögel die andern verfolgen, und ſelbſt die ſchwächern Säugethiere oder Reptilien angreifen. Sie ſind unter den Vögeln das, was die Klaſſe der fleiſchfreſſenden Thiere unter den Säugethieren. Die ſtarken Schenkelmuskeln bezeichnen die Stärke, welche ſie in den Füſsen haben, die Läufe ſind ſelten lang; ſie haben alle 4 Zehen; die Klaue des Daums und diejenige der Mittelzehe ſind am ſtärkſten.

Sie bilden zwey Familien, Tagraubvögel und nächtliche Raubvögel.

Die Tagraubvögel haben nach der Seite ſtehende Augen; eine Haut, welche die Wachshaut heiſst, bedeckt die Schnabelwurzel, in dieſer Haut liegen die Naſenlöcher; die Zehen ſind immer unbefiedert, drey ſtehen nach vorn, einer nach hinten, die beyden äuſsern ſind meiſt mit einer kurzen Haut an ihrer Wurzel verbunden, das Gefieder iſt dicht, die Federn ſtark, der Flug ſchnell und geſchickt; der Magen iſt faſt ganz häutig; der Darmkanal nicht ſehr lang, und der Blinddarm ſehr kurz. Der Bruſtknochen

Digitized by Google

breit und vollständig verknöchert, um den starken Muskeln eine desto festere Anlage zu geben, der Gabelknochen ist halbcirkelförmig und weit ausgebogen, um desto eher den starken Bewegungen zu wiederstehen, welche die Oberarmknochen beym schnellen Fluge machen.

Linneus machte daraus nur zwey Gattungen, welche zwey natürliche Abtheilungen bilden, die Geyer und die Falken.

Geyer. Vultur.

Die Augen stehen mitten im Gesicht, die Läufe sind mit kleinen Schuppen bedeckt; der Schnabel gerade, nur an seinem Ende gekrümmt, ein größerer oder kleinerer Theil des Kopfs, selbst des Halses ist nackt, ohne Federn. Die Stärke der Klauen entspricht ihrer Größe nicht, sie bedienen sich zum Angriff mehr des Schnabels. Ihre Flügel sind so lange, daß sie im Gehen dieselben halb ausgespannt halten. Es sind träge und feige Vögel, welche mehr von Aas leben, als von lebender Beute; wenn sie gefressen haben, bildet der Kropf einen vorragenden Sack ob dem Gabelknochen, aus ihren Nasenlöchern läuft beständig eine stinkende Materie. Die intellectuellen Fähigkeiten scheinen geringe zu seyn.

Die eigentlichen Geyer haben einen großen und starken Schnabel, die Nasenlöcher stehen schief an der Wurzel des Schnabels, Hals und Kopf sind nackt, unter dem Halse dagegen bildet sich ein Federhalsband. Man fand sie bis dahin nur in der alten Welt. Sie haben eine übelriechende Ausdünstung und behalten dieselbe lange nach dem Tode noch. Ihr Flug ist zwar schwerfällig und langsam,

Digitized by Google

allein ſie können ſich bis zu einer unermeßlichen Höhe erheben. Ihr Geſicht iſt ſcharf, noch ſchärfer der Geruch, ſie riechen das Aas meilenweit. Leben in großen Schaaren, nähren ſich einzig von Aas und niſten in unzugänglichen Felſen. Männchen und Weibchen unterſcheiden ſich wenig von einander.

Weißköpfiger Geyer. Vult. Fulvus. Linn.

Vultur trencalos. Bechst. Leucocephalus. Meyer. Vögel Deutſchl. H. 20. Percnoptere Buff. le grand Vautour, le Vautour. Albin. Chassefiente. Vaill. Vautour des Indes. Lath. Naumann. I. 2.

Kopf und Hals mit kurzem, weißem Flaum bedeckt, das Halsband weiß, zuweilen bräunlich gemiſcht, die Schwing- und Schwanzfedern ſchwärzlich, das übrige Gefieder blaß rothgelb oder auch röthlichbraun. Schnabel und Füße bleifarb. Dieſe Art iſt ſehr weit verbreitet, das eigentliche Vaterland iſt Afrika, doch beſuchen einzelne das wärmere Europa und kommen zuweilen doch ſelten nach der Schweiz und Deutſchland. Sein Körper iſt ſchwer und gleicht an Größe oft dem des Schwans. Er ſoll bis zu 10 Fuß Flügelweite erreichen.

Grauer Geyer. Vult. cinereus. Linn.

Vultur Monachus pl. enl. 425. V. d'Arabie. Le Chincou Vaill. V. Arrian de la Peyrouse. V. noir. Savigny. Naumann. I. 1.

So groß oder größer als der vorige. Schwarzbraun. Das Halsband geht hinten bis nach dem Hinterhaupt hinauf, welches ſelbſt noch eine Federhaube hat, die Fußwurzeln ſind bis zur Hälfte befiedert, ſonſt ſo wie die Wachs-

haut violetbläulich oder schmutzig fleischfarben. Er ist eben so weit verbreitet als der vorige und greift zuweilen lebende Thiere an.

Ohrengeyer. Vult. auricularis.

L'Oricou Vaill. Afr. pl. IX. Wahrscheinlich der Geyer von Pondichery des Sonnerat. pl. enlum. Ann. d. Mus. pl. XX.

Schwärzlich, am Halse der Länge nach ein fleischiger Wulst, bis unter die Ohren. Die Größe einer Hausgans. In Afrika und Indien *).

Geyer mit fleischigen Erhöhungen an der Schnabelwurzel, der Schnabel so groß, wie bey den vorigen, aber die Nasenlöcher sind eiförmig und liegen der Länge nach. Sie bewohnen Amerika.

Kammgeyer. Sarcoramphus. Dumeril.

Geyerkönig. Vultur. Papa. Linn.

Planch. enlum. 428.

So groß wie eine Gans, in der Jugend schwärzlich, später mit Falb gemischt, im Alter endlich röthlichgelb, die Flügel schwarz. Ueber den Nasenlöchern eine ausgezackte Haut, wie ein Hahnenkamm, Scheitel und Hals ganz kahl und lebhaft roth und schwarz gefärbt. Er lebt in den Ebenen und Gebirgen von Südamerika.

Kondor. Sarcoramph. Gryphus.

Humb. obs. Zool. pl. VIII. Vultur gryphus.

Kopf und Hals nackt und runzlicht; vom Genick bis zur Gurgel ein drüsiger Leisten, und an der Kehle eine

*) Dahin gehören Vult. Monachus. pl. color 13. — Pondicerianus pl. c. 1 — Indicus. III. p. c. 26. — Angolensis.

ſchlaffe nach Gefallen ſich vergrößernde Haut, wie ein Kehllappen; unten am Halſe ein dunenartiger Halskragen, auf dem Scheitel beym Männchen ein runder Kamm, der nicht ausgeſchnitten iſt. Kehllappen und Kamm fehlen den Weibchen. Die Farbe im Alter grauſchwarz mit einem weißen Flügelſpiegel, in der Jugend gelbbraun und ohne Halskragen. Er iſt ſo groß als der Geyeradler, und ſcheint in ſeinen Sitten ihm nahe zu kommen, er frißt Aas, ſtößt aber auch auf Hirſche, Lamas, Schafe, Kälber. Niſtet in Felſen und legt ohne Neſt, große, weiße Eyer. Er iſt der fürchterlichſte Lufttyrann der hohen Gebirgskette der Cordilleren der Andes in Südamerika, und erhebt ſich von jenen höchſten Punkten aus, noch in ungemeſſene Höhen.

Aasvogel. Cathartes. Illiger. Catharista. Vieill. *).

Neophron Savigny. Gypaetos. Bechst. Percnopterus. Cuvier.

Der Schnabel iſt dünne, lang, oberhalb ſeiner Biegung erhaben, die Naſenlöcher eiförmig, und nur der Kopf, nicht aber der Hals ohne Federn. Dieſe Vögel ſind von mittlerer Größe, und haben nicht die Stärke der eigentlichen Geyer; ſie leben nur von Aas und allen Arten von thieriſchen Abgängen, und haben einen bewundernswürdigen Geruch, der ihnen aus weiter Ferne das Aas anzeigt. Sie leben paarweiſe oder in kleinen Geſellſchaften.

---

*) Dahin gehören V. californianus - Atratus. Wils. - Vulturinus. p. c. 31. und neuere Arten.

Digitized by Google

Schmutziger Aasvogel. Cathart. percnopterus.

Vultur albicans. Syst. Verzeich. d. Schw. Vög. leucocephalus et fuscus. V. de gingi. Sonn. Ourigourap. Vaill. Rachamach. Bruce. Naumann n. A. 1. 3.

Von der Größe einer kleinen Truthenne, am jungen Vogel die Hauptfarbe dunkelbraun, am alten Vogel weißgelblich, die Schwungfedern schwarzbraun. Der Nagel der Mittelzehe lang und wenig gekrümmt, der Hinterzehe groß und sehr krumm. Dieser Vogel ist über die ganze warme Zone des alten Continents verbreitet, und reinigt das Land von Aas. Er folgt in großen Truppen den Caravannen in den Wüsten, um den Abganz zu genießen. Die alten Egyptier verehrten ihn der großen Dienste wegen, die er dem Lande leistet. Auch heut zu Tage thut man ihm nichts zu leide, ja fromme Muselmänner machen Legate, womit man eine gewisse Zahl dieser Vögel unterhalten kann. In Europa bewohnt er besonders Spanien, und Unteritalien, seltener verfliegt er sich bis in die Schweiz, er nistet am liebsten in Felsen.

Schwarzer Aasvogel. Cathart. Aura.

Vult. aura Linn. pl. enl. 187.

Von der Größe des vorigen, der Schnabel etwas kürzer, der Ganze schwärzlich. In allen Theilen des warmen Amerika gemein, wo er dieselben Dienste leistet, wie der schmutzige Aasvogel *).

*) Die Geyer sind von Vieillot unter folgende Gattungen gebracht worden. Gypagos. Catharista. und Caracara.

Digitized by Google

Geyeradler. Gypaetos. Storr.

Phène. Savign-Griffon. Cuv.

Gmelin und Bechstein haben diesen Vogel den Falken zugesellt, allein er macht bestimmt eine Mittelgattung zwischen den Geyern und Falken aus, und nähert sich beyden, doch mehr noch durch Sitten und Bildung den Geyern; die Augen stehen nicht so tief im Kopfe, wie bey den Falken. Die Klauen sind verhältnißmäßig schwach, wenig gekrümmt, die Füße kurz, die Flügel in der Zeit der Ruhe halb ausgebreitet, der Kropf, wann er voll ist, stark vorspringend; der Kopf ganz befiedert, klein mit flacher Stirn: der Schnabel sehr stark, gerade, gegen das Ende aufgetrieben, in einen großen Hacken endigend; die Nasenlöcher mit vorwärtsgerichteten, steifen Borsten besetzt, und am Unterschnabel ein ähnlicher Bart; die Läufe sehr kurz, bis auf die Zehen befiedert, die Flügel sehr lang; die dritte Feder ist die längste von allen.

Bärtiger Geyeradler. Gyp. barbatus.

Lämmergeyer, Goldgeyer. V. barbarus. Gmel. Gyp. barbat. System. Verz. d. S. V. Naumann n. A. 1 Taf. 4 und 5.

In Hinsicht der Flügelweite der größte europäische Raubvogel, der bis 10 Fuß klaftert. Er bewohnt, doch nur in kleiner Zahl, die hohen Alpen des alten Continentes. Nistet in den unzugänglichsten Felsen, stößt auf Schafe, Ziegen, Gemsen, ist selbst Kindern gefährlich, kommt nie außer die Gebürge, frisches Fleisch von todten Thieren verachtet er so wenig als Blut, er verschlingt

Digitized by Google

und verdaut sehr große Knochen und giebt kein Gewölle von sich. Seine Länge beträgt an 4 Fuß, da der keilförmige Schwanz sehr groß ist, sein Gewicht ist doch nur 10 bis 12 Pfund, bey weitem geringer, als bey den großen Geyern; sein Flug schön und leicht. Wie die meisten Raubvögel ändert er sehr mit dem Alter die Farbe, in der Jugend ist er einfärbig braun, im Alter erhält er einen weißen Kopf mit einer schwarzen Linie um denselben, der Hinterhals weißgelb, mit langen, schmalen Federn, Unterleib, Hals, Hosen lebhaft falb, fast ins Orangefarbe übergehend, ein schwarzfleckiges Band zieht sich von den Schultern gegen die Brust hin, der Rücken ist schwarzgrau, jede Feder mit einem weißen Schaftfleck.

Falke. Falco.

Sie bilden die zweyte zahlreichste Gruppe der Tagraubvögel; Kopf und Hals sind mit Federn bedeckt; die Augenbogen bilden einen vorspringenden Rand, wodurch das Auge vertieft wird, und ihre Physiognomie einen ganz andern Ausdruck erhält, als bey den Geyern: Die meisten nähren sich von lebender Beute; aber sie unterscheiden sich sehr in Hinsicht ihres Muthes und der Kühnheit, womit sie die Beute verfolgen. Die meisten haben in der Jugend ein vom Alter verschiedenes Gefieder, und erst im dritten oder vierten Jahre erhalten sie ihr bestimmtes Kleid; unbekannt mit diesem Farbenwechsel haben daher die ältern Systematiker die Arten sehr vervielfältigt. Im Allgemeinen sind die Weibchen fast um ein Drittheil größer als die Männchen.

Der Schnabel ist kurz und hackenförmig, von seiner Wurzel an gekrümmt, an der Wurzel mit der Wachshaut

Digitized by Google

bedeckt. Die Naſenlöcher zur Seite des Schnabels liegend, rundlich und unbedeckt. Der Flug iſt erhaben, ſie können ſich leicht und hoch erheben. Das Auge iſt ſehr ſcharf. Die Klauen an den Füßen gekrümmt und meiſt groß und ſehr ſpitzig.

Man muß ſie in mehrere Familien theilen:

Eigentliche Falken. Edle Falken (Falco. Bechstein).

Sie bilden die erſte Hauptfamilie. Sie ſind in Hinſicht ihrer Größe muthvoller als die übrigen, da ihre Flügel groß, und ihre Angriffswaffen ſtark ſind; der Schnabel von ſeiner Wurzel an gekrümmt, hat einen ſcharfen Zahn an jeder Seite vor der Spitze; die zweyte Feder jedes Flügels iſt die längſte, und die erſte nur etwas kürzer, dies macht den Flügel länger und ſpitzer. Aus dieſem Bau entſtehen verſchiedene Eigenheiten, die Länge der Flügelfedern ſchwächt die Kraft in ſcheitelrechter Linie zu fliegen, und giebt ihrem Fluge bey ruhiger Luft vorwärts eine ſchiefe Richtung; dies zwingt ſie, wenn ſie ſich gerade in die Höhe heben wollen, gegen den Wind zu fliegen. Dieſe Raubvögel ſind ſehr gelehrig und werden daher zur Jagd abgerichtet; indem man ſie lehrt das Wild verfolgen, und auf den Ruf wieder zurückzukehren. Bey allen ſind die Flügel ſo lange oder länger, als der Schwanz.

Geyerfalken. Hiero-Falco. Cuv. *).

Die Flügel ſind wie bey andern Edelfalken, auch haben ſie alle Eigenſchaften dieſer, aber der Schnabel iſt nur ein-

*) Cuvier führt dieſen Falken erſt nach den eigentlichen Falken

fach und ſtumpf gezahnt, wie bey den unedlen Raubvögeln, der Schwanz lang und breit, übertrift die Länge der Flügel merklich; die Läufe ſind kurz, netzförmig geſchuppt, oben mit Federn beſetzt, es gehört hierher nur eine Art.

Geyerfalke. Falco candicans.

Jagdfalke, Naumann, neue Auflage. Taf. 21 und 22.

Falco islandicus; rusticolus; Gyrfalco; cinereus. *).

Der größte und geſchätzteſte von allen Edelfalken. Er findet ſich vorzüglich im rauhen Norden; ſein gewöhnlichſtes Gefieder in jüngern Jahren iſt oben braun, mit hellern Endkannten auf jeder Feder, auf den Deckfedern der Flügel und den Flügelfedern, mit dunklern und hellen Querſtreifen; die untere Seite des Körpers iſt weißlich, mit braunen Längsflecken, welche mit dem Alter ſich auf den Hoſen in Querflecken verwandeln, der Schwanz iſt braun und graulich gebändert. Er verändert ſich aber ſo in Hinſicht auf mehr oder weniger weiß oder braun, daß man ſolche findet, welche faſt ganz weiß ſind, nur auf dem Rücken behält jede Feder einen braunen Fleck in der Mitte; Füße und Wachshaut ſind bald blau, bald gelb, letzteres beſonders im Alter. Die Männchen und jüngern Weibchen ſind am Unterleib gelblichter und die Flecken größer. Nor-

---

an, ich habe mir erlaubt, denſelben vorauszuſetzen, wegen ſeiner Aehnlichkeit mit dem folgenden, blos dieſes einfachen Zahns wegen iſt es doch wahrhaftig zu viel, eine eigene Gattung aus dieſem Vogel zu machen, welcher den übrigen Falken ſonſt vollkommen gleicht. A. d. U.

*) Falco sacer ſcheint dem folgenden zu gehören.

Digitized by Google

wegen und Island sind die Länder, wo er am häufigsten vorkommt, selten kommt er nach Deutschland *).

Wahre Falken mit scharfem Zahn. Falco.

Würgfalke. Falco Lanarius.

Falco communis; stellaris; sacer; Lanier. Naumann u. A. Taf. 23.

Der Schnabel schwächer und länglichter, weniger gekrümmt; die Füße schwächer, mit kürzern Zehen. Der Streif am Mundwinkel, der allen Edelfalken gemein ist, schmal und braun. Auch dieser ändert die Farbe; die Jungen sind oben braun, die Federn rostfarb gekanntet, unten weißlicht, mit ovalen, braunen Längsflecken. Das Weibchen ist immer heller und bedeutend größer. Bey jüngern Vögeln ist Wachs- und Fußhaut bläulicht, im Alter werden beyde gelb.

Auch dieser Vogel bewohnt den Norden, doch nicht so hoch hinauf als der vorige. Schweden, Norwegen, Schottland, Sibirien und die Tartarey. Nistet in den unzugänglichsten Felsen. Sein Flug ist so schnell, daß fast kein Ort auf der Erde ist, wo er nicht schon wäre gefunden worden. Er stößt auf seine Beute scheitelrecht, wie, wenn er aus den Wolken fiele. Die Männchen braucht man zur Jagd der Elstern, Rebhühner und kleinerer Vögel, die Weibchen für Fasanen und selbst Hasen.

---

*) Naumann sagt, der Zahn am Geyerfalken sey eigentlich nicht stumpf, er werde oft von den Falkanirern abgefeilt, so fiele also dann die Cuvier'sche Eintheilung ganz weg. A. d. U.

Digitized by Google

Wanderfalke. Fal. peregrinus.

Falco communis; barbarus; hornotinus; abietinus. Naumann. n. A. Taf. 24 und 25.

Die zusammengelegten Flügel reichen bis auf die Mitte des Schwanzes. Oberkopf, Nacken und Mundwinkelstreif schwarzbraun, der Unterleib gelb, mit braunen Längsflecken. Im Alter wird bey beyden Geschlechtern der Oberleib aschblau, der Mundwinkelstrich schwarz, der Unterleib weiß, schwarz, gewellt, nur die Brust bleibt gelblich. Das Weibchen größer und dunkler. Dieser muthige Vogel ist durch ganz Deutschland verbreitet, auch in den nördlichen Theilen von Asien, Afrika und Amerika; er liebt große Wälder und Gebirgsgegenden *). Auch dieser Vogel wird mit Vortheil zur Jagd abgerichtet.

Die übrigen europäischen Edelfalken sind:

Der Baumfalke. Fal. Subbuteo.

Naumann 4. Taf. 15. F. 23. Neue Auflage. Taf. 26.

Oben braun, bläulich überlaufen, unten weiß, mit braunen Längsflecken, Hosen und Unterleib rostfarb, an der Backe ein schwarzer Streif.

Im ganzen mittlern Europa nicht selten.

Der rothfüßige Falke. Fal. rufipes.

Naumann Nachträge, Taf. 17. Fig. 33. und Taf. 18. N. Aufl. Taf. 28.

Das Männchen am ganzen Körper blaugrau, Hosen und Unterleib rostroth, am Weibchen, Scheitel, Nacken

*) Cuvier irrt ganz gewiß, wenn er diesen Falken für eine Altersverschiedenheit vom Würgfalken hält. A. d. U.

Digitized by Google

und ganzer Unterleib roſtfarb mit weniger ſchwarzen Längsflecken, Kehle weiß. Bey beyden Geſchlechtern, Augenkreis, Wachshaut und Füße ziegelroth.

In felſigen Gegenden des wärmern und mittlern Europa, ziemlich ſelten.

Der Zwergfalke. Schmirl. Fal. aesalon. Linn.

F. lithofalco. Linn. iſt das alte Männchen; caesius Meyer. Naumann. 4. Taf. 15. Fig. 24. Neue Auflage. Taf. 27.

Der kleinſte europäiſche Tagraubvogel, oben braun, unten gelblich, mit braunen Längsflecken, das alte Männchen iſt oben blau überlaufen. Niſtet in Felſen und raubt alle Arten kleiner Vögel. Im mittlern Europa.

Thurmfalke. Falco Tinnunculus.

Naum. n. Aufl. Taf. 30.

Am Männchen der Kopf grau, ſonſt bey beyden Geſchlechtern der Rücken roſtroth, ſchwarz gefleckt, beym Weibchen ſtärker, beym Männchen der Schwanz grau, mit ſchwarzer Endbinde, bey Weibchen röthlichſchwarz gewellt. Unterleib bey beyden Geſchlechtern weißgelb, mit ſchwarzen Schaftſtrichen. Niſtet und wohnt in Felſen, alten Schlöſſern und Thürmen *).

---

*) Von ausländiſchen Vögeln ſind dem Thurmfalken nahe verwandt. Der Thurmfalke von St. Domingo. (Falc. Sparverius.) pl. enl. 465. und zwey oder drey andere Arten, deren Flügel denen der edeln Falken gleichen, aber kürzer als der Schwanz ſind. Der Chiquera. (Fal. Chiquera) Vaill. 30.

Digitized by Google

Kleiner Thurmfalke. Fal. tinnunculoides *).

Falco cenchris. Röthelfalke. Naum. neue Auflage. Taf. 29.

Halfter und Kehle weißrostgelb. Kopf, Wangen und Hinterhals hellaschgrau, Schultern und die kleinen Flügeldeckfedern ziegelfarb ohne Flecken, die großen Deckfedern aschgrau, Unterrücken, Steiß und Schwanz eben so, letzterer mit breiter, schwarzer, weißgesäumter Endbinde. Der ganze Unterleib dunkelrostgelb, Brust und Seiten mit kleinen, rundlichen, schwarzbraunen Flecken. Am Schnabel ein starker Zahn, der in einen Ausschnitt des Unterschnabels paßt. Das Weibchen ist dem des Thurmfalken ähnlich, aber die Rückenfarbe dunkler, die Flecken schmäler und blässer, der Schwanz grau, mit schwarzen Binden. Er lebt im südlichen Europa, findet sich selten in Deutschland und der Schweiz. Nach Temmink, sind die Nägel dieses Vogels reinweiß.

Die zweyte Familie der großen Gattung Falke machen die sogenannten unedeln Raubvögel aus, weil man sie nicht zur Falkenirkunst gewöhnen kann, ihre Zahl ist größer, als die der edeln Falken, und sie zerfallen wieder

---

Der Bergfalke. (F. capensis) Vaill. 35. Dem Baumfalken nähern sich F. caerulescens, F. aurantius et bidentatus. Dem wahren Falken, der gehaubte Falk. (F. frontalis) Vaill. 25. Der schwarzhosige Falke. (F. tibialis). Vaill.

*) Die Falken überhaupt hat Vieillot unter folgende Gattungen gebracht. Aquila. Haliaetus. Pandion. Circaetus. Circus. Buteo. Milvus. Elanoides. Ictinia. Falco. Daptrius. Ibicter. Herpetotheres. Harpyia. Spizaetus. Asturina. und Sparvius.

Digitized by Google

in mehrere Familien. Die längste Flügelfeder ist fast immer die vierte, und die erste ist sehr kurz, so daß es gerade aussieht, als ob der Flügel an seinem Ende quer abgestutzt wäre, dies bedingt einen schwächern Flug, im übrigen gleichen sie den Edelfalken; der Schnabel ist weniger gut bewaffnet, da er keinen Seitenzahn nahe an seiner Spitze, sondern nur einen leichten Vorsprung an der Mitte seiner Länge hat.

Adler. Aquila.

Sie bilden die erste Zunft der unedlen Falken. Der Schnabel ist sehr stark, an der Wurzel gerade, nur an der Spitze gebogen. Sie enthalten die größten Vögel der Falkengattung, und die mächtigsten Raubvögel, ausser dem Geyeradler und Condor.

Eigentliche Adler. Cuvier.

Die Läufe sind bis zur Zehenwurzel befiedert: sie leben in Gebirgen, verfolgen Vögel und Säugethiere; die Flügel sind so lang als der Schwanz, der Flug schnell und hoch, und ihr Muth übertrift denjenigen der übrigen Raubvögel.

Der Steinadler. Falc. fulvus.

F. chrysaetos, melanaetos, niger, Mogilnik. Gmel. Linn. Naum. n. A. Taf. 8 u. 9.

Braun mehr oder minder dunkel, Scheitel hellbräunlich, der Schwanz in der Jugend weiß an seiner obern Hälfte, der übrige Theil schwarzbraun. Bey den Alten hat der Schwanz unregelmäßige grau und braune Bänder,

Digitized by Google

dies ist der sogenannte Goldadler *). Die Flugweite 7 bis 7½ Fuß, die Krallen fürchterlich. Ein kühner Räuber, welcher Hasen, Rehe, Lämmer, Auer- und Birkhühner und dergl. raubt. In hohen Gebirgen häufig, seltener in andern Gebirgswaldungen.

Der Kaiseradler. Fal. imperialis.

Aquila chrysaetos. Leisler, Nachträge. Naumann u. A. Taf. 6 und 7.

Die Füße bis an die Zehen dunkel befiedert, die Mittelzehe mit fünf großen Schildern; der Rachen bis hinter die kleinen graugelben Augen gespalten; Nasenlöcher quer, der obere Rand mit einem Einschnitt; die Flügelspitzen reichen im Sitzen über das Ende des Schwanzes hinaus; die schmalen Nackenfedern weißlich rostfarb, die Schultern weißgefleckt; der Schwanz aschgrau gewässert, mit schwarzer Endbinde, der übrige Körper schwarzbraun. In den hohen Gebirgen südlicher Länder, im wärmern Europa, auch in Egypten und Abyßinien.

Der Schreiadler. Fal. naevius.

F. maculatus. Gmel. Naum. n. A. Taf. 10 und 11.

Ein Drittheil kleiner als die vorigen, braun; Schwanz schwarz, am Ende weißlich; auf den Deckfedern der Flügel und an den Hosen gelbweiß gefleckt, auf den Flügeln sind

*) Ich glaube durchaus nicht an die Existenz des Goldadlers als Art, ich habe mehr als zwanzig Adler gesehen, oft im Uebergange zum Goldadler. A. d. U.

sind die Flecken eiförmig, an den Hosen Längsflecken, der untere Theil des Körpers ist heller als der obere. Dieser Vogel ist in den Gebirgen des südlichen Europa gemein, selten im nördlichen Theil: er greift nur schwache Thiere an. Man kann ihn zähmen, und in der Falkenjagd brauchen, er soll aber sogar den Sperber fürchten *).

Auch in Neuholland giebt es Adler von derselben Gestalt, nur ist bey jenen der Schwanz keilförmig.

Zwergadler. Falc. pennatus. Temm.
Aquila minuta Brehm.

Die Füße bis auf die Zehen befiedert, die Augendeckel stehen wenig hervor. Zügel und Gesicht weißgrau; der Oberleib dunkelkaffeebraun, der Unterrücken schwarzbraun, auf den Achseln ein reinweißer Fleck, die Nackenfedern rostgelb gerändert. Flügel und Schwanz braunschwarz, auf letzterm kaum einige undeutliche Bänder. Der ganze Unterleib reinweiß, mit schmalen, dunkelbraunen Schaftflecken, bey jungen rothbraun, mit starken, dunkeln Schaftflecken. Dieser schöne Adler hat noch nicht die Größe des Mäusebußhards. Er bewohnt die östlichen Gegenden von Europa, und passirt regelmäßig durch Oestreich. Sehr selten in einigen Gegenden Deutschlands, doch wurde er in Sachsen gefangen.

Fischadler. Cuv. (Haliaetus. Savigny).

Sie haben denselben Flügelbau wie die vorigen, aber die Läufe sind nicht bis auf die Zehen befiedert, sondern

*) Hierher gehört der Grissard. (Fal. armiger) Vaill. 1. Falco bellicosus Lath.

blos an ihrer obern Hälfte; die untere ist geschildert. — Sie leben am Ufer der Seen, Flüsse und des Meeres, und genießen hauptsächlich Fische.

Der Seeadler. F. albicilla. Linn. *)

F. ossifragus et albicaudus Gmel. Naumann n. A. Taf. 12, 13, 14. Le Pygargue et l'Orfraye.

Schnabel in der Jugend schwärzlich, im Alter gelb; die Läufe nur halb befiedert, der nackte Theil derselben und die Zehen gelb, die Hosen dunkelbraun, einfärbig, am jungen Vogel gefleckt; der keilförmige Schwanz bey Jungen weiß, dunkelbraun gefleckt, bey Alten reinweiß, im Alter wird der Vogel einfärbig graubraun, Kopf und Hals weißlich. Die Flügelbreite bis zu acht Fuß. Der Schnabel viel größer und stärker als am Steinadler. Lebt hauptsächlich von Fischen, doch auch von Säugethieren. Er findet sich im Norden beyder Welten.

Weißköpfiger Adler. Fal. leucocephalus.

Aigle à téte blanche. pl. enl. 411.

Einfärbig dunkelbraun, Kopf und Schwanz reinweiß, der Schnabel gelblich. Fast so groß als der vorige, lebt in Nordamerika, kommt zuweilen nach dem Norden von Europa, und verfolgt beständig die Fische, von denen er allein lebt. Bey Jungen ist Körper und Kopf braungrau,

---

*) Dahin gehören von ausländischen Vögeln, der Adler von Pondichery (F. pondicerianus) pl. enl. 416. Der Blagre (F. blagrus Sh. F. leucogaster?) Vaill. 5. Der afrikanische Schreiadler (F. vocifer) Vaill. 4. Der schwarze Adler. (Le caffre. F. vulturinus) Vaill. 6.

Digitized by Google

faſt wie am alten Seeadler, mit dem er nicht zu verwechſeln iſt.

Balbußarde. (Pandion. Savigny).

Schnabel und Füße wie bey den andern Fiſchadlern; aber ihre Klauen ſind rund, während ſie bey anderen Raubvögeln eckig und gekerbt ſind; die Läufe ſind netzartig geſchuppt, und die zweyte Feder der Flügel iſt die längſte. Man kennt nur eine Art, welche faſt in allen Welttheilen an ſüßen Waſſern ſich findet, deſſen Gefieder wenig Veränderungen leidet.

Der Flußadler. Falc. haliaetus.

Naum. n. A. Taf. 16.

Ein Drittheil kleiner als der Seeadler, der Rücken braun, der ganze Untertheil weiß, an der Bruſt einige braune Längsflecken, eben ſo an Kopf und Nacken, die Federn des letztern ſpitzig und lang. Wachshaut und Füße blau. Lebt ganz von Fiſchen.

In Amerika giebt es Fiſchadler mit langen Flügeln, wie bey den vorigen, bey welchen aber ein größerer oder kleinerer Theil der Seiten des Kopfs, und zuweilen der Kehle von Federn entblößt iſt. Man nennt ſie im Allgemeinen Caracara.

Der gemeine Caracara. Fal. brasiliensis. Gmel.

So groß wie der Flußadler, in die Quere weiß und ſchwarz geſtreift, die Federn zerſchließen, die Gurgel weiß, der Nacken ſchwarz, bildet einen kleinen Federbuſch; Deck-

Digitized by Google

federn der Flügel, Hosen und Schwanzende schwarz. In Brasilien und Guiana der gemeinste Raubvogel *).

Der kleine Adler mit nackter Gurgel. Fal. aquilinus.

Schwarz, Bauch und die untern Deckfedern der Flügel weiß, Gurgel nackt und roth. Pl. enl. 417. In Südamerika.

Die Harpien oder Fischadler mit kurzen Flügeln, (Harpyia. Cuv.) sind ebenfalls amerikanische Adler, sie haben sehr große und sehr starke Füße, mit netzförmigen Schuppen und zur Hälfte befiedert, wie die eigentlichen Fischadler, von denen sie sich nur durch die Kürze der Flügel unterscheiden. Schnabel und Klauen sind stärker, als bey allen andern Familien.

Die große Harpie aus Amerika. F. Harpyia. Linn.?

Aigle destructeur Daudin. Aigle de guiane Mouduit. F. cristatus? Linn. imperialis? Shaw. F. Iaquini. Gmel. l'Yzguantzli. Fernandes. Pl. col. 14.

Dieser Vogel hat die fürchterlichsten Klauen und Schnabel; seine Größe übertrift die des gemeinen Adlers, Kopf und Hals sind graulich, Rücken und Seiten der Brust schwarzbraun, unten weißlich, die Hosen weißlich-

*) Azara voyag. III. p. 30. Auch Margraf beschreibt ihn. Der Falco cheriway. Jaq. scheint eine Altersvarietät. Dahin gehört ferner Falc. formosus. — Falc. degener. Illig. und viele neue Arten.

Digitized by Google

braun gewellt; am Nacken bilden längere Federn einen schwarzen Federbusch. Er soll so stark seyn, daß er im Stande seyn soll, einem Menschen die Hirnschale zu zerspalten? Die Faulthiere machen seine gewöhnliche Nahrung aus, er soll aber auch nicht selten Hirschkälber rauben.

Adler Habichte. Morphnus. Cuv.

Wie bey den vorigen, sind auch bey diesen die Flügel kürzer, als der Schwanz; aber ihre Läufe sind lang und dünne, und die Zehen schwach, daher müssen sie von den Harpien getrennt werden.

Mit langen, nackten, geschilderten Läufen.

Gehaubter Adler-Habicht. F. Guianensis. Daud.

Petit aigle de la Guiane. Maud.

Gleicht in Hinsicht der Farben und des Federbusches, dem großen Fischadler von Guiana, aber er ist kleiner, und seine Läufe lang, nackt und geschildert, wodurch er sich sehr leicht auszeichnet; auf dem Rücken ist er schwärzlich, zuweilen dunkelgrau gemischt; der Bauch ist weiß, gelbröthlich gewellt, mehr oder weniger deutlich; Kopf und Hals bald grau, bald weiß, der Federbusch lang, schwärzlich. In Guiana.

Digitized by Google

Der Urubitinga. Fal. Urubitinga. Linn.

Schwarz, ohne Busch, Steiß und Schwanzwurzel weiß. Dieser schöne Vogel sucht seine Beute hauptsächlich in überschwemmtem Lande *). In Amerika.

Mit langen, ganz befiederten Läufen.

Der schwarze, gehaubte Adlerhabicht. F. occipitalis. Daud.

Huppart. Vaill. 2.

So groß als ein Rabe, schwarz, am Nacken hängt ein langer Federbusch, die Läufe, der Rand der Flügel und Streifen über den Schwanz weißlich. Er bewohnt fast ganz Afrika.

Der gescheckte Adlerhabicht. Falco ornatus. Daud.

Epervier patu, Az. Vaill. XXVI. F. superbus et coronatus Sh. Urutaurana. Margrav.

Federbusch und Scheitel schwarz, Seiten des Halses lebhaft rothbraun, der Mantel schwarzgrau gemischt, weiß gewellt; unten weiß, an den Seiten schwarz gestreift, ebenso an Schenkel und Läufen; Schwanz schwarz, mit vier grauen Bändern. Ein schöner Vogel des südlichen Amerika, welcher bald schwarz, bald weißlich, bald braun gefleckt ist **).

---

*) Hierher gehört wahrscheinlich auch der Neuseeländische Falke. F. nova Zaelandia.

**) Dazu ist zu zählen der Blanchard. Vaill. 3. (F. albes-

Endlich gehören hierher einige amerikaniſche Falken, deren Schnabelbau wie bey den vorhergehenden iſt, aber die Läufe ſind ſehr kurz, netzartig geſchuppt, vorn zur Hälfte mit Federn bedeckt, die Flügel kürzer als der Schwanz, ihr Hauptcharakter aber iſt, daß die Naſenlöcher beynahe ganz durch eine Haut, wie durch ein Ventil geſchloſſen ſind. Man kann daraus eine kleine Familie unter dem Namen Cymindis. Cuv. machen. Dazu gehört

Der kleine Habicht aus Cayenne. Falc. cayennensis. Gm. Enl. 473.

Er hat noch als Kennzeichen der Art einen kleinen Zahn, da, wo der Schnabel ſich biegt. Der alte Vogel iſt weißlicht, der Mantel ſchwarzbläulich, der Kopf aſchgrau, auf dem Schwanz vier weiße Bänder; beym jungen Vogel iſt der Rücken braun und rothbraun gefleckt, der Kopf weiß, mit einigen ſchwarzen Flecken *).

Habichte. Cuv. (Astures. Bechst. Daedalion. Savigny).

Sie bilden die zweyte Abtheilung der unedeln Raubvögel, und haben, wie die drey letzten Familien der Adler kürzere Flügel, als der Schwanz; aber ihr Schnabel krümmt ſich von der Wurzel an, wie bey allen nun folgenden Arten.

Man nennt vorzugsweiſe Habichte, diejenigen, deren Läufe etwas kurz und geſchildert ſind.

---

cens). — L'Aigle moucheté. (aq. maculosa) Vieillot. — F. ecaudatus. Aigle. bateleur Vaill. afrig. 7 et 8.

*) Dahin gehören Fal. hamatus. Illig. — Uncinatus. Illig.

Taubenhabicht. Falc. palumbarius.

Falc. gallinarius ist der Junge. Naumann u. A. Taf. 1. 17 und 18.

Oben braun, die Augenlieder weißlich, unten weiß, beym alten Vogel in die Quere braun gestreift; in der Jugend braun gefleckt, auf gelblichem Grunde; am Schwanze fünf dunklere braune Querbinden. Er ist an Größe dem Gyerfalken fast gleich, aber nicht so muthig, er stürzt sich immer schief auf seine Beute, doch bedient man sich seiner in der Falknerei auf schwache Thiere. Er ist fast in ganz Europa gemein, und der fürchterlichste Feind der Tauben.

Unter den ausländischen Raubvögeln, gehört unter andern hierher der neuholländische Habicht. Fal. novae Hollandiae. White. Man findet diesen Vogel oft schneeweiß, es scheint aber dies nur eine Varietät eines andern Vogels dieses Landes zu seyn, welcher oben, unten weiß ist, mit Spuren von grauen Wellenlinien.

Den Habichten nähern sich auch einige Vögel aus Amerika mit kurzen Flügeln und Läufen, welche letztere geschuppt sind.

Der Nacagua. Az. Falc. cachinnans. Linn.

Autour rieur ou à calotte blanche.

Den Namen hat er von seiner Stimme; er ist weiß, Mantel und ein Streif, welcher vom Augenkreis herkommt, und sich auf dem Nacken, mit einem von der andern Seite kommenden vereinigt, braun, der Schwanz mit

Digitized by Google

braunen und weißlichten Bändern. In den Sümpfen von Südamerika, wo er sich von Reptilien und Fischen nährt *).

Diejenigen Raubvögel, welche längere, geschilderte Läufe haben, kann man ausschließend Sperber, (Nisus. Cuv.) nennen.

Der gemeine Sperber. Falc. Nisus. Linn.

Naumann u. A. I. 19 u. 20.

Er hat dieselben Farben wie der Habicht, aber seine Füße sind höher, und sein Körper um ein Drittheil kleiner, dennoch ist er ein muthiger Raubvogel, den man selbst für die Falkenirkunst abrichtet. Bey jungen Vögeln sind am Unterleib pfeilförmige, rothbraune Längsflecken, und die Federn des Mantels sind rostfarb kantirt. Männchen und Weibchen sind sehr an Größe verschieden.

Es giebt einige ausländische noch kleinere Arten **), aber auch größere, wie

Der Singfalke. F. musicus.

Faucon chanteur Vaill. 27.

Fast so groß wie der Taubenhabicht, oben grau, weißbraun gestreift an Bauch und Bürzel. Er lebt in Afrika, wo er sich von Rebhühnern und Hasen nährt, und auf Bäumen nistet. Es ist der einzige bekannte Raubvogel, der einen angenehmen Gesang hat ***).

---

*) Dahin gehört auch Fal. melanops. Lath.

**) Der Gabar, Vaill. 33. F. Gabar. S. Der Minute. Vaill. 34. (F. minullus. Sh.)

***) Dahin gehören auch Azaras, Buse mixté de plomb. ferner

Milane. Milvus. Bechst.

Mit kurzen Läufen, schwachen Nägeln, und für die Größe verhältnißmäßig schwachem Schnabel, es sind die trägsten und feigsten Vögel der ganzen Gattung, allein, da ihre Flügel sehr lang, der Schwanz ebenfalls lang und gabelförmig ist, so übertreffen sie alle im leichten Fluge. Die einen haben sehr kurze Läufe, welche geschuppt und oben mit Federn bedeckt sind, wie bey der letzten Familie der Adler (Elanus, Savigny). Solche sind

Der Blac. Fal. melanopterus.

Vaill. Afr. 36 und 37.

So groß wie ein Sperber, mit weichem, seidenartigem Gefieder, der Schwanz wenig gegabelt, oben graulich, die kleinen Deckfedern der Flügel schwärzlich; unten weiß, der junge Vogel ist braun rothgelb gemischt. Dieser Vogel ist gemein von Egypten bis zum Kap, und nährt sich hauptsächlich von Insekten.

Der caroliniſche Milan. Fal. furcatus.

Cates. 6. 4.

Weiß, Flügel und Schwanz schwarz, die beyden äußern Schwanzfedern sehr lang. Größer als der vorige. Er frißt auch Reptilien. In Amerika.

Eigentliche Milane.

---

der großschnäblige Falke, F. magnirostris. pl. enl. 460. Fal. calumbarius. Catesb. 3.

Digitized by Google

Mit geſchilderten und ſtärkern Füßen.

Rother Milan. Fal. Milvus. Linn.

Naum. n. Auf. Taf. 31. F. 1.

Rothgelb, die Schwungfedern ſchwarz, der Schwanz roſtfarb. Unter unſern Vögeln der geſchickteſte Flieger, der ohne Flügelſchlag große Räume durchſchwimmt. Er iſt übrigens feig und träge, und lebt meiſt von Amphibien *).

Rothbrauner Milan. Fal. fusco ater.

Naum. n. A. Taf. 31. F. 2.

Kleiner als der vorige, dunkler, die Farbe geht mehr ins erdbraune, der Schwanz nicht ſo ſtark gegabelt. Lebt meiſt von Fiſchen, man findet ihn daher am Ufer der Seen und Flüße. Levaillants Paraſit ſcheint von dieſem wenig verſchieden, lebt aber in Afrika.

Weſpenbußarde. (Pernis. Cuv.).

Sie haben denſelben ſchwarzen Schnabel des Milans, ein beſonders charakteriſtiſches Merkmal aber iſt, daß der Raum zwiſchen Auge und Schnabel, welcher bey allen übrigen Raubvögeln nackt oder mit wenigen Haaren bedeckt iſt, hier mit ſehr dichten Federn, welche ſchuppenartig auf einander liegen, bekleidet iſt. Die Läufe ſind oben zur Hälfte befiedert und ſchuppig, der Schwanz iſt nicht gegabelt, die Flügel lang, der Schnabel von der Wurzel an gekrümmt.

---

*) Dahin gehört auch F. aegyptius. Gmel. und deſſelben F. Forskaehlii.

Digitized by Google

Der Wespenfalk. F. apivorus.

Naum. IV. Taf. 27. N. a. I. Taf. 35. 36.

Etwas kleiner als der gemeine Bussard, oben braun, unten verschiedenartig braun und weiß gefleckt und gewellt, je nach dem Alter, beym Weibchen einfärbig braun. Beym Männchen wird der Kopf aschgrau. Dieser Vogel lebt hauptsächlich von Insekten, Bienen, Wespen, genießt aber auch, was kein anderer Raubvogel thut, grünes Getreide und Obst.

Auch in andern Weltgegenden leben Wespenbussarde, dahin gehört der gehaubte Wespenbussard aus Java, er ist ganz braun, mit grauem Kopf, der Schwanz schwarz, in der Mitte mit einer weißlichen Binde, und am Hinterhaupt ein brauner Federbusch. Er ist durch Lechenault us Java gebracht worden.

Bußharde. Buteo. Bechst.

Lange Flügel, ungegabelter Schwanz, der Schnabel an der Wurzel gekrümmt, die Gegend zwischen Schnabel und Augen ohne Federn, die Füße stark. Es giebt solche, welche die ganzen Läufe bis auf die Zehen befiedert haben. Sie unterscheiden sich von den Adlern durch den von der Wurzel an gekrümmten Schnabel, von den Habichten oder Habichtsadlern, durch die langen Flügel.

Raubfüßiger Falk. Falc. Lagopus. Linn. *).

Naum. IV. Taf. 26. F. 44. N. A. I. Taf. 34.

Oben braun, unregelmäßig gelb oder weißlich gemischt, der Unterleib am Männchen heller, die Füße bis auf die

*) Falco pennatus Vaill. XVIII. gehört allerdings hierher, aber

Zehen befiedert. Wohnt eigentlich im Norden von Europa, ſtreift aber im Winter weit umher.

Die gröſsere Zahl der Bussharde haben nackte und geſchilderte Läufe. Dahin gehört

Der Mäuſe-Bussard. Falc. Buteo.

Naum. N. A. Taf. 32 und 33.

Mit zahlreichen Varietäten in der Farbe, nach Alter und Geſchlecht, und andern zufälligen Umſtänden. Die Hauptfarbe iſt immer am Rücken braun, mehr oder minder mit weiſs gemiſcht, beſonders am Unterleib, der oft faſt ganz weiſs iſt. Er iſt der häufigſte Raubvogel unſerer Gegenden, doch mehr nützlich, als ſchädlich, da er eine Menge Mäuſe, mitunter freilich auch Vögel und junge Haſen und Hühner verzehrt. Falco albidus iſt ſeine weiſsliche Varietät, es giebt aber auch ganz brandgelbe. Unter die ausländiſchen gehört

Der Bacha. Fal. Bacha.

Vaill. I. pl. XV.

So groſs wie der unſrige, braun, mit kleinen, runden Flecken an den Seiten der Bruſt; ein ſchwarz und weiſser Federbuſch am Nacken, ein breites Band an der Mitte des Schwanzes. Dieſes iſt einer der gröſsten Räuber in Afrika, der ſich beſonders von Klippſchliefern nährt *).

Fal. pennatus Temmink iſt ein ganz anderer Vogel, und gehört zu den Adlern. A. d. U.

*) Dahin gehören: der Jakal Fal. Jackal. Daud. Vaill. 1. 16). Der Taſchard, Fal. Tachardus. Sh. id. 19. Der kleine Buſ-

Weihen. Circus. Bechst.

Sie unterscheiden sich von den Bußarden durch längere Läufe, schmächtigern Körpern, längern Schwanz, und die Federn um die Ohren bilden, wie bey den Eulen eine Art Schleier. Sie sind gewandter als die Bußarde.

Es giebt in Europa drey Arten, der Unterschied zwischen Männchen und Weibchen und die Veränderungen des Gefieders, nach dem Alter, verwirrten die Systematiker.

Die Kornweihe. Falc. pygargus.

Fal. cyaneus Meyer. Naum. 4. Taf. 21. F. 34. N. a. 1. 7. 38. F. 2. u. Taf. 39.

Der Kopf mit einem Schleier umgeben, am Männchen, Steiß und Schwanzwurzel weiß. Oberleib und Brust weißgrau. Unterleib weiß, die vordern Schwungfedern schwarz. Das Weibchen ist ganz verschieden in der Farbe vom alten Männchen, Oberleib braun, der Schleier gelblich, der Schwanz braun mit weißgelben Bändern, Hals und Brust brandgelb, mit großen braunen Längsflecken, die Hosen und Steiß heller. Im nördlichen Europa mehr als im wärmern.

Die graue Weihe. Fal. cinerascens. Meyer.

Naum. IV. Taf. 21. F. 33. N. a. 1. 7. 40.

Die obern Theile dunkel aschgraublau, über die Flügel laufen zwey schwarze Bänder. Gurgel und Brust hell-

---

sard, Falc. busarellus. Sh. id. 20. Der Buson, Fal. Buson Sh. id. 21. Der Taschiro, Falc. Tachiro. id. 24. Der Bussard der überschwemmten Savannen, Az. Der Milanbußhard, (milan cresterelle) Vieillot.

grau, Unterleib weiß, mit roſtfarben Längsflecken, Schwanz grau, mit roſtfarben Querbändern. Das junge Männchen iſt am Unterleib brandgelb, ohne Flecken, oben braun. Das alte Weibchen gleicht dem des vorigen. Im öſtlichen und ſüdlichen Europa, Ungarn, Polen, Dalmatien.

Die Rohrweihe. Fal. rufus.

F. aeruginosus, arundinaceus et rufus, Naum. 4. Taf. 22 und 23. F. 37. N. A. 17. 37 und 38. F. 1.

Die Wachshaut gelbgrün, die Füße blaßſchwefelgelb, der Scheitel roſtgelb, der Leib ſchocoladebraun. Im Alter verliert ſich der roſtgelbe Scheitel. Er lebt vorzüglich an Sümpfen und Teichen, ſtößt auf Waſſervögel, dann aber auch vorzüglich auf Reptilien *).

Kranichgeyer. Gypogeranus. Illig. Serpentarius. Cuv.

Messager ou Secretaire. Vaill. ois. d'Afrique. I.

Dieſe ſonderbare afrikaniſche Gattung, welche nur eine Art zählt, hat Läufe, welche beynahe doppelt ſo lang ſind,

*) Hierher gehören von ausländiſchen Vögeln: der hudſoniſche Falke, Falc. hudsonius. Edw. 107. vielleicht nur eine Varietät des Pygargen, Falc. uliginosus. Edw. 291. L'Acoli. Vaill. Af. 31. (F. Acoli. Sh.). Der Tſchong, id. 32. (F. melanoleucos). Vaillants grenouillard. (ranivorus Sh.) iſt nur das Weibchen des Pygargen, ſo wie der busard rous des Vieillot.

Die übrigen ausländiſchen Raubvögel können hier nach den angegebenen Unterabtheilungen eingeſchaltet werden, im Ganzen aber herrſcht unter den Raubvögeln noch viele Verwirrung.

Digitized by Google

als bey keinem vorhergehenden Raubvogel, daher haben ihn einige Systematiker unter die Sumpfvögel gezählt; aber seine ganz mit Federn bedeckten Schenkel, sein gebogener, auseinander stehender Schnabel, sein vorspringender Augenliederrand, und sein ganzer innerer Bau, reihen ihn unter die Raubvögel. Die Läufe sind geschildert, die Zehen verhältnißmäßig kurz, der Augenkreis ohne Federn; am Nacken steht ein langer, steifer Federbusch, die beyden Mittelfedern des Schwanzes sind viel länger, als die übrigen.

Der afrikanische Kranichgeyer. Serpent. Africanus.

Bewohnt die dürren von Gebüsch entblößten Gegenden um das Kap, wo er im schnellen Laufe die Reptilien verfolgt. Die Nägel sind nicht sehr scharf, da er mehr auf der Erde sitzt als fliegt, daher sie abnutzt. In den Füßen hat er die meiste Kraft. Gmelin hat ihn unter die Falken gezählt, und Fal. Serpentarius genannt.

Nächtliche Raubvögel.

Sie zeichnen sich durch einen großen Kopf, große tellerförmige nach vorn gerichtete Augen, welche mit zerschlissenen Federn die einen Kreis bilden und vorn die Wachshaut bedecken, umgeben sind, auch die hintern dieser Federn machen einen ähnlichen Kreis um das Ohr, man nennt diese Federbildung, welche den Eulen ganz eigen ist, Schleier. Die Pupille des Auges ist sehr groß, die Regenbogenhaut sehr reitzbar, daher sind die meisten Arten

für

Digitized by Google

für das Tageslicht sehr empfindlich, sie sehen besser in der Dämmerung. Der Schedel ist sehr dick, aber wenig dicht, poros und hat zwischen seinen Lamellen große Zellen, welche mit dem Ohr in Verbindung stehen, wodurch wahrscheinlich die Feinheit dieses Organs erhöhet wird. Die Flugorgane haben wenig Kraft; der Gabelknochen ist wenig fest. Die Federn sind weich, seidenartig, daher der Flug sanft und leise. Die äußere Zehe ist so eingerichtet, daß sie dieselbe nach Willkühr, nach hinten oder vorn richten können (digitus versatilis). Diese Vögel jagen meistentheils in der Dämmerung und beym Mondenlicht. Ihre Stimme ist stark, und tönt oft schauerlich durch die stille Nacht. Wenn sie beunruhigt, angegriffen oder erschreckt werden, machen sie sonderbare Stellungen und lächerliche Geberden, ohne wegzufliegen.

Der Vormagen ist sehr muskulös, ob schon sie nichts als thierische Nahrung genießen, besonders Mäuse, kleine Vögel, Insekten; der Kropf ist groß; die Blinddärme sind lang, am blinden Ende weit. Die kleinen Vögel, so wie die Krähen, Raben haben gegen die Eulen eine angeborne Feindschaft, und wenn sie sich den Tag durch sehen lassen, so versammeln sich alle Arten von Vögeln, und necken die Eulen. Man bedient sich ihrer daher um die kleinen Vögel anzulocken und zu fangen. Sie sind durch ihre Nahrung meist sehr nützliche Thiere, der Schaden an der Jagd ist unbedeutend, daher sollten sie eher gehegt als verfolgt werden. Sie nisten in Felsen, Mauren, hohlen Bäumen, und legen alle weiße, rundliche Eier.

Sie bilden nur eine Gattung nach Linneus.

Eule. Strix.

Man kann sie nach dem Schleier, nach der Größe der Ohrfedern, nach der Größe der Augenkreise, und einigen andern Charakteren eintheilen. Die Arten, welche um die Augen einen vollkommnen Kreis von zerschlissenen Federn haben, welcher selbst wieder von einem Kreise oder Schleier von schuppenartig übereinander liegenden Federn umgeben ist, zwischen welchen beyden aber die Ohröffnung liegt, sind in ihren Sitten und Gestalt mehr von den Tagraubvögeln verschieden, als diejenigen, deren Ohr klein, eirund und mit zerschlißenen Federn umgeben ist, die blos von der Oberseite des Auges kommen. Man bemerkt selbst am Scelet, Spuren dieser Verschiedenheit. Unter die erstern Arten zählt man

Die Ohrkautze. Otus. Cuv. (Hibous).

Sie haben auf der Stirne zwey Federbüsche, welche sie nach Willkühr erheben können, die Muschel des Ohres macht einen Halbcirkel vom Schnabel bis zum Scheitel und ist mit einem hautigen Deckel umgeben. Die Füße sind bis auf die Zehen befiedert. Dahin gehören unter den in Europa vorkommenden.

Der große Ohrkautz mit kurzen Ohren. Strix. ascalaphus. Savigny.

Brit. Zool. tab. B. III.

Ein Viertheil größer als der folgende, wie derselbe rothgelbbraun gefleckt, auf Flügeln und Rücken geschlängelt, aber am Bauche mit querlaufenden, schmalen Wel-

Digitized by Google

lenlinien, und ſehr kurzen Ohrfedern. Er lebt in Afrika, ein Exemplar wurde aber auch in England gefangen.

Mittlerer Ohrkautz. Str. Otus.

Naum. IV. Taf. 29. F. 48.

Mit wenigſtens zehen großen, abgeſtumpften, ſchwärzlichen, roſtgelben, weißgerandeten Federn an jedem Buſch, roſtgelben und tief braun gefleckten Oberleibe; Unterleib blaßroſtgelb, mit ſchmalen, dunkelbraunen, zackigen Längsflecken. Der Schwanz hat acht bis neun Bänder. Das Weibchen heller.

In Europa in Wäldern häufig. Der merikaniſche Ohrkautz — (Strix mexicana et americana, unterſcheidet ſich blos durch dunklere und deutlichere Flecken *).

Kurzöhriger Ohrkautz. Str. brachyotos.

Naumann IV. Taf. 29. F. 49.

Die Farben ſind bläſſer als am vorigen, der Kopf kleiner, die Augengegend dunkler, die Federn auf dem Rücken dunkelbraun, gelb gerändert, der Unterleib gelblich, dunkelbraun geſtreift, der Schwanz ſchwarzbraun gebändert mit weißer Spitze. Die Federbüſche ſind nur am Männchen ſichtbar, ſehr kurz, und ſtehen ſelten aufgerichtet, ſo daß man ſie überſehen hat und die Art unter die Glattköpfe ſetzte. Im Norden von Europa, wandert im Herbſt und Winter nach Deutſchland.

*) St. occipitalio pl. c. 34. — Leucotis. id. 16. — Lactea. id. 4. — Leschenaulti. id. 20.

Digitized by Google

Unter den ausländiſchen Arten ſind zu bemerken.

Der große amerikaniſche Ohrkautz. Strix. magellanica. Gmel.

Strix virginiana. pl. enl. 385. Jacurutu. Marg. Nacurutu. Az.

Faſt ſo groß als der Uhu, unten in die Quere braun gewellt, oben braun, ſchwarz punktirt. Dieſe Eule findet ſich faſt in ganz Amerika in Wäldern.

Auch Afrika hat eine ſehr ähnliche, aber um ein Viertheil kleinere Art.

Die Kautzeulen. Ulula. Cuv. (Chouettes).

Haben Schnabel und Ohren wie die Ohrkautze, aber keine Büſche; man findet ſolche im Norden beyder Welten.

Die graue, ſchwediſche Kautzeule. Str. litturata. Retz.

Strix lapponica Tenn.

So groß, als der Uhu; oben grau und braun geſprenkelt; weiß, mit graubraunen Längsflecken unten. In den Gebürgen des nördlichen Schwedens.

Die canadiſche Kautzeule. Str. nebulosa. Gm.

Etwas kleiner als die vorige, Hals und Bruſt mit braun und weißen Querſtreifen, der Rücken braun mit weißen Flecken, der Bauch weißlich mit weißen Spitzflecken.

Schleiereulen. (Strix exclusive. Savigny).

Sie haben eben ſo große Ohren als die Ohrkautze, und dieſe ſind noch deutlicher mit einem Deckel verſehen,

Digitized by Google

aber ihr Schnabel ist länger und nur am Ende gekrümmt, während er bey allen andern Untergattungen von der Wurzel an gebogen ist. Sie haben keine Federbüsche; ihre Läufe sind befiedert, aber die Zehen sind nur mit Haaren bedeckt. Der Schleier bildet durch seine haarigen Federn, welche die Augen umgeben, ein breites und plattes Gesicht, und giebt ihrer Physiognomie ein ganz eigenes Ansehen.

Die Schleiereule. Strix. flammea. Linn.
Naum. IV. Taf. 31. F. 52.

Diese schöne Eule scheint fast über die ganze Erde verbreitet. Ihr seidenartiges Gefieder ist angenehm gezeichnet, der Oberleib ist auf wenig hervorschimmerndem, rostfarbem Grunde aschgrau gewässert, und mit kleinen, in Linien geordneten, schwarzen und weißen Flecken bezeichnet. Der Unterleib gelb oder rothgelb, mit schwarzen, rundlichen Flecken, in wärmern Gegenden oft ganz weiß, mit oder ohne Flecken. Sie findet sich in Städten und Dörfern, in Kirchen und Thürmen in ganz Europa.

Eulen. Syrnium. Savigny.
Chats-huans.

Gesicht und Schleier wie bey den vorigen, aber die Ohrmuschel, bildet eine eiförmige Vertiefung, die nicht die Hälfte der Höhe des Schedels einnimmt, sie haben keine Federbüsche, die Füße sind bis auf die Klauen befiedert.

Nachteule. Str. Aluco.
Naum. IV. Taf. 30 und 31. F. 51.

Etwas größer als der mittlere Ohrkautz, graulich allenthalben mit braunen Längsflecken, der Unterleib mit

zikzakförmig auslaufenden Querstreifen, die durch einen dunklen Mittelstrich getheilt sind, an den Schultern eine Reihe weißer, eiförmiger Flecken. Das Weibchen eben so gezeichnet, aber der Grund fuchsroth (Str. stridula). Der Kopf ist groß, der Augenstern braun. Nistet in Wäldern, oft in fremde Nester, und wohnt außer dem meist in hohlen Bäumen *).

Großköpfige Eule. Str. macrocephala. Meisner.

Der Kopf groß, dicht mit langen Federn befiedert, der Schnabel länger, weißlich hornfarben. An Kopf, Oberleib und Brust dunkelschwarzbraun, jede Feder mit etlichen weiß und rostgelben Bändern, die durch einen dunklern Mittelstrich unterbrochen sind; der Kreis um die Augen aschgraubraun gewellt; Flügel dunkelgraubraun, mit breiten, schmutzigweißen Querbinden, die dritte und vierte Schwungfeder sind die längsten. Unterleib und Deckfedern des Schwanzes weiß, mit schwarzbraunen Querbändern. Die Füße weiß, mit braunen Querstreifen. Die Zehen und Klauen lang, stark gekrümmt und weißlich. Größe der Nachteule. Bisher nur in der Schweiz bey Bern und Solothurn gefunden.

Uhus. Bubo. Cuv. (Ducs).

Sie haben eine eben so kleine Ohrmuschel und undeutlichen Schleier, wie die Eulen, dagegen Federbüsche.

---

*) Dahin gehören außer S. Stridula wahrscheinlich auch S. rufa, sylvestris, noctua et alba des Scopoli und wahrscheinlich auch S. soloniensis Gmel.

Digitized by Google

Der Uhu. Str. Bubo.

Naum. IV. Taf. 28. Le grand. Dus.

Der größte Nachtraubvogel, roſtgelb, ſchwarz geflammt: die Federbüſche dick, meiſt ſchwarz; oben iſt die Farbe mehr braun, unten mehr roſtgelb. Die Füße ſtark, mit ſtarken Klauen, und befiedert bis an dieſe. In Wäldern, beſonders Gebirgswäldern, lebt von Haſen, Auerhühnern u. dgl., doch auch von Mäuſen.

Vaillants Eulen mit Federbüſchen ſind Uhus, deren Büſche weiter nach hinten ſtehen, und ſich nicht bis auf die Horizontallinie heben. Man kennt nur eine Art aus Guiana (Strix griseata). Das Gefieder iſt rothgelb oder braun, fein ſchwärzlich geſtreift, die Federbüſche an ihrer innern Seite weiß, auf den Flügeln einige Flecke von ſchönem Weiß. Vaill. ois. d'Afrique. 43.

Habichtseulen. Noctua. Savigny. (Les Chevèches. Cuv. Surnia. Dumer).

Sie haben keine Federbüſche, die Ohrmuſchel iſt nicht vertieft, die Ohröffnung eiförmig, kaum größer als bey andern Vögeln, der Schleier iſt weniger ausgezeichnet und kleiner, als bey den Uhus. Einige haben einen langen, kegelförmigen Schwanz, die Zehen ſind ſtark befiedert. Es ſcheint, daß mehrere verwandte Arten im Norden vorhanden ſind.

Uraliſche Eule. Strix. Uralensis.

Strix macroura. Naum. Nachtr. 34. Fig. 66.

Faſt ſo groß als die Schneeeule, der Schwanz über zehen Zoll lang. Geſicht groß, rundlich, blaßbräunlich-

gelb, hin und wieder schwärzlich gestrichelt, der Schleier deutlich, schwarzbraun, mit runden, weißen und gelben Flecken; der Grund des ganzen Gefieders ist hellgrau: unten mit braungrauen Flecken und Längsstreifen, die obern Theile sind mit denselben Farben unregelmäßig gefleckt; Flügel und Schwanz in die Quere grau gebändert, der Schwanz hat sieben weißgrauliche Bänder; der Schnabel gelb, ganz in den Gesichtshaaren vorborgen; die Regenbogenhaut braun; die Füße mit dichtem Flaum bedeckt; die Nägel sehr lang und ausgezackt; der Schwanz stark, keilförmig. Lebt in den arktischen Gegenden Rußlands, Lapplands und Schwedens, und nährt sich von Mäusen, kleinen Vögeln und Schneehühnern. Sehr selten kommt sie nach Deutschland, doch wird sie bey Wien gefunden.

Sperbereule. Str. nisoria. Meyer.

Naum. Nachtrag. XXXIII. Fig. 67. Strix funerea et hudsonia.

Mit dunkelbraunem, weißgeflecktem Oberleibe; weissem in die Quere braungestreiftem Unterleibe, und langem, keilförmigem, weißbandirtem Schwanz. Länge 14 Zoll, wovon der Schwanz allein 6 Zoll.

In den arktischen Gegenden beyder Welten, streift zuweilen nach dem nördlichen Deutschland. Sie jagt mehr bey Tage als bey Nacht.

Vaillant beschreibt auch eine afrikanische Habichtseule (ois. d'Afr. 38), welche unten ganz weiß, oben rothgraulich ist, auf dem Schwanz hat sie 14 oder 15 weiße

Digitized by Google

Linien, sie soll nur des Nachts jagen. Lebt in Afrika; er nennt sie Choukou *).

Bey andern ist der Schwanz kurz, die Zehen ebenfalls stark befiedert. Dahin gehört

Die Schneeeule. Strix nyctea.

Le Harfang. Naum. Nachträg. Taf. 33. N. a. I. Taf. 41.

Sie kommt in der Größe dem Uhu nahe. Ihr Gefieder ist schön weiß, mit braunen Querflecken, welche mit dem Alter immer mehr verschwinden, so daß sie endlich ganz weiß wird. Sie bewohnt den Norden beyder Festländer, nistet in hohen Felsen, macht Jagd auf Hasen, Auerhühner, Schneehühner. Zuweilen streift sie im Winter bis nach Deutschland.

Es giebt in Europa und andern Welttheilen, einige sehr kleine Arten.

Der rauhfüßige Kautz. Str. Dasypus. Bechst.

Strix Tengmalmi. Linn. Naum. 4. 7. 32. Fig. 54.

Mit bis an die Nägel stark befiederten Füßen. Augenkreis und Schleier groß, letzterer kastanienbraun gesprenkelt. Oberleib wenig oder gar nicht weiß gefleckt. Unterleib weiß, mit kastanienbraunen Flecken. Schwanz und Flügel lang, auf letzterem 4 weiße Linien. Etwas größer als eine Amsel. Sie lebt hin und wieder in

*) Vaillants weiße Eule ois. d'Afr. 45. ist nichts, als eine alte Schneeeule.

Digitized by Google

Deutschland und der Schweiz, mehr aber im Norden von Europa.

Kleiner Kautz. Str. passerina. Linn.

Naum. 4. Taf. 32. Fig. 53.

Die Schwungfedern dunkelbraun, mit weißen Flecken, in fünf bis sechs Reihen; der Oberleib graubraun, mit großen, weißen Tropfen; Brust und Bauch weißlich, dunkelbraun gefleckt. Augenkreis klein, die Zehen wenig und haarförmig befiedert. Im größten Theil von Europa in Steinbrüchen, alten Schlössern u. s. w., lebt von Mäusen und Insekten.

Zwergkautz. Str. pygmaea. Bechst. Chévechette. Vaill. ois. d'Afr. 46.

Strix acadica. Gmel.

Mit einem Weihenkopfe, der Oberleib dunkelrothgrau, weißpunktirt, der Unterleib weiß, mit dunkelbraunen Längsstrichen, und an den Seiten mit dergleichen Querstreifen; der Schwanz mit vier weißen, schmalen Querbinden; die Fußzehen stark befiedert.

In den nördlichen Gegenden, selten im nördlichen Deutschland in hohen Gebirgswäldern.

Es giebt in Amerika und Indien mehrere sehr nahe verwandte Arten, in Brasilien lebt eine Art wenig größer als ein Sperling. (Str. minutissima. Princ. Max).

Rothgelber Kautz. Str. cayennensis.

Gm. Enl. 442.

Am ganzen Körper unregelmäßig und fein, mit braunen Wellenlinien auf rostfarbem Grunde. In Cayenne.

Digitized by Google

Schwarzer Kautz. Strix. Xuhul. Vaill. Afr. 41.

Auf schwarzem Grund weiß gewellt, am Schwanze vier weiße Linien. Sie flieht das Licht so wenig, daß man sie Tageule nennt. Diese beyden Eulen, haben die Größe der gemeinen Nachteulen.

Halsband Kautz. Str. torquata. Daud. Vaill. Afr. 42.

Oben braun, unten weißlich, Augenkreis und ein Band auf der Brust braun, Gurgel und Augenlieder weiß. Sie ist größer als die gemeine Nachteule.

In Südamerika.

Es giebt in Amerika Eulen, deren Läufe und Zehen nackt sind, dahin gehört Daubins, Strix. nudipes.

Endlich sind noch zu bemerken, die ganz kleinen

Ohreulen oder Scops. Scops. Savigny.

Sie haben ihre Ohren fast oben am Kopf, die Augenkreise sind unvollkommen, und die Zehen unbefiedert, dagegen haben sie Federbüsche, wie die Ohrkautze und Uhus.

Die kleine Ohreule. Str. Scops. Linn. Naum. Nachtr. Taf. 25. Fig. 49.

Kaum so groß wie eine Amsel, das Gefieder ist aschgrau, mit vielen wellenförmigen, schwärzlichen Querstreifen, am Unterleibe mit Weiß gemischt, die Querflecken mit Längsstrichen durchschnitten, die Federbüsche klein, aus mehrern stufenweise, erhöheten Federn, welche bräunlich und dicht schwärzlich gestreift und gedüpfelt sind. Dieser niedliche, kleine Vogel ist mehr im wärmern Europa anzutref-

Digitized by Google

fen, doch auch in Deutschland, niſtet in Felſen und Baumlöchern, und lebt von Mäuſen und Inſekten. Es giebt in Afrika eine ſolche Eule, welche nur unbedeutend in den Farben abweicht *).

Zweyte Ordnung der Vögel.

Sperlingsartige. Passeres.

Dieſe Ordnung iſt die zahlreichſte von allen. Die ſie charakteriſirenden Merkmale, ſcheinen beym erſten Blick nur negativ zu ſeyn, denn ſie umfaßt alle Vögel, welche man weder unter die Sumpfvögel, noch unter die Schwimmvögel, noch unter die Klettervögel oder Raubvögel und Hühner zählen kann. Dennoch, wenn man ſie unter einander vergleicht, bemerkt man große Aehnlichkeit in ihrem Bau, und vorzüglich ein ſo unmerklicher Uebergang einer Gattung in die andere, daß es ſehr ſchwer iſt, die Gattungen zu beſtimmen. Sie haben weder die Schnelligkeit der Raubvögel, noch das Beſtimmte der Hühnerarten oder Waſſervögel, in Hinſicht auf ihre Nahrung; dieſe beſteht aus Inſekten, Früchten, Körnern, letztere dienen ihnen um ſo ausſchließlicher zur Nahrung, wenn ihr Schnabel ſtark iſt; Inſekten, wenn ihr Schnabel dünne iſt. Die, welche

*) Auch Strix Zorca. Cetti. carniolica Scopoli und pulchella Pallas ſcheinen nicht verſchieden von Scops zu ſeyn. Die Geſchichte der kleinen Eulen-Arten iſt noch ſehr verwirrt, und ſchwer die Synonymie zu finden.

Digitized by Google

einen sehr starken Schnabel haben, verfolgen selbst kleine Vögel *).

Der Magen hat immer einen muskulosen Vormagen; sie haben überhaupt zwey kleine Blinddärme; unter ihnen findet man die Singvögel, bey welchen der untere Luftröhrenkopf sehr zusammengesetzt erscheint.

Die verhältnißmäßige Länge der Flügel, und die Kraft zu fliegen sind so verschieden, als ihre übrige Lebensart.

Das Brustbein hat gewöhnlich nur eine Ausschweifung an jeder Seite des innern Randes. Bey den Raben finden sich zwey, bey den Eisvögeln und Bienenfressern eben so, ganz mangelt sie bey den Mauerschwalben und Kolibris.

Die erste Unterordnung kann nach dem Schnabel gemacht werden, bey den übrigen sind besonders die Füße zu betrachten.

Die erste und zahlreichste Abtheilung begreift die Gattungen, wo die äußere Zehe mit der innern verbunden ist, aber nur mit einem oder zwey Gelenken.

Die erste Abtheilung dieser Familie, begreift die

Zahnschnäbel. Dentirostres. Insectivores. Temm.

Der Schnabel ist an den Seiten nahe an der Spitze ausgeschweift. In diese Familie gehören die größte Zahl

*) Weder das Aeußere, noch das Innere der linneischen Rabenarten, bietet genugsame Charaktere dar, diese von den Sperlingsarten zu trennen, die Kletervögel dagegen müssen von diesen getrennt werden.

der insektenfressenden Vögel, die meisten fressen indeß auch Beeren und andere zarte Früchte.

Die Gattungen müssen durch die Form des Schnabels überhaupt bestimmt werden; er ist stark und zusammengedrückt in den Würgern und Drosseln; platt gedrückt bey den Fliegenschnäppern; rund und dick bey den Merlen, schwach und gekrümmt bey den Grasmücken und Sängern.

Würger. Lanius. Linn. Pie grièches.

Der Schnabel kegelförmig oder zusammengedrückt, am Ende mehr oder weniger gekrümmt.

Die eigentlich sogenannten Würger, haben den Schnabel an der Wurzel dreieckig, von der Seite her zusammengedrückt. Bey den einen ist die obere Schnabelfirste gewölbt; die Spitze stark und gekrümmt, diese besitzen so viel Muth und Grausamkeit, daß die frühern Systematiker sie den Raubvögeln beygezählt haben. Sie verfolgen in der That die kleinen Vögel, und vertheidigen sich mit Erfolg gegen große, welche sie selbst angreifen, wenn sie sich ihrem Neste nähern wollen. Sie leben in Familien, ihr Flug ist ungleich und stoßweise, ihr Geschrei ist scharftönend, sie nisten auf Bäumen und bauen ein ziemlich künstliches Nest, legen fünf bis sechs Eier, und tragen große Sorgfalt für ihre Jungen. Sie leben von kleinen Vögeln und Insekten.

Der große, graue Würger. Lanius. Excubitor. Linn.

Naum. 4. Taf VI. Fig. 12.

Von der Größe einer Drossel, oben schön aschgrau, unten weiß; Flügel und ein Streif um die Augen schwarz,

Deckfedern der Flügel, ein Streif über den Schwungfedern und äußern Seite der Schwanzfedern weiß. Man findet diesen Vogel in ganz Europa, er wandert nicht im Winter.

Schwarzstirniger Würger. Lanius minor.

Naum. 4. Taf. VII. F. 13.

Etwas kleiner als der vorige, die Farbe gleicht dem vorigen, aber die Stirne ist schwarz, der Unterleib röthlich. Dieser Vogel findet sich hin und wieder in Deutschland, häufiger im wärmern Europa. Er besitzt die Kunst, den Gesang fast aller andern Vögeln nachzuahmen.

Südlicher Würger. Lanius meridionalis. Temm.

Kopf, Nacken, Mantel und Rücken tief aschgrau, eine breite, schwarze Binde läuft um die Augen, bis zu den Ohren: Die Gurgel ist weißlich weinroth, alle übrigen untern Theile sind weinrothgraulich überlaufen, an den Seiten ganz grau. Die Wurzel und die Spitze der Schwungfedern der zweyten Ordnung reinweiß, die vier mittlern Schwanzfedern ganz schwarz. Im südlichen Italien, Dalmatien, Spanien und Egypten.

Rothköpfiger Würger. Lanius collurio.

Lan. ruficeps, rufus, pomeranus, rufi collis Auctor. Naum. 4. Taf. VII. Fig. 14.

Noch kleiner als der vorige, Stirne weiß, Scheitel und ein Band über und hinter den Augen schwarz, Hinterkopf und Nacken lebhaft rostroth, Rücken schwarz, Unterleib und Bürzel weiß. Allenthalben im mittlern Europa

in Dorngebüschen, ahmt ebenfalls geschickt den Gesang anderer Vögel nach.

Dorndreher. Lanius Spinitorquus.

Naum. 4. Taf. VIII. F. 16. Lan. collurio. Gm.

Die kleinste europäische Art, Scheitel, Nacken und Bürzel grau. Rücken- und Deckfedern der Flügel rothgelb, der Unterleib weißlich, durch die Augen geht ein schwarzer Streif, die Flügelfedern schwarz, rostgelb gesäumt; die Schwanzwurzel weiß, das Uebrige schwarz. Auch dieser ahmt die Stimme anderer Vögel sehr geschickt nach. Das Weibchen ist auf dem Rücken ganz rostroth, die Federn dunkler kantirt. Er ist zu schwach, um Vögel zu fangen, und begnügt sich mit Insekten, deren er eine große Zahl vertilgt, und dieselben im Vorrath auf die Dornbüsche seines Aufenthalts aufspießt. Man findet ihn ebenfalls im mittlern Europa, die letzten Arten wandern aber im Herbst weg.

Es giebt viele ausländische Arten. Einige haben schwächere und kleinere Schnäbel, je nach den Arten, so daß der Uebergang von den Würgern zu den Merlen fast unmerklich wird *).

Bey

*) Vieillot hat die Linneische Gattung Lanius unter folgende Gattungen zertheilt. Tityra. Tyrannus. Lanius. Falcunculus. Sparactes. Tamnophilus. Cissopis. Dicrourus. Prianops. Laniarius und Artamus. Die größten ausländischen Arten sind: Der Capische Würger, Lan. collaris. Gm. enl. 477. Vaill. Afr. 61. 62. — Le boubou. Lan. Aethiopicus. Vaill. 68. — Le brubru. Lan. Brubru. Vaill. 71. Lan. Capensis

Bey andern Linneiſchen Würgern iſt die Schnabelfirſte gerade, der Schnabel lang, und nur an der Spitze gekrümmt. Alle dieſe Arten ſind ausländiſch, und ihre Form geht faſt unmerklich in die der Grasmücken und Sänger über.

Batara. Tamnophilus. Vieill.

Schnabel kurz, dick, etwas bäuchig, an der Wurzel breit, an den Seiten erweitert, gegen die Spitze zuſammengedrückt, die Spitze ſtumpf, ſehr gebogen und ausgeſchweift, über die untere Kinnlade übergebogen. Die Naſenlöcher zur Seite ſtehend, nahe an der Wurzel, offen, rundlich. Die Füße lang und dünne. Die Flügel ſehr kurz und abgerundet.

Sh. — Der Würger aus Madagascar. Lan. madagascariensis. enl. 299. — Der kleine, blaue Würger, Lan. bicolor. Gm. enl. 208. — Der Louiſianiſche Würger, Lan. Americanus enl. 397. — Le Sourciroux. Vail. 76. 2. Le Tanagra mordoré. Tanagra atricapilla Enl. 809. — La pie grièche à tête noire des iles de Sandwich. Lan. melanocephalus. Sh.

Unter die Arten, welche den Droſſeln ſich nähern, gehört Vaillants, Oliva. 75. 76. Lanius olivaceus, ferner Lanius gutturalis. Daud. in Ann. du Mus. III. 144. pl. 15. oder Vail. Pie grièche perrin. 236. — Der Ceyloniſche Würger, (Turdus Zeilonus) enl. 22/. — Der Bachakiri, Lan. Bachakiri Sh. Vail. 67. Turdus crassirostris. Gm., dieſes iſt eins mit Tanagra capensis Mus. carlsonianum pl. 45.

Geſtreifter Batara. Lan. doliatus.

Der Kopf ſchwarz, weiß gefleckt, der ganze Unterleib ſchwarzgrau, weiß in die Quere geſtreift, der ganze Oberleib rothbraun. Aus Braſilien und Cayenne.

Es gehören hieher: Lanius atricapillus — Naevius — Tanagra guianensis und viele neue Arten.

Braſilien hat mehrere Arten, welche den Fliegenfängern (Muscicapa) ſich nähern *).

Bey einigen dieſer Würger mit geradem Schnabel iſt derſelbe ſehr ſtark, und der Unterſchnabel ſtark aufgetrieben **).

Andere haben einen großen, ſehr zuſammengedrückten Schnabel, die Spitze iſt ſehr gebogen und diejenige der Unterkinnlade geht aufwärts. Dahin gehört Buffons Vanga. Lan. curvirostris und Vanga destructor Temm. beyde aus den Inſeln des indiſchen Meeres.

Bey noch andern iſt der Schnabel lang und dünne, ſie haben Federbüſche von zurückliegenden Federn ***).

---

*) Dahin gehört der roſtrothe Würger aus Madagascar, Lanius rufus. enl. 298. Ferner gehört noch Cuvier unter die Würger, die Droſſel von Mindanao (Turd mindanensis. Lath et Gmel. enl. 627. auch die gracula saularis oder Dialbird. Albin. III. 1718. Edw. 181. Vail. Afr. 109. (Sturnus solaris. Daud.) und ſelbſt der Turdus orientalis enl. 273. kann hieher gerechnet werden.

**) Alle Würger mit geradem und aufgetriebenem Schnabel ſind neu.

***) Dahin gehören, (Le Geoffroy. Vail. Afr. 80 u. 81. Lan. plumatus Sh.) — Buffons Manicup. enl. 707. (Pipra al-

An diese Vögel, welche man alle unter die Gattung Würger zählen kann, reihen sich einige ausländische Gattungen, welche mehr oder minder abweichen.

Die Würgerschwalben. Ocypterus. Cuv. Artamus. Vieillot.

Les Langrayens ou Piegrièches hirondelles.

Der Schnabel ist kegelförmig abgerundet, ohne Gräthe kaum merklich bogig gegen die Spitze; die Spitze sehr fein, auf jeder Seite etwas ausgeschweift; die Füße kurz, und die Flügel so lang oder länger als der Schwanz, daher der Flug schwalbenartig; aber dabey sind es kecke und muthige Vögel, welche selbst die Raben anzugreifen wagen.

Sie leben alle in andern Welttheilen, und die Arten sind an den Küsten und auf den Inseln der indischen Meere zahlreich, wo man sie beständig in schnellem Fluge nach Insekten haschen sieht.

Weißschnablige Würgerschwalbe. Ocypt leucorhynchus.

Lan. leucorhynchus. Gm. enl. 9. 1. Lan. dominicanus. Sonnerat.

Kopf, Hals, Oberrücken, Gurgel und Schwanz schwarz, Steiß und Unterleib weiß. Der Schnabel weißlich. In Ostindien *).

---

bifrons Gmel.) welcher mit den Manakinarten nichts gemein hat, als die Verbindung der beyden äußern Zehen, welche etwas stärker ist als gewöhnlich, man könnte ihn auch zu Myothera stellen.

*) Dahin gehört auch Lan. viridis. enl. 298. 1. aus Madagascar und mehrere neue Arten, welche Peron gebracht hat.

Haartrager. Criniger. Temm.

Schnabel kurz, ſtark, langkegelförmig, an der Spitze gebogen, an der Wurzel etwas breit, die Oberkinnlade an der Spitze etwas ausgeſchnitten; die Wurzel des Schnabels mit ſehr langen Haaren. Die Naſenlöcher eiförmig und offen. Die Füße kurz, der äußere mit dem mittlern am erſten Gelenk verbunden, der innere an ſeiner Wurzel. Die Flügel mittelmäßig.

Dieſe Gattung wird aus fünf neuen noch unbeſchriebenen Arten gebildet, alle aus dem weſtlichen Afrika. Mehrere haben am Nacken einen Haarbüſchel.

Die Caſſikans. Barita. Cuv. Cracticus. Vieill.

Der Schnabel groß, kegelförmig und gerade, an der Wurzel rund, umgiebt die Federn an der Stirne durch eine cirkulförmige Ausſchweifung; auf dem Rücken iſt er abgerundet, von den Seiten zuſammengedrückt, die Spitze gebogen und an den Seiten ausgeſchweift.

Zu dieſer Gattung gehören ziemlich große Vögel aus Neuholland und Neuguinea, welche man in verſchiedene Gattungen geworfen hat, man findet ſie unter den Paradiesvögeln, den Raben, Rackern und Atzeln.

Bunter Caſſikan. Bar. varia *).

Coracias varia. Gmel. enl. 628. Gracula varia. Sh.

Hauptfarbe ſchwarz; Unterleib, Unterrücken und Steiß weiß; Flügel weiß geſchäckt, die Schwanzfedern mit weißer Spitze. Schnabel ſtark und lang. Aus Neuguinea.

*) Zu dieſer Gattung gehören auch: Der Flötenvogel aus Neu-

Grüner Caßikan. Bar. viridis.

Paradisea chalybea. Lath. enl. 634.

Die ſchönſte Art, die dicken, ſammetartigen Kopffedern reichen weit über den Oberſchnabel vor. Hauptfarbe glänzend ſchwarz, auf dem Rücken, Steiß, Bauch und Schwanz ſtahlblau. Neuguinea.

Die Vögel dieſer Gattung ſind ſehr lebhaft, wild, haben eine rauhe Stimme, und verfolgen kleine Vögel.

Die Bekarden. Buffon. Psaris. Cuv. Tityra. Vieill.

Der Schnabel kegelförmig, ſehr groß, rund an ſeiner Wurzel; an der Stirne nicht ausgeſchweift; die Spitze leicht zuſammengedrückt und gebogen. Man kennt nur eine Art aus dem ſüdlichen Amerika.

Cayenniſche Bekarde. Ps. cayana.

Lanius cayanus Gm. enl. 304. et 317.

Kopf, Flügel und Schwanz ſchwarz, das Uebrige beliſchgrau. Er gleicht in ſeinem Betragen unſern Würgern.

---

holland, Coracias tibicen. Lath. 2. Supplen. Gracula tibicen Sh.). — Der Wecker, Corvus graculinus White. Coracias strepera Lath. Gracula strepera. Sh. von der Inſel Norfolk, und eine neue Art mit keilförmigem Schwanze. Temminck reihet dieſe Gattung unter ſeine Omnivores, welche den Raben meiſt entſprechen.

Graubvogel. Graucalus. Cuv.

Choucaris. Buff.

Der Schnabel weniger zusammengedrückt, als bey den Würgern; die obere Firste ist scharf, der ganzen Länge nach gleichmäßig gebogen; da bey einigen die Nasenlöcher mit Federn bedeckt sind, so wurden sie den Raben beygezählt, allein die Ausschweifung des Schnabels trennt sie davon (Temmink rechnet sie zu Ceblepyris).

Sie leben wie die Cassikans in Neu-Polinesien.

Der neu guineische Graubvogel. Grauc. Novae Guineae.

Corvus novae Guineae enl. 629.

Grau, Stirn, Flügel und Schwanz schwarz; Steiß, Bürzel und Unterleib weißgewellt.

Papuischer Graubvogel. Grauc. papuensis.

Corvus papuensis. Gmel. enl. 630.

Grau, Zügel und Schwungfedern schwarz, der Unterleib weißlich. Beyde leben in *) Neuguinea.

Die Würgelstern. Bethylus. Cuv.

Mit starkem, kurzem, gewölbtem Schnabel, gegen das Ende ist er etwas zusammengedrückt.

Man kennt nur eine Art, deren Form und Farbe fast unserer Elster gleicht.

---

*) Hieher gehört der Racker mit schwarzer Maske, Vail. ois. de Parad. 86. Ferner eine andere Art von glänzend violeter, ins stahlblaue schillernden Farbe, das Weibchen ist grünlich.

Digitized by Google

Die Würgelster. Beth. plicatus.

Lanius leverianus Sh. Lanius plicatus. Lath. Tanagra plicata. Illig. Vail. ois. d'Afr. 60. La Pie piegrièche.

Kopf, Hals, Bruſt, Flügel, Schwanz ſchwarz, ſtahlblau überlaufen. Deckfedern der Flügel, Hinterrücken und Bauch weiß, der Schwanz keilförmig, alle Federn mit weißer Spitze. Afrika.

Die Merlen. Tanagra. Cuv. Tangara *).

Mit ſtarkem, kegelförmigem Schnabel, der an ſeiner Wurzel dreieckig und auf der Firſte leicht gebogen, gegen die Spitze aber ausgeſchweift iſt. Die Flügel ſind kurz, und ſo mit auch der Flug nicht ſehr geſchickt; ſie gleichen unſern Finken in Hinſicht ihrer Gewohnheiten, ſie freſſen Körner, Beeren und Inſekten. Sehr viele prangen mit ausgezeichnet ſchönen Farben. Man kann ſie folgendermaßen eintheilen.

Gimpel-Merlen. Tangaras. Bouvreuils ou Euphones. Cuv.

Mit kurzem Schnabel, der, wenn man ihn von oben herunter betrachtet, an ſeiner Baſis auf jeder Seite breiter erſcheint; der Schwanz iſt verhältnißmäßig kurz.

Die ſchwarzblaue Merle. Tanagra violacea. enl. 114. 2.

Mit gelber Stirn, gelbem Unterleib, das Uebrige ſchwarz. In Braſilien.

---

*) Vieillot macht aus dem Geſchlecht Tanagra, die Gattungen Tanagra. Nemosia. Arremon. Pyranga. Tachyphonus.

Die cayennische Merle, T. cayennensis. enl. 114. 3. unterscheidet sich durch gelben Scheitel, schwarze Gurgel und Hals *).

Dickschnäblige Merlen. Tangaras grosbecs.

Der Schnabel dick, gewölbt, so breit als hoch, der Rücken der Oberkinnlade abgerundet.

Die große Merle. Tanag. magna. enl. 205 **).

Der obere Theil des Leibs olivenfarb, der Schwanz lang, der Unterleib grüngelb. Cayenne. Brasilien.

Wahre Merlen. Tangaras proprement dits.

Mit kegelförmigem Schnabel, der kürzer als der Kopf ist, und so breit als hoch, die obere Kinnlade gebogen, ein wenig spitzig.

Paradiesmerle. Tanag. Tatao. enl. 127.

Oberleib sammetschwarz; Kopf grün; Brust und Achseln blau, Hinterrücken und Steiß sehr schön orangegelb, feuerfarben. Brasilien. Cayenne.

Grünköpfige Merle. Tan. tricolor. 33.

Kopf, Unterhals und Brust meergrün; Oberhals goldgrün; Steiß orangegelb, Oberleib und ein Fleck auf der Kehle schwarz. Cayenne ***).

---

*) Dahin gehört auch Pipra musica enl. 809. 1.

**) Tanagra atra. enl. 714. 2. — Coracias cayennensis. enl. 616.

***) Tanag. mexicana enl. 290. 2. 155. 1. — Gyrola. enl. 153.

Digitized by Google

Pirol-Merlen. Tangaras. Loriots.

Der Schnabel kegelförmig, gebogen, spitzig, am Ende ausgeschweift.

Geschopfte Merle. Tanagra cristata.
enl. 7. 2 u. 201. 2.

Hauptfarbe schwarz, Federbusch pomeranzenfarb, Achseln weiß, Kehle, Steiß und Hinterrücken röthlichgelb. Aus Cayenne.

Schwarze Merle. Tanagra nigerrima.
enl. 179. 2. und 711.

Ganz schwarz mit weißen Achseln. Aus Brasilien.

Zu den Pirol-Merlen gehört auch Tanag. olivacea.

Cardinal-Merlen. Tangaras cardinals. Cuv.

Der Schnabel kegelförmig, etwas gewölbt, an der Seite ein vorspringender stumpfer Zahn.

Missisipi-Merle. Tanag. mississipensis.
enl. 742.

Ganz roth, die Farbe an Flügel und Schwanz etwas dunkler. Am Missisipi.

Dahin gehört auch Tanag. rubra. enl. 156. 1.

---

2. — Cayana. enl. 201. 2. 290. 1. — Episcopus. enl. 178. — Archiepiscopus. Desmar. — Varia. Desm. (velia) enl. 669. — Punctata et siaca. enl. 133. Den Uebergang zu den Sängern macht Tanag. gularis. enl. 155. 2. pileata. 720. 2. Tanag. nigricollis. 720. 1. ist ein wahrer Sänger.

Dickſchnäblige Merlen. Tangaras. Rhamphocèles.

Rhamphocelus. Desmarest.

Mit kegelförmigem Schnabel, die untere Kinnlade iſt hinten aufgeſchwollen.

Braſiliſche Merle. Tanag. brasilia. Linn. enl. 127. 1.

Lebhaft roth, Flügel und Schwanz ſchwarz. Das Weibchen rothbraun.

Dahin gehört Tang. jacapa. enl. 128 *).

– Fliegenfänger. Muscicapa.

Der Schnabel iſt von oben herab zuſammengedrückt, an der Würzel mit ſteifen Haaren, die Spitze mehr oder weniger gekrümmt und ausgeſchweift. Sie gleichen in ihren Sitten den Würgern, und leben, je nach ihrer Größe, von kleinen Vögeln und Inſekten. Die kleinen gehen unmerklich in die Sänger über. Auch dieſe Vögel ſind daher in mehrere Gattungen geworfen worden. Man kann ſie in folgende Gattungen theilen.

Tyrannen. Tyrannus.

Der Schnabel gerade, lang, ſtark; die Firſte gerade, ſtumpf; die Spitze plötzlich gebogen. Es ſind alles amerikaniſche Vögel, von der Geſtalt unſerer Würger, eben ſo

*) Tanagra atricapilla enl. 809 und guyannensis gehören unter die Würger. Faſt jede dieſer Abtheilungen bildet bey Vieillot eigene Gattungen.

lich, wie sie. Sie vertheidigen ihre Jungen sogar gegen die Adler, und wissen alle Raubvögel von ihrem Nest zu entfernen. Die größten Arten rauben kleine Vögel, und verachten selbst Aas nicht.

Der Bentavi. Tyrann. pitangua. enl. 212.

Lan. pitangua. Gmel. Tyrann du Bresil.

Der Schnabel breit und stark; der Scheitel pomeranzenfarb, über die Augen ein breiter, weißer Streif, Oberleib dunkelbraun mit hellern Federrändern; Unterleib hellgelb. In Brasilien.

Grauköpfiger Tyranne. Tyr. poliocephala. Temm.

Kopf, Hals und Gurgel dunkelaschgrau, Rücken und Flügel braunroth, Schwanz und Unterleib lebhaft rosiroth. In Brasilien.

Fliegenschnäpper. Muscipeta. (Moucherolles).

Mit langem, sehr zusammengedrücktem Schnabel, er ist doppelt so lang als hoch, selbst an der Wurzel; die Firste ist sehr stumpf, und doch auffallend; die Seiten sind eiförmig gewölbt; die Spitze schwach ausgeschweift; an der Schnabelwurzel stehen starke Barthaare. Ihre Körperschwäche erlaubt ihnen nur Insekten zu fressen. Sie sind alle außereuropäisch, mehrere haben sehr lange Schwänze oder schöne Federbüsche auf dem Kopf, oder ein lebhaft gefärbtes Gefieder. Die größte Zahl lebt in Afrika und Indien.

Schwefelgelber Fliegenſchnapper. Musc. sulfurata.

Lanius sulphuratus Gm. enl. 296 und 249. Corvus flavus. Gm.

Beynahe die größte Art, Scheitel und Backen ſchwarz, über die Augen ein weißer Streif. Oberleib und Schwanz röthlichbraun, Unterleib ſchwefelgelb. In Braſilien.

Dahin gehören ferner: Lanius Tyrannus Gm. enl. 537 und 676. Muscicapa audax. Gmel. enl. 453. 2. — Muscicapa ferox. Gm. enl. 571. 1. — Muscicap. Tyrannus. Gmel. enl. 571. 2. — Muscic. for ficata. enl. 677. Todus regius. enl. 289. Muscicap. paradisi et Todus paradisiacus Gm. enl. 234. — Muscicapa mutata. (petit maucherole de Paradis Buff. — Todus plumbeus — maculatus — Upupa paradisea — Muscicapa flabellifera. Muscicap. flavigaster. — Dann Büffons. Vardiole ou pie de paradis. Muscicap. burbonica enl. 573. 1. und Mus. cristata. id. 2. — Vaill. Tchitrec 142. Musc. caerulea. enl. 666. 1. — Todus leucocephalus. Pall. Sp. V. p. III. F. 2. — Musc. melanoptera. enl. 567. 3. — Muscic. barbata. enl. 830. — Musc. coronata. enl. 675. Musc. ruticilla. enl. 566. 2. — Motacilla cristata. enl. 391. 1. Le mantelé Vaill. 4. 151. 1. — Le molenar. id. 160. 1. 2. Le gobemouche à lunettes. id. 152. und noch eine Menge andere.

Einige den Fliegenfängern verwandte Arten, zeichnen ſich durch einen noch breitern und zuſammengedrücktern Schnabel als die vorigen haben, aus.

Breitſchnäbliger Fliegenſchnapper. Muscip. platyrhynchos.

Tod. platyrhynchos. Pall. Spic. VI. pl. III. Gmel.

Schnabel ſehr breit und ſchwärzlichblau; Oberleib ſchwarz, mit blauem Glanze; Schulterfedern zugeſpitzt, flatternd und weiß; Gurgel, Steiß, Bauch und After ſcharlachroth. Vaterland unbekannt *).

Andere dieſer Gattung haben denſelben breiten und zuſammengedrückten Schnabel, aber einen kurzen Schwanz und längere Füße. Man kennt zwey oder drey Arten aus Amerika, welche ſich von Ameiſen nähren; daher ſind ſie auch wohl mit jenen kleinen Familien von Droſſeln vereinigt worden, welche man den Namen Ameiſenfreſſer gab. Dahin gehören Turdus auritus Gm. enl. 822., ſie kommt auch unter dem Namen Pipra leucotis vor, und Pipra naevia. enl. 813. F. 2.

Eigentliche Fliegenfänger. Muscicapa. Cuv.

Die Barthaare am Schnabel ſind kürzer, der Schnabel nicht ſo breit, wie bey den Fliegenfängern, er iſt indeß auch niedergedrückt, mit deutlicher Firſte oben, geraden Seiten, und etwas gebogener Spitze.

---

*) Dahin gehören auch Muscicap. aurantia enl. 831. 1. Todus macrorhynchos Lath. Es ſind früher mehrere unter die Plattſchnäbel geſetzt worden, wie Pallas that, allein die Plattſchnäbel haben keinen ausgeſchweiften Schnabel und keine freye, äußere Zehe. Temminck nennt die Gattung Platyrhynchos und ſetzt dazu die Arten, Lanius Pitangua. — Lan. nasutus. Olivaceus et cancromus Temm.

Mehrere leben in Europa, es sind stille, dumme Vögel, welche keinen Gesang haben, und im Winter wegziehen.

Gefleckter Fliegenfänger. Muscic. grisola.

Naum. 1. 41. F. 92.

Oben grau, unten schmutzigweiß, mit graulichen Flecken auf der Brust. Man findet diesen Vogel im ganzen mittlern Europa in Gärten, wo er eine Menge Insekten vertilgt.

Schwarzrückiger Fliegenfänger. Musc. atricapilla.

Musc. atricapilla et muscipeta auct. Naum. 1. 41. F. 93. 94.

Kopf, Hals, Rücken, Flügel und Schwanz schwarz, Stirn, ganzer Untertheil, ein Streif über die Flügel, und Steiß weiß. Alles, was schwarz ist am Männchen, ist am Weibchen graulich. Nistet in Baumlöchern.

Halsband Fliegenfänger. Musc. collaris.

Gobe mouche de Lorraine. Albicollis Temm. Enl. 565. 2.

Schwarz, Stirne, Halsband und Unterleib reinweiß, auf dem Flügel ein weißer Spiegel, mittlere und große Deckfedern der Flügel ebenfalls weiß, so wie der Bürzel. Im mittlern Europa, aber viel seltener als der vorige.

Digitized by Google

Kleiner Fliegenfänger. Musc. parva.

Oben einfärbig rötlichgrau, der Schwanz schwärzlich, die Bruſt gelblich, der Steiß weiß. Mehr im wärmern Europa *).

Der Schnabel wird bey einigen Arten ſchlanker, und ſo gehen ſie in die Gattung der Sänger über.

Bey einigen iſt die Gräthe des Schnabels etwas deutlicher und biegt ſich gegen die Spitze bogenförmig, ſie nähern ſich dann den Steinſchmätzern **).

***) Einige Gattungen ſind ſehr nahe mit den Fliegen-

---

*) Dahin gehören ferner: Muscic. bicolor. Le gillit enl. 675. 1. — Le Pririt. Vail. 161. enl. 567. 1—2. Muso. senegalensis. — L'Azouroux. Vail. 158.

**) Dahin gehören der Oranor, Vaill. IV. 155. 1. und mehrere benachbarte Arten, welche in Hinſicht der Farben der Muscic. ruticilla gleichen, im Schnabel aber davon abweichen, wahrſcheinlich muß dazu gerechnet werden: Turd. speciosus. Lath. — Le gobe mauche étoilé Vail. IV. 157. 2. Muscic. multicolor Lath, ſie nähert ſich ſo ſehr einigen Sängern, wie dem Rothſchwänzchen, daß man nicht weiß, wohin ſie zählen.

***) Hieher gehört die Gattung Malurus Vieill. Mérion Temm. Schnabel ſtark, höher als breit, an der Spitze etwas gekrümmt, der ganzen Länge nach zuſammengedrückt; mit deutlicher bis in die Stirn vordringender Gräthe; die Schnabelwurzel mit kurzen Borſten, die Spitze ſchwach ausgeſchweift; Naſenlöcher ſeitlich, durch eine Haut halb geſchloſſen. Die Füße lang und dünne, der äußere bis zum erſten Gelenk verwachſen. Die Flügel kurz, abgerundet. Der Schwanz ſehr lang, kegelförmig abgeſtuzt, die Federn deſſelben bey einigen

schnäppern und Würgern verwandt, daß sie in eine Reihe nach ihnen geordnet werden müssen. Dahin gehören

Die Nacktköpfe. Gymnocephalus. (Tyranns chauves).

Sie haben einen Schnabel dem der Tyrannen ähnlich, die Gräthe ist aber etwas mehr gebogen, und ein großer Theil ihres Kopfes ist von Federn entblößt. Man kennt nur eine Art aus Cayenne.

Der kahle Nackkopf. Gymnoc. calvus.

Corvus calvus. enl. 521. L'oiseau mon pere, der Neger in Cayenne.

Von der Größe einer Krähe. Stirn und Scheitel nackt, oben rostbraun, unten fuchsröthlich.

Schopfvogel. Cephalopterus.

Die Schnabelwurzel ist mit langen, zurückgebogenen Federn geschmückt, welche einen sonderbaren Federbusch bilden, der anfangs gerade aufwärts steigt, dann aber oben fächerförmig sich ausbreitet und wie ein Sonnenschirm den Kopf beschattet. Man kennt nur eine Art.

Ge-

Arten zerschlissen. Arten sind: Sylvia africana (Merle fluteur Vaill. 112. F. 2. — S. macroura.) Capocier Vaill. 129 et 130. — S. longicauda. — Turdus brachypterus. — Muscicapa malachura. — Sylvia cyanea Temm. — Magnifica Temm. und einige neue.

Gezierter Schopfvogel. Cephalop. ornatus. Geoff.

Annal. du Mus. XIII. pl. XV.

Von der Größe eines Hehers, schwarz, an der Brust hängt ein Büschel langer Federn, wie ein Bart. In Brasilien *).

Schmuckvögel. Ampelis. Linnei. (Cotingas).

Der Schnabel wie bey den Fliegenfängern zusammengedrückt, aber verhältnißmäßig kürzer, breit und etwas gebogen. Diejenigen, mit etwas stärkerm Schnabel, leben fast durchaus von Insekten; man nennt sie Piohos (Querula. Vieill.), welches ihr Geschrei ausdrückt. Sie leben in Truppen in Gehölzen, und jagen gemeinschaftlich nach Insekten. Auch diese Vögel sind zum Theil unter andern Gattungen zerstreut.

---

*) Temminck macht eine neue Gattung Coracina. Schnabel stark, dick, hart, eckig, oben gewölbt, an der Wurzel etwas niedergedrückt, gerade, an der zusammengedrückten Spitze etwas gebogen, und sehr wenig ausgeschweift. Die untere Kinnlade unten platt, gerade. Die Schnabelwurzel mit Borstenhaaren. Die Nasenlöcher an der Wurzel, rundlich, vorn offen, hinten durch eine Haut geschlossen, welche bald mit kleinen Federn besetzt, bald nackt ist. Die Füße stark, die drei vordern Zehen fast gleich lang, die äußere bis ans erste Gelenk verbunden, die innere nur an der Wurzel. Die Flügel ziemlich lang. Dahin rechnet er Cephalopterus ornatus. — Corvus calvus. — Cotinga militaris. — Muscicapa rubricollis. — Le Cotinga cendrée Vaill. 44. — Gracula nuda et foetida.

Rothkehliger Pioho. Amp. rubricollis.

Muscicapa rubricollis. Gmel. enl. 381.

Schwarz mit purpurfarbner Kehle. In Südamerika.

Purpurfarber Pioho. Ampel. militaris.

Cotinga rouge Vaill. ois. d'Afriq et des Indes. pl. XXV. XXVI. Coracias militaris. Sh. Ampelis phoenicea. Sh.

Ganz purpurfarben *).

Eigentliche Schmuckvögel. Ampelis. Linn. (Cotingas).

Der Schnabel ist etwas schwächer; außer den Insekten, nähren sie sich noch von Beeren und von zarten Früchten. Sie leben in nassen Gegenden von Südamerika, und zeichnen sich durch den Glanz ihrer Farben aus, womit besonders das Gefieder des Männchens im hochzeitlichen Kleide prangt, den übrigen Theil des Jahres sind beyde Geschlechter graulich oder braun. Sie mausern also, gleich manchen Vögeln der kältern Zonen zweymal im Jahr.

Rother Schmuckvogel. Amp. Carnifex. Linn. **).

Enl. 378.

Scheitel, Steiß und Bauch scharlachroth, das Uebrige braunroth, die vierte Flügelfeder schmäler, kürzer, härter.

*) Der graue Cotinga, enl. 699. nähert sich den Pirohos mehr als den eigentlichen Seidenschwänzen.

**) Dahin gehören, Amp. cayana. enl. 624. — Amp. maynana

Eine Binde durch die Augen schwarz. In Cayenne, Guiana, Brasilien.

Pompadur Schmuckvogel. Am. pompadura. Linn.

Enl. 279.

Sehr hell purpurfarbig, fast rosenroth, die hintern, großen Deckfedern der Flügel steif, lang, sichelförmig gekrümmt, an der Spitze ohne Fahne, und liegen dachförmig in einer Reihe. In Cayenne und Guiana.

Rothbrüstiger Schmuckvogel. Amp. Cotinga. Linn.

Enl. 186 und 188.

Vom schönsten ultramarinblau, die Brust violet, oft mit einem blauen Halsbande, im violetten finden sich morgenrothe Flecken. Am Weibchen ungefleckt.

In Brasilien.

Man hat in neuern Zeiten von den Seidenschwänzen geschieden.

Die Raupenfresser. Ceblepyris. Cuv.

Der Hauptcharakter dieser Vögel besteht darin, daß die Schäfte der Bürzelfedern etwas verlängert, steif und

---

enl. 229. Amp. tersa et variegata. Linn. sind Varietäten von cayana. Ampelis cuprea et coccinea scheinen zu Carnifex zu gehören. Ferner Amp. lutea M. Carls. — Fusca. Vieill. — Hypopyra Vieill. — Aureola Vieill.

ſtachlig ſind. Sie leben in Afrika und Oſtindien von Raupen, welche ſie auf den höchſten Bäumen ſuchen. Ihr Gefieder hat nichts von dem Glanze, der jener der Schmuckvögel verſchönert. Der Schwanz iſt in der Mitte etwas gabelförmig, an den Seiten hingegen mit abnehmenden Federn.

Grauer Raupenfreſſer. Ceblep. cana.

Muscicapa cana. Gmel. enl. 541. Echenilleur cendré Vaill. ois. d'Afriq. 162.

Der Kopf ſchwärzlichaſchfarben; der obere Theil des Körpers dunkelaſchfarben, an Bruſt und Bauch heller; die Schwanzfedern ſchwarz, die äußerſten beyden an der Spitze aſchgraulich; Schwungfedern inwendig weiß.

In Madagascar *).

Ebenſo hat man von den Schmuckvögeln getrennt.

Die Seidenſchwänze. Bombycivora. Temmink. (Jaseurs).

Sie haben die merkwürdige Eigenheit, daß die Schäfte an den Schwungfedern der zweyten Ordnungen rothe, glatte, aus einer bröcklichten Materie beſtehende, breitere Anfänge haben, zuweilen auch an den Schwanzfedern.

---

*) Dahin gehört Vaillants echenilleur jaune pl. 163. und ſein echenilleur noir. pl. 164. — Corvus papuensis. Vaill. pl. 30. oder Corv. melanops. — Corv. novae Guineae. Dieſe letzten Arten rechnet Temmink hierher, Cuvier macht daraus ſeine Gattung graucalus, wo ſie ſchon angeführt wurden.

Europäiſcher Seidenſchwanz. Bombycivora garrula.

Ampelis garrulus. Jaseur de Bohème. Naum. I. 32. F. 66.

Etwas größer als ein Fink, auf dem Kopf ein Federbuſch, das Gefieder weich, röthlichgrau, Gurgel ſchwarz, Stirn roſtfarb, Mundwinkel weiß, Zügel und ein Strich durch die Augen ſchwarz; die Flügel- und Schwanzfedern ſchwarz, über die Flügel ein weißer Streif, beym Männchen jede Feder an der Spitze gelb, an der breitern Seite weiß gerandet, die hintern Schwungfedern ſchwärzlichgrau, an der ſchmalen Seite mit weißem Fleck, und ſechs bis ſieben rothen Anhängſeln; der Schwanz mit gelber Endbinde, oft mit kurzen, rothen Anhängſeln; der Steiß roſtfarb. Beym Weibchen alles weniger lebhaft, die Anhängſel kleiner. Im hohen Norden ſcheint die Heimath dieſes Vogels zu ſeyn, von da wandert er alle Jahre ins nördliche Deutſchland und Holland, ſelten bis nach den Alpen der Schweiz in ungeheurer Menge. Die ungewöhnliche Erſcheinung dieſes Vogels, hat zu aberglaubiſchen Meinungen, als verkünde er Unglück, Anlaß gegeben. Er iſt übrigens dumm, läßt ſich leicht fangen und zähmen, und lebt von Inſekten, Beeren und ſo weiter. Seine Brütplätze ſcheinen tief in Norden zu ſeyn.

In Nordamerika iſt eine ihm ſehr ähnliche Art.

Illiger und Hofmannsegg haben von den Schmuckvögeln annoch geſchieden *).

*) Temmink bringt hier noch eine neue Gattung hinein, welche

Die Schnapper. Procnias. Illig.

Der Schnabel ist schwächer und mehr zusammengedrückt, und bis unter die Augen gespalten. Sie leben in Amerika von Insekten.

Nackthälsiger Schnapper. Procnias nudicollis. Prin. Max.

Das Männchen milchweiß, von der Größe einer Amsel, die Kehle nackt und grün. Im Winterkleid ist der Kopf schwarz, Rücken und Oberleib hellolivengrün, Unterleib hellgrünlich mit schwärzlichen und weißlichen Längsflecken. In Brasilien. Hat eine sehr laute, hellklingende Stimme, welche man dem Schlag eines Hammers auf eine zersprungene Glocke vergleichen kann. Er heißt in Brasilien Arapanga.

Lappiger Schnapper. Procn. carunculata.

Ampelis carunculata. Gm. enl. 793.

Von der Farbe des vorigen, hat eine lange, weiche, hängende Drüse an der Schnabelwurzel.

Ebenfalls in Südamerika.

---

er Casmarhynchos nennt. Der Schnabel ist breit, sehr niedergedrückt, weich und biegsam an der Basis, zusammengedrückt und hornig an der Spitze, welche ausgeschweift ist. Nasenlöchergrube sehr breit, und die Nasenlöcher weit gegen die Spitze liegend. Auch die Unterkinnlade ist biegsam, die Läufe sind länger als die Mittelzehe, die Zehen an der Wurzel verwachsen. Dahin rechnet er Ampelis variegata — Carunculata. — Nudicollis. Pr. Max Arapanga in Brasilien und melanocephalus P. Max. Der Gattung Procnias blieben. Proc. ventralis — cyanatropus Pr. Max und eine neue Art. Carnobarba. Cuv. A. d. U.

Digitized by Google

Zwischen die Schnapper und Nachthälse ordnet Herr Humboldt einen höchst merkwürdigen Vogel, welchen er in Südamerika entdeckte, der mit der nächtlichen Lebensart der Nachtschwalben, die Sitten der Doblendrosseln verbindet, durch seinen Schnabelbau aber den Schnappern sich annähert.

Fettvogel. Steatornis. Humb.

Humb. Observ. de Zoologie. 10. Livr. pl. XLIV.

Schnabel an den Seiten zusammengedrückt, an der Spitze gekrümmt, die obere Kinnlade doppelt gezähnelt, der vordere Zahn schärfer. Die Mundöffnung bis hinter die Augen gespalten. Die Füße kurz, die Klauen glatt.

Caripischer Fettvogel. Steatorn. Caripensis. Humb.

Grauröthlich, mit weißen rautenförmigen Flecken. Der Schnabel ziemlich dick, schwarzröthlich, erhaben, an der Spitze gebogen. Die untere Kinnlade ungezahnt, flach, kürzer als die obere. Die Nasenlöcher groß, nicht röhrenförmig, keine Wachshaut. Am obern Rande der Schnabelwurzel starke, schwarze, steife Bartborsten; unten vor der Spitze der Unterkinnlade stehen einige kürzere. Die Mundöffnung sehr weit, die Haut, welche die Schenkel der untern Kinnlade deckt, nackt, dreieckig und weiß. Die Augen sehr groß, rund, zur Seite stehend, blau. Die Ohren groß, mit Federn bedeckt. Die Zunge dünn, spitzig, ohne Einschnitte, gegen die Spitze sich in eine Haut endigend.

Der Rücken ist graubräunlich, mit schwarzen Flecken und Punkten, ohne weiße Flecken. Kopf, Brust, Unter-

leib rostroth, mit weißen Flecken; an den Achseln und in den Weichen sind diese Flecken häufiger und breiter. Der Schwanz keilförmig, doppelt so lang als die Füße. Die Füße kurz, dünn, die Schenkel fast nackt, fleischig. Die Nägel schwarz, etwas gebogen.

Der Fettvogel findet sich in Höhlen im südamerikanischen Thale Caripe, hat die Größe unserer Haushühner, und lebt blos von Früchten und harten Kernen. Er scheut das Tageslicht, ist sehr gesellschaftlich, hat eine scharfe, rauhe Stimme, nistet in jenen Höhlen zu tausenden in Felslöchern, und wird so fett, daß man ein treffliches Oel von ihm zieht, besonders von den Jungen. Er heißt in seinem Vaterland Guacharo.

Unmittelbar nach diesen Gattungen kommen

Die Nackthälse. Gymnoderus. Geoff.

Der Schnabel ist etwas stärker, aber der Hals ist zum Theil nackt, der Kopf hingegen mit sammetartigen Federn bedeckt. Die einzig bekannte Art ist

Der stinkende Nackthals. Gymnod. foetidus.

Gracula foetida et nuda.

Schwarz, die Seiten des Kopfes und Halses fast kahl, einige Deckfedern der Flügel- und Schwungfedern von außen grau; die hintere Zehe sehr einwärts gestellt, Größe der Dohle. Aus Südamerika *).

*) Vaillant beschreibt noch eine Art: Ois. d'Ameriq. et des Indes pl. XLV et XLVI., welche vielleicht verschieden ist.

Die Drangos. Edolius. Cuv. Dicrurus. Vieillot.

Auch dieſe Vögeln nähern ſich nach der großen Zunft der Fliegenfänger; der Schnabel iſt auch platt und am Ende ausgeſchweift. Die Schnabelfirſte ſtark, allein beyde Kinnladen ſind ihrer ganzen Länge nach leicht gebogen; die Naſenlöcher ſind mit Federn bedeckt, und ſie haben unter anderm lange Haare, welche eine Art von Schnurbärten bilden.

Die Arten ſind ziemlich zahlreich an den Küſten der oſtindiſchen Meere. Die meiſten ſind ſchwarz mit mehr oder minder gegabelten Schwanze, ſie leben von Inſekten; einige ſollen ſo ſchön, wie die Nachtigallen ſingen. Faſt alle ſind unter die Würger gezählt worden.

Gabelſchwänziger Drongo. Edolius. forficatus.

Lanius forficatus. enl. 189. Vaill. Afr. IV. 166.

Der Schwanz gabelförmig; auf der Stirn ein erhabener Federbuſch. Hauptfarbe ſchwarzgrün. In Afrika *).

Zahnſchnabel. Sparactes. Illig. (Becdefer).

Der Schnabel mittelmäßig, dick, breit, krummfirſtig, die Kuppe etwas gekrümmt, die Kieferſcheiden zu beyden

*) Dahin gehören: Lanius malabaricus Vaill. IV. 175. Sonnerat voy. aux Indes pl. XCVII. Briſſon nennt ihn Cuculus paradiseus. — Lanius coerulescens. Gm. Vail. IV. 172. Corvus balicassius. Gm. enl. 603. Le Drongolon Vail. IV. 171. — Le Drongo bronzé. id. 176. Außer den übrigen Drongos von Vaillant noch andere neue Arten.

Seiten zahnförmig ausgeschnitten, die Kinnladenschneiden ohne Einschnitte.

Schöner Zahnschnabel. Spar. superbus.

Auf der Stirne ein aufstehender, vorwärtsgekehrter, langer Federbusch. Der Körper ist schwarz, Gurgel lebhaft roth, Mittelbauchgegend gelb, roth gestreift. In Afrika.

In diese oder die vorige Gattung, scheint auch Corvus hotten tottus enl. 226. zu gehören.

Drosseln. Turdus. Linn. (Merles).

Der Schnabel zusammengedrückt und etwas gebogen; die Spitze macht keinen Hacken, und die Ausschweifungen desselben sind nicht so stark, als bey den Würgern; dennoch aber nähern sich einige von ihnen den Würgern. Die Drosseln sind aber mehr beerenfressend, doch lieben sie auch sehr die Insekten. Die meisten Drosseln der nördlichen Zonen sind Zugvögel, sie leben außer der Zugzeit einsam oder paarweise.

Amseln nennt man diejenigen Drosseln, deren Farben nicht mannigfaltig sind. Dahin gehört

Die schwarze Amsel. Schwarzdrossel. Turd. Merula.

Naum. I. 31. F. 63. 64.

Das alte Männchen ist ganz schwarz mit gelbem Schnabel; das Weibchen oben braungrau, unten röthlichbraun, mit einigen dunklern Flecken auf der Brust. Ein

Digitized by Google

ſcheuer und ſchlauer Vogel, welcher ſich jedoch leicht zähmen läßt, dann auch künſtlich ſingen und ſelbſt ſprechen lernt. Aus einigen Gegenden ziehen nur die Weibchen weg. Allenthalben in Europas Wäldern.

Halsband- oder Ringamſel. Turd. torquatus. Linn.

Naum. I. 32. F. 65.

Die ſchwärzlichen Federn ſind grauweißlich gekantet, an der Bruſt ein weißes Band. In Gebirgsgegenden. Zieht im Herbſt weg.

Amſel mit weißem Schwanze. Turd. leucurus. Lath.

Kleiner als die gemeine Amſel, Bürzel und Schwanz weiß, letzterer mit ſchwarzer Endbinde. Im ſüdlichen Europa. Temmink nennt ſie Saxicola cachinnans *).

Felſenamſel. Turd. saxatilis. Linn.

Enl. 562. Naum. Nachtr. Taf. 53. Fig. 99. 100.

Kopf und Hals am Männchen blau, Oberrücken dunkelbraun, Mittelrücken weiß, Unterleib roſtroth, Schwanz

*) Gehört zur Gattung Steinſchmätzer Saxicola, denen ſich auch die Stein- und Blauamſel nähern, die Blauamſel beſonders hat vorn eine ſtark gekrümmte Schnabelſpitze, wie die Tyrannen. Ihr nähert ſich die Felſenamſel, Le rocar. Vail. Afr. 101. und l'espionneur id. 103. Ferner Turdus manillensis enl. 636., wahrſcheinlich eins mit Turd. vio laceus. Sonnerat. — Turdus Eremita enl. 339.

gelbroth. Im südlichen Deutschland und Italien, geht selten ins nördliche Deutschland.

Blaudrossel. Turd. cyanus. Linn.

Enl. 250. Turdus solitarius. Passere solitario.

Das Männchen ganz blaugraulich. Das Weibchen braun. In Italien und dem wärmern Europa.

Eigentliche Drosseln sind solche, mit gesflecktem Unterleib. Auf dem Rücken sind alle braungraulich, auf der Brust braun gefleckt. Es sind schöne Sänger, leben von Beeren und Insekten, ziehen in großen Schaaren, das Fleisch ist angenehm.

Misteldrossel. Turd. viscivorus. Linn.

Naum. I. 30. F. 62.

Die größte Drossel, der Unterleib weißgelb, mit runden, braunen Flecken, unter den Flügeln weiß. Liebt sehr die Mistelbeeren, und pflanzt die Pflanze durch ihren Koth fort, indem die Saamen unverdaut abgehen.

Wachholderdrossel. Turd. pilaris. Linn.

Naum. I. 29. F. 59.

Kopf und Hals grau, die Flecken am Bauche sind Längsflecken. In Norden von Europa. Kommt im Winter nach Deutschland und Italien.

Digitized by Google

Schwarzkehlige Droſſel. Turd. atrogularis. Temm.

Geſicht, Backen, Vorderhals und Oberbruſt ſchwarz, an letzterm Ort in grau ſich endigend; unterer Theil der Bruſt und Mittelbauch weißlich, an den Seiten roſtfarbig, mit braunen Flecken; der ganze Oberkörper graulich olivenfarben, der Schwanz ebenſo. Selten in Oeſtreich und Schleſien, häufiger in Ungarn und Rußland. Von Natterer entdeckt.

Naumanniſche Droſſel. Turd. Naumanni. Temm.

Scheitel und Ohrgegend dunkelbraun, alle andere, obere Theile grauroſtroth, an den Seiten des Halſes, am Bürzel, und den Seitenfedern des Schwanzes lebhaft roſtroth, an den Seiten und am Bauche ſind auf jeder Feder Flecken von eben dieſer Farbe, auf weißem Grunde; die Mitte des Bauches und Schenkel reinweiß; Schwungfedern und mittlere Schwanzfedern dunkelbraun, der Schwanz unten ganz roſtroth. Dieſe von Naumann zuerſt beſchriebene Droſſel iſt in Schleſien, Oeſtreich und Ungarn zu Hauſe, auch in Dalmatien und Italien. Naum. Nachtr. Taf. 4. F. 8.

Singdroſſel. Turd. musicus. Linn.

Naum. I. 30. F. 61.

Die Farbe wie bey der Miſteldroſſel, aber viel kleiner, unter den Flügeln gelb. Singt ſehr angenehm, und wohnt im mittlern Europa allenthalben, zieht aber im Winter weg.

Rothdroſſel. Turd. iliacus. Linn.

Naum. I. 29. F. 60.

Seiten und Federn unter den Flügeln roſtfarb, am Bauche verwaſchene Längsflecken. Niſtet im Norden, zieht im Herbſt im mittlern Europa nur durch *).

Die ausländiſchen zu dieſer Gattung gehörigen Vögel ſind ſehr zahlreich. Dahin gehören

Die Spottdroſſel. Turd. polyglottus. Linn. Catesb. 27.

Oben grau, unten bläſſer, mit einem weißen Band über die Flügel. Dieſer Vogel iſt höchſt merkwürdig, durch die bewundernswürdige Leichtigkeit, mit welcher er die Waldgeſänge anderer Vögel, und ſelbſt die Stimmen anderer Thiere täuſchend nachahmen kann **).

Einige unter die Droſſeln gerechnete Vögel, reihen ſich durch ihre Sitten an die Würger, der Schnabelbau aber nähert ſie doch den Droſſeln, ſie ſind zum Theil ſchon unter den Würgern angeführt worden und gehören unter diejenigen Arten, welche keinen beſtimmten Charakter haben und daher eben ſo gut den Droſſeln als den Würgern beygezählt werden können. Es gehören dahin außer Turd.

*) Dahin gehören zahlreiche Ausländer: T. rufus, enl. 645. — migratorius. enl. 556. Guyanensis. enl. 398. — Minos Edw. 296. — olivaceus. Vaill. Afr. 98.

**) Der kleine Spötter: T. orpheus Edw. 78. — Der Spötter von St. Domingo: T. Dominicus. enl. 558. ſind ihr nahe verwandt.

Zeilonus, des Syſtemes: Turd. cafer. enl. 563. Vail. 107., welcher ſehr wenig verſchieden iſt von Lanius jocosus enl. 508. Ferner, Turd. capensis enl. 317. Vail. 105 und Turd. perspicillatus. enl. 604. Mit Turd. Zeilonus ſind ſehr nahe verwandt, Vaillants hausse col noir. 110. und la cravate noire. id. 115.

Die Droſſeln mit dünnerm Schnabel grenzen eben ſo an die Steinſchmätzer, und ſind kaum von ihnen zu unterſcheiden, es iſt ſchon bey der Amſel mit weißem Schwanze bemerkt worden, daß ſie den Steinſchmätzern gleiche, dies iſt auch mit einigen vaillantiſchen Vögeln der Fall. Sein Janfredic. III. — Grivetin. 118. — Coud'or. 119. — gehören dahin, ferner Turd. trichas. enl. 709. 2. Dagegen Turd. orientalis. enl. 273. 2. ähnelt wieder den Würgern. Die kleinſten Droſſeln aber gehen faſt unmerklich in die Sänger über, und ſind bald unter dieſe, bald unter die Droſſeln gezählt worden, darunter gehören: Die Rohrdroſſel Turd. arundinaceus. Ferner Vaillants Citrin. Motacilla subflava enl. 584. 2. Vail. Afr. 127. Motac. macroura enl. 752. 2. *).

*) Man kann von den Droſſeln nicht wohl durch auszeichnende Charaktere trennen, einige afrikaniſche Droſſelarten, welche, wie unſere Staare, in großen lärmenden Schaaren umherziehen, Inſekten verfolgen oder in den Gärten ſchaden; Daubin hat ſie unter die Staare gerechnet, Temmink macht ein eigenes Geſchlecht Pastor daraus, und rechnet dazu Gracula calva - tristis - cristatella. Sturnus gallinaceus — Turd. pagodarum. Dann ſchiebt er noch eine Gattung hier herein, welche er Stourne. Lampratornis nennt, und darunter zählt

Rosenfarbige Drossel. Turd. roseus. Linn. Pastor. Temm.

Naum. Nachtr. 27. F. 55. Pastor roseus. Temm.

Schwarzglänzend, Rücken, Steiß und Schultern blaßrosenfarb, auf dem Kopf ein Federbusch am Männchen. Häufig in den warmen Gegenden Afrikas und Asiens, wo er besonders von Heuschrecken lebt. Auch im wärmern Europa findet sie sich nicht selten, seltener in Deutschland.

Einige staararttige Drosseln zeichnen sich durch den schönen Metallglanz aus, welche ihr Gefieder ziert.

Die glänzende Drossel. Turd. nitens. Linn. *).

Enl. 561. (Couigniop Vail. 90.) Pastor nitens. Temm.

Oben glänzend goldgrün, auf den Flügeln einige schwarze Flecken, der Unterleib stahlblau. In Afrika.

Die

Paradisea Gularis — Turd. aeneus — Auratus — Nitens — Columbinus — Leucagaster — Tanagra atrata und viele neue.

*) Dahin gehören ferner Turd. auratus. enl. 540. — Nabirop Vail. 89. — Turd. morio enl. 199. (Corvus rufipennis Sh.) wahrscheinlich auch Corvus splendidus. Sh. Choucador Vail. 36.

Digitized by Google

Die Goldgrüne Droſſel. Turd. aeneus. Linn. Enl. 220. Vert d'oré Vail. 87. Pastor aeneus. Temm.

Goldgrün, mit ſehr langem, keilförmigem Schwanze. Dieſer nähert ſich ſehr die Droſſel von Neuguinea, der Schwanz iſt dreimal ſo lang als der Körper, mit doppeltem Federbuſch auf dem Kopfe, aus welchem man einen Paradiesvogel gemacht hat. Paradisea gularis Lath. et Shaw. Parad. nigra. Gm. Vail. ois. de Paradis. 20. 21. Vieillot. ois. de Parad. pl. VIII. nur das ausnehmend prachtvolle Gefieder, und die Sonderbarkeit des Federbuſches, nähert dieſen Vogel den Paradiesvögeln, ſonſt iſt er ganz Droſſel.

Dohlendroſſeln. Pyrrhocorax. Cuv.

Der Schnabel etwas zuſammengedrückt, gebogen und ausgeſchweift, wie bey den Droſſeln; aber die Naſenlöcher ſind mit Federn bedeckt, wie bey den Raben, mit denen man ſie bis anhin vereinigt hat.

Schneedohlendroſſel. Pyrrhocorax alpinus *).

Corvus Pyrrhocorax enl. 531.

Ganz ſchwarz, der Schnabel ſchwefelgelb, die Füße bey Jungen braun, bey Alten zinoberroth. Es ſind ſehr geſellige Vögel, welche auf den höchſten Alpen leben, ſich von Inſekten, Aas und Beeren nähren. Im Winter kom-

*) Alle Eigenſchaften dieſes Vogels gleichen ſo ſehr der Dohle, daß man ſie wohl beym Geſchlecht Corvus laſſen könnte. Temminck bringt auch die Steindohle hieher und nennt ſie Pyrrhocorax Graculus.

men sie in die tiefern Thäler herunter, um da besonders Beeren zu suchen, so bald aber der Schnee wieder schmilzt, ziehen sie wieder in die Gebirge. Sie nisten in den höchsten und unzugänglichsten Felsen in Höhlen.

Der Sicrin. Pyrrhoc. setifer.

Vaill. Ois. d'Afriq. pl. 82.

Zeichnet sich durch drey Federschäfte ohne Bart aus, welche an jeder Seite unter den Federn stehen, welche das Ohr bedecken, und so lang sind, als der Körper.

Die Pirole, welche von den frühern Naturforschern zu der Abtheilung der Rabenarten gezählt worden, unterscheiden sich von den Drosseln durch so wenig charakteristische Kennzeichen, daß man sie den Drosseln füglich anschließen kann, doch nur

Die wahren Pirole. Oriolus. Linn.

Der Schnabel gleicht dem Schnabel der Drosseln, nur ist er etwas stärker, und die Füße sind verhältnißmäßig etwas kürzer. Linneus und seine Nachfolger haben sie mit den Cazikes vereinigt, mit denen sie nichts gemein haben, als die Farbenmischung. Alle Pirole sind gelb und schwarz, wenigstens die Männchen.

Europäischer Pirol. Oriolus galbula *).

Naumann I. 40. F. 89. 90.

Etwas größer als eine Amsel. Das Männchen ist glänzend hochgelb. Flügel, ein Streif durch die Augen

*) Die übrigen, wahren Pirole sind: Der chinesische Pirol, Or. chinensis. enl. 570. — Der Javanische, Oriol. javanus. —

und Schwanz schwarz, letzterer mit gelber Endbinde. Das Weibchen ist statt gelb zeisiggrün, der Bauch weißlich, mit bräunlichen Flecken. Der Pirol findet sich in ganz Europa, die kältesten Gegenden ausgenommen, ist aber allenthalben ein Zugvogel, welcher spät im Frühjahr ankommt, und frühe im Herbst in Gesellschaft von zwey oder drey wieder wegzieht. Er macht ein sehr künstliches, hängendes Nest, lebt von Insekten und Beeren, vorzüglich Kirschen, und hat einen nicht unangenehmen doch wenig abändernden Gesang.

Ameisenfresser. Myothera. Illig. Fourmiliers. Cuv.

Diese Vögel sind theils unter die Drosseln, theils unter die Würger und selbst unter die Raben gezählt worden. Sie haben hohe Beine, und einen sehr kurzen Schwanz. Der Schnabel ist mittelmäßig, mehr oder weniger messerförmig, an der Wurzel höher; die Schnabelschneide ist vor der Spitze ausgeschweift. Bey einigen stehen an der Schnabelwurzel auseinanderlaufende Barthaare, öfters aber keine.

Man findet die zu dieser Gattung gehörigen Vögel in beyden Continenten, diejenigen aus der alten Welt zeichnen sich durch glänzende und bunte Farben aus.

Der schwarzköpfige, O. melanocephalus. enl. 79. L'oriot rieur Vaill. 263. — Der goldene, O. aureus. Vail. 260. — Der Cudugnan, Vail. 261.

Kurzgeschwänzter Ameisenfresser. Myot. brachyura.

Corvus brachyurus. Enl. 257. 258.

Hauptfarbe grün; auf den Flügeln ein weißer Fleck; der Unterleib rothgelblich; Kopf und Kehle schwarz; über den Augen ein rothgelber Streifen. Auf den Molucken und Inseln des stillen Meeres.

Blaukehliger Ameisenfresser. Myoth. cyanura.

Turdus cyanurus. enl. 355.

Oberleib rothbraun, Unterleib gelb; Schwanz keilförmig, blau; über die Brust ein breites, blaues Band, über die Augen eine pomeranzenfarbe Binde; Scheitel und ein Streif durch die Augen schwarz. In Ostindien (nicht in Cayenne).

Die Arten des neuen Continents sind viel zahlreicher, die Farben sind weniger vorstehend, meist ins braune ziehend, sie haben verschiedene Stärke des Schnabels, und einen oft etwas längern Schwanz. Sie leben von Ameisen aus den ungeheuren Haufen, welche sich in den Wäldern und wüsten Gegenden Amerikas finden; die Weibchen sind größer als die Männchen. Sie fliegen wenig, haben eine angenehme Stimme, welche bey einigen Arten wirklich zum schönen Gesang wird.

Unter denjenigen, mit starkem und gebogenem Schnabel ist zu bemerken *).

---

*) Diese beyden Arten gehören zu der Gattung Pitta, vom Vieillot.

Königs-Ameisenfresser. Myother. Rex.

Turd. rex. Gmel. Corv. Grallarius Shaw. Enl. 702.

Die größte Art, von der Größe der Misteldrossel, mit sehr langen Beinen, und einem sehr kurzen Schwanze, man würde diesen Vogel beym ersten Blick wohl gar für einen Sumpfvogel halten; die Größe und Gestalt des Körpers gleicht einer Wachtel, der Oberleib ist rothbraun, der Unterleib röthlichgelb, der Hinterkopf bleifarben, an der Unterkinnlade ein weißer Streifen und ein gleichfarbiger Fleck auf der Brust. Sie lebt in Guyana und Brasilien. Dahin gehört auch Turd. tinniens Gmel. aus Cayenne. enl. 706. 1. Le grand beffroi.

Die Arten mit geradem Schnabel, der aber annoch stark ist, nähern sich den Würgern, wie

Die Colma. Myoth. Colma.

Turd. Colma. enl. 821.

Oben rothbraun, unten weiß, im Genick ein fuchsrother Halbmond; Gurgel weiß, schwarz gefleckt; hinter den Nasenlöchern ein weißer Fleck. Kehle weiß. Aus Cayenne *).

Noch andere Arten haben einen dünnen und spitzigen Schnabel, dieser sowohl als ihr gestreifter Schwanz, nähert sie unserm Zaunkönig.

---

*) Auch Turd. formicivorus enl. 700 (le palioour.) — Turd. lineatus. enl. 823. 1. (le petit beffroi). — T. auritus — T. Telma. — Pipra naevia. — Sitta naevia.

Schwarzflüglichter Ameisenfresser. Myoth. Bambla.

Turdus Bambla. Gmel. enl. 703.

Der Oberleib gelb, rothbraun gesprenkelt; der Unterleib hellaschfarben dunkelbraun gesprenkelt; Flügel schwarz mit weißem Querbande; Schwanz kurz und schwärzlich. In Cayenne *).

Wasserschwätzer. Cinclus.

Der Schnabel etwas zusammengedrückt, gerade, die Kinnladen gleich hoch, fast linienartig sich gegen die Spitze verfeinernd, und die obere Kinnlade kaum merklich gebogen.

Weißbauchiger Wasserschwätzer. Cincl. aquaticus.

Sturn. Cinclus Linn. Naum. III. 72. F. 114.

Die Füße sind ziemlich lang, der Schwanz sehr kurz, wie bey den Ameisenfressern, etwas abgerundet, die Flügel kurz. Kopf und Hals rothbraun, der übrige Oberleib

*) Die flötende Drossel, Turd. cantans aus Cayenne gehört hieher; dagegen müssen Tur. tintinnabulatus. enl. 700. 2. und cinnamomeus enl. 560. 2. und die Drossel, welche eine Varietät des T. formicivorus seyn soll, enl. 644. 1. unter den Drosseln gelassen werden, auch die Drosseln, welche sich der Gattung Tanypus. Oppel. in den Memoiren der Bayerschen Akademie für 1811 und 12. pl. VIII. nähern, unterscheiden sich nur durch etwas höhere Beine.

Digitized by Google

schiefergrau. Hals und Brust weiß, Unterleib rothbraun, Steiß grau. Dieser Vogel lebt an klaren Bächen und Flüssen des mittlern Europa, und geht nach den Wasserinsekten von denen er sich nährt, ganz auf den Grund der reißenden Ströme oder Bäche, wo er umherspaziert. Man findet ihn nur Paarweise, er singt mitten im Winter *).

Afrika, Ostindien und Neuholland ernähren eine Gattung von Vögeln, welche den Drosseln in der Lebensart nahe kommen, sie wurden bald unter die Bienenfresser, bald unter die Nashornvögel, bald unter die Raben, Atzeln, Staare und Baumlaufer in ihren einzelnen Arten gezählt. Die meisten Arten zeichnen sich durch gewisse Sonderbarkeiten in einzelnen Theilen größtentheils aus. Einige haben Schnabelhöcker, andere am Schnabel fleischige Lappen oder nackte Häute, an Backen oder Kehle, oder sonderbar gebildete Federn. Cuvier nennt sie

Faltenvögel. Philedon. Cuv. Meliphaga. Temm.

Der Schnabel stark, die Oberkinnlade zusammengedrückt, gleichmäßig gebogen, ohne übergebogene Spitze, mit deutlicher Schnabelfirste. Die Nasenlöcher groß, durch eine knorplige Schuppe bedeckt. Die Zunge endigt in einen Haarpinsel. Die Zehen getrennt.

---

*) Brehm will noch eine zweyte Art mit schwarzem Bauche in Deutschland entdeckt haben? Er nennt sie melanogaster. Dahin gehört auch Cinclus Pallasii.

Blaudhriger Faltenvogel. Phil. cyanotis.

Gracula cyanotis.

Kopf schwarz, am Nacken zu beyden Seiten ein weißer Fleck, Oberhals und Backen, Kehle und Hals schwarz. Oberleib olivengrün, der Schwanz etwas keilförmig. Ein Streif vom Unterschnabel nach den Schultern, Brust und Unterleib weiß. Ob den Augen bis gegen die Ohren eine faltige, nackte, blaue Haut. In Neuholland. Leben wahrscheinlich von Insekten und Beeren. Größe der Misteldrossel.

Höckeriger Faltenvogel. Phil. corniculatus.

Merops corniculatus. Vaill. ois. d'Amerique et des Indes. pl. 24.

Am Schnabelgrunde ein kurzer, vorwärtsgerichteter Höcker. Der Kopf nackt und blau, mit wenig steifen, kurzen, schwarzen Borstenhaaren sparsam besetzt. Der ganze Oberkörper schwarzbraun, der untere weiß, mit bräunlichen Federschäften. Vaterland Neuholland, Vaillant nennt ihn Corbi calao.

Zu diesen beyden neuholländischen Vögeln gehört wahrscheinlich Merops monachus Lath. Die Höcker sind größer und stehen hinten gegen die Stirne gekehrt. Dazu gehören ferner Merops carunculatus, (auch Corvus paradoxus). Pie à pendeloques. Daudin. ornith. II. pl. 16. Der Schnabel ist ausgeschweift, die Zunge endigt in einen Pinsel, die Nasenlöcher sind ohne Federn, er lebt in den Philippinen. Gracula carunculata Daud. et Shaw. (Stur-

Digitized by Google

nus carunculatus. Lath. et Gmel. Syn. III. pl. 36., ferner wahrſcheinlich auch Certhia carunculata. Lath. et Gm. Vieill. ois. dor. 11. pl. 69. Dieſer Vogel ſoll ſehr ſchön ſingen, er lebt auf den Freundſchaftsinſeln, Gracula calva enl. 200. — Merops phrygius Shaw. gen. Zool. 8. 20. Certhia goruc Sh. Vieill. ois. dor. 11. pl. 78. — Certhia lunata. ib. pl. 61. — Certhia graculina ib. pl. 87. — Merops moluccensis. Gm. (Polochion Buff.) *).

Bey einigen ſind ſtatt nackter Theile, die Federn auf eine ſonderbare Art geordnet, wie beym

Gekräuſelten Faltenvogel. Phil. circinnatus.

Merops. novae. Seelandiae. Gmel. oder Merops circinnatus Lath.

Er iſt grünlich ſchwarzglänzend an beyden Seiten des Halſes ein Büſchel gekräuſelter, weißer Federn; auf den Flügeln eine weiße Binde. In Neuſeeland.

Die Arten, welche zu dieſer Gattung zu rechnen ſind und nichts von den angeführten Sonderbarkeiten haben, ſind Certhia xantotus. Vieil. ois. dor. 11. pl. 84. — C. Novae Hollandiae ib. 57 und 71. — C. australasiana. 55. — C. mellivora. 86. — C. auriculata. 84. — C. caerulea. 83. — C. seniculus. 50. Wahrſcheinlich auch C.

*) Vieillot hat dieſe Vögel mit den Baumläufern vermiſcht; wie Latham und Shaw mit den Bienenfreſſern. Temminck nennt ſie Meliphaga, trennt aber davon alle Vögel von Amerika, welche Cuvier dazu gerechnet hat, und verbindet dagegen mit Meliphaga die Gattung Diceum. Cuv.

cucullata, ob ſchon ſein Schnabel lange iſt. — Merops niger Gmel. (iſt mit fasciculatus und mit Gracula nobilis Merr. Beyträge Fascic. I. Taf. 11. derſelbe Vogel); in keinem Fall iſt letzterer ein Bienenfreſſer. Dahin ſcheinen ferner zu gehören, der Verdin de la Cochinchine, enl. 642. Turd. malabaricus. N. 125. Gmelin und Certhia cocincinica. Sh. Vieil. 77 u. 78. und Gracula melanocephala und viridis. Shaw.

Atzel. Gracula, (Martins) Cuv. *).

Auch dieſe Gattung nähert ſich noch den Droſſeln, die Arten leben in Afrika und Oſtindien. Der Schnabel iſt zuſammengedrückt und ſehr wenig gebogen, wenig ausge-

*) Die ganze Linneiſche Gattung Gracula iſt von Cuvier vollkommen auseinandergeriſſen worden, und es bleiben nach ihm nur zwey, nehmlich Gr. cristatella und carunculata. Es ſcheint aber, daß Cuvier mit Unrecht die Gr. religiosa davon trennt, und unter der Gattung Eulabes als eigene Gattung aufſtellt, da ſie doch alle Charaktere der Gattung hat, und Lichtenſtein ſtellt mit Recht unter dieſe Gattung neben den angeführten, zu Gracula, die Linneiſche religiosa und Calva und Turdus Pagodorum. Die Gr. Foetida iſt ein Gymnoderus. Gr. Barita, Quiscula, Saularis gehören zur Gattung Quiscula Lichtenſtein, welche zwiſchen die Gattungen Cassicus, icterus et Sturnus eingereihet werden muß. Gracula Athis iſt eine Droſſel, longirostris ein Cassicus. Grac. strepera, varia und Tibicen gehören zu den Caßikans, und Gracula picoides et cayennensis zu Dendrocopus. Temminck bringt mehrere Graculae zu ſeiner Gattung Pastor.

ſchweift; ſeine Einlenkung bildet einen Winkel, wie bey den Staaren. Faſt bey allen ſind die Kopffedern ſteif, und um das Auge iſt ein nackter Fleck. Sie haben die Sitten der Staare und fliegen wie ſie in großen Schaaren, um Inſekten zu jagen.

Die Atzel-Martin. Grac. tristis.

Paradisea tristis Gmel. Gracula gryllivora Daud. enl. 129.

Von der Größe einer Droſſel, Schnabelwurzel ſammtfederig, wie bey den Paradiesvögeln. Hauptfarbe kaſtanienbraun, Kopf und Hals dunkelbraun, die vordern Schwungfedern halb weiß, halb dunkelbraun; hinter den Augen ein kahler, dreieckiger, rother Fleck. Unterleib weiß. Sie lebt auf der Inſel Frankreich, wo ſie durch Verfolgung der Heuſchrecken ſehr nützlich iſt, ſie niſtet auf Palmen und läßt ſich leicht zahm machen und abrichten.

Hauben-Atzel. Grac. cristatella.

Enl. 507.

Hauptfarbe ſchwärzlich, mit blauen Anſtrich, die vordern Schwungfedern an der Wurzelhälfte weiß; auf der Stirn ein Federbuſch. In China *).

*) Hieher gehören Grac. caruncula'a. Le porte lambeaux. Vail. Afr. pl. 93. 44. (Sturnus gallinaceus Daud.), ferner Turd. pagodarrum Vail. 95., die malabariſche Droſſel, Turd. malabaricus, Turdus ginginianus, und die ſtahlgraue Atzel, Vail. 95. 1. Sturnus sericeus Gmel. und wahrſcheinlich Turd.

Leyerſchwanz. Maenura. Sh.

Die Größe dieſer Gattung, welche eine einzige Art enthält, hat zur Folge gehabt, daß man ſie unter die Hühner ſetzte, Illiger ſetzt ſie gerade nach der Gattung des Haushuhns und nennt den Vogel Schweifhuhn. Allein nach Cuviers Meinung gehört ſie durchaus in dieſe Abtheilung, da die Zehen geſondert ſind, (ausgenommen das erſte Gelenk der äußern und Mittelzehe) da der Schnabel an der Wurzel dreieckig, verlängert, etwas zuſammengedrückt und gegen die Spitze ausgeſchweift iſt. Die hautigen Naſenlöcher ſind groß, und zum Theil mit Federn bedeckt, wie bey den Hehern.

Prächtiger Leyerſchwanz Maenura superba.

Vieillot ois. de Paradis. pl. XIV. XV.

Schwarz, um die Augen nackt, der Schwanz ſehr lang, mit 16 Federn am Männchen, die beyden innerſten ſehr ſchmal und länger, die beyden äußern dagegen ſehr breit, wie ein Band, pomeranzenfärbig und S förmig gekrümmt, ſo daß ſie eine Art von Leyer bilden, die zwölf Übrigen ſind ſehr lang, die Bärte fadenförmig und die einzelnen Faſern ſtehen weit auseinander. Das Weibchen hat nicht mehr als 12 Federn, von gewöhnlichem Bau. Dieſer ſchöne und ſonderbare Vogel bewohnt die ſteinigten Gegenden Neuhollands und hat die Größe eines Faſans.

---

ochrocephalus. Lath. (Sturnus ceylanicus Gmel.), Brown III. 22. und einige neue Arten.

Digitized by Google

Manakins. Pipra. Linn.

Die meisten Arten dieser Amerika angehörigen Gattung sind klein, der Schnabel zusammengedrückt, mehr hoch als breit, ausgeschweift, die Nasenlöcher sehr groß, der Schwanz kurz; sie würden in ihrem Baue sich den Ameisenfressern nähern, wenn ihre Füße nicht kurz wären, sie unterscheiden sich aber auch von allen Zahnschnäblern dadurch, daß die äußere Zehe mehr als zur Hälfte ihrer Länge mit der mittlern verwachsen ist. Auf der andern Seite hat ihr kurzer Schnabel und ihr übriger Körperbau sie in die Nachbarschaft der Meisen gebracht. Man muß als eine besondere Gruppe von ihnen trennen

Den Felsenhahn. Rupicola. Vieillot.

Der Schnabel stark, gegen sein Ende zusammengedrückt, ausgeschweift und die Spitze der Oberkinnlade ungekrümmt. Sie sind von der Größe einer Misteldrossel und haben auf dem Kopf einen Federbusch aus zwey Reihen fächerförmig stehender Federn zusammengesetzt. Die alten Männchen beyder bekannten Arten, haben das schönste, pomeranzenfärbige, zerschlissene Gefieder, die Jungen sind dunkelbraun. Sie leben von Früchten, scharren in der Erde, wie die Hühner, und machen ihr Nest aus dürren Holzreisern in tiefen Felsenlöchern; das Weibchen legt zwey Eier.

Brasilischer Felsenhahn. Rupic. brasiliana. Enl. 39. und 747.

Vom schönsten Morgenroth, die Flügel schwarz, die Deckfedern pomeranzenfarbig gekantet, der Schwanz mit einer schwarzen, breiten Binde. In Brasilien, Guiana *).

Wahre Manakins. Pipra.

Kleine Vögel aus Südamerika, welche fast alle abstehende und bunte Farben haben. Die Weibchen sind meist von den Männchen verschieden. Sie leben in feuchten Wäldern in kleinen Truppen.

Gestreifter Manakin. Pipr. Strigilata. Hahn, Vögel. IV. Lieferung. Pipra regulus.

Männchen, Scheitel hochroth, durch die Augen ein grüner Strich, der sich hinten mit dem grünen des Nackens vereinigt. Oberleib grün, Unterleib gelbweiß, mit röthlichten Längsflecken. Schwungfedern schwarz. Das Weibchen ganz grün. In Brasilien.

Schwarzköpfiger Manakin. Pip. Manacus **). Enl. 302. 1. 303. 1.

Oberleib schwarz, unter dem Nacken ein weißes Halsband, Unterleib weiß, Steiß grau. In Brasilien ***).

---

*) Rupicola peruviana. Pipra peruviana enl. 745.

**) Pipra pareola enl. 687. 2 und 303. 2 — Superba. Pall. Sp. I. pl. III. 1. — Erythrocephala. 34. 1. — Leucocapilla 34. 2. — Aureola 34. 3. 302. 1. — Serena. 324. 2. — Gutturalis 324. 1. — Caudata. — Militaris.

***) Hieher gehören die Gattungen Phibalura und Pardalotus Vieillot. Die erste hat einen sehr kurzen Schnabel, er ist oben

Feinſchnäbler. Motocilla. Linn.

Linneus hat unter dem Namen der Bachſtelzen eine ſehr zahlreiche Gruppen von Vögeln zuſammengeſtellt, welche alle darin übereinſtimmen, daß ſie einen faſt geraden, dünnen, ahlenförmigen Schnabel haben. Wenn er an ſeiner Wurzel etwas niedergedrückt iſt, nähert er ſich dem der Fliegenfänger, iſt er aber zuſammengedrückt und ſeine Spitze etwas gekrümmt, ſo gränzen dieſe Vögel an die Würger mit geradem Schnabel. Da ſie aber von einander abweichen, hat man mehrere Gattungen daraus gemacht.

Steinſchmätzer. Saxicola. Bechst.

Der Schnabel an der Wurzel etwas niedergedrückt, breit, dadurch reihen ſie ſich an die Fliegenfänger. Es ſind lebhafte, muntere Vögel. Sie ſind hochbeinig und

---

etwas kegelförmig, an den Seiten erweitert, dick, ſtark, etwas gebogen, der untere iſt gerade; die Grube für die Naſenlöcher ſehr klein. Die Naſenlöcher an der Wurzel, ſeitlich, wenig deutlich, mit einer Haut bedeckt; die Füße mittelmäßig, die Zehen an der Wurzel verbunden, die Flügel etwas lang. Der Schwanz lang und ſehr gegabelt. Es iſt nur eine Art bekannt, Phibalura flavirostris (Pipra chrisopogon, aus Braſilien.

Die Gattung Pardalotus, hat einen kurzen, dicken Schnabel mit beſtimmter Firſte, die beyden Kinnladen faſt gleich lang und gleich ſtark, beyde conver und etwas ſtumpf, die obere ausgeſchweift. Die Naſenlöcher ſeitlich, klein, mit einer Haut bedeckt. Die Füße dünn, mittelmäßig lang, die äußere Zehe mit der innern vereinigt. Dahin gehören Pipra punctata — Striata — Superciliosa.

laufen ſchnell. Sie niſten an der Erde, auch wohl unter Erdſchollen, und ſingen zum Theil artig.

Schwarzkehliger Steinſchmätzer. Saxic. rubicola.

Naum. Nachträg. Taf. 43. F. 85. 86.

Kopf und Gurgel ſchwarz, Halsſeiten weiß, Rücken braun, über die Flügel ein weißer Streif; Unterleib roſtfarb. Das Weibchen heller. Er lebt in ſteinigen Gegenden und fliegt beſtändig nach Inſekten, die er im Fluge haſcht. Läßt immer einen ſchnalzenden Lockton von ſich hören, und ſchlägt dazu mit Flügeln und Schwanz. Im mittlern Europa.

Braunkehliger Steinſchmätzer. Sax. rubetra.

Naum. I. 48. F. 113 und 114.

Ueber die Augen ein weißer Streif, Kehle und Bruſt zimmetfarb. Auf den Flügeln ein weißer Fleck, durch die Augen ein braunſchwarzer Streif; Oberleib hellbraun, ſchwarzbraun gefleckt. Schwanzwurzel weiß, Schwanz ſchwarz. In Wieſen, beſonders in Gebirgen, hoch in die Alpen hinauf, ſo weit Gebüſche ſind, ſingt angenehm.

Graurückiger Steinſchmätzer. Sax. Oenanthe.

Naum. I. Taf. 48. F. III. und 112. Le cul blanc.

Stirn und ein Streif um die Augen weiß, durch die Augen ein ſchwarzer Strich, Scheitel und Rücken aſchgrau, Flügel ſchwarz, Schwanz weiß, am Ende ſchwarz.

Alles

Alles graue iſt am Weibchen rothgrau, das ſchwarze braun, das weiße roſtgelb. Im Frühling und Herbſt auf Aeckern, zwiſchen den Furchen, im Sommer auf Bergen.

Roſtgelber Steinſchmätzer. Sax. stapazina.

Scheitel, Hinterrücken und Schwanz weiß, letzterer am Ende mit ſchwarzen Flecken, Schultern und Unterleib hell roſtgelb, faſt iſabellfarben; Kehle und Flügel ſammetſchwarz, am Weibchen fehlt die ſchwarze Kehle. In gebirgigen Gegenden des wärmern Europa, in Italien.

Schwarzöhriger Steinſchmätzer. Saxic. aurita. Temm.

Die Stelle zwiſchen Augen und Schnabel, und Ohren und Flügel ſchwarz; Kehle, Vorderhals und Unterleib reinweiß, eben ſo Kopf, Bürzel, Nacken und Oberrücken leicht roſtgelbweiß, der Schwanz Dreyviertheile weiß, gegen das Ende ſchwarz, die mittlern Schwanzfedern ganz, die äuſſerſten gröſtentheils ſchwarz. Das Weibchen ſtatt ſchwarz, braun, ſtatt weiß, roſtfarb gemiſcht. Im nördlichen Italien, längs dem Mittelmeer, auf den Appenninen und in Sardinien.

Weiß und ſchwarzer Steinſchmätzer. Sax. leucomelas. Temm.

Seiten des Kopfs, Raum zwiſchen Augen und Schnabel, Kehle und Vorderhals ſchwarz, Scheitel und Hinterhals weiß, Rücken und Flügel braunſchwarz, Seiten dunkelgrau, der Schwanz Zweydrittheile weiß, das Ende und die beyden Mittelfedern ſchwarz. Im Norden von Eu-

ropa, in Lappland, dem nördlichen Rußland und an der Wolga *).

Sänger. Sylvia. Meyer. Ficedula. Bechst. Rothschwänzchen. Rubiettes.

Der Schnabel ist an der Wurzel nur etwas schmäler, als bey den Steinschmätzern. Es sind einsam lebende Vögel, welche sich von Insekten und Beeren nähren, und in Gebüschen und Mauerlöchern nisten.

Rothkehlchen. Sylv. rubecula.

Naum. I. Taf. 35. F. 73. Rouge gorge.

Oben graulich, olivenbraun, Gurgel und Brust rostroth, Bauch weiß. Ein harmloses, sehr bekanntes Vögelchen, es nistet in Gebüschen, ist neugierig, leicht zu zähmen, und wandert in etwas wärmern Gegenden nicht, sondern flieht zu den Häusern und sucht Fliegen oder Beeren.

Blaukehlchen. Sylv. suecica.

S. cyanecula Meyer. Naum. I. Taf. 36. F. 78. 79. Gorge bleue.

Oben braun, Gurgel am Männchen schön blau, Brust rostfarb, Bauch weiß. Seltener als das Rothkehlchen, in Gebüschen nahe am Wasser, singt nicht so schön.

---

*) Dahin gehören Motac. Caprata enl. 235. — Fulicata enl. 158. 1. — Leucothoa enl. 583. — L'imitateur Vaill. 181. — Sax hottentotta. Le familier. 183. — Le montagnard. 184 — Le Fourmiler. 186. — Motac. leucomela Falc. voy. III. 30. — Mot. cyanea. Gmel. —

Digitized by Google

Schwarzkehlchen. Sylv. phoenicurus.

Rossignol de muraille. Naum. I. Taf. 37. F. 80. 81.

Oben braun, Kehle schwarz, Brust, Bürzel und Seitenfedern des Schwanzes rostroth, Stirne weiß. Nistet in Mauern und unter Dächern, und singt oft in der Nacht auf den Giebeln der Häuser. Auch in Felsen, hoch auf den Alpen.

Schwarzbauchiger Sänger. Sylv. Tithys. Lath.

Naum. I. Taf. 37. F. 82. 83. La rouge queue. Mot. erithacus, gibraltariensis und atrata.

Oberleib bläulichgrau, Wangen, Kehle und Brust schwarz; Schwanz gelbroth; die mittlern Federn dunkelbraun, die Schwungfedern weiß gerändert. Wo das vorige, auch auf den höchsten Alpen, in Felsen und Steinen *).

Grasmücken. Curruca. Bechst.

Der Schnabel gerade, sehr dünne, vorn etwas zusammengedrückt, die Firste biegt sich etwas gegen die Spitze.

Nachtigall. Sylv. Luscinia.

Naum. I. Taf. 36. F. 77. Rossignol.

Oben braun, roströthlich; weißlichgrau unten; der Schwanz rostfarb. Durch ganz Europa verbreitet, in dich-

*) Dahin gehören von Ausländern, das Rothkehlchen mit blauem Rücken Mot. sialis enl. 390 — Cyanocephala — Cayana — Africana — Cyanura — Blackburnia lateralis — Guira — Elata — Pusilla — Calendula — Platensis — Furva und sehr viel neue Arten.

ten Gebüschen, nahe am Wasser. Ihren herrlichen Gesang läßt sie nur einige Monate hören, bis die Jungen aus den Eiern kommen, da dann die Sorge für dieselben beyde Gatten beschäftigt. Nistet nahe an der Erde im dichsten Gebüsche, wandert im Herbst. Im Frühjahr kommen die Männchen vor den Weibchen an.

Sprosser. Sylv. Philomela.

Naum. Nachtr. Taf. 26. F. 52.

Etwas größer, die Brust, besonders aber die Kehle, fallen mehr ins Graue. Sie lebt mehr im wärmern Europa.

Seidenfedriger Sänger. Sylv. sericea. Natt.

Der ganze Oberkörper mit dem Schwanze mattgraubraun; Seiten des Halses und Brust rein aschgrau, an den Seiten des Unterleibes graubraun, der Unterleib reinbraun; Augenbraunen, Augenkreis, Kehle und Mitte des Bauches reinweiß, der Schwanz keilförmig. Länge 5 Zoll 3 Linien. In den südlichen Provinzen von Spanien.

Man nennt die übrigen Sänger überhaupt Grasmücken, sie haben meist einen angenehmen Gesang, und sind muntere Vögel, welche immer auf Insekten jagen, in dichtem Gebüsche nisten, einige vorzüglich an den Ufern der Flüsse, Bäche und Teiche im Schilf. Alle wandern von uns weg. Zuerst kommen die Rohrsänger.

Digitized by Google

Drosselsänger. Sylv. turdoides.

Turd. arundinaceus. Linn. Rousserolle. Naum. I. Taf. 46. F. 103.

Macht den Uebergang von den Drosseln zu den Sängern. Etwas kleiner als die Weindrossel, der Schnabel oben etwas gebogen. Oben braunröthlich, unten gelblichweiß. Der Schwanz rostfarb. Sie lebt im Schilf von Wasserinsekten, und nistet im Schilf. Sie ist weit verbreitet, doch nicht allenthalben in Europa anzutreffen. Sie singt sehr schön.

Rostrother Sänger. Sylv. galactotes. Temm.

Der ganze Oberleib mit dem Schwanze lebhaft rostroth, die Seitenfedern des Schwanzes haben am Ende einen schwarzen Fleck; die Spitze aber ist reinweiß, die Flügel sind hellbraun, rostfarb geändert; vom Auge zum Schnabel geht ein brauner Streif, über dem Auge ein weißer; der Unterleib weiß isabellfarbig, an den Seiten rostfarb, die Hälfte des Unterschnabel und die Füße gelblich. Im südlichen Spanien.

Rohrsänger. Sylv. arundinacea.

Naum. I. Taf. 46. F. 104. Bec fin des roseaux.

Oben hell olivenbraun, unten rostgelblich weiß, über die Augen ein rostgelblich weißer Streif. Schwanz keilförmig. Lebt immer im dicksten Rohr, und singt den ganzen Tag durch. In Deutschland und andern Orten.

Cettis-Sänger. Sylv. Cetti. Temm.

Enl. 655. F. 2. Bouscarle.

Schnabel sehr schwach; Oberleib dunkelbraun, rostroth überlaufen, Flügel und Schwanz schwarzbraun; zwischen Aug und Schnabel ein grauer Fleck; Halsseiten weiß, Seiten, Schenkel und Unterleib rostbraun, Vorderhals und Mittelbauch reinweiß, Schwanz breit, sehr abgerundet. In Sardinien, und wahrscheinlich auch im südlichen Frankreich an Flüssen.

Sumpfsänger. Sylv. palustris.

Naum. I. Taf. 46. Fig. 105.

Oberleib graugrünlich überlaufen, über den Augen ein undeutlicher weißlicher Streifen, Schwanz keilförmig. Nicht im Rohr, wohl aber in sumpfigen Wiesen oder daran stoßenden Feldern im Getreide. Singt sehr schön. Hin und wieder in Deutschland und der Schweiz.

Flußsänger. Sylv. fluviatilis. Meyer.

Bec fin riverain Temm.

Olivenfarb bräunlich überlaufen, die Kehle weiß, mit einigen olivenfarben Längsflecken, Brust und Seiten des Halses weißlich olivengrün mit lanzenförmigen Flecken, Seiten des Unterleibs hell olivenfarb, Mittelbauch weiß, die untern Schwanzdeckfedern hell olivenbräunlich, mit weißen Spitzen. Der Schwanz stark abgerundet. An den Ufern der Donau.

Digitized by Google

Heuſchreckenſänger. Sylv. Locustella. Lath.

Bec fin locustelle Temm.

Oben olivenfarb, mit eiförmigen, ſchwarzbraunen Flecken; Kehle, Vorderhals und Mittelbauch reinweiß, unter der Kehle ein Halsband von kleinen, eiförmigen, braunen Flecken. Die untern Schwanzdeckfedern roſtgelb, mit braunen Flecken. Hin und wieder in Deutſchland, und im ſüdlichen Europa an Flüſſen.

Schilfſänger. Sylv. Phragmitis. Bechst.

Bec fin phragmite Temm. Naum. I. 46. Fig. 107.

Ueber den Augen ein gelbweißer und ein ſchwarzbrauner Streif, Nacken und Oberrücken roſtgelb, mit verloſchenen, dunkelbraunen Flecken. Unterrücken roſtfarb. Schwanz abgerundet. In Geſträuchen nahe an Sümpfen, in Schilf und Rohr, in Deutſchland und Italien u. ſ. w.

Binſenſänger. Sylv. aquatica. Temm.

S. salicaria et Schoenobanus. Bec fin aquatique. Naum. I. Taf. 47. F. 206.

Ueber dem Auge ein braunſchwarzer und ein weißer Streif. Oberleib roſtgelb, mit ſchwarzbraunen Längsflecken, Unterrücken lohgelb; Unterleib gelblich weiß; Bruſt und Seiten roſtgelb, mit feinen, braunen Strichen. Schwanz zugerundet. In Rohrteichen in Italien, und in einigen Gegenden Deutſchlands.

Dicker Sänger. Sylv. certhiola. Temm.
Bec fin trapu.

Schnabel ſtark; obere Kinnlade ſchwarz, der Unterleib olivenfarb und bräunlich gewölkt, mit eiförmigen, braunſchwarzen Flecken, in der Mitte jeder Feder: Kehle und Vorderhals reinweiß; unter der Kehle ein Halsband von kleinen, eiförmigen, dunkelbraunen Flecken, Seiten, Unterleib und untere Deckfedern des Schwanzes roſtgelb, Mittelbauch reinweiß; Schwanz lang und ſehr keilförmig. Im ſüdlichen Rußland *).

Grasmücken, welche mehr an trockenen Orten leben.

Schwarzſcheiteliger Sänger. Sylv. atricapilla.

Naum. I. Taf. 34. F. 71. 72. Mönch, Schwarzkopf.

Stirn, Scheitel und Nacken am Männchen ſchwarz, am Weibchen rothbraun. Kehle, Hals, Bruſt, Hinterhals und Backen aſchgrau, der Oberleib olivengrün, Unterleib weiß, Seiten grauröthlich. Schwanz ſchwarzgrau, die mittlern Federn etwas kürzer. In ganz Deutſchland in Laubhölzern, ſingt ſehr ſchön.

Schwarzköpfiger Sänger. Sylv. melanocephala. Temm.

Kleiner als der vorige, Kopf, Backen, Hinterhals am Männchen tief ſchwarz, Kehle, Hals, Bruſt und Mittel-

*) Es giebt außer Europa mehrere Sänger, welche den angeführten, beſonders dem Droſſelſänger gleichen, alle ſind einander ähnlich und ſehr ſchwer zu beſchreiben, nur Geſang und Sitten unterſcheiden ſie.

Digitized by Google

bauch reinweiß; die Seiten tief aschgrau. Oberleib und Schwanz schwärzlich aschgrau. Am Weibchen der Kopf aschgrau, der Oberleib röthlichgrau. Der Schwanz etwas keilförmig, die drey äußern Schwanzfedern mit weißer Spitze, die äußerste ist am meisten weiß. In Italien und im wärmern Europa.

Sardinischer Sänger. Sylv. Sarda. Marmora.

Stirn, Scheitel, Backen und Vorderhals grauschwärzlich, an der Stirne und bey den Augen dunkler; Mantel, Rücken und Bürzel schwarzgrau; Nacken, Halsseiten, Brust und Seiten heller, etwas rostfarb; Mittelbauch hell weinröthlich. Flügel und Schwanz schwärzlich. Augenkreis nackt und roth. Das Weibchen heller. Häufig an einsamen Orten in Sardinien.

Orpheus Sänger. Sylv. orphea. Temm.

Enl. 579. 1. Fauvette proprement dite. Bec fin orphée.

Der Kopf schwarzgraulich, der Oberleib graubräunlich. Kehle und Unterbauch weiß, Brust, Seiten und Steiß röthlich überlaufen. Schwanz grauschwarz, die äußerste Feder an der schmalen Fahne und Spitze weiß, die andern an der Spitze weißlich. Die größte inländische Art.

In wärmern Gegenden, häufig in Italien, nistet in Mauren.

Grauer Sänger. Sylv. hortensis. Lath.

Naum. I. Taf. 53. F. 68. Bec fin fauvette Temm. enl. 579. 2.

Oberleib röthlichgrau, Unterleib weißgrau, Füße bleifarb. In Deutſchland, allenthalben in Gebüſchen.

Fahler Sänger. Sylv. cinerea. Bechst.

Naum. I. Taf. 33. F. 69. Fauvette grise. Motacill. Sylvia.

Oberleib aſchgrau, Deckfedern der Flügel roſtfarb gerändert, Unterleib weißlich. Die äußere Schwanzfeder mit einem großen, weißen Fleck. Häufig in Deutſchland.

Klapper-Sänger. Sylv. garrula. Bechst.

Sylv. curruca. Naum. I. Taf. 34. F. 70.

Oberleib röthlichgrau, Unterleib weiß, die äußerſte Schwanzfeder auf der äußern Seite weiß. Häufig in ganz Deutſchland.

Brillen-Sänger. Sylv. conspicillata. Marmor.

Bec fin à Lunette. Planch. enlum. nouveau recueil. 6. F. 1.

Scheitel und Backen ſchön grau; Raum zwiſchen Auge und Schnabel ſchwarz, Augenkreis weiß; Mantel und Rücken weinroth, ins roſtrothe übergehend; Flügel ſchwärzlich roſtfarb bandirt; Kehle reinweiß, Unterleib weinröthlich, Seiten roſtfarb, Schwanz ſchwärzlich, abgerundet, die äußern Federn faſt ganz weiß. In Sardinien in Gebüſchen häufig, wahrſcheinlich auch in Unteritalien.

Digitized by Google

Geſperberter Sänger. Sylv. nisoria. Bechst. Naum. I. Taf. 33. Fig. 67.

Oberleib bräunlichaſchgrau, Unterleib weiß, mit aſchgrauen Wellenlinien. Augenſtern gelb. Im nördlichen Europa.

Provenzaliſcher Sänger. Sylv. provincialis. Lath.

Pitechou de Provence enl. 656. 1. Sylv. dartfordensis.

Oberleib röthlichaſchgrau, Schwanz lang, ſchwärzlichaſchgrau. Kehle, Bruſt und Seiten dunkel ziegelroth, bey jüngern weißlich gemiſcht, Mittelbauch weiß. Im ſüdlichen Frankreich und Italien.

Sperlingsſänger. Sylv. passerina. Lath.

Scheitel, Backen, Nacken und Halsſeiten hellgrau; Oberleib olivengrau, die Deckfedern der Flügel roſtfarb geändert; Kehle und Mittelbauch reinweiß, Vorderhals, Bruſt und Seiten hell roſtröthlich; Schwanz hellgrau, die mittlern Federn ausgenommen, alle mit weißer Spitze. In Italien, Spanien und Portugall.

Unteralpiniſcher Sänger. Sylv. subalpina. Bonnelli.

Nouveau récueil. 6. F. 2.

Der Oberleib dunkel aſchgrau, die Flügelfedern roſtgelb geändert, der Unterleib weinröthlich, Mittelbauch weiß, der Schwanz ſchwärzlichgrau, leicht abgerundet, die Spitze weiß. In Italien bey Turin und Florenz.

Weißbartiger Sänger. Sylv. Leucopogon. Heckeli.

Schnabel gerade, braun, der Unterschnabel heller, am Grunde gelblich, der Augenstern orangefarbig; Füße bräunlichgelb. Kopf und Oberkörper aschgrau, bleifarbig, auf dem Rücken mit leichtem, bräunlichem Anfluge. Zu beyden Seiten der Kehle am Grunde des Unterschnabels ein weißer Streifen; Kehle, Vorderhals und Brust hellrostfarbig, der übrige Unterleib weiß, die Seiten rostfarbig angeflogen, Schenkel rostfarb; Flügel braun, die äußern Fahnen schmal, gelbweiß eingefaßt. Schwanz braun, die äußerste Feder nur am Grunde braun, das übrige weiß, die zweyte mit weißer Spitze, die dritte mit einem dreyeckigen, weißen Fleck. Länge des ganzen Vogels 4 Zoll 7 Linien. In Sizilien.

Natterers-Sänger. Sylv. Nattereri. Temm.

Scheitel und Nacken graubraun. Rücken olivenbraun. Von den Augen bis zum Schnabel ein breiter, weißer Streif. Der ganze Unterleib reinweiß. Flügel- und Schwanzfedern grauschwärzlich, hellgrün gesäumt. In Spanien und Italien.

Gefleckter Sänger. Sylv. cysticola. Temm.

Pl. enl. nouveau récueil 6. F. 3.

Oberleib rostgelb, mit schwarzbraunen Längsflecken, Unterrücken und Bürzel ungefleckt, Unterleib roströthlich ungefleckt, Seiten etwas dunkler. Schwanz kurz, braunschwärzlich, sehr keilförmig. In Spanien und Portugall.

Digitized by Google

Feigenfreſſer. Regulus. (Laubvögel. Fuiguiers).

Schnabel ſehr dünne, völlig kegelförmig, ſehr ſpitzig, die Seiten ſcheinen etwas ausgehöhlt. Kleine Vögel, leben in Gebüſchen von Inſekten, Beeren, in warmen Gegenden von Feigen.

Gekrönter Sänger. Sylv. regulus.

Naum. I. Taf. 47. F. 109. 110.

Der kleinſte europäiſche Vogel, oben hell olivengrün, unten gelblichweiß. Der Scheitel pomeranzenfarb, am Weibchen bläſſer. In Schwarzwäldern faſt allenthalben.

Feuerköpfiger Sänger. Sylv. ignicapilla. Brehm.

Auf den Backen ſind drey Längsſtreifen, zwey weiße und ein ſchwarzer; der Federbuſch des Männchens ſehr lebhaft pomeranzenfarbig. Der Schnabel zuſammengedrückt, an der Wurzel ziemlich ſtark. Alle Farben ſind lebhafter als am Goldhähnchen.

In Nadelwäldern, auch in Gartengebüſchen, ſehr ſelten in Deutſchland, häufig in Frankreich und Belgien.

Gelbbauchiger Sänger. Sylv. Hippolais. Lath.

Naum. I. Taf. 41. F. 91. Le grand Pouillot. Bec fin à poitrine jaune.

Oberleib olivenfarb aſchgrau. Unterleib hellgelb. Von den Naſenlöchern bis zu den Augen ein gelber Streif. In dichten Gebüſchen allenthalben in Deutſchland: ſingt ſehr ſchön.

Grüner Sänger. Sylvia Sybilatrix. Bechſt.

Naum. Nachtr. pl. 5. F. 12. Bec fin ſiffleur.

Ueber den Augen ein gelber Streif, durch die Augen ein dunkelbrauner. Oberleib zeiſiggrün, der innere Flügelrand gelb, dunkelbraun gefleckt. In Wäldern.

Fitis-Sänger. Sylv. Fitis. Bechſt.

Naum. Nachtr. V. F. 12. Bec fin pouillot. Motac. Trochilus. Lath.

Ueber den Augen ein weißgelber Streifen; die Wangen ſind gelblich; Oberleib olivenfarbig; die untern Deckfedern der Flügel ſchön gelb. In Wäldern und Gebüſchen.

Weidenſänger. Sylv. rufa. Lath.

Naum. I. 35. Fig. 76. Bec fin veloce. Temm. petite fauvette rousse. Buff.

Wangen bräunlich; Oberleib rothgrau, über den Augen ein ſchmutziggelber Streif, die untern Deckfedern der Flügel ſtrohgelb. In Vorhölzern, beſonders der Schwarzwälder.

Die ausländiſchen Feigenfreſſer ſind ſehr zahlreich, und oft mit angenehmen Farben gezeichnet, dahin gehören: Der Tſcherik Vail. III. 131. Der Gelbhals, Mot. pensilis enl. 686. 5. — Der gefleckte Feigenfreſſer aus Canada, Mot. aestiva. enl. 58. 2. — Der Feigenfreſſer mit gelber Gurgel, Mot. ludoviciana. enl. 731. 2. — Der gelbbrüſtige Feigenfreſſer, Mot. mystacea enl. 709. Edw. 237. 2. — Der graue Feigenfreſſer, Mot. canadensis enl. 705. 1. — Der Feigenfreſſer mit ſchwarzem Halsband, Vail. III. 123. — Der Feigenfreſſer aus der Inſel Frankreich, Mot. mauritiana. enl. 705. und andere mehr. Diejenigen, mit

Digitized by Google

an der Wurzel breiterm Schnabel nähern sich den geradschnäbligen Fliegenschnäppern.

Zaunkönige. Troglodytes. Cuv.

Sie unterscheiden sich von den Feigenfressern durch einen noch dünnern und etwas gebogenen Schnabel. In Europa ist nur eine Art.

Der Zaunkönig. Sylvia. Troglodytes.

Naum. I. Taf. 47. F. 108.

Oberleib schmutzig roſtbraun, mit undeutlichen Querſtreifen; der Schwanz kurz etwas keilförmig, und wie die Flügel gebändert, immer aufgerichtet. In ganz Europa häufig in Wäldern, wo er an der Erde niſtet, im Winter in Dörfern und Gärten. Singt mitten im Winter ſehr angenehm und laut *).

Bechſtein und nach ihm die neuen Syſtematiker, trennten von den Sängern die

Fluevögel. Accentor.

Schnabel mittelmäßig ſtark, gerade, ſcharf zugeſpitzt; der Rand beider Kinnladen eingedrückt. Die Naſenlöcher unbedeckt, in einer großen Haut liegend. Die Füße ſtark, der Nagel der Hinterzehe lang, ſtark, gekrümmt.

Alpenfluevogel. Acc. alpinus.

Fauvette des alpes. Motac. alpina. Meyer und Wolf, deutſche Ornithologie. enl. 668.

Aſchgrau, dunkelbraun gefleckt; Kehle weiß, mit kleinen ſchwärzlichen Flecken. Seiten des Unterleibs roth-

*) Die ausländiſchen Zaunkönige gehen auf der einen Seite in die Ameiſenfreſſer, auf der andern in die Baumläufer über.

braun; auf den Flügeln drei gleichlaufende Reihen weißer Flecken. Das Gefieder sehr dicht und weich. Dieser Vogel, der sogar unter die Staare geworfen wurde, findet sich in allen höhern Alpen über der Region des Holzwuchses im Sommer auf Felsen, wo er nach Insekten jagt, im Winter geht er in die Thäler herab, und lebt dann von Beeren und Sämereyen *).

Schieferbrüstiger. Fluevogel. Accent. modularis.

Sylvia modularis. Traine buisson. Naum. I. XIII. Fig. 32.

Oberleib hellrosifarbig, mit schwarzbraunen Längsflecken, die Flügelfedern mit weißen Spitzen. Unterhals und Brust schieferblau. In jungem, dichtem Schwarzholze, bleibt in etwas wärmern Gegenden im Winter, und frißt Insekten und Sämereien, singt angenehm.

Berg-Fluevogel. Accent. montanellus. Temm.

Scheitel und Hinterhaupt, und eine Binde über die Augen schwarz, von der Schnabelwurzel an geht ein gelblicher Streif bis zum Nacken. Oberleib graurothlich, mit großen, ziegelrothen Längsflecken. Flügel graubraun, röthlich gesäumt; auf den Flügeln zwey Reihen gelblicher Punkte. Alle untern Theile isabellgelb, an der Brust mit braunen, an den Seiten mit rothgrauen Flecken. In Unteritalien, Dalmatien, Ungarn und in Asien.

Man

*) Zu den Fluevögeln rechnet Temmink das Rubinkehlchen, Motacilla cailiope aus Sibirien.

Man kann auch noch von den Sängern einige ausländische Arten trennen, deren Schnabel sehr dünne, und fast wie bey den Drosseln zusammengedrückt ist, der Schwanz ist lang und keilförmig. Einige von ihnen bauen sehr künstliche Nester von Baumwolle und andern feinen Pflanzenfasern, welche sie auf die merkwürdigste Art zusammen weben.

Der blonde Sänger. Sylv. subflava. Lath.

Enl. 5841. Wahrscheinlich Vaillants Citrin. ois. d'Afr. 127.

Der Schnabel dünn, Oberleib braun; unten grau, an den Seiten röthlich. Schwanz keilförmig. Am Senegal. Dahin gehört auch Mot. macroura. Gmel. enl. 752. 2. — Vaillants double sourcil. 128. und sein Capolier. id. 129. 130.

Wahre Bachstelzen. Motacilla. Cuv. (Lavandieres).

Schnabel dünn, walzenförmig, mit pfriemförmiger Spitze. Nasenlöcher eirund und unbedeckt. Zunge schmal, an der Spitze gefasert. Füße schlank, lang, mit langer, krummer Hinterzehe. Schwanz lang, wagerecht stehend. Leben an den Ufern der Seen und Flüsse, nisten in Mauern und Löchern, und nähren sich von Insekten.

Weiße Bachstelze. Motac. alba.

Naum. I. Taf. 39. F. 86. 87.

Oben grau, Scheitel schwarz, Halsseiten und Bauch weiß; Brust und Schwanz schwarz, am letzten die äußern Federn zur Hälfte weiß. In ganz Europa häufig.

Schwarze Bachſtelze. Motacil. lugubris. Pall.

Der ganze Oberleib ſchön ſchwarz, eben ſo Bruſt und Kehle, Stirn, Augengegend, Unterleib und die beyden äußerſten Schwanzfedern reinweiß, die Seiten ſind ſchwarzgrau, die Schwungfedern ſchwarz, weiß geſäumt. Im mittäglichen Europa; auf ihrem Zuge an der Küſte der Nordſee. Sie gleicht ſehr der Motac. aguimp. Vaill. Afr. pl. 178.

Gelbe Bachſtelzen. Budytes. Cuv. (Bergeronnettes).

Sie haben neben den übrigen Kennzeichen der Bachſtelzen, den Nagel der Hinterzehe verlängert und etwas gebogen, wodurch ſie ſich mehr den Lerchen und Piepern nähern. Sie leben auch an Waſſern, häufig aber auf Viehweiden, wo ſie die Inſekten unter den Viehheerden verfolgen.

Gelbe Bachſtelze. Motac. flava. Gmel.

Naum. I. Taf. 39. Fig. 88.

Oberleib grau, olivengrün überlaufen; Unterleib ſchön gelb, die zwey äußern Schwanzfedern über die Hälfte weiß.

Graue Bachſtelze. Mot. boarula Gmel.

Naum. Nachtr. VI. F. 13. 14.

Oberleib dunkel aſchgrau; Kehle ſchwarz, Bruſt und Bauch hochgelb. Der Schwanz ſehr lang. Im Sommer mehr in gebirgichten Gegenden, im Winter in Ebenen.

Digitized by Google

Citrongelbe Bachſtelze. Motac. citreola. Pall.

Scheitel, Backen und alle untern Theile ſchön citrongelb; am Nacken eine breite, ſchwarze Binde, welche einen halben Mond bildet. Rücken, Flügeldeckfedern und Seiten bleigrau. Die Schwungfedern weiß geſäumt und mit weißer Spitze; der Schwanz, die Seitenfedern ausgenommen, ſchwärzlich. Im ſüdlichen Rußland und in der Krimm, wahrſcheinlich auch in Ungarn und dem Archipel.

Pieper. Anthus. Bechſt. (Farlouses).

Schnabel ſehr dünn, pfriemenförmig, faſt walzenförmig, oben an der Spitze etwas ausgeſchnitten, unten nach vorn etwas eingezogen. Naſenlöcher eirund, unbedeckt, in einer etwas aufgeblaſenen Erhöhung. Die Zunge geſpalten, oder Faſerig. Die Füße dünn, der Hinternagel lang, mehr oder weniger gekrümmt. Man hat ſie dieſes Nagels wegen lange unter die Lerchen gezählt, ihr Schnabelbau nähert ſie den Sängern, und ihre kurzen Deckfedern der Flügel trennen ſie von den Bachſtelzen. Sie leben meiſt auf der Erde, in ſumpfigen Gegenden, oder an den Ufern der Flüſſe und Seen, diejenigen, deren Nagel der Hinterzehe gebogen iſt, ſitzen auch auf Bäume. Sie nähren ſich von Inſekten. Alle geben einen ſcharfen, piependen Ton von ſich, daher der Name Pieper. Sie ſingen aber zum Theil auch ſchön.

Baumpieper. Anth. arboreus. Bechſt.

Naum. II. 8. Fig. 12.

Lerchengrau, Bruſt roſtgelb, ſchwarzbraun gefleckt, auf den Deckfedern der Flügel zwey weißliche Streifen.

Schwanz schwarzbraun, die äußern Federn zum Theil weiß. Der Nagel der Hinterzehe nicht sehr lang, gekrümmt. In bergigen und waldigen Gegenden, selbst hoch auf den Alpen.

Wiesenpieper. Anth. pratensis. Bechst. Naum. II. 8. F. 11.

Oberleib olivengrün, schwärzlich gefleckt. Unterleib rostgelblich, an der Oberbrust stark bräunlich gefleckt; über die Augen ein weißlicher Streif, die äußern Schwanzfedern zum Theil weiß, der Daumnagel sehr lang und gerade. In Sümpfen und feuchten Wiesen.

Richards-Pieper. Anth. Richardi. Vieill.

Schnabel stark, Füße lang; der Nagel der Hinterzehe länger als die Zehe, wenig gebogen. Scheitel, Rücken, Schultern dunkelbraun, hellbraun gesäumt. Unter den Augen ein Streif, Schläfen, Kehle, Bauch und Unterleib reinweiß, die Brust etwas röthlich, mit einem Gürtel von kleinen, lanzetförmigen Flecken, Seiten röthlich, Schwung- und Schwanzfedern schwärzlich, weißgelb gesäumt. Die äußerste Schwanzfeder weiß. Gegen die Pyrenäen, und auf dem Zuge in der Pikardie.

Wasserpieper. Anth. aquaticus. Bech.

Alauda spinoletta. Linn.

Stirn und Schnabel sehr gestreckt. Oberleib olivengrau. Unterleib schmutzig weiß, an der Brust dunkelbraun gefleckt. Die Kehle weiß, die äußern Schwanzfedern zur Hälfte weiß, der Daumnagel schwarz und gekrümmt. Mau-

sert zweymal, im Sommer wird der Oberleib mehr grau, über die Augen ein weißer Streif, Backen grau, Unterleib und Seiten des Halses weiß, rostgelblich überlaufen, ohne Flecken. Im Sommer auf Bergen, bis hoch in die Alpen, im Winter am Ufer der Seen und Flüsse.

Brachpieper. Anth. campestris. Bech.

Naum. II. F. 10. Anth. rufescens. Temm.

Ueber den Augen ein rostgelber, breiter Streifen. Oberleib grau und rostgelblich mit undeutlichen Flecken, die Flügelfedern schwärzlich, gelb gerändert. Unterleib weißrostgelblich, nur an der Brust feine, undeutliche Flecken. Nagel an der Hinterzehe kurz. In sandigen und steinigen Gegenden, besonders auf Anhöhen *).

Nach Cuvier sollen die Pieper im Herbst auch Trauben fressen und davon sehr fett werden, daher in einigen Provinzen Frankreichs dann als Delicatesse sehr gesucht seyn, und unter dem Namen Feigenfresser vorkommen **).

Die Pieper machen den Uebergang zu den Lerchen, aber vorher darf wohl eine Familie angeführt werden, welche sich zwar durch ihren ganzen Bau von den bisherigen unterscheidet, und eine von der Natur sehr schön begränzte

*) Von Ausländern gehören dahin alauda capensis enl. 504. 2. — Alauda rufa enl. 738. 2. und eine andere 738. 1. wahrscheinlich auch a. rubra. Edw. 297.

**) In Deutschland wenigstens ist dies nirgends bekannt, ob gleich es seyn mag, daß diese Vögel zuweilen Beeren fressen, doch weit seltener, als die Sänger.

Familie ausmacht, durch ihre Lebensart und Nahrung aber, sich den Fliegenfängern und Sängern nähert *).

Schwalbenartige Vögel. Fissirostres. Cuv.

Chelidones. Meyer und Wolf.

Eine nicht sehr zahlreiche, aber durch den kurzen, schwachen, breiten, platten, wenig gekrümmten Schnabel sehr ausgezeichnete Familie. Er hat keine Ausschweifung, und die Mundöffnung ist bis hinter die Augen gespalten, so daß sie im Fluge die Insekten leicht fangen können.

Sie sind mit den Schnappern am nächsten verwandt, deren Schnabel von dem der Schwalben sich nur durch die Ausschweifung unterscheidet. Da die Schwalben durchaus von Insekten leben, so müssen sie in allen kältern Ländern Zugvögel seyn. Sie theilen sich in Tagschwalben und Nachtschwalben.

Tagschwalben. Hirundo. Linn.

Diese Abtheilung begreift die sämmtlichen Arten der Tagschwalben, welche sich durch ihr anliegendes Gefieder, durch ihre langen Flügel und sehr schnellen Flug auszeichnen. Man unterscheidet in neuern Zeiten zwey Gattungen.

Segler, Mauerschwalben. Apus. Cuv. Cypselus. Illiger. Micropus. Meyer.

Sie haben nach Verhältniß unter allen Vögeln dieser Ordnung die längsten Flügel und fliegen mit ausserordent-

*) Diese Einschaltung hier scheint nicht natürlich, die Schwalben gehörten eher gerade nach den Schnappern als hierher.

licher Schnelligkeit und Kraft; der Schwanz iſt gabelförmig; die Füße ſehr kurz, und alle 4 Zehen ſind nach vorn gerichtet, und die Mittel- und äußere Zehe haben jede nur drey Gelenke, wie die innerſte. Die Kürze ihres Schulterknochens, die Breite ſeiner Anhänge, die eiförmige Geſtalt des Gabelknochens, das unten nicht ausgeſchweifte Bruſtbein zeigen ſelbſt am Scelett, wie geſchickt der Körper dieſer Vögel zum ſchnellen und kräftigen Fluge eingerichtet ſey; dagegen macht die Kürze der Füße, und die Länge der Flügel, daß ſie, wenn ſie auf der Erde ſitzen, nicht Luft faſſen und alſo nicht auffliegen können. Es ſind eigentliche Luftvögel, die ihr Leben meiſt fliegend zubringen und geſellſchaftlich unter großem Geſchrei die Inſekten ſelbſt in großen Lufthöhen verfolgen. Sie niſten in Mauerlöchern, legen weiße, ſehr eiförmige Eier, und klettern mit großer Geſchwindigkeit ſelbſt an glatten Mauern.

Spyr-Segler. Cyps. Apus.

Naum. I. 42. F. 95.

Schwarzgrau, die Kehle weißlich. In ganz Europa.

Felſen-Segler. Cyp. Melba.

Viel größer, oben braungrau, unten weiß, mit einem braungrauen Halsbande. In den hohen Alpen, auch in einigen Schweizerſtädten auf den Thürmen *).

*) Hieher gehören: Hirundo sinensis. Le martinet à croupe blanche Vaill. 244? Le martinet velocifere. ib. 244?

Digitized by Google

Wahre Schwalben. Hirundo. Cuv.

Zehen und Bruſtbein iſt wie bey den übrigen Vögeln dieſer Ordnung. Bey einigen ſind die Füße bis auf die Zehen befiedert; die Hinterzehe iſt geneigt, ſich nach vorn zu richten, der Schwanz iſt mittelmäßig lang, ungegabelt.

Hausſchwalbe. Hirund. urbica. Linn.
Naum. I. 43. F. 98.

Mit ungeflecktem Schwanze, bläulichſchwarzem Rücken; ganz weißem Unterrücken und Unterleib. In ganz Europa *).

Bergſchwalbe. Hirund. rupestris. Temm.
Hirund. montana. Meisner Museum.

Die obern Theile graubräunlich, jede Feder etwas röthlich gerandet, an Flügeln und Schwanzfedern mit breiterm Raude, unterer Theil des Körpers roſtfarb ins bräunliche ziehend; Stirne und Gurgel kaſtanienbraun. Der Schwanz wenig gegabelt, auf jeder Feder, die beyden mittlern ausgenommen, ein weißer Fleck. Die Füße mit grauem, braun geflecktem Flaum bedeckt. Im mittäglichen Europa, vorzüglich häufig am Mittelmeer, ſelten in der Schweiz in den Alpen. Niſtet in Felſen.

Uferſchwalbe. Hir. riparia. Linn. **).
Naum. I. 43. F. 100.

Oberleib aſchgraubraun. Kehle und Bauch weiß,

*) An dieſe reihen ſich: Hir. cayennensis. enl. 725. Hirund. ludoviciana. Cuv. enl. 725. et Catesb. 1. 51.

**) Hieher gehören: Hir. rufa. enl. 724. 1. — Hir. fasciata. id. 724. 2. — Hir. violacea. enl. 727. — Hir. chálybaea. enl.

Füße faſt nackt. Faſt auf der ganzen Erde, niſtet in Erdlöchern.

Rauchſchwalbe. Hirund. rustica. Linn. Naum. I. 42. F. 96.

Stirn und Kehle kaſtanienbraun, Oberleib ſchwarzſtahlblau, Unterleib weiß. Schwanz ſehr ſtark gegabelt, die beyden mittelſten Federn ausgenommen, jede mit einem weißen Fleck. Sehr weit verbreitet.

Unter den ausländiſchen Arten ſind mehrere mit faſt gleich langen Schwanzfedern *). Andere mit ſehr kurzem Schwanz und ebenfalls gleich langen Federn, welche in leere Fahnen auslaufen **).

Unter den ausländiſchen Schwalben iſt beſonders merkwürdig.

Die Schwalbe mit eßbarem Neſt. Hir. esculenta. Linn.

Eine ſehr kleine Art aus dem indiſchen Archipel, mit gegabeltem Schwanze, oben braun, unten und an der

---

545. 2. — H. Senegalensis. enl. 310. — Capensis. id. 723. 2. — Indica. Lath. Syn. II. pl. 56. — H. Panayana Sonner. I. voy. pl. 76. — H. Subis. Edw. 120. — H. ambrosiaca. Briss. II. p. 45. F. 4. — H. tapera. ib. F. 3. — Nigra. ib. p. 46. F. 3. — Daurica. H. à front. roux, Vail. 245. 2. — H. de marais. id. 246. 2. — H. huppée. ib. 247.

*) Hir. dominicensis. enl. 545. 1. — H. torquata. enl. 723. 2. — H. leucoptera. enl. 546. 1. — H. francica. enl. 544. 2. — H. borbonica. — H. americana. — H. fulva. (fauve Vaill. 246. 1.).

**) Hir. Acuta. enl. 544. — H. pelasgia. enl. 726. 1. 2.

Digitized by Google

Schwanzspitze weißlich; das Nest besteht aus gallertartiger Substanz, ist weißlich blätterig, wahrscheinlich aus dem Rogen gewisser Fische bestehend, oder aus einer Masse, welche auf der Oberfläche des Meeres schwimmt. Da man diesen Nestern eine stärkende Kraft zuschreibt, so sind sie ein kostbarer Handelsartikel mit China. Sie werden wie Schwämme gekocht.

Nachtschwalben. Caprimulgus. Linn.

Sie haben ein ähnliches, weiches Gefieder, und eben so grau und braun gemischt wie andere nächtliche Vögel; große Augen, der Schnabel noch mehr gespalten, als bey den Schwalben mit Bartborsten versehen, so daß sie große Insekten verschlucken können, welche in dem klebrigen Munde stecken bleiben; an der Schnabelwurzel stehen die röhrenförmigen Nasenlöcher; die Flügel sind lang, der Schwanz nicht gegabelt, die kurzen Füße bis auf die Zehen befiedert, die Zehen an ihrer Wurzel durch eine kurze Haut verwachsen; selbst der Daum verbindet sich so mit der innern Zehe und kann sich vorwärts richten, er hat nur vier Glieder, welches selten vorkommt. Die Nachtschwalben leben einsam, fliegen nur während der Dämmerung oder in mondhellen Nächten, verfolgen Nachtschmetterlinge und andere Insekten, nisten auf die Erde, und legen ohne künstliches Nest eine kleine Zahl Eier. Die Luft, welche sie im Fluge einathmen, macht in ihrem breiten Schnabel ein sonderbares Gesumme.

Digitized by Google

Es giebt zwey Arten in Europa.

Punktirte Nachtschwalbe. Caprim. punctatus. Meyer.

Caprim. europaeus. Linn. Naum. I. 44. F. 101.

So groß wie eine Droſſel, graubraun gewellt und braun getüpfelt; vom Schnabel bis zum Nacken geht ein weißlicher Streifen. Schwanz aſchgraulich, mit dunkelbraunen Querbinden und ſchwarzen Flecken. In Waldungen, welche lichte Stellen haben, niſtet auf der Erde und legt zwey ſchmutzig weiße mit aſchgrauen und hellbraunen Flecken beſtreute Eier.

Rothhälſige Nachtſchwalbe. Caprim. ruficollis. Temm.

Kopf, Rücken und Flügel hellgrau, mit kleinen ſchwarzen Punkten und Zikzaks; über den Scheitel laufen zwey ſchwarze Streifen; am Nacken iſt ein breites, roſtrothes Halsband, vorn am Halſe wird es weiß. Der Unterleib iſt ganz, wie bey der gemeinen Nachtſchwalbe, aber die rothhälſige iſt größer. Bey Algeſiras in Spanien von Herr Natterer entdeckt, wahrſcheinlich auch in Afrika.

In Amerika giebt es mehrere Arten, eine Art iſt ſo groß wie ein Uhu. Caprimulg. grandis. enl. 325. — Ferner, Caprim. virginianus. Edw. 63. — nahe verwandt mit Caprim. Guyanensis enl. 733. — Caprim. Carolinensis. Catesb. 8. nahe verwandt mit dem unſrigen. — Caprim. Jamaicensis. Lath. — C. rufus. enl. 735. — Capr. semitorquatus enl. 734. — C. cayennensis. enl. 760. — C. acutus. enl. 752.

Digitized by Google

Auch in Afrika finden sich Nachtschwalben, deren gegabelter Schwanz sie noch mehr den Tagschwalben nähert, der Nagel der Mittelzehe ist nicht gezähnelt, Vieillot bildet daraus seine Gattung Nyctibius. Dahin gehören: Caprimulgus furcatus. Cuv. Vail. Afr. 47. und Cap. pectoralis ib. 49.

Eine Art ebenfalls in Afrika einheimisch, aber mit abgerundetem Schwanz, ist sehr merkwürdig durch eine Feder, welche doppelt so lang als der Körper ist, und beym letzten Flügelgelenk wächst, sie hat keinen Bart, als fast an ihrem Ende, Caprim. longipennis Shaw. Natur. miscell. 265.

Dritte Familie der Singvögel,

Kegelschnäbler.

Enthält die Gattungen mit starkem Schnabel, der mehr oder weniger kegelförmig und ohne Zahn ist; sie leben um so mehr von Körnern, als ihr Schnabel stark und dick ist.

Lerchen. Alauda. Linn.

Der Nagel der Hinterzehe ist ganz gerade, stark und viel länger als die andern *). Es sind körnerfressende Vögel, welche sich gerne im Sand baden, und auf der Erde nisten, und leben, doch fressen sie auch Insekten.

*) Dieser Charakter findet sich mehr oder weniger bey den Bachstelzen, Lerchen, Piepern und Schneeammern.

Die meiſten Arten haben einen geraden, mittelmäßig dicken und zugeſpitzten Schnabel.

Feldlerchen. Al. arvensis. Linn.

Naum. II. 6. F. 6.

Gefieder oben hellbraun, dunkler gefleckt, unten weißgelb, an der Bruſt mit dunkelbraunen Längsflecken. Die bey den äußern Schwanzfedern an der äußern Fahne weiß. Allenthalben auf Feldern und Wieſen, bekannt durch den ſchönen Geſang, welchen ſie im Fluge hören läßt, und beliebt als Leckerbiſſen im Herbſt.

Haubenlerche. Alauda. cristata. Linn.

Naum. II. 7. F. 8.

Von der Farbe der Feldlerche, mit einem ſpitzigen Federbuſch auf dem Kopf, die Schwanzfedern ſchwarz, die äußern nach außen roſtgelb. Im nördlichen Deutſchland, in Gebüſchen, die an Felder gränzen.

Baumlerche. Alaud. nemorosa.

Al. arborea. Linn. Naum. II. 6. F. 7.

Kopf mit einem weißlichen Kranze, von einem Auge zum andern umgeben; auf den roſtbraunen Wangen vorn ein dreieckiger, weißer, deutlicher Fleck. Der Schwanz kurz. In Feldhölzern und Gebüſchen, ſitzt auf Bäume, und ſingt ſehr angenehm.

Digitized by Google

Berglerche. Alaud. alpestris.

Enl. 650.

Kehle und Hals gelb; quer über den obern Theil der Bruſt ein ſchwarzes, breites Band; die äußerſte Schwanzfeder mit einem keilförmigen, weißen Fleck, der die ganze äußere Fahne einnimmt; die übrigen mit einer ſchmalen, weißen Spitzeneinfaſſung. Im Norden von Europa und in Sibirien, ſelten in Deutſchland.

Kurzzehige Lerche. Alaud. brachidactyla *).

Lerchenfärbig, der Bauch weiß, mit wenigen undeutlichen Flecken an der Bruſt. Der Schwanz kurz, die beyden äußerſten Federn gelb. Die Zehen kurz, der Nagel an der Hinterzehe ebenfalls kurz. Im wärmern Europa.

Bey andern Lerchen iſt der Schnabel ſo dick, daß man ſie an die Finken anreihen kann.

Kalanderlerche. Al. Calandra. Linn.

Enl. 363, 2.

Die größte europäiſche Art, oben lerchenfärbig, Kehle und Bauch weiß, an der Bruſt des Männchens ein großer, ſchwarzer Fleck. Im wärmern Europa und den Steppen von Aſien **).

---

*) Wahrſcheinlich Alaud. italica. Unter die europäiſchen Lerchen dieſer Abtheilung rechnet Cuvier annoch Alaud. undulata. enl. 662. aus der Provence, welche Temmink für eine Varietät der cristata hält. Ferner Vaillants bateleuse O. d'Afr. 194. Le dos roux. ib. 197. La calotte rousse. ib. 198.

**) Hieher gehört Vaillants dickſchnäblige Lerche, Vail. Afr. 193.

Digitized by Google

Tartariſche Lerche. Alaud. tartarica. Gm.

Alaud. mutabilis, Tanagra sibirica. Gm. Mus. Carls. pl. XIX.

Schnabel ſehr dick. Kopf, Hals, Unterleib, Flügel und Schwanz tief ſchwarz. Federn des Unterhalſes, Bürzels und Seiten in der Mitte ſchwarz, weißlich kantirt. Schnabel gelb, an der Spitze ſchwarz, Füße und Klauen ſchwarz, der Nagel der Hinterzehe ſehr ſchmal und länger, als die Zehe; der Schwanz etwas gabelförmig. Beym Weibchen iſt alles heller, die Stirne grau, an Hals, Gurgel und Bruſt feine, graue Querſtriche.

In Aſien und einigen Provinzen des europäiſchen Rußlands, in kleinen Truppen.

Sporner. Alaud. calcarata. Cuv. *).

Fringilla calcarata et lapponica. Emberiza calcarata. Temm. Naum. Nachtr. XX. B. F. 41.

Rücken braun mit roſtfarbe vermiſcht, über den Augen ein weißer Strich; an den beyden äußern Schwanzfedern ein weißer, keilförmiger Fleck; das Männchen mit einem ſchwarzen Scheitel, und ſchwarzem Fleck an der Bruſt. Im hohen Norden, kommt zuweilen nach Deutſchland im Winter.

*) Dieſer Vogel wurde bald zu den Finken, bald zu den Ammern gezählt, gehört aber hieher, ſo wie wahrſcheinlich Vaillants Tracal. Afr. pl. 191. Temmink ſetzt den Sporner zu den Ammern.

Digitized by Google

Noch andere Lerchen haben einen etwas verlängerten, zusammengedrückten und gebogenen Schnabel, wodurch sie sich den Weidehopfen nähern, darunter gehört

Der Sirli. Al. africana. Gm. enl. 712.

Fast wie unsere Lerchen in der Farbe. Sehr gemein durch ganz Afrika in den Sandebenen.

Meisen. Parus. Linn. (Mesanges).

Der Schnabel ist dünn, kurz, kegelförmig, gerade, an der Wurzel mit Haaren versehen, die Nasenlöcher mit Federn bedeckt. Die Meisen sind kleine, lebhafte, kecke Vögel, welche ohne Ruhe an den Baumzweigen herumfliegen, klettern, sich aufhängen, Saamen und Insekten in gleicher Menge genießen, selbst kleine Vögel nicht schonen. Sie machen sich kleine Saamenvorräthe, nisten in hohlen Bäumen, oder bauen sich sehr künstliche Nester, vermehren sich sehr stark, und legen mehr Eier, als alle andere Singvögel. In Europa sind folgende Arten.

Die große Kohlmeise. Par. major. Linn.
Naum. I. 23. F. 42.

Oben olivengrün, unten gelb Kopf und ein Längsstreif über den Unterleib schwarz, auf den Backen ein dreieckiger, reinweißer Fleck. Sehr gemein in Baumgärten und Gärten von ganz Europa.

Tannenmeise. Par. ater. Linn.
Naum. I. 24. F. 46.

Kleiner als die vorige, statt dem olivengrün ist sie grau, und statt gelb, weißlich. In Tannenwäldern.

Sumpf-

Sumpfmeise. Par. palustris. Linn.

Naum. I. 23. F. 44.

Oben grau, unten weißlich, Scheitel schwarz. In Gebüschen, vorzüglich in sumpfigen Gegenden.

Blaumeise. Parus caeruleus. Linn.

Naum. I. 23. F. 43.

Oben olivengrün, unten gelblich, Scheitel blau, Backen weiß, schwärzlich umfaßt, Stirn weiß. Häufig in kleinern Laubhölzern und Gärten.

Dunkle Meise. Par. lugubris. Natt.

Von der Größe der Kohlmeise. Das Schwarze des Kopfs ist braun und geht nicht über den Kopf hinaus, Kehle, Vorderhals und Seiten des Halses schwarz. Nacken und Rücken braungrau. Flügel und Schwanz grau, weißlich gesäumt. Schläfen und alle untern Theile weiß, graubräunlich überlaufen. In Dalmatien.

Sibirische Meise. Par. Sibiricus. Gmel. Enl. 708.

Oberleib graurothlich, auf Kopf und Nacken dunkler; Kehle, Vorderhals und Oberbrust schwarz, Schläfen, Halsseiten und Unterbrust weiß, am Bauche etwas graulich; Flügel und Schwanz braungrau, letzterer lang und keilförmig, an der Spitze graurothlich. Im nördlichsten Europa und Asien, auch in einigen russischen Provinzen.

Lasurmeise. Par. cyanus. Linn.

Naum. Nachtr. XX. 3. F. 42. Parus Saebyensis. Mus. Carls.

Schnabel stark; Stirn und Unterleib weiß; Hinterhals mit einem dunkelblauen Bande; Oberleib hellblau, Schwanz keilförmig. Im nördlichen Europa und Sibirien, zuweilen in Deutschland.

Hauben-Meise. Par. cristatus. Linn.

Naum. I. 24. F. 45.

Mit einem zugespitzten weiß und schwarzen Federbusch auf dem Scheitel; Oberleib weißgrau, Bauch weiß, um den Hals ein schwarzer Ring. In Nadelwäldern, besonders im nördlichen Europa.

Schwanzmeise. Par. caudatus.

Naum. I. 24. F. 47 und 48.

Schnabel sehr kurz, Schwanz keilförmig, sehr lang; Scheitel weiß, Oberleib schwarz, weiß und roth gemischt. In Feldhölzern *).

Bartmeisen. Mystacini.

Unterscheiden sich von den wahren Meisen dadurch, daß die obere Kinnlade etwas über die untere übergebogen ist. Man kennt nur eine Art.

---

*) Dahin gehören: Par. atricapillus. Briss. III. pl. 29. F. 1. und eine andere Par. palustris. enl. 502. 1. alle sehr nahe verwandte Arten. Par. malabaricus Sonner. 2. voy. pl. 110. 1. et coccineus Mus. Carlson. 48. 49. sind Steinschmätzer oder Fliegenfänger mit Vaillants oranor., Mot. ruticilla Linn. et turdus speciosus. Lath. verwandt.

Digitized by Google

Die Bartmeiſe. Par. biarmicus. Linn.

Naum. Nachtr. II. F. 3. 4. La moustache.

Rothgelb, der Kopf des Männchens aſchgrau, mit einem ſchwarzen Streif, der das Auge umgiebt, und ſich in einen hervorſtehenden, hinterwärts liegenden Schnurrbart verlängert. Lebt mehr in nördlichen Gegenden, baut im dickſten Schilf ein künſtliches Neſt; nährt ſich von Rohrſaamen und Waſſerinſekten.

Beutelmeiſen. Pendulini.

Der Schnabel iſt dünner und ſpitziger als bey den gemeinen Meiſen, ſie bauen ſehr künſtliche, beutelförmige Neſter. Nur eine Art.

Die Beutelmeiſe. Par. pendulinus, Linn.

Le Remiz. Naum. Nachtr. III. F. 5. 6.

Graulich, Flügel und Schwanz braun; an der Stirne eine ſchwarze Binde, welche am Männchen hinter das Auge läuft. Dieſer kleine Vogel bewohnt den Oſten und Süden von Europa, und iſt durch ſein äußerſt künſtliches Sack- oder Beutelförmiges Neſt bekannt, welches er mit großer Sorgfalt an Weiden und Pappeln aufhängt, und aus der Wolle dieſer Pflanzen webt, innerlich aber mit Federn ausfüttert *).

*) Par. Narbonnensis. enl. 708. iſt das Weibchen. Hieher gehört die capiſche Meiſe, Par. capensis. Sonn. 2. Vay. pl. 112., deren Neſt aus Baumwolle in Form einer Flaſche gewoben iſt, am Hals dieſer Flaſche iſt eine Art von napfförmigem Anhang, in welchem das Männchen ſitzt.

Ammer. Emberiza. Linn. Bruants. Cuv.

Der Gattungscharakter ist sehr bestimmt in ihrem kurzen, kegelförmigen, geraden Schnabel, die obere Kinnlade ist schmäler und schließt in die untere, am Gaumen ist ein vorspringender, harter Höcker. Es sind Vögel, welche ganz von Körnern leben; ihre intellectuellen Fähigkeiten sind eben nicht groß, sie lassen sich leicht in mancherlei Schlingen fangen. Der Gesang ist nicht sehr bedeutend, das Fleisch ist dagegen sehr angenehm.

Goldammer. Emb. citrinella. Linn.

Naum. I. 11. F. 26. 27. Enl. 30. 1. Bruant. commun.

Mit rothgelbem, schwärzlich gefleckten Rücken, Kopf und Unterleib schön gelb, Brust und Seiten rostfarb gefleckt; die beyden äußersten Schwanzfedern am innern Rande weiß. Lebt in Gebüschen in der Nachbarschaft der Dörfer, so bald Schnee fällt, zieht sie in großen Schaaren in Dörfer und Städte. Nistet in Zäunen und Gebüschen.

Zippammer. Emb. cia. Linn.

Enl. 30. 2. Bruant fou. Em. lotharingica. enl. 511.

Oberleib rothgelb, schwarz gefleckt, Wangen, Kehle und Hals grau, durch die Augen ein schwarzer Streif, welcher mit einem andern vom Schnabelwinkel kommenden, ein Dreieck bildet. Unterleib und Brust rostroth. Mehr im wärmern Europa, besonders häufig in Italien

und Spanien, selten in Deutschland und dem nördlichen Frankreich.

Zaunammer. Emb. cirlus. Linn.

Emb. Eleathorax. Bechst. Enl. 653. Bruant des haies.

Kopf schwärzlichgrau, Backen und Unterhals gelb, ein Streif durch die Augen und Gurgel schwarz, Oberleib fuchsroth, dunkler gefleckt, Brust rostfarb, Unterleib gelb. Ebenfalls mehr im südlichen Europa, in Zäunen und Gebüschen.

Rohrammer. Emb. shoeniclus. Linn.

Bruant de roseaux. Naum. I. 12. F. 28. 29. enl. 247. 2.

Kopf, Hals, Backen und Brust schwarz, am Schnabelwinkel ein weißer Fleck. Hinterhals und Unterleib weiß. Rücken und Flügel rostfarb, schwarz gefleckt. Im Schilf und in Weidengebüschen. Emb. passerina ist das Männchen im Winter.

Grauammer. Emb. miliaria. Linn.

Le Proyer. Naum. I. 10. F. 25. Enl. 233.

Graubräunlich, dunkelbraun gefleckt. Nistet im Grase und Getreide. Die größte inländische Art. Im nördlichen und südlichen Europa.

Digitized by Google

Fettammer. Emb. hortulana. Linn.

L'Ortolan. enl. 247. 1. Emb. Melbyensis. Mus. Carl. 1.

Kopf und Hals olivengrün, Gurgel und Kehle gelb, Bruſt olivengrünlich überlaufen, Unterleib gelbroth, Rücken rothbraun, mit dunkelbraunen Flecken. Die beyden äußern Schwanzfedern inwendig weiß.

In großer Menge im mittäglichen Europa, doch auch in Holland, ſelbſt in Schweden, wird häufig gefangen und iſt ſeines delikaten Fleiſches wegen berühmt.

Schneeammer. Emb. nivalis. Linn.

Bruant de neige. Emb. mustelina et montona et glacialis. Naum. Nachtr. 1. F. 2.

Kopf und ganzer Unterleib, Hals- und kleine Deckfedern der Flügel weiß, Rücken und Schwanz ſchwarz, erſterer weißlich und roſtfarb gemiſcht, die äußern Schwanzfedern faſt ganz weiß, die innern weiß gerändert. Im hohen Norden, kommt im Winter nach Deutſchland und wird nur im Alter, reiner weiß.

Schwarzköpfige Ammer. Em. melanocephala. Gmel.

Kopf und Oberhals ſchwarz; Rücken fuchsroth, Unterleib gelb, an den Seiten der Bruſt ins gelbrothe ſpielend. Etwas größer als der Goldammer. Im ſüdlichen Europa in Dalmatien und Unteritalien.

Digitized by Google

Lesbiſche Ammer. Ember. Lesbia. Gmel.

Enl. 656. F. 2. Mitilene de Provence.

Oberleib röthlichgrau, mit großen ſchwarzen Flecken; Stirne, Augenbraunen und Ohrgegend hell roſtroth; an den Seiten des Halſes drey kleine, braunſchwarze Längsſtreifen; Kehle und Unterleib weißlicht; an der Bruſt und Seiten etwas röthlich; der Schwanz ein wenig gegabelt, die beyden äußern Schwanzfedern haben eine weiße Binde. In den höhern Gegenden des ſüdlichen Frankreichs. Dort iſt auch noch eine Art, welche Gavoué heißt, (enl. 656. F. 1.) ſie iſt aber noch nicht gehörig bekannt und ſcheint ſehr ſelten zu ſeyn.

Fichten-Ammer. Emb. Pythyornus. Gmel. *).

Hauptfarbe fuchsroth; Bauch hellgrau; auf dem Kopf ein weißer Längsſtreifen, der auf beyden Seiten durch einen ſchwarzen begränzt wird, an den Wangen und der Bruſt ein dreieckiger, weißer Fleck. Größe des Goldammers. In Sibirien und Aſtrakan, aber auch in Ungarn und Böhmen im Winter.

---

*) Emb. brumalis iſt Fringilla citrinella. — Emb. rubra iſt Fring. erythrocephala. enl. 665. 1. 2. — Die Wittwen gehören nicht hieher. Emb. quadricolor. enl. 101. 2. — Cyanopis. Briss. III. pl. VIII. — coerulea. ib. XIV. (cyanella, M. Carls.) ſind Loxiae. — E. quelca enl. 223. — Capensis enl. 158 et 664. — borbonica enl. 311. 2. — Brasiliensis. 3121. 1. ſind Finken. Emb. ciris enl. 158. und oryzivora. enl. 388. ſind Hänflinge, und viele andere Ammern des Syſtems, gehören nicht dahin.

Digitized by Google

Finken. Fringilla Linn. Moineaux.

Der Schnabel ist kegelförmig, an der Wurzel mehr oder minder dick; der Schluß desselben ist nicht eckig. Sie leben überhaupt von Körnern, und sind im Allgemeinen sehr gefräßig, einige schaden unsern Pflanzungen.

Man kann sie auf folgende Art abtheilen.

Weber. Ploceus. Cuv. et Vieillot. Tisserins.

Der Schnabel ist so groß, daß man diese Vögel den Caziken zugezählt hat, aber der gerade Schluß des Schnabels trennt sie davon, auch ist die Oberkinnlade leicht gewölbt. Man findet diese Vögel in beyden Festländern. Die meisten, welche auf dem alten Festland leben, bauen ihr Nest mit ausserordentlicher Kunst, indem sie Grashalmen und Baumwolle unter einander weben, daher der Name Webervögel.

Philippinischer Weber. Ploc. philippinus. Cuv.

Loxia philippina. Linn. enl. 135. Toucnam courvi.

Gelbbraun gefleckt, Kehle schwarz. Das aufgehängte Nest hat die Gestalt einer Kugel, mit einem vertikalen Gange, der unten offen ist, und seitwärts mit der Höhle zusammenmündet, worin die Jungen sind *).

*) Dahin gehören: Der gelbe Webervogel, Oriol. textor. enl. 375 und 376., aus Afrika. — Fringilla erythrocephala. enl. 655. — Le Tangara du Malimbe. Daud. Ann. du Mus. I. p. 148. pl. X. — Der Baglafecht, Lox. abyssinica. — Der

Einige bauen ihre Neſter in großer Anzahl zuſammen, ſo daß ſie eine große Maſſe mit vielen Abtheilungen bilden. Dahin gehört

Der Republicaner. Ploc. socius.

Lox. socia. Lath. Paterson vay. pl. 16.

Oben braun, olivenfarb, unten gelblich, Kopf und Flügel braun oder ſchwärzlich.

Unter denjenigen des neuen Feſtlandes ſind bemerkenswerth.

Der Reisfreſſer. Ploc. oryzivorus *).

Oriolus niger et oryzivorus. Corvus surinamensis. Gmel. enl. 534. Cassique noir, petit choucas de Surinam. Brown. illust. X.

Verwüſtet in unzählbaren Schaaren die Reisfelder mehrerer Theile von Südamerika. Er iſt ſchwarz, mit herrlichem Schein aller Farben von gebläuetem Stahl.

Nelikurſi, Lox. pensilis. Sonn. 2. Vay. pl. 109. oder Hängneſtkernbeißer, er hängt ſein Neſt an die Zweige der am Waſſer ſtehenden Bäume, es beſteht aus Strohhalmen und Binſen, und bildet oben einen Beutel, in welchem der Vogel ſitzt, und von wo aus eine Röhre nach unten geht. Im zweyten Jahr wird ein neues Neſt an dieſes angebaut und ſo oft fünf bis ſechs.

*) Dieſer Vogel gehört unter die zahlreiche Sippe der ſchwarzen amerikaniſchen Vögel aus der Linneiſchen Gattung Oriolus, oder Cassicus der Neuern. Sie ſind in ihren Arten nirgends gehörig aus einander geſetzt. Die merkwürdigſten

Digitized by Google

Sperlinge. Pyrgita. Cuv. Fringilla. Linn.

Der Schnabel ist kürzer als bey den vorigen, kegelförmig und gegen sein Ende etwas gewölbt *).

---

und bestimmten sind: 1) Der schwarze Cazike. Siehe Cassicus. 2) Der Reisfresser, mit den angegebnen Synonymen, wozu noch kommen, Oriolus ludovicianus. enl. 646. eine Varietät. Petit choucas de la Jamaique. Gracula Barita et quiscala. Pennant. 3) Der wahre, schwarze Heervogel (Xanthornus) mit violettem Glanze, kurzem aber geradem Schnabel enl. 710. als eine Tanagra bonariensis; (der Vogel enl. 606. F. 2. ist nicht sein Weibchen); es ist dieser Heervogel, der linneische Oriol niger. 4) Ein wahrer Cazike von sammetschwarzer Farbe mit Violetglanze, mit spitzigem, etwas gebogenem Schnabel, der seinen Schwanz oben kahnförmig gekrümmt trägt. Linnés gracula quiscala, Pennants boat. tailed Grakle. Catesby. pl. 12., der Schnabel ist nicht gut abgebildet. Endlich 5) ein schwarzer Vogel mit violettem und grünem Glanze, etwas keilförmigem Schwanze, einem Schnabel wie bey den Caziken, aber etwas gegen das Ende gebogen.

*) Auch diese zahlreiche Sippe der Vögel, welche Linne unter den beyden Gattungen Loxia und Fringilla und zum Theil Emberiza begreift, hat in neuern Zeiten mehrere Abänderungen erlitten. Der Uebergang ist so geringe, daß es äußerst schwer hält, darüber etwas zu sagen. Schon Brisson hat sie in mehrere Gattungen getrennt, nehmlich: Cardinalis, Vidua, Linaria, Fringilla, Serinus, Chloris, Bengalus, Senegalus, Maja und Granatinus. — Vieillot theilt die Finken in sechs Gattungen, Loxia, Strobilophaga, Pyrrhula, Coccothraustes, Fringilla, Linaria. Illiger hat dagegen wieder alle unter die Gattungen Fringilla und Loxia getheilt,

Digitized by Google

Haussperling. Fring. domestica. Linn. *).

Naum. 1. 1. F. 1. 2.

Braun, schwärzlich gefleckt oben, unten grau, die Kehle des Männchens schwarz, Scheitel grauröthlich, über die Flügel ein weißer Streif. Schnabel gelblich. Allenthalben durch seine Kühnheit und Gefräßigkeit bekannt.

---

zur letzten Gattung aber zählt er unter den Europäern nur die Creutzschnäbel. Auch Temmink ist dieser Eintheilung gefolgt, und unterscheidet Creutzschnäbel, Loxia, Gimpel, Dickschnäbel, Sperlinge, Finken und Zeisige, letztere alle als Abtheilungen der Gattung Fringilla. Auch Meyer in seiner Beschreibung der Vögel Lief- und Estlands, trennt von den Finken blos den Creutzschnabel unter dem Namen Crucirostra, alle übrigen vereinigt er mit Fringilla. Die Cuvier'sche Eintheilung, folgt im Allgemeinen den Abtheilungen eines Temminks, Meyers und anderer, benennt sie aber anders, als Vieillot. Der Name Pyrgita, welchen er den Sperlingen giebt, stammt aus dem Griechischen und bedeutet einen Hausvogel. A. d. U.

*) Der italienische Sperling Fring. italica, scheint nur eine klimatische Varietät, er unterscheidet sich durch schwarzen Schnabel, kastanienbraunen Scheitel und Hinterhals, Seiten des Halses reinweiß. Das Weibchen ist durchaus nicht verschieden vom Weibchen unsers Sperlings. In Piemont und Italien. Temmink hält ihn für eine eigene Art und nennt ihn Fringilla cisalpina.

Feldsperling. Fring. montana. Linn. *).

Naum. I. 1. F. 3. Le Friquet.

Gewöhnlich mehr entfernt von den Häusern, in Weidengebüschen nahe an Feldern, kleiner als der vorige. Er hat zwei weiße Streifen auf den Flügeln, einen rothbraunen Scheitel und Nacken, Seiten des Halses weiß, mit einem schwarzen Flecken. Kehle am Männchen schwarz. Im Herbst in sehr großen Schaaren; nistet in hohlen Bäumen.

Spanischer Sperling. Fring. hispaniolensis.

Scheitel und Nacken lebhaft dunkelkastanienbraun; Rücken und Mantel schwarz, die Federn gelbröthlich gerändert, Kehle, Vorderhals und ein schmales Band an der Brust schwarz; an den Seiten des Unterleibs lange, schwarze Flecken; Backen, Augenkreis, Mittelbauch und Unterleib reinweiß. Im südlichen Spanien, in Afrika und Ostindien.

Finken. Fringilla.

Der Schnabel ist etwas weniger gebogen, als bey den Sperlingen, etwas länger und stärker als bey den Hänf-

*) Hieher gehören von ausländischen Finken: Fring. arcuata. enl. 230. 1. (ist dort viel zu roth). — Emberiza capensis. enl. 386. 2. und 664. 2. — Tanagra silens. enl. 742. — Fringilla elegans. enl. 203. 1. — Emberiza ciris. enl. 159. — Loxia Oryx. enl. 6. 2. — Loxia dominicana. enl. 55. — und 103. le cardiral dominiquain hupé, de la Louisiane. — Fringilla cristata. enl. 181. — Loxia capensis, dieser nähert sich den Dickschnäblern.

Digitized by Google

lingen, sie sind munterer und singen schöner als die Sperlinge.

Buchfink. Fring. coelebs. Linn.

Naum. I. 2. F. 4. 5.

Oben braun, unten weinroth beym Männchen, graulich beym Weibchen; auf dem Flügel zwey weiße Streifen, auch die Seiten des Schwanzes sind weiß. Sie leben von allen Arten Sämereyen, und nisten auf Bäumen. Das Gesang ist sehr angenehm.

Bergfink. Gägler. Fring. montifringilla. Linn.

Naum. I. 3 F. 6. 7.

Oben schwarz, rothgelb gemischt, Brust rothgelb. Die untere Deckfedern der Flügel schön citrongelb. Das Gesang unbedeutend. Dieser Vogel ist im Norden zu Hause, und kommt nur im Winter und Spätherbst in großen Schaaren zu uns. Er soll auch in einigen Gegenden Deutschlands brüten.

Schneefink. Fring. nivalis. Linn.

Naum. Nachtr. XX. A. F. 38.

Scheitel, Backen und Nacken grau, Rücken und Schultern chocoladebraun. Deckfedern der Flügel, Schwung- und Schwanzfedern reinweiß, die Seitenfedern des Schwanzes mit schwarzer Spitze, die beyden mittlern aber ganz schwarz, Unterleib schmutzigweiß, Kehle schwarz,

Digitized by Google

Füße und Schnabel schwarz, letzterer oft gelb. Auf den höchsten europäischen Alpen, über den Holzregion hinauf, im Winter in den höhern Alpenthälern. Nistet auf Felsen.

Leinfinken und Distelfinken. Carduelis. Cuv.

Der Schnabel kegelförmig, nicht gewölbt. Sie leben von Körnern. Distelfinken nennt man vorzüglich diejenigen, welche einen etwas längern und spitzigen Schnabel haben.

Der Distelfink. Fring. Carduelis. Linn. Chardonnerets.

Naum. I. 5. F. 12.

Oben braun, unten weiß, Brust und Seiten rostfarb, die Gegend um den Schnabel schön roth, über die Flügel ein gelber Streif, der Schwanz schwarz, jede Feder mit einem weißen Fleck an der Spitze. Einer der schönsten europäischen Vögel von angenehmem Gesang, leicht zähmbar und sehr gelehrig. Er frißt hauptsächlich gerne Distelsaamen, und von andern ähnlichen Pflanzen *).

Hänflinge. Leinfinken. Linaria. Cuv. Linottes.

Der Schnabel ist ebenfalls vollkommen kegelförmig aber kürzer und stumpfer. Sie leben auch von Säme-

*) Dahin gehören: Fring. psittacea. Lath. Syn. II. p. 48. — Fring. melba. Edw. 128 et 272. — Fring. coccinea. Vieill. ois. ch. pl. 31.

Digitized by Google

reich verschiedener krautartigen Pflanzen, vorzüglich Hanf und Lein, und lassen sich leicht im Bauer halten.

Die europäischen Arten sind braun, immer mit roth an einigen Theilen des Körpers, was aber besonders bey Jungen und Weibchen wechselt, oder letztern ganz mangelt.

Leinfink. Fring. linaria. Linn.

Naum. I. 6. F. 15. 16.

Oben braun, schwarzbraun gefleckt, Schwung- und Schwanzfedern dunkelbraun; über die Flügel zwei weißgelbe Querstreifen; die Kehle schwarz, Scheitel roth, beym Männchen die Brust rosenroth, zuweilen auch der Bürzel. Im Norden von Europa, wo er auch brütet, im Herbst kommt er in großen Zügen nach Deutschland.

Gelbschnäbliger. Fink. Frig. flavirostris. Linn.

Naum. Nachtr. XX. A. F. 39. Männchen Fring. montium. Temm.

Etwas größer als der Leinfink, der Schnabel gelb; oben rostgelb, dunkelbraun gefleckt, die Kehle rostgelb, eben so die Brust, diese aber dunkelbraun gefleckt, Steiß weiß. Ueber die Flügel ein gelblicher Streifen. Der Schwanz länger als am Leinfinken, schwarz, jede Feder an der innern Seite weiß gerändert. Der Scheitel nicht roth, sondern beym Männchen blos der Bürzel schwach rosenroth, beym Weibchen nicht. Im hohen Norden, kommt im Herbst seltener nach Deutschland, häufig nach Holland *).

*) Dieser Vogel ist bestimmt eine eigene Art, er singt sehr

Hänfling. Fring. Canabina. Linn.

Naum. I. 5. F. 10. 11.

Männchen, Stirn und Scheitel roth, Nacken und Hinterhals aschgrau, Kehle und Vorderhals weiß, mit graubräunlichen Längsflecken. Unterbrust karminroth, Rücken und Seiten des Unterleibs braunroth, Flügel und Schwanz schwarz, auf den Flügeln ein weißer Fleck, die Schwanzfedern am innern Rand weiß. Am Weibchen nichts rothes, es gleicht ganz den Weibchen des vorigen, nur zieht es weniger ins rostfarbe, der Unterleib ist weißlicher, und der Kopf mehr grau. Nistet oft in Weinbergen, aber auch in Gebüschen und Hecken.

Andere Arten sind mehr oder weniger grünlich und heißen Zeisige.

Zeisig. Fring. Spinus. Linn.

Naum. I. 6. F. 13. 14.

Der Schnabel nähert sich dem Distelfinken, ja selbst dem des Leinfinken. Scheitel am Männchen schwarz. Schwung- und Schwanzfedern schwarz, erstere in der Mitte, letztere an der Wurzel gelb; Oberleib zeisiggrün, Unterleib gelb. Im Norden von Europa, im Herbst in großen Schaaren in ganz Deutschland. Nistet in Norden an den äußersten Spitzen hoher Fichtenzweige.

Citro-

---

angenehm und ganz verschieden vom Leinfinken und Hanffinken.

Citronenfink. Fring. citrinella. Linn.

Enl. 658 2. Venturon de Provence. Emberiza brumalis. Scopoli.

Männchen, Kopf und Hals aschgrau, Stirn, Gegend um die Augen und ganzer Unterleib schön gelbgrün. Oberleib zeisiggrün, graulich überlaufen, Schwung- und Schwanzfedern schwarz, grün gerändelt. Am Weibchen der Unterleib mehr grau. Im Sommer in den Tannenwäldern der Alpen, nistet auf Tannen und unter den Dächern der Sennhütten. Im Herbst wandert er nach südlichern Gegenden. Der Schnabel gleicht dem des Hänflings.

Girlitz. Fring. Serinus. Gmel.

Enl. 658. Le Cini.

Grüngelb, der Oberleib schwärzlich und rothgrau gefleckt; über die Flügel eine gelbgrüne und röthlichgelbe Binde; das Männchen am Unterleib hoch grüngelb, das Weibchen blässer und dunkelbraun gefleckt. In Obstgärten an Bächen und Flüssen, doch nicht allenthalben gemein. Nistet besonders gerne auf Obstbäume. Zieht weg.

Canarienzeisig. Frin. canaria.

Enl. 202. 1. Serin de Canarie.

Seine Farbe im ursprünglichen Zustand soll grün seyn in der Gefangenschaft ist er meist gelb. Eigentlich stammt er von den canarischen Inseln, wird aber bekanntlich seines Gesangs und seiner Artigkeit wegen allenthal-

ben in Europa gezogen, und begattet sich mit fast allen Arten Finken, woraus fruchtbare, verschieden gefärbte Bastarde entstehen *).

Wittwen. Vidua. Cuv.

Afrikanische und ostindische Vögel mit Schnäbeln gleiche denen der Hänflinge, an der Wurzel etwas aufgeblasen; einige von ihnen haben zur Begattungszeit die obern Deckfedern des Schwanzes ungemein verlängert. Linneus zählte sie den Ammern bey.

Paradies-Wittwen. Vid. paradisea **).

Emb. paradisea. enl. 194.

Oberleib, Kehle und Vorderhals schwarz, ein breites Halsband und Brust rostgelb, letztere fast kastanienbraun,

---

*) Dahin gehören unter den ausländischen Finken, Fring. lepida. — Fring. tristis. enl. 202. 2. Fring. nitens. enl. 291. Fring. senegala. — Fring. amandava. enl. 115. 2. 3. — Fring. bengalus. — Fring. angolensis. enl. 115. 1. und mehrere Arten von Vieillot in seinem Werke über die Singvögel der warmen Länder beschrieben. Auch die Emberiza oryzivora gehört ihres Schnabels wegen hierher, ob schon die starken und spitzigen Schwanzfedern sie auszeichnen.

**) Emberiza regia. enl. 8. 1. 2. — Emb. serena. ib. 2. — panayensis. enl. 647. — Emb. longicauda. enl. 625. — Emb. principalis und Ember. Vidua. Edw. 270. und Aldrov. Ornith. II. 585. sind wahrscheinlich ein Vogel in verschiedenem Gefieder, Emb. psittacea. Seb. pl. 66. F. 5. ist nicht zu bestimmen. Emb. angolensis. Salern. Ornith. 277; la veuve

Unterleib weißlich roſtgelb. Deckfedern des Schwanzes, die einen ſehr breit, faſt eiförmig, die Schäfte laufen über die Spitze über ein Zoll lang nackt weg, die übrigen ſehr lang, dreimal ſo lang als der Vogel, alle mit vertieften Querbändern. In Afrika. Hat nur zur Begattungszeit den langen Schwanz.

Kernbeißer, Dickſchnäbel. Coccothraustes. Cuv.

Der Schnabel iſt ganz kegelförmig, und zeichnet ſich nur durch ſeine Größe aus. *).

---

chrysoptère Vieillot. ois. chant. pl. 41. et Loxia macroura. enl. 183. 1. (wahrſcheinlich derſelbe Vogel) ſind keine Wittwen, ſondern Dickſchnäbel.

*) Einen faſt unmerklichen Uebergang von den Hänflingen zu den Dickſchnäbeln, machen mit immer größer werdendem Schnabel: Loxia quadricolor (Ember. Linn.) enl. 101. 2. — L. sanguinirostris. enl. 183. 2. — L. molucca. enl. 139. 2. — Lox. punctulata. 139. 1. — L. maja. enl. 109. 1. — L. striata. enl. 153. 1. — L. malacca enl. 139. 3. — L. astrild. enl. 157. 2. — L. oryzivora. enl. 152. 1. — L. brasiliana. enl. 309. 1. — L. ludoviciana. enl. 153. 2. — L. petronia. enl. 225. L. chloris. enl. 134. — L. caerulea. — L. cardinalis. enl. 57. — L. melanura. Sehr leicht laſſen ſich hier einſchalten die ſchönen Arten, welche Vieillot in dem ſchon angeführten Werke über die Sänger der heißen Länder beſchreibt.

Kirschkernbeißer. Fring. Coccothraustes.

Loxia coccothraustes Linn. Naum. I. 7. F. 17. 18.

Kopf und Wangen hell kastanienbraun oder rothgelb, Zügel und Gurgel schwarz, am Hinterhalse ein graues Halsband, Rücken und Schwanz dunkelbraunröthlich, Unterleib hellbraunröthlich, Flügel schwarz, über dieselben ein weißer Streif. Schnabel sehr groß und stark, so daß er Kirschkerne, seine Lieblingsnahrung, damit leicht aufbeißt. Lebt in Bergwaldungen, nistet auf Buchen und Fruchtbäumen, und frißt alle Arten Beerkernen, Mandeln und Bucheckern.

Grüner Kernbeißer. Fring. chloris.

Loxia chloris. Naum. I. 4. F. 8. 9.

Graulich olivengrün, Bürzel, Steiß, Schwanzwurzel und äußerer Rand der Schwungfedern gelb, Schwanz und Flügel schwärzlich. Lebt in kleinen Gehölzen und Zaungebüschen und nährt sich von allerhand Sämereien.

Grauer Kernbeißer. Fring. petronia. Linn.

Naum. Nachtr. I. F. 1.

Dieser Vogel, welchen man sonst unter die Sperlinge zählt, gehört seines dicken Schnabels wegen, eher unter die Kernbeißer. Er hat die Farbe des Haussperlingsweibchens, aber an der Kehle einen gelben Fleck, und über die Augen einen deutlichern, weißlichten Streif. In Deutschland und Italien.

Digitized by Google

Karminkopfiger Kernbeißer. Fring. erythrina. Meyer.

Loxia erythrina. Fringilla flammea. Retz. Flammenfink. Naum. Nachtr. XX. B. F. 40. Meyer. Vögel, Liefs und Estlands Titelkupfer,

Scheitel, Kehle, Oberbruft und Bürzel lebhaft karminroth; Rücken und Flügel grau, mit rosenrothem Anstrich. Bauch- und Afterfedern weißlich. Das Weibchen hat nichts rothes, der Oberleib ist grau, bräunlich überlaufen, der Unterleib schmutzig weiß, mit hellgrauen Längsflecken. Im nördlichen Deutschland, Est- und Liefland, auf den dänischen Inseln, und noch tiefer nördlich.

Rosenfink. Fring. rosea. Pall.

Pyrrhula rosea Temm.

Stirn und Kehle glänzend silberfarben; Kopf, Nacken, Schultern, Bürzel lebhaft karmoisinroth, Rücken schwarz, karmoisinroth gerändert; über die Flügeln zwey hellrosenrothe Streifen, die Flügel dunkelbraun; die Deckfedern der Flügel schmutzig weiß gerändert; Schwanzfedern braun, karmoisinroth gesäumt; Unterleib hell rosenroth. In Sibirien, im Winter im östlichen Europa, zuweilen in Ungarn.

Von den Kernbeißern sind ebenfalls zu trennen, einige ausländische Arten.

Dickschnäbel mit zusammengedrücktem Schnabel. Pytilus. Cuv.

Der Schnabel groß und dick, etwas zusammengedrückt, mit etwas gebogener Firste, zuweilen mit einem vor-

Digitized by Google

ſpringenden Winkel, an der Mitte des Randes der Oberkinnlade.

Großſchnäbliger Dickſchnabel. Pytilus grossus.

Loxia grossa. Linn. Enl. 154.

Schnabel oben mit einem Ausſchnitt und roth; Hauptfarbe blau. Kehle und Gurgel ſchwarz, in der Mitte mit einem weißen Fleck *).

Gimpel. Pyrrhula. Cuv.

Der Schnabel iſt abgerundet, aufgeblaſen, und allenthalben gewölbt.

Gemeiner Gimpel. Pyrrh. vulgaris. Linn. **). Naum. I. 4. F. 19. 20.

Oben aſchgrau, unten menigroth, Scheitel ſchwarz. Das Weibchen iſt rothgrau, ſtatt roth am Unterleib. In kleinen Gehölzen, nahe an Straßen, niſtet auf verſchiedene Bäume. Iſt bekannt wegen ſeiner leichten Zähmung, und der Gelehrigkeit, womit er fremden Geſang nachahmen lernt, er lernt ſogar ſprechen. Es giebt zuweilen viel größere Gimpel, als die gewöhnlichen.

---

*) Dahin gehören ferner: Lox. canadensis. enl. 152. 2. — Lox. erythromelas. Lath. 11. pl. 47. — L. portoricensis. Daud. Orn. 11. pl. 29.

**) Es gehören zu den Gimpeln: Lox. lineola. enl. 319. 1. — Lox. minuta. ib. 2. — L. collaris. enl. 393. 3.

Langschwänziger Gimpel. Pyrh. sibirica. Pallas.

Fring. longi cauda. Temm.

Um den Schnabel ein Kreis von hochrothen Federn; die Federn des Kopfs, der Gurgel und des Halses spitzig, hell rosenfarbig und sehr glänzend. Brust und Bauch karmoisinroth; die kleinen Deckfedern der Flügel weiß; die mittlern mit einem weißen Endfleck; die Schwungfedern schwarz, weiß gesäumt; die äußern Schwanzfedern weiß, mit schwarzen Schäften, die andern schwarz, rosenfarb gesäumt. Schwanz viereckig und drei Zoll lang. Sehr häufig in Sibirien, aber auch im Winter in den südlichen Provinzen Rußlands, und in Ungarn *).

Kreuzschnäbel. Loxia. Brist.

Der Schnabel zusammengedrückt, und beyde Kinnladen, so gebogen, daß ihre Spitzen sich kreuzen, bald auf diese, bald auf jene Seite. Dieser sonderbare Bau dient ihnen die Tannzapfenschuppen abzureißen, um die Saamen zu erhalten.

Kleinschnäbliger Kreuzschnabel. Lox. curvirostra. Linn.

Naum. I. 9. F. 21. 22. 23. Taf. 10. F. 24.

Der Schnabel kleiner als bey der folgenden Art, beyde Kinnladen etwas gestreckt, so lang als die Mittelzehe, an

*) Temminck zählt unter Pyrrhula: Lox. enucleator. — Fring. rosea. — Erythrina. — Grossa. — Erythromelas — Angolensis — Mysia — Lineola — Minuta und mehrere neue Arten.

der Spitze kreuzweise von einander hingebogen, die untere über den Rücken der obern hinausreichend. Die Farbe zeisiggrün, das einjährige Männchen zinnoberroth. In Fichten- und Tannenwäldern. Nistet oft im Januar und Februar auf Tannen und Fichten.

Großschnäbliger Kreuzschnabel. Lox. pytiopsittacus. Bech.

Naum. Nachtr. Taf. 42. F. 83. 84.

Schnabel sehr stark, kürzer als die Mittelzehe; Unterschnabel stark gewölbt; die Spitzen gekreuzt, ohne daß die untere über den Rücken der obern hinaus geht. Rücken olivengrün, Scheitel, Bürzel und Kehle olivengelb. Das junge Männchen roth, wie beym vorigen. In Deutschland in Kiefernwäldern. Nistet im März auf Kiefern. Sein Gesang ist von dem des vorigen verschieden *).

Von den Gimpeln und Kreuzschnäbeln lassen sich nicht wohl trennen, die Gattung

Hackenkernbeißer. Corythus. Cuv. (Les Durbecs **).

Der Schnabel ist auf allen Seiten gewölbt, an seiner gebogenen Spitze reicht die obere über die untere Kinnlade hervor.

---

*) Dahin gehört: Lox. leucoptera. Gm. aus Nordamerika.

**) Ich habe weder für die Cuviersche Gattung Pytilus noch Corythus einen passenden Namen im Deutschen finden können. Dickschnäbel bezeichnet sie alle. A. d. U.

Digitized by Google

Der Hackenkernbeißer. Lox. Enucleator. Linn.

Naum. Nachträg. XIX. F. 36. 37.

Männchen am ganzen Leibe karmoisinroth; auf den Flügeln eine doppelte, weiße Binde, auf dem Rücken schwärzlich gefleckt, der Schwanz lang, etwas gabelförmig. Das Weibchen ist an Kopf, Hals, Brust, schmutzig pomeranzengelb, das übrige aschgrau. Es ist der größte, europäische Kernbeißer. In den Schwarzwäldern des nördlichen Europa, auch im nördlichen Deutschland, und in Nordamerika und Asien *).

Kegelschnabel. Colius.

Der Schnabel kurz, dick, kegelförmig, etwas zusammengedrückt, die beyden Kinnladen gebogen, ohne sich zu kreuzen. Der Schwanz ist keilförmig, sehr lang; die Hinterzehe kann wie bey den Spyrschwalben nach vorn gedreht werden. Das Gefieder ist zart und seidenartig, und im Allgemeinen ins Graue spielend. Es sind Vögel, welche in Afrika und Indien zu Hause sind, und wie die Papageien klettern, sie leben in Gesellschaft, bauen ihre Nester in einem Gehölz sehr nahe zusammen, schlafen an den Zweigen hängend, den Kopf nach unten gekehrt, hart an einander genähert. Sie nähren sich von Früchten.

---

*) Dahin gehört: Lox. psittacea. Lath. Syn. II. pl. 42. — Loxia flamengo. Mus. Carlson. pl. 17. scheint eine weißlichte Varietät des Hackenkernbeißers. Aus Lox. psittacea besteht Temminks Gattung Psittirostra.

Gelbkehliger Kegelschnäbler. Col. indicus. Lath.

Stirn und Kehle gelb, Zügel und Augenkreise mattroth. Unterleib rothgrau, Oberleib und Schwanz aschgraublau. In Ostindien *).

Man kann füglich hier einreihen.

Die Lappenvögel. Glaucopis. Forst. Callaeas. Bechst.

Der Schnabel ziemlich dick, mittelmäßig lang, die obere Kinnlade gewölbt, an der Schnabelwurzel ein fleischiger Lappen. Eine Art.

Aschgrauer Lappenvogel. Glauc. cinerea. Lath.

Lath. Syn. I. pl. XIV.

Ganz schwärzlich, aschgrau, so groß wie eine Elster, der Schwanz keilförmig. In Neuholland, lebt von Insekten und Beeren, geht wenig auf Bäume. Sein Fleisch ist vortrefflich zu essen.

Ochsenhacker. Buphaga. Briss. Pique Boefs **).

Der Schnabel mittelmäßig lang, anfangs cylindrisch, vor der Spitze aber an beyden Kinnladen aufgeblasen, die

*) Dahin gehören: C. capensis. enl. 282. 1. — Col. senegalensis. enl. 282. 2. C. striatus ist eins mit panayensis. —. C. viridis. — C. coromandeliensis. C. erythropus ist eins mit capensis.

**) Diese Gattung gehört zu Temminks Abtheilung der Omnivoren, so wie Glaucopis.

Digitized by Google

Spitze sehr stumpf. Dieser Bau dient ihnen dazu, die Haut der Ochsen niederzudrücken, so, daß die Larve der Ochsenbremse hervorschlüpft, die darunter sitzt, welche des Vogels Hauptnahrung ausmacht. Nur eine Art.

Afrikanischer Ochsenhacker. Buph. Africana.

Enl. 293. Vaill., Afr. pl. 97.

Kopf, Hals, Rücken und Flügel braunschwärzlich, Unterleib und Bürzel rostgelb, der Schwanz graubräunlich, keilförmig. Der Schnabel an der Wurzel schön gelb, an der Spitze roth.

Cazike. Cassicus. Cuv. *).

Der Schnabel groß, völlig kegelförmig, an der Wurzel dick, dann aber sehr spitz auslaufend; die Nasenlöcher liegen an den Seiten, sind klein und rund. Der Schnabelschluß macht eine gebogene Linie, und bildet einen Winkel, wie beym Staar. Es sind amerikanische Vögel, deren Sitten denen unserer Staare gleichen, sie leben in Schaaren, bauen sich meist sehr künstliche Nester, welche

*) Die Linneische Gattung Pirol Oriolus zerfällt nach Vieillot in die Gattungen Oriolus. Ploceus. Icteria. Pendulinus. Yphantes. Agelaius und Cassicus. Nach Cuvier in die Gattungen Oriolus. Ploceus. Cassicus. Icterus und Xanthornus. — Temminck rechnet zu Icterus, Oriolus cristatus. — Gracula Quiscula et barita. — Oriol. ferrugineus et niger — Americanus — Guianensis — Viridis — Tanagra militaris — Fringilla pecoris — Turdus labradorus — hudsonius et noveboracensis.

Digitized by Google

sie auf einem Baume, sehr nahe zusammen anlegen. Sie leben von Insekten und Körnern, und ihre zahlreichen Flüge schaden sehr viel in angebauten Gegenden.

Man kann sie eintheilen, in

Stirnvögel, Kaziken. Cassicus. (Cassiques).

Die Schnabelwurzel geht über die Stirn weg, und seine Wurzel ist mit einem Halbkreise von Federn umgeben. Der Schnabel ist konisch verlängert, stark und spitzig. Es sind einige große Arten darunter.

Gehaubter Stirnvogel. Cassic. cristatus.

Enl. 344. und 328. Oriolus cristatus. Linn.

Schwarz, mit grünem Glanze, Steiß, Deckfedern des Schwanzes und Bürzel kastanienbraun, der Schwanz keilförmig, die beyden mittlern Schwanzfedern schwarz, die übrigen hochgelb. Am Kopf ein dünner, hängender Federbusch am Männchen. In Brasilien *).

Haufenvögel. Gilbvögel. Icterus. (Troupiales).

Die Schnabelwurzel endigt an der Stirn in ein scharfes Dreyeck, ohne Federnkreis, der Schnabel dünner als bey den Caziken und der ganzen Länge nach etwas gebogen.

---

*) Oriolus hemorrhous. Enl. 482. — Or. persicus. Enl. 184. — Eine schwarze Art mit metallischem Glanze, deren Halsfedern sich zu einem Kragen erheben können. Der große Troupial. Der Azara. Alle aus Südamerika.

Digitized by Google

Domingiſcher Haufenvogel. Ict. dominicensis.

Enl. 5. 2.

Kopf, Rücken, Hals, Flügel und Schwanz ſchwarz, Schultern, Bauch und Bürzel gelb. Auf St. Domingo*).

Horbenvögel. Xanthornus. (Carouges).

Schnabel wie bey den vorigen, aber ganz gerade.

Rothſchultriger Horbenvogel. Xant. phoeniceus.

Enl. 402. Agelajus phoeniceus. Vieill.

Schwarz, die Deckfedern der Flügel an den Achſeln ſcharlachroth, unter denſelben ein ſchmutziggelber Streif. Südamerika **).

---

*) Or. varius. enl. 607. 1. — Or. cayanus. enl 535. 2. — Or. capensis. enl. 607. 2. Or. chrysocephalus. Merr. I. pl. 111. und eine ſchwarze, metalliſch glänzende Art, deren Schwanz jede Form annehmen kann, da die Seitenfedern deſſelben bald mit den andern eine Fläche bilden, bald rückwärts ſtehen, und eine kahnförmige Geſtalt bilden. (Lathams bootſchwänzige Axel, vielleicht Linnés Gr. barita? Alle aus Amerika. Lichtenſtein will dieſe Gattung Quiscala nennen, da dieſe Vögel nicht gelb, ſondern ſchwarz ſind. Er rechnet dazu: Quisc. purpurea (Gracul. Quiscala. Linn.). — Q. fulgida. (vulgaris. Daud. — Navicularis (Grac. Barita). — Saularis. Gracula). — Jamaicensis. (Sturnus jamaicensis Daudin, der dieſe Gattung auch Quiscala nennt).

**) Or. icterus. enl. 532. — Minor et Tanagr. bonariensis. enl. 710. — Le Carouge à tête grise. enl. 606. 1. — O. guya-

Pitpits. Dacnis. Cuv. (Pitpits).

Sind kleine Hordenvögel, ihr Schnabel ist kegelförmig und spitzig. Sie gränzen an die Sänger.

Cayennischer Pitpit. Dacn. cayennensis.

Matacilla cayennensis. Gmel. Enl. 669.

Stirne blau. Oberleib und Schwanz schwarz. Bürzel gelbgrün, Kehle, Brust und Oberbauch blau, Unterbauch und Steiß pomeranzenfarbig. In Cayenne.

Staare. Sturnus. (Etourneaux).

Sie unterscheiden sich von den Hordenvögeln nur durch den an der Spitze niedergedrückten Schnabel *).

---

nensis. Enl. 536. — O. Americanus. Enl. 236. 2. — Leucopterus. Lath. I. Frontispic. — Or. bonana. Enl. 535. 1. — O. Cayennensis. 535. 2. — O. Icterocephalus. Enl. 343. — Mexicanus. Enl. 533. — Xanthornus. Enl. 5. 1. — Baltimore. 506. 1. — Spurius. 506. 2. — Melancholicus. 545.

*) Sturn. Capensis. Enl. 280. (Stur. contra Albin?). — Sturn. militaris. Enl. 113. — St. ludovicianus. Enl. 256. (Alauda magna Catesb. 133.). Sturnus sericeus scheint eher eine Atzel zu seyn. St. caruculatus hingegen, gehört zu den Philedons. Die Arten von Osbeck und Hermandes, sind sehr problematisch; die von Pallas nirgends abgebildet. Die von Daudin angegebenen, sind zum Theil Drosseln oder Philedons, seine Quiscales sind Atzeln oder Cazikes, er hat überhaupt diese schon vorher unbestimmte Gattung noch mehr verwirrt.

Digitized by Google

Gemeiner Staar. Stur. vulgaris.

Naumann I. Taf. 38. Fig. 84.

Oberleib braun, Unterleib schwarz, mit grünem und violettem Glanze, oben gelblich, unten weiß gefleckt. In ganz Europa verbreitet, und fast über die ganze, alte Welt, nährt sich von Insekten und Beeren, fängt die Viehbremsen, findet sich daher häufig auf Viehweiden; fliegt in überaus dichten Schaaren, welche beständig lermen, ist leicht zu zähmen, lernt leicht singen, selbst sprechen. Verläßt uns im Winter. Das Fleisch der Alten schmeckt widrig.

Einfärbiger Staar. Stur. unicolor. Marmora.

Glänzend schwarz, mit leichtem Purpurglanz, ohne alle Flecken. In Sardinien, wandert nicht.

Steigschnabel. Xenops. Illig.

Schnabel kurz, dünn, sehr zusammengedrückt, spitzig, die Spitze nach oben übergebogen, der Unterschnabel schmäler, unten bauchig, die Nasenlöcher seitlich eiförmig, mit einer Haut bedeckt. Die Füße mittelmäßig, die Zehen fast gleich lang, die äußere mit der innern bis zum zweyten Gelenk verbunden, die innern bis zum ersten. Die Nägel stark, zusammengedrückt, gebogen. Flügel mittelmäßig. Der Schwanz keilförmig.

Man kennt nur zwey Arten aus Südamerika, Xen. genibarbis Illig und rutilus Lichtenstein.

Spechtmeise. Sitta.

Der Schnabel ist eckig, spitzig zum durchboren der Baumrinden, wie bey den Spechten, um die unter der Rinde verborgenen Insekten hervorzuziehen; aber ihre Zunge ist nicht wurmförmig, wie bey den Spechten, und ob schon sie wie die Spechte klettern, so ist doch nur eine Zehe nach hinten gerichtet, und diese ist sehr stark, und der Schwanz dient beym Klettern nicht zur Unterstützung des Körpers, wie bey den wahren Klettervögeln.

Die europäische Spechtmeise. Sit. europaea *).

Naum. I. 28. F. 57.

Oberleib aschgrau, durch die Augen ein schwarzer Streif bis zur Schulter. Unterleib röthlich zimmetfarben. In kleinen Gehölzen und Baumgärten.

Die Familie der Raben unterscheidet sich durch kein charakteristisches Zeichen von der Familie der Kegelschnäbler, die dazu gerechneten Vögel haben denselben innern und äußern Bau, nur sind sie größer und stärker, so daß sie sogar kleine Vögel verfolgen können. Der Schnabel ist bey den meisten auf der Seite zusammengedrückt, oder messerförmig. Es gehören zu dieser Familie drei Gattungen, die Raben, die Paradiesvögel und die Racker, welche freilich

*) S. carolinensis. — Jamaicensis. — Pusilla. — Major. — Naevia. — Surinamensis. — Caffra. — Longirostra. — Chrysoptera, sind die bekannten Arten.

freilich von den neuern in mehrere Gattungen getheilt wurden. Temminck nennt sie omnivores.

Raben. Corvus. Linn. (Corbeaux).

Der Schnabel ist stark, an den Seiten mehr oder weniger platt, die Nasenlöcher sind mit harten, vorwärts gerichteten Federn bedeckt. Der Geruch ist bey den meisten sehr entwickelt, sie sind listig und scheu, und haben die Gewohnheit, glänzende Dinge wegzunehmen, und zu verstecken, ob schon sie keinen Gebrauch davon machen können. Die meisten lassen sich leicht zähmen, sind sehr gelehrig und lernen selbst Worte sprechen.

Raben nennt man besonders die größern Arten, deren Schnabel nach Verhältniß stark ist, und deren Oberkinnlade mehr sich biegt. Der Schwanz ist abgerundet. Man heißt sie auch Krähen. Die meisten sind schwarz von Farbe.

Kohlrabe. Corv. Corax. Linn.

Naum. VI. I. 1.

Der größte Vogel dieser Ordnung, noch größer, als der Leyerschwanz. Ganz schwarz, der Schwanz abgerundet, der Rücken der Oberkinnlade nach vorwärts gebogen. Er lebt einsamer als die übrigen Arten, in Gebirgswäldern von ganz Europa. Fliegt leicht und hoch, riecht das Aas auf eine Stunde weit, nährt sich auch von kleinen Thieren, Mäusen, raubt selbst junge Hühner aus den Höfen, genießt aber auch alle Arten Früchte. Nistet auf hohen Bäumen oder in Felsen. Läßt sich leicht zähmen,

Digitized by Google

lernt sprechen. Er scheint über die ganze Erde verbreitet. Ist sehr scheu und vorsichtig.

Die schwarze Krähe. Corv. Corone. Linn.

Naum. IV. 1. F. 2.

Ein Viertheil kleiner als der Rabe, der Schwanz mehr abgestumpft, der Oberschnabel weniger gebogen. Ebenfalls weit verbreitet. Ganz schwarz.

Nebelkrähe. Corv. Cornix. Linn.

Naum. IV. 2. F. 3. 4.

Kopf, Kehle, Brust, Flügel und Schwanz schwarz, das Uebrige aschgrau. Häufiger im Norden von Europa, und besonders längs den Meeresküsten, wo sie von Gewürmen und Weichthieren lebt. Im Winter ziehen die meisten südlicher.

Saatkrähe. Corv. frugilegus. Linn.

Naum. IV. 3. F. 5. 6.

Der Schnabel gerader und spitziger als bey der schwarzen Krähe. Ein Kreis um den Schnabel, ist ohne Federn ausgenommen in der frühern Jugend, wahrscheinlich weil der Vogel oft in der Erde wühlt. Sie ist schwarz, mit Purpurglanz. Lebt wie die beyden vorigen in großer Gesellschaft, nistet auch gesellschaftlich, so daß man oft auf einem Baume zwanzig und mehr Nester antrift. Sie lebt in nördlichen Gegenden, zieht aber im Winter südlicher und nährt sich von Getreide, Früchten, Würmern, Aas.

Digitized by Google

Dohle. Corv. Monedula. Linn.

Naum. IV. 4. Fig. 7.

Schwarz, Hinterhals grau, Augenstern weiß. Von der Größe einer Taube, oft ganz schwarz, nistet in alten Thürmen und Mauern, lebt geselig und gleicht in ihren Sitten den übrigen Krähen. Im Winter ziehen sie in Schaaren immer lärmend umher.

Alle diese Vögel sind geschworne Feinde der Raubvögel und verfolgen sie mit großem Geschrei, ohne ihnen indeß im Allgemeinen etwas anhaben zu können *).

Elstern. Pica. Cuv. (Pies).

Kleiner als die Krähen, die Oberkinnlade mehr gebogen als die untere, der Schwanz lang und keilförmig.

Europäische Elster. C. Pica. Linn.

Naum. IV. 4. F. 8.

Kopf, Hals, Rücken, Flügel und Schwanz schwarz, letzterer ins goldgrüne oder blaue schillernd. Bürzel, Bauch- und Deckfedern der Flügel weiß. Seine Unruhe und sein beständiges Geschrei macht diesen schönen Vogel beschwerlich. Sie lebt in Dörfern und Städten, nistet bald auf die höchsten Bäume, bald auf nieders Gesträuch,

*) Die Dohle beendigt die Familie der eigentlichen Raben, ihre Oberkinnlade ist wenig gebogen. Zu dieser Familie gehören: Corvus Jamaicensis. — Corv. dauuricus. enl. 317., dieselbe mit scapularis. Daud. Vaill. 53. — C. albicollis. Lath. Vaill. 50.

Digitized by Google

nährt sich aus dem Thier- und Pflanzenreich, greift oft selbst junge Hühner auf den Höfen an, und verderbt sehr viele Eier der kleinern Vögel, ist daher sehr schädlich *).

Heher. Garrulus. Cuv. (Geais).

Die Kinnladen sind länger, und die Spitze macht einen schnellen Bug, beyde sind fast gleich lang: wenn der Schwanz keilförmig ist, verlängert er sich wenig, und die Stirnfedern sind seidenartig und weich, und erheben sich im Zorn zu einem Busche.

Eichelheher. Corv. glandarius. Linn. **).

Naum. IV. 5. F. 9.

Graurötblich, Flügel und Schwanz schwarzgrau. Auf den Deckfedern der Flügel ein großer, hellblau dunkelblau und weißlich gestreifter Fleck, die längern Federn auf dem Kopf erheben sich zu einem Busche, sind schmutzig weiß und schwarz, in die Länge gefleckt. Am untern Schnabelwinkel ein schwarzer Streif, die Kehle weiß, alle Federn weich und seidenartig zerschlissen. In ganz Europa, frißt Insekten und Sämereien, besonders Eicheln.

---

*) Dahin gehören: Corv. Senegalensis. enl. 538. — C. ventralis. Sh. Vaill. Afr. 55. — C. peruvianus. enl. 625. — C. cyaneus. Pall. Vaill. Afr. 58. 2. — C. rufus. Vaill. Afr. 59.

**) Corv. cristatus. enl. 529. — C. Stelleri. Vaill. ois. de parad. 48. Corv. canadensis. enl. 530. und eine Varietät. Vaill. 48. — Corv. auritus. Vaill. 43. — Corv. galleri culatus. Cuv. Vaill. 42.

Digitized by Google

Sibiriſcher Heher. Cor. infaustus. Lath.

Yeay imitateur. Corvus sibiricus. enl. 608. Corv. russicus.

Auf dem Kopf ein ſchwärzlicher Federbuſch, die Federn, welche die Naſenlöcher bedecken, und die um die Schnabelwurzel, weiß; das Gefieder am Obertheil des Körpers aſchgraulich; unten rothgrau; die Deckfedern der Flügel, inneres der Flügel, Bürzel, Unterbauch und äußere Schwanzfedern ſchön roſtbraun. In Sibirien, aber auch im Norden von Rußland, in Schweden, Dännemark und Norwegen.

Nußheher. Caryocatactes. Cuv. (Casse. noix).

Die beyden Kinnladen ſind gleichmäßig zugeſpitzt, gerade und ohne Biegung, faſt wie bey den Cazikan.

Gemeiner Nußheher. Corv. Caryocatactes. Linn.

Naumann IV. Taf. 5. F. 10. Caryocatactes nucifraga. Nilsson.

Chocoladebraun, weiß gefleckt; Scheitel braun. Flügel und Schwanz ſchwarz, letzterer mit weißer Endbinde. Steiß weiß. In gebirgichten Wäldern, niſtet in Baumlöchern, klettert geſchickt wie ein Specht, und durchbort die Baumrinde, lebt von allen Arten Früchten, Inſekten und ſelbſt kleinen Vögeln, im Herbſt zieht er in größern oder kleinern Truppen auf den Ebenen umher. Die Liſt und Vorſicht der Rabenarten, mangelt ihm faſt ganz *).

*) Von den übrigen Linneiſchen Raben ſind die meiſten, welche hier nicht angeführt worden, ſchon unter andern Gattungen

Die Temias. Temia. Vaill.

Haben mit dem Körperbau der Raben, und mit eben der Art den Schwanz zu tragen, wie dieſe, einen erhabenen Schnabel, der an ſeiner Wurzel ſammetartige Federn beſitzt, wie bey den Paradiesvögeln. Man kennt nur eine Art.

Goldgrüner Temia. Temm. Vaillanti.

Vaill. ois. d'Afriq. 56.

Grün, mit Goldglanze. In Afrika *).

---

begriffen, C. balicassius; unter den Drongos, C. calvus als Gymnocephalus, C. Novae Guineae et papuensis unter graucalus. — C. speciosus. Sh. iſt eine Coracias. C. flavi ventris ein Tyrannus. C. argyrophtalmus iſt ein Cazike, ſo auch wahrſcheinlich C. mexicanus. — C. hottentottus. enl. 226. wahrſcheinlich ein Tyrannus. C. rufipennis iſt ein Turdus und zwar T. morio. enl. 199. C. brachyurus und grallarius gehören zu Myothera auch cyanurus. — C. caruncula-tus iſt ein Philedon und C. caribaeus ein Merops. — C. Pyrchocorax und Graculus machen eigene Gattungen.

*) Hieher gehört die von Kuhl aufgeſtellte und von Temmink angenommene neue Gattung, Ptilonorhynchus; Schnabel ſtark, hart, an der Wurzel niedergedrückt, gekrümmt, Spitze ausgeſchweift; die untere Kinnlade ſtark, in der Mitte aufgeblaſen; Füße ſtark, die Läufe länger als die Mittelzehe, welche mit der äußern am hinterſten Gelenk verbunden iſt; der Nagel der Hinterzehe ſtark und gebogen. Die Flügel mittelmäßig. Dahin gehören zwey neue Arten aus den Südländern, das Männchen der einen Art iſt ſchwarz, mit ſchönem Violettglanz, das Weibchen olivenfarb. Bey der andern Art iſt Männchen und Weibchen ſchön grün.

Digitized by Google

Die Racken. Coracias. Linn. (Rolliers).

Der Schnabel ist stark, gegen das Ende zusammengedrückt; die Spitze etwas gebogen; die Nasenlöcher ablang, stehen am Rande der Federn, und sind nicht mit solchen bedeckt; die Füße kurz und stark. Es sind Vögel des alten Festlandes, sehr ähnlich den Hehern in ihren Sitten, und durch die weichen Stirnfedern, mit lebhaften aber meist grell abstechenden Farben.

Wahre Racken. Coracias.

Der Schnabel ist gerade, die Oberkinnlade etwas gebogen, an der Spitze gekrümmt und übergebogen, allenthalben höher als breit. Die Zunge knorpelig und gespalten.

Blaue Racke. Corac. garrula. Linn.

Mandelkrähe. Birkheher. Naum. IV. Taf. 6. F. 11.

Kopf, Hals, Bauch und Untertheil des Schwanzes meergrün, Rücken und obere Deckfedern der Flügel leberfarben oder braunrothlich, Achseln dunkelblau, Schwungfedern an der Wurzel meergrün, am Ende schwarz. Schwanz meergrün, die beyden mittlern Federn schwarzblau, die äußersten etwas länger, die übrigen gleich lang. Lebt von Körnern, Insekten, Früchten, jungen Fröschen, ist sehr scheu, obgleich mit seines gleichen gesellig, fliegt sehr schnell, ist fast gar nicht zu zähmen, ausgenommen sehr jung aus dem Neste genommen, nistet in hohlen Bäumen, verläßt Europa im Winter. Dieser Vogel ist

nicht aller Orten in Deutschland zu Hause, in einigen Gegenden häufig, in andern gar nicht.

Einige ausländische Arten haben wie die europäische den Schwanz abgestumpft, allein schon bey diesem sind die äußern Schwanzfedern am Männchen etwas länger, und diese Verlängerung ist sehr bedeutend bey einigen ausländischen Arten. Zu denen ohne Verlängerung gehört: Corac. bengalensis. enl. 285. (derselbe mit indica. Edw.). — Corac. viridis, Vaill. Ois. de parad. I. 31.

Zu denen mit langen Schwanzfedern gehören: Corac. Abyssinica. enl. 626. und Varietät, C. senegala. enl. 326. C. cyanogaster. Vaill. Ois. de parad. 26. *).

Rollen. Colaris. Cuv. Euristomus. Vieillot. (Les Rolles).

Der Schnabel ist kürzer, mehr gebogen, und an der Wurzel breit, so daß er fast weniger hoch, als breit ist.

---

*) Cor. caudata soll nach Cuvier nur eine senegala seyn, mit dem Kopf einer Abyssinica. Außer den langen Schwanzfedern unterscheidet sie sich gar nicht von Garrula. C. Caffra ist Turd. nitens. — C. sinensis. enl. 620. unterscheidet sich von andern durch mehrere Eigenheiten. — Cor. viridis soll nach Shaw ein Eisvogel seyn. — C. strepera et varia gehören zu Barita. — C. militaris und scutata sind Ampelides. — C. mexicana. Seb. I. pl. 64. F. 5. ist ein Heher — und C. cayana. enl. 616. eine Tanagra.

Digitized by Google

Madagascarische Rolle. Col. madagascariensis. enl. 501.

Coracias madagascariensis. Lath. Euristomus purpurascens. Vieill.

Der ganze Obertheil des Körpers ist rothbraun. Die Schwungfedern dunkelblau, der Unterleib purpurviolet, Schwanz viereckig, abgestumpft, grün, mit dunkelblauer Endbinde. Der Schnabel gelb. In Madagascar *).

Minos. Eulabes. Cuv. (Les Mainates).

Der Schnabelbau fast wie bey den vorigen, doch länger und stärker, an der Wurzel schmäler, beyde Kinnladen gleich lang, die Spitze nicht übergebogen. Sammetartige Federn gehen bis zu den Nasenlöchern, wie bey den Paradiesvögeln, dagegen sind einzelne Stellen des Kopfs von Federn entblößt und mit fleischigen Vorragungen versehen.

Der Mino. Eulabes religiosa.

Gracula religiosa. Lath. enl. 668. I.

Von der Größe einer Dohle, schwarz, mit grünem und Violetglanz, Schnabel und ein paar fleischige Auswüchse, welche am Nacken wie eine Art Flügel hervorstehen, auch ein warziger Fleck, unter dem Auge gelb, auf den Flügeln ein weißer Fleck. Der Schwanz viereckig, ab-

*) Coracias orientalis. enl. 619. — Cor. afra. Lath. Vail. ois. de parad. pl. 35.

gestumpft. Dieser Vogel lebt auf Java, frißt Fleisch und Früchte, läßt sich sehr leicht zähmen und lernt die menschliche Sprache vollkommner, als kein anderer Vogel nachahmen *).

Paradiesvögel. Paradisea. Linn.

Sie haben wie die Raben, einen geraden, zusammengedrückten, starken Schnabel, ohne Zähne, bedeckte Nasenlöcher; aber der Einfluß des Klimas, welches sie bewohnen, gab den Federn, welche die Nasenlöcher bedecken, das Ansehen von Sammet, und dem Gefieder einen metallischen Glanz, während eben dieser Einfluß einzelne Theile ihres Gefieders wunderbar entwickelt hat. Sie bewohnen Neu-Guinea und die benachbarten Inseln. Sie sind schwer zu bekommen, da die Bewohner jener Gegenden sehr unkultivirte Menschen sind. Sie bedienen sich ihrer als Zierarten und machen Federbüsche daraus, zu diesem Ende reißen sie ihnen Flügel und Füße ab, daher glaubten die ältern Naturforscher, daß ihnen diese Theile wirklich mangeln, und daß sie wahre Luftvögel seyen, welche durch ihre langen Seitenfedern in der Luft getragen wurden. Allein da man nun ganze Vögel gesehen hat, so ist man von diesem Irrthum längst zurückgekommen, ihre Füße sind im Gegentheil groß und stark, ihre Flügel hingegen klein. Sie gehören in systematischer Hinsicht, gerade nach den Raben. Sie leben von Früchten, und suchen vorzüglich gewürzhafte auf.

---

*) Ueber diese Art siehe die Anmerkung zu Gracula.

Digitized by Google

Bey einigen sind die Federn der Weichen seidenartig zerschlissen und bilden Büsche, länger als der Körper, dadurch wird ihr Flug vom Winde abhängig, so daß sie oft bey stürmischem Wetter vom Winde verschlagen werden. Bey zwey Arten finden sich am Bürzel noch zwey lange Federn ohne Bärte, welche noch über die Weichenfedern sich verlängern.

Der große Paradiesvogel. Par. Apoda. Linn.

Enl. 254. Vaill. ois. de parad. pl. 1. Vieill. ois. de parad. pl. 1.

Von der Größe einer Drossel, kastanienbraun, Kopf und Nacken blaßgelb; Kehle goldgrün, Seitenfedern schmutzig weiß, länger als der Leib, zwey Steißfedern sehr lang und borstenförmig. Molucken.

Kleiner Paradiesvogel. Parad. papuana. Bechst.

Vieill. ois. de parad. pl. 2.

Kastanienbraun, Brust tief rothbraun; Kopf, Oberhals, Oberrücken und Deckfedern der Flügel hellgelb. Kehle glänzendgrün, die langen Seitenfedern weiß, mit hellgelb gemischt; zwey längere Steißfedern. Auf den Inseln Papua und Mixoal.

Rother Paradiesvogel. Parad. rubra.

Vaill. pl. 6. Vieill. pl. 3.

Auf der Stirn ein goldgrüner, getheilter Federbusch; die langen, zerschlissenen Seitenfedern hochroth, die bor-

Digitized by Google

ſtenförmigen Steißfedern ſchwarz. Bruſt, Bauch, Flügel und Schwanz rothbraun. Wo der vorhergehende.

Weißer Paradiesvogel. Parad. alba.

Blumenb. Abb. 96. Vaill. pl. 16. 17. Vieill. pl. 13.

Von den Seitenfedern, welche weiß ſind, gehen zwölf lange Borſtenfedern weit über die andern vor, auf jeder Seite ſechs. Kopf, Hals, Bruſt ſchwarzviolet, auf den Schultern grüne, halbmondförmige Streifen; die Seitenfedern weißgelb, die Borſtenfedern ſchwarz. Auf der Inſel Waygehoe bey Neu-Guinea Es ſcheint, es exiſtiren auch Varietäten mit ganz weißem Körper. Sein Schnabel iſt länger und ſpitziger als bey andern Arten, und etwas gebogen; welches ihn den Wiedehopfen und Epimachen nähert. Die Flügelfedern der erſten Ordnung ſind kurz, und wegen zahlreich als bey andern Vögeln.

Bey den übrigen Paradiesvögeln finden ſich auch noch Borſten und Seitenfedern, aber ſie gehen nicht über den Schwanz aus.

Königsparadiesvogel. Parad. regia. Linn.

Enl. 496. Vaill. 9. Vieill. 5.

Die Größe einer Feldlerche; kaſtanienbraun, ins purpurfarbe ſchillernd; der Bauch weiß, über die rothe Bruſt geht ein grüner, glänzender Querſtreifen. Das Ende der Seitenfedern, und die breiten Enden der zwey langen, am Ende umgekrümmten Borſten goldgrün. In Neu-Guinea.

Digitized by Google

Prächtiger Paradiesvogel. Parad. magnifica. Gmel.

Sonnerat. 98. Enl. 631. Vaill. 9. Vieill. 4.

Hauptfarbe rothbraun; Scheitel braungelb; Halfter schwarz; im Nacken ein gelber Federbusch; Unterleib schwärzlich, ein Längsstreif, an Unterhals und Brust blaugrün. Die zwey mittlern Schwanzfedern fadenförmig, am Ende auf einer Seite mit einem kurzen, grünen Bart. Die Flügel gelb. Der Federbusch am Nacken ist hängend und vertheilt sich über beyde Seiten, bey der Einlenkung der Flügel ist ein dunklerer, kleinerer Busch.

Andere haben auch noch zerschlissene Federn, aber kurze, und am Bürzel keine.

Goldfarbiger Paradiesvogel. Parad. sexsetacea. Shaw.

parad. aurea. Sonnerat, pl. 97. Enl. 633. Vieill. 6. Parotia. Vieill.

Von der Größe einer Amsel, schwarz, an der Gurgel ein goldgrüner Fleck, an jedem Ohr verlängern sich drei Federn in Borsten, an ihrem Ende steht ein goldgrüner Federkreis.

Noch andere haben weder Borsten noch verlängerte Seitenfedern.

Violetkehliger Paradiesvogel. Parad. superba. Gmel.

Sonnerat 96. enl. 632. Vaill. 14. Vieill. 7.

Ganz schwarz, die Seiten der Brust, mit prächtigem, grünem Stahlglanze. Die Schulterfedern sind verlängert

und bilden eine Art von Kragen, welcher die Flügel deckt, die Federn der Bruſt aber bilden eine Art von herabhängendem und gabelförmig auslaufendem Kleide.

Goldgelber Paradiesvogel. Parad. aurea. Shaw.

Oriolus aureus Gmel. Edw. 112. Vaill. 18. Vieill. 11.

Hat durchaus keine außerordentliche Entwicklung des Gefieders, und iſt blos in Hinſicht der ſammetartigen Bedeckungen der Nasllöcher der Paradiesvögeln zuzuzählen. Das Männchen iſt ſehr lebhaft pomeranzenfarbig, die Kehle und die Schwungfedern erſter Ordnung ſind ſchwarz, ſo wie der Schwanz. Das Weibchen iſt braun ſtatt pomeranzenfarbig *). In Indien.

Die vierte Familie ſperlingsartiger Vögel begreift die

Dünnſchnäbligen. Tenuirostres.

Dahin gehören alle übrigen Vögel dieſer erſten Abtheilung; der Schnabel iſt dünne, mehr oder weniger in ſeinem ganzen Umfange gebogen, ohne Zähne. Alle waren ehemals in drei Gattungen enthalten; die Wiedehöpfe, die Baumlaufer und die Colibris. Die letztern machen

*) Zu den Droſſeln gehören: Paradis. Gularis. Lath. — nigra. Gm. Vaill. 20. et 21.; Vieill. 8. 9. und leucoptera. Lath. — Zu Barita gehört Parad. chalyboea. enl. 633. Sonn. 97. Vaill. 23, Vieill. 10. — Parad. cirrhata, Aldrov. 1814 iſt zu verſtümmelt um ihn beſtimmen zu können, und Parad. furcata ſcheint eine unvollkommene Superba.

Digitized by Google

eine leicht kennbare Gattung aus, die andern dagegen gleichen einander im Schnabel und Fußbau, nur der Totalhabitus iſt etwas verſchieden.

Wiedehopfe. Upupa.

Steindohlen. Fregilus. Cuv. (Craves).

Die Naſenlöcher ſind mit vorwärtsſtehenden Federn bedeckt, daher ſie von den meiſten Syſtematikern und zuerſt von Linneus unter die Raben gezählt wurden, denen ſie auch durch Sitten und äußere Geſtalt nahe kommen. Der Schnabel iſt etwas länger als der Kopf.

Europäiſche Steindohle. Freg. graculus. Cuv. *).

Corvus graculus. Linn. enl. 255.

Etwas größer als eine Dohle, ſchwarz, mit ſchwachem Stahlglanz; Schnabel und Füße corallenroth. Die Flügel reichen im Sitzen etwas über das Schwanzende hin. In den höchſten Alpen der Schweiz, der Pyrenäen; ſoll auch in England ſich finden. Niſtet in Felſen und auf Kirchthürmen, lebt weniger geſellig als ähnliche Vögel, gleicht ſonſt der Dohle in ihren Sitten, ſelbſt im Geſchrei, lebt von Inſekten, Würmern, Beeren. Iſt unruhig,

*) Ungeachtet des verſchiednen Schnabelbaues ſollte man weder die Dohlendroſſeln, noch die Steindohlen von den Dohlen trennen, da ſie in Farbe, Lebensart und Sitten dieſen vollkommen gleichen, der Ueberſetzer hat ſie ſehr oft beobachtet.
A. d. U.

Digitized by Google

ſcheu, vorſichtig, fliegt ſchnell, zieht im Winter umher, bey großer Kälte zieht ſie ſüdlicher über das Gebirge *).

Wahre Wiedehöpfe. Upupa. Linn. (Huppes **).

Haben auf dem Kopf einen Federbuſch, beſtehend aus einer doppelten Reihe langer Federn, die durch Muskeln nach Willkühr des Vogels, bald einen hängenden, bald einen aufgerichteten Federbuſch bilden. Der Schnabel verlängert, mäßig gekrümmt, dünne und rundlich, an der Wurzel dreieckig, die Spitze ſtumpf. Die Naſenlöcher an der Wurzel des Schnabels, klein, eirund und offen. Die Füße mittelmäßig lang.

Europäiſcher Wiedehopf. Up. Epops. Linn. Naum. I. 38. Fig. 85.

Kopf, Hals, Bruſt, Federbuſch roſtgelb, die Federn des Buſches mit ſchwarzen Spitzen, Rücken weinröthlich. Deckfedern der Flügel weiß und ſchwarz geſtreift, Schwanz ſchwarz, mit weißer Binde, Unterleib weiß. Lebt von Inſekten, beſonders auf Viehweiden, niſtet in hohlen Bäumen, hat einen ſehr unangenehmen Geruch, und verläßt uns im Winter ***).

Die

*) Bekannt iſt Geßners Cor. Eremita mit dem Federbuſch ein Unding und nichts als unſere Steindohle, dagegen ſcheint Corv. affinis. Lath. eine Steindohle zu ſeyn, und ein ähnlicher, ſchwarzer Vogel findet ſich in Neuholland.

**) Das franzöſiſche Huppe, ahmt ihre Stimme Hup Hup nach.

***) In Afrika lebt eine etwas kleinere, ſonſt unſerm ſehr ähnliche Art, aber doch von ihm verſchieden, er lebt im ſüdli-

Digitized by Google

Die Promerops. Promerops. Briss.

Kein Federbuſch, aber ein langer Schwanz iſt dieſen Vögeln eigen; die Zunge iſt ausdehnbar und gegabelt, ſie leben daher vom Nectar der Blumen, wie die Honigvögel und Colibris.

Der Promerops der Protea. Prom. proteae.

Sucrier du protea. Vaill. Afr. 139. Upupa promerops, Merops Cafer. enl. 637.

Oberleib graubraun, Bruſt gelbröthlich; Bauch braun und weiß geſtreift; Steiß gelb; die ſechs mittlern Schwanzfedern ſehr lang. Größe der Feldlerche, wegen des Schwanzes aber 18 Zoll lang. Am Cap, nährt ſich vorzüglich auch vom Saft der Proteenblumen *).

---

chen Afrika, am Cap und bis nach Congo, man hat ihn Upupa Africana oder minor genennt, der unſrige kommt im Winter auch nach Afrika, aber nur ins nördliche, die übrigen Linneiſchen Wiedehopfen, gehören meiſt den folgenden Gattungen. Verſchieden von jener afrikaniſchen Varietät iſt: Le Promerops marcheur. Largup de Vaill. pl. 9.; dieſes ſind die einzigen bekannten.

*) Temmink rechnet auch die Promerops zu den Epimachen und als Arten Paradisea alba, und Upupa indica. Upupa aurantia ſcheint ein Cassicus. Seb. I. LXVI. 3. Up. mexicana. Seb. I. LXV. 3. iſt wenigſtens nicht aus Mexiko, Upupa paradisea iſt Muscicapa Paradisi. Dagegen gehört: Promerops erythrorhynchus wirklich hieher. Vieill. Promerops. pl. 6. Auch wahrſcheinlich der blaue Promerops, Prom. caeruleus. Vieill. pl. 9., man kennt aber weder ſeine Füße noch ſeine Zunge, ſo wenig als die der folgenden Gattung.

Strupphopfe. Epimachen. Epimachus. Cuv.

Sie haben den Schnabelbau der Wiedehopfe und der Promerops, schuppenartige oder sammetartige Federn, welche einen Theil der Nasenlöcher bedecken, wie bey den Paradiesvögeln; sie haben mit diesen dasselbe Vaterland, und glänzen mit demselben herrlichen Gefieder. Die Schulter- und Weichenfedern sind bey den Männchen mehr oder weniger verlängert. In den europäischen Sammlungen sind nur zwei Arten, von denen man nicht einmal die Füße kennt, da die Bewohner ihres Vaterlands sie ihnen, wie den Paradiesvögeln abschneiden.

Prächtiger Strupphopf. Epim. superbus.

Upupa magna Cm. Up. superba. Lath. Enl. 639. Le grand Promerops. Vieill. hist. naturell. de promerops. pl. 8.

Der Schwanz ist keilförmig, dreimal länger als der Körper, die Hauptfarbe stahlblau und violetgrün. Das Kinn seidenfaserig und schwarz. Oberkopf, Backen und Kehle stahlblau, grün und violetglänzend; Brust und Bauch grün, violet gemischt. Zwei Federbüschel von den reichsten und glänzendsten Farben, entspringen an den Schultern und Deckfedern der Flügel, die acht obern Federn des ersten Büschels sind ganz sammetschwarz, die untern an ihrem Ende glänzend grün, mit Violetglanz eingefaßt; die Bärte auf der einen Seite sehr kurz, auf der andern sehr lang, endigen sich in einen halben Cirkel. Die Federn des andern Büschels sind länger, krümmen sich rückwärts und haben eben die schönen Farben, vom schönsten

Digitized by Google

Goldglanz, und ein blauvioletter Streifen am Schafte; unter dieſen Federn liegen noch längere, zerſchliſſene, nur an der Spitze mit Bärten verſehene Federn. An der Schwanzwurzel entſpringen annoch lange Federn, welche den zerſchliſſenen Seitenfedern der Paradiesvögel ähnlich und ſchön ſchwarz ſind, und nun erſt kommen die 12 langen Schwanzfedern. In Neuguinea.

Struppkopf mit zerſchliſſenen Federn. Epimach. filamentosus.

Epimaque promefil. Cuv.

Sammetſchwarz, der Schwanz mittelmäßig, etwas gegabelt, der Kopf und die Bruſt vom ſchönſten Stahlblau; die Seitenfedern verlängert, zerſchliſſen und ſchwarz. In Neuguinea?

Baumlaufer. Certhia. Linn.

Unter dieſem Namen hat Linneus und ſeine Nachfolger eine zahlreiche Gattung von Vögeln geordnet, welche bey näherer Unterſuchung ſehr von einander verſchieden erſcheinen. Einige Aehnlichkeit im Bau und in der Größe, haben dieſe Verirrung der Syſtematiker veranlaßt. Denn nur wenige von ihnen klettern mit Geſchicklichkeit und ſind von der Natur ganz dafür eingerichtet.

Wahre Baumlaufer. Certhia.

Sie haben ihren Namen von der Geſchicklichkeit, mit welcher ſie an den Bäumen hinklettern, wie die wahren Spechte, wie dieſe bedienen ſie ſich auch ihres Schwanzes zum Stützungsmittel, und ſeine Elaſticität dient dazu,

ihnen das Klettern zu erleichtern, die Schwanzfedern sind sehr stark und endigen in starke, spitzige Kiele, die am Ende keine Fahnen tragen. Der Schnabel sehr dünne, meist walzenförmig und gebogen.

Europäischer Baumlaufer. Certh. familiaris. Linn.

Naum. I. Taf. 28. F. 58.

Dieses Vögelchen ist allgemein bekannt, und lebt besonders in Baumgärten; beständig lauft es unter einfachen Locktönen Baum auf, Baum ab, und ist mit seinem gekrümmten, ahlenförmigen, feinen Schnäbelchen im Stande, aus den engsten Ritzen die Insektenеier Fliegen und dergleichen, welche seine Nahrung ausmachen, hervorzuholen. Es singt im Frühjahr recht artig und nistet wohl unter die Dächer der Häuser, oder in Baumhöhlen. Es ist graubräunlich, weißlich gefleckt am obern Theil des Körpers der Bürzel rostfarb, der Unterleib weißlich *).

Holzhauer. Dendrocaleptes. Herrm. (Picucules. Grimpars).

Der Schnabel mittelmäßig lang oder länglich, messerförmig zusammengedrückt, gerade, spitzig, an der Spitze

*) Es gehören hierher: Certh. cinnamomea. Vieill. 62. und Motacilla spinicauda. Lath. Synops. Herr Brehm beschreibt einen kurzzehigen Baumläufer, Certh. brachydactyla, er ist kleiner, hat auf dem Rücken eine dunklere Farbe, einen längern Schnabel, kürzere Nägel an den Zehen. Er findet sich auch in Deutschland.

Digitized by Google

etwas gebogen. Die Naſenlöcher an der Schnabelwurzel, rundlich und offen. Die Zunge kurz und ſpitzig. Die Flügel mittelmäßig lang. Der Schwanz hat 12 Federn, welche einen ſtarken Schaft haben, und wie bey den Baumläufern ſich in Spitzen endigen. Die Füße Gangfüße. Sie ſind in Amerika zu Hauſe und ziemlich groß *).

Cayenniſcher Holzhauer. Dendrocalept. cayennensis.

Gracula cayennensis Gmel. Gracul. scandens. Lath. et Shaw. enl. 621.

Der Schnabel lang, ſtark und gebogen; der Oberleib roſtbraun. Der Unterleib ſchmutzig gelblich; Kopf und Hals mit weißen Längsſtreifen. Der Bauch mit ſchwarzbraunen Querſtreifen, der Schwanz keilförmig, die Enden der Federn kahl und ſehr ſpitzig. In Guiana und Cayenne.

Der Talapiot. Dendroc. Picus.

Oriolus picus Gmel. et Lath. Gracula picoides Sh. enl. 605.

Schnabel faſt gerade und ſpitzig, Hauptfarbe gelbroth, Kopf, Hals und Bruſt weiß gefleckt, die Schwanzfedern wie bey den Spechten. Aehnelt auf der einen Seite den Spechtmeiſen, auf der andern den Nußhehern. In Guiana.

---

*) Von Dendrocaleptes trennt Temminck diejenigen Vögel, deren Schwanz bey ähnlichem Körperbau keine Stacheln haben, und nennt dieſe neue Gattung Anabates, dahin gehört Motacilla gujanensis und einige neue.

Digitized by Google

Dahin gehören: Le Nasican. Vaill. promer. pl. 24. Dendroc. procurvus Temm. — Dendrocalep. Xenops. Temm.

Mauerklette. Tichodroma. Illig. (Echelettes). Petrodroma. Vieill.

Der Schnabel lang, dünne, bogenförmig gekrümmt, rundlich, an der Wurzel dreieckig, am Ende spitzig. Die Nasenlöcher liegen an der Schnabelwurzel, und sind mit einer Haut halb verschlossen, der Schwanz abgerundet ohne kahle Spitzen. Die Füße Gangfüße, die Nägel sehr lang und scharf.

Rothflüglichte Mauerklette. Tichodr. phoenicoptera. Meyer.

Certh. muraria. Linn. Naum. Nachtr. Taf. 41. F. 82. Enl. 372.

Der ganze Vogel hat weiche und zerschlissene Federn, der ganze Obertheil des Körpers ist schön hell aschgrau, am Kopfe dunkler, die Kehle im Winter weißlich, im Sommer schwarz, der Unterleib dunkelgrau, die Deckfedern der Flügel und die äußern Fahnen einiger Schwungfedern lebhaft karmoisinroth, der Schwanz schwarz, jede Feder am Ende mit einem weißen Fleck *). Dieser Vogel be-

*) Der Vogel mausert sich zweimal und bekommt nur in der Frühjahrsmauser die schwarze Kehle bey beyden Geschlechtern, im Winter wird sie weiß. Diese Gattung hat nur eine Art. Vor derselben schiebt Temmink die Gattung Climacteris hin, deren Charakter ist ein kurzer, schwacher und dünner

wohnt im Sommer die höchsten Felsen der Alpen, wo er mit großer Geschicklichkeit an senkrechten Felsenwänden flatternd klettert, und sich von Insekten nährt. Im Winter zieht er weit umher und sucht an Mauren, Kirchthürmen und Felsen Fliegen und verborgene Insekten. Er nistet in Felsenlöchern und singt artig *).

Honigvögel. Nectarinia. Illig. Sucriers.

Unter diesem Namen begreift Illiger alle diejenigen Vögel, welche Linneus und seine Nachfolger unter die Baumlaufer gezählt haben, welche aber weder einen Spitzschwanz besitzen, noch klettern. Der Schnabel ist dünne, gebogen, spitzig und zusammengedrückt, fast wie bey den Baumläufern. Alle sind Ausländer, sie unterscheiden sich aber selbst wieder so sehr unter sich, daß man mehrere Gattungen aus ihnen gebildet hat. Bey vielen von ihnen, ja bey den meisten sind Männchen und Weibchen im Farbenkleid sehr verschieden, und andere mausern zweimal, und erscheinen im hochzeitlichen Kleide sehr glänzend, daher viele Verwirrung in den Arten entstanden ist, welche auch die besten Abbildungen und Beschreibungen noch nicht alle lösen konnten. Das beste Werk, welches wir darüber

---

Schnabel, seiner ganzen Länge nach zusammengedrückt, wenig gebogen, die Laden gleich lang und spitzig. Die Nasenlöcher an der Wurzel, seitlich, mit einer nackten Haut bedeckt, die Füße stark, die Nägel sehr groß und gekrümmt, die äußere Zehe bis zum zweyten Gelenk verbunden. Dahin gehören: Certhia Scandens und Certh. Picumnus. Illig.

*) Certhia fusca. Lath. Vieill. 65. scheint hierher zu gehören.

Digitized by Google

haben, ist Vieillot Naturgeschichte der Baumlaufer, der Colibris und anderer Vögel mit Metallglanz *).

Honigvogel. Nectarinia. (Guitguits). Coereba. Vieill.

Schnabel an der Wurzel etwas dick, fast dreieckig, zusammengedrückt, dünn, gebogen, sehr spitzig. Die Farben am Männchen oft sehr lebhaft, doch nicht metallischglänzend.

Zweyfärbiger Honigvogel. Nect. coerulea.

Vieill. 44. 45. 46.

Der ganze Körper vom schönsten Königsblau, Stirn, Kehle, Flügel und Schwanz schwarz, letzterer kurz. In Brasilien, Cayenne.

Das Weibchen ist oben hellbraun. Kehle und Brust hellgrau; Bauch rostgelblich.

Blauer Honigvogel. Nectar. cyanea.

Enl. 83. 2. Vieill. 41. 42. 43.

Schön blau, durch die Augen geht ein schwarzer Streifen, Hinterhals, Schultern, Schwanz und Flügel schwarz, letztere unten schwefelgelb, Scheitel meergrün. In Brasilien **).

---

*) Histoire naturelle des oiseaux dorés ou à reflets metalliques par Audebert et continué par Vieillot. Paris 1802.

**) Dahin gehören wahrscheinlich einige ostindische Arten, meist von rother Farbe: Certh. sanguinea. Vieill. 66. — Certh.

Eine Art gehört unter die größern Vögel, und wird beynahen von Vieillot zu einer eigenen Gattung gemacht; Gmelin setzte ihn unter die Bienenfresser. Es ist der

Rothbraune Honigvogel. Nect. rufa.

Merops rufus. Furnarius. Vieillot. Le Fournier, de Buénos Ayres. Enl. 739.

Von der Größe des drosselartigen Sängers, oben rothbräunlich, Kopf und Unterleib weiß rosträthlich, Schwanz lang, rostfarb. Den Namen den ihm die Franzosen geben, hat er von der Bauart seines Nestes, welches oben wie ein Backofen gewölbt und gedeckt ist. Temmink nennt ihn Opetiorhynchos.

Scharlach-Vögel. Dicaeum. Cuv.

Sie klettern nicht, haben keinen abgenutzten Schwanz, der Schnabel ist spitzig, nicht länger als der Kopf, aber zusammengedrückt und breit an seiner Wurzel. Sie leben in Ostindien und haben alle etwas scharlachrothes in ihrem Gefieder. Es sind sehr kleine Vögel.

---

cardinalis. ib. 54. 58. — Certh. borbonica. enl. 681. 2. — Dagegen sind Cert. armillata und Cayana nur Varietäten der cyanea und coerulea. — Certh. flaveola. Edw. 122. 362. Vieill. 51. — Motacilla varia. Linn. Edw. 30. Vieill. 74. — Certh. semitorquata. Vieill. 56. — Merops olivaceus. Sh. Vieill. huppes. et promerops. pl. 5. — Wahrscheinlich auch Cert. virens. Vieill. 57 und 58. und Certh. Sannio. ib. 64., welche aber einen gegabelten Schwanz haben.

Rothrückiger Scharlachvogel. Dic. erythronotos. Lath. *).

Certh. erythronotos. Vieill. II. 35.

Oberleib karmoisinroth; Unterleib röthlichweiß; Deckfedern der Flügel dunkelgrün; an den Seiten des Halses ein schwarzer Streif. Schwung- und Schwanzfedern schwarz.

Bogenschnäbler. Melithreptus. Vieill. Drepanis. Temm. Héorotaires.

Der Schwanz ist nicht abgenutzt, der Schnabel sehr lang, und völlig bogenförmig gekrümmt. Sie leben auf den Inseln der Südsee.

Hochrother Bogenschnabel. C. vestiaria. Sh.

Certh. coccinea. Blumenbach.

Scharlachroth, Flügel und Schwanz schwarz. Sandwichsinseln. Aus den Federn dieses schönen Vogels, machten die Bewohner dieser Inseln ihre schönen Scharlachmäntel und andere Zierarten **).

---

*) Certh. cruentata scheint eine Altersverschiedenheit dieses Vogels. Dahin gehören: Certh. rubra. Vieill. pl. 54. — C. erythropygia. Lath. Supp. — Cert. taeniata. Sonn. 11. Voy. pl. 107. F. 3. — C. cantillans. ib. F. 2.

**) Dahin gehören: Certhia obscura. Vieill. pl. 53. — Cert. pacifica. id. pl. 63., die übrigen Héorotaires. Vieill. gehören zu andern Gattungen, besonders Philedon, Dicaeum.

Digitized by Google

Zuckerfreſſer. Cinnyris. Cuv. (Soui mangas).

Der Schwanz nicht abgenutzt; der Schnabel lang, ſehr dünne und läuft in die feinſte Spitze aus, gebogen, die Schnabelſchneiden fein, ſägenförmig gezähnelt, die Zunge kann aus dem Schnabel hervorgeſtreckt werden, endigt ſich in eine Gabel. Es ſind meiſt kleine Vögel, die ſich zweimal mauſern, die Männchen glänzen im hochzeitlichen Kleide mit den ſchönen metallglänzenden Farben der Colibris, deren Stelle ſie in der alten Welt vertreten. Die Wintermauſer und das Kleid des Weibchens iſt ſehr beſcheiden, die Farben nicht glänzend. Sie leben vorzüglich in Afrika, vom Honigſaft der Blumen, es ſind muntere Vögelchen, zum Theil von angenehmem Geſang. Die Farbenveränderung und die Verſchiedenheit der Weibchen, macht die Beſtimmung der Arten ſchwer. Vaillant und Vieillot haben viele davon beſchrieben und abgebildet, die Gattung iſt zahlreich.

Die größere Zahl hat den Schwanz gleich lang.

Verſchiedenfarbiger Zuckerfreſſer. Cyn. discolor. Vieill.

Sucrier Protée. Vaill. Afr.

Kopf und Kehle goldgrün. Oberleib ſchwarzbräunlich, Flügel und Schwanz roſtbräunlich. Hals und Bruſt hochroth, mit ſtahlfarbigen Querſtreifen, ſo daß dieſelbe bald roth, bald violet erſcheint, je nachdem das Licht auffällt. Der Unterleib ſchwarzbraun *). Senegal.

*) Dahin gehören: Cert. splendida. Sh. Vieill. 82. — Afra, Edw. 347. — C. superba. V. 22. — C. lotenia. Vieill. 34.

Bey andern hat der Schwanz zwey verlängerte Federn.

Schöner Zuckerfresser. Cyn. pulchella *).

Enl. 670. 1.

Oberleib, Kehle, Hals und Bauch goldgrünglänzend, auf der Brust ein rothes Band, zu beyden Seiten gelb. Schwanz und Flügel schwärzlich. Senegal.

Colibris. Trochilus.

Die kleinsten aller Vögel, Wunder der Schönheit durch ihre elegante Form, durch den blendenden Metallglanz ihres Gefieders, welches besonders an einigen Stellen mit dem Glanze der Edelsteine pranget, vorzüglich auf dem Kopf und an der Kehle, wo schuppenartige Federn von eigener Bildung sich finden. Der Schnabel ist

---

enl. 575. — C. amethystina. V. 5 und 6. C. chalybaea. V. 10. 13. 18. 24. 34. 80. enl. 246. — Omnicolor. Seb. I. 69. 5. — cuprea. V. 23. — purpurata. Edw. 265. V. 11. — cyanocephala. V. 7. Zeilonica. enl. 576. V. 29. 30. — Dubia. V. 81. — Senegalensis. V. 8. — Sperata. V. 16. 32. enl. 246. 1. 2. — Madagascariensis. V. 18. — Lepida. Sparm. 35. — Curruearia. V. 31. enl. 576. 3. — Rubrofusca. V. 27. — Fuliginosa. V. 20. — Maculata. V. 21. — Rectirostris. V. 75. — Venusta. V. 79. — Gutturalis. enl. 578. 3. Bey weitem nicht alle sind als Arten bestimmt.

*) Certh. famosa. enl. 83. 1. — C. pulchella. enl. 670. 1. — C. violacea. enl. 670. 2. Le sucrier cardinal. Vaill. Afr. 291. 6. cardinalis. — Le sucrier figuier. id. 293. C. platurus. Der Schnabel ist kürzer und platter.

Digitized by Google

lang und dünne, die Zunge lang und ausstreckbar, fast wie bey den Spechten, theilt sich am Ende in zwey fadenartige Röhren, womit der Vogel wie die Schmetterlinge, den Honigsaft der Blumen aufsaugt. Sie genießen aber doch auch Insekten. Ihre sehr kleinen Füße, ihr breiter Schwanz, ihre sehr langen und schmalen Flügel, an denen sich die Federn schnell verkürzen; ihr kurzer Schulterknochen, und ihr Brustbein ohne Ausschnitt, macht sie den Spyrschwalben ähnlich im Fluge. Die Colibris schweben im Fluge so leicht wie die großen Abendschwärmer oder Schwebfliegen, wie diese summen sie um die blühenden Sträucher und Gebüsche, und ihr Flug ist schneller als der keines andern Vogels. Sie leben einsam, vertheidigen ihre Nester mit Keckheit, und zanken sich unter einander sehr heftig.

Man theilt sie ein in Colibris mit gebogenem Schnabel, und in Fliegenvögel mit geradem Schnabel, einige haben auch die mittlern Schwanzfedern mehr oder weniger verlängert.

So sehr auch die Gattung als Gattung natürlich und die dazu gehörigen Arten nicht zu verkennen sind, so unbestimmt ist noch die Bestimmung der Arten selbst. Jugend und Geschlecht ändert sehr im Glanze der Federn, nur alte Männchen haben den recht glänzenden, vollkommnen Federschmuck. Das schönste und vollständigste Werk ist Audeberts Naturgeschichte der Colibris und Fliegenvögel, mit Abbildungen, worin der metallische Glanz wirklich zur Verwunderung nachgeahmt ist, wenn er schon hinter der Natur weit zurück bleibt. Es sind gegen 80 Arten bekannt. Alle aus Amerika.

Digitized by Google

Einer der größten Colibris ist

Der Topas, Colibri. Troch. Pella. Le Topaze.

Enl. 599. Audebert. I. pl. 2. 3.

Der Kopf sammetschwarz; der Oberleib kastanienbraun ins Purpurfarbe gehend, mit Goldglanze, der Schwanz rostfarb, die mittlern Schwanzfedern sehr schmal und lang. Die Kehle glänzend topasgelb oder grün, je nachdem das Licht auffällt, dieser Fleck ist ringsum schwarz eingefaßt, der Unterleib rubinrothglänzend. Einer der größten und schönsten Colibris, aus Brasilien *).

Bey einigen Arten sind die Seitenfedern des Schwanzes ausserordentlich verlängert, und bildet eine ausserordentlich lange Gabel.

Gabelschwänziger Colibri. Tr. forficatus. Linn. **).

Audeb. pl. 60.

Schnabel wenig gekrümmt, Hauptfarbe grün; Scheitel blau, Unterleib und After weiß, Schwanz goldgrün, mit blauem Glanze, die äußerste Feder an jeder Seite 8 Zoll lang. Mexiko, Neuspanien.

---

*) Hier ist beyzufügen: Troch. superciliosus. Audeb. I. pl. 17. 18. 19. Tr. cyanurus. Lath.

**) Troch. polytmus. Linn. And. pl. 6. 7. — Troch. macrourus. Gmel.

Digitized by Google

Mit wenig gegabeltem Schwanze.

Schwalbenschwänziger Colibri. Tr. furcatus. Gmel. *).

Aud. pl. 34.

Schnabel wenig gekrümmt, Hals und Steiß goldgrün; Rücken und Brust vom glänzendsten Violetblau; der Schwanz etwas gabelförmig, schwarz. In Jamaika, Brasilien, Cayenne.

Die größere Zahl hat einen abgerundeten oder abgestumpften Schwanz.

Schwarzbrüstiger Colibri. Tr. gramineus. Gmel. **).

Audeb. pl. 9.

Hauptfarbe goldgrün; Brust schwarz, Schnabel halb so lang als der Leib; Schwanz kurz, abgerundet, purpurblau. Im wärmern Nordamerika.

Fliegenvögel heißen diejenigen Colibris mit geradem Schnabel. Lacepede begreift sie unter der Gattung Geradschnabel, Orthorhynchus. Sie lassen sich aber nicht füglich von den Colibris trennen, da sie ihnen an Größe, Gestalt, Glanz der Farben und Lebensart vollkommen gleichen, und die Uebergänge ganz unmerklich sind. Meh-

*) Troch. elegans. Aud. pl. 14.

**) Dahin gehören nun alle übrigen, wahren Colibris, mit gebogenem Schnabel.

rere von ihnen zeichnen sich durch besondere Federzierarten aus. Wie

Der Haubencolibri. Tr. cristatus. Linn.

Aud. pl. 47. und 48.

Hauptfarbe goldgrün, die Kehle bräunlich. Federbusch liegend, platt, dreieckig, grünblauglänzend *). In Martinique und Cayenne.

Andere haben an den Seiten des Kopfs Federbüsche, wie

Der geputzte Colibri. Troch. ornatus. Gmel.

Enl. 640. 3. Audeb. 49. 50. Le Hupecol.

Oberleib goldgrün, Unterleib braungolden, am Männchen an der Stirne fuchsrothe, spitzige, nach hinten aufgerichtete Federn, an den Seiten verlängern sie sich bis zu einem halben Zoll, an der Spitze bildet sich ein breiteres, goldgrünglänzendes Auge. Der Vogel ist sehr klein. In Cayenne.

Bey einem sind die Schäfte der ersten Flügelfedern auf eine merkwürdige Art ausgebreitet.

Breit-

*) Troch. pileatus (puniceus Gmel.). And. 63. — Troch. auritus. Princ. Max., mit goldenen Federbüschen an den Ohren, und zwey verlängerten Schwanzfedern.

Breitschwingichter Colibri. Troch. latipennis.

Enl. 672. Aud. 21.

Oberleib goldgrün, Unterleib weißlich, der Schnabel lang, die mittlern Schwanzfedern goldgrün, die drei äußern violetblau, an der vordern Hälfte weiß. Die Flügelfedern violetblau, sehr breit.

Auch unter diesen giebt es solche, mit langem und gegabeltem Schwanze.

Weißbauchiger Colibri. Troch. mellivorus. Linn. *).

Audeb. 23.

Oberleib goldgrün, mit Kupferglanze; Kopf, Kehle und Hals blau, im Nacken ein weißes Band; Bauch, Seiten- und Schwanzfedern weiß, Schwanz gabelförmig. In Surinam, Guiana und Cayenne.

Bey einer Art: Troch. platurus. Aud. 52. sind die Seitenfedern des Schwanzes sehr lang und am Ende breit.

Als der kleinste aller Vögel ist zu bemerken

Der kleinste Colibri. Troch. minimus. Linn.

Enl. 276. Aud. 64.

Oberleib goldgrün, mit Kupferglanz; Unterleib weißgrau. Schwanz bläulichschwarz, die äußern Federn grau

*) Troch. smaragdosa phirinus. Aud. 36. 40. — T. colubris. Aud. 31. 32. 33. Tr. mougeanus. And. 37. 38.

gerändert, die äußerste ganz grau. Etwas größer als eine Bienenkönigin. In vielen Gegenden Südamerikas.

Die zweyte aber kleinere Abtheilung der Sperlingsartigen Vögel begreift diejenigen, bey welchen die äußere Zehe fast so lang als die mittlere ist, und beyde mit einander bis zum vorletzten Gliede verbunden sind.

Sie bilden nur eine Familie

Mit verbundenen Zehen. Syndactyli.

Die Familie enthält 5 Gattungen.

Bienenfresser. Merops. Linn. Guépiers.

Die Füße kurz, der Schnabel an der Wurzel dreieckig, verlängert, etwas gebogen, mit einer scharfen Spitze; die Flügel sind lang, daher fliegen diese Vögel sehr geschickt, und fangen die Insekten, von denen sie sich nähren, oft im Fluge. Sie nähren sich von Bienen, Wespen und andern solchen Insekten.

Der europäische Bienenfresser. Mer. apiaster. Linn.

Naum. Nachtr. Taf. 27. Fig. 56.

Der Rücken rothgelb, Stirn und Bauch meergrün, die Kehle gelb, schwarz eingefaßt. Die mittelsten Schwanzfedern sind etwas verlängert, die erste Spur einer Verlängerung die bey den meisten ausländischen Arten viel ansehnlicher ist. Die europäische Art bewohnt den südlichen

Digitized by Google

Theil dieſes Welttheils, niſtet an ſteilen Ufern in Löchern, welche ſie ſelbſt ausſcharrt *).

Viele haben den Schwanz abgeſtutzt.

Bülockiſcher Bienenfreſſer. Mer. Bulockii.

Kopf oben grün, Kehle und Gurgel dunkelroſenroth, Hinterhals, Bruſt und Unterleib roſtgelbröthlich, Flügel, Rücken, Bürzel, die beyden äußerſten und die mittelſten Schwanzfedern olivengrün, die übrigen Schwanzfedern roſtfarb; Steiß himmelblau **). Am Senegal.

---

*) Unter die ausländiſchen Arten mit verlängerten Schwanzfedern gehören: M. viridis. enl. 740. — Ornatus. Lath. — Superbus, Nat. Misc. 78. — Senegalensis. enl. 314., et badius. 252. — Superciliosus. enl. 259. — Mer. nubicus. enl. 649. (Cuvier ſetzt ihn unter diejenigen mit abgeſtutztem Schwanze, allein er hat lange Mittelfedern).

**) Dahin gehören: M. philippinus. enl. 57. — Cayennensis. enl. 454. iſt aber nicht aus Cayenne, Amerika hat wahrſcheinlich keine Bienenfreſſer; Erytropterus. enl. 318. — Malimbicus. Sh. od. bicolor., Daudin, Ann. du. Mus. I. LXII.

Mer. congener iſt keine beſtimmte Art. — M. cafer iſt ein Promerops. — M. brasiliensis. Seb. I. LXVI. 1. iſt wahrſcheinlich ein Hordenvogel. Die Arten des Syſtems monachus, corniculatus, phrygius, cincinnatus, cucullatus, cyanops, garrulus, fasciculatus, carunculatus, ſind wahrſcheinlich alle Philedons. — Cinereus. Seb. I. XXI. 10. iſt eine Cynniris.

Statt der Bienenfreſſer finden ſich in Amerika

Die Motmots. Prionites. Illig. (Baryphonus. Vieill.).

Füße und Körperbau wie bey den Bienenfreſſern, allein der Schnabelbau iſt verſchieden, ſtark, von mittelmäßiger Länge, dick, etwas meſſerförmig, die Schnabelſchneiden ſägenförmig gezähnelt, gegen die Spitze ohne Zähne. Die Zunge iſt federförmig zerſchliſſen, wie bey den Pfefferfreſſern, wohin ſie von Linneus gezählt werden. Es ſind anſehnliche Vögel, von der Größe einer Elſter; die Kopffedern ſind weich, wie bey den Hebern; der Schwanz lang, keilförmig, die zwey mittelſten Federn ſind länger, bey Alten, da wo ſie über die übrigen Schwanzfedern ausgehen, eine Strecke ohne Bart. Sie fliegen ſchlecht, leben einſam, niſten in Baumlöchern, nähren ſich von Inſekten, und verfolgen ſogar kleine Vögel.

Blauköpfiger Motmot. Prion. momota.

Rhamphastos Momota. Linn. enl. 370.

Hauptfarbe grün, der Unterleib ins Olivengrüne ziehend. Der Scheitel ſchwarz, um denſelben geht ein ſchöner, himmelblauer Kranz, durch die Augen ein ſchwarzer Streif. In Braſilien.

Auch die beyden andern bekannten Arten: Prionites ruficeps. Motmot à tête rousse. Vaill. ois. de Paradis etc. 1. pl. 37. und 38. Le Tutu. Azar. und Prion. Dombey. Vaill. 39. finden ſich in Südamerika.

Eisvögel. Alcedo. Martin pêcheurs.

Die Füße noch kürzer als bey den Bienenfreſſern, der Schnabel länger, ſtärker, gerade und eckig zugeſpitzt.

Digitized by Google

Keine Bartborſten. Der Schwanz und die Zunge ſehr kurz, letztere fleiſchig und platt, faſt pfeilförmig. Sie leben von Fiſchen, welche ſie fangen, indem ſie ſich von einem Baumzweige, der über dem Waſſer hängt, oder von einem andern vorſpringenden Körper, auf dem ſie auflauern, ins Waſſer ſtürzen. Der Magen iſt hautig. Sie niſten wie die Bienenfreſſer in Löcher, an ſteilen Ufern. Man findet ſie in beyden Welten.

Europäiſcher Eisvogel. Alc. ispida. Linn.

Naumann. III. Taf. 72. Fig. 113.

So groß wie ein Sperling. Die Kehle weißlich, der Bauch roſtroth, der Rücken ſchön blau, auf dem Kopf etwas längere Federn von hellblau und ſchwarzer Farbe. Das Gefieder glänzend. Er niſtet in Uferlöchern und legt ſeine Eier auf ausgeſpeite Fiſchgräthe. Schnabel und Füße ſind roth.

Faſt alle ausländiſchen Arten haben eine ähnliche Farbenmiſchung von blau, weiß und roſtfarb. Man kann ſie in zwey Familien trennen, in ſolche, mit einem ganz geraden Schnabel, wie der europäiſche *), und in ſolche, bey denen die untere Kinnlade aufgetrieben iſt **).

---

*) Alc. maxima. enl. 679. — Alcyon. 715 und 593. — Torquata. enl. 284. — Rudis. 62 und 716. — Bicolor. 592. — Americana. 591. — Bengalensis. Edw. 11. — Coeruleocephala. enl. 35. 6. 2. — Cristata. 756. 1. — Madagascariensis. 778. 1. — Purpurea. 778. 2. — Superciliosa. 756. 1. 2.

**) Alc. capensis. 590. — Atricapilla. 673. — Smirnensis.

In Neu-Holland und den benachbarten Ländern giebt es Eisvögel, deren Schnabel am Ende etwas übergebogen und gekrümmt ist. Ihr Gefieder ist nicht glattanliegend, wie bey denjenigen, welche das Wasser besuchen, und hat auch nicht die lebhaften Farben, welche man bey jenen antrift, der Schwanz ist länger und nicht so abgerundet, ihre Hauptnahrung besteht auch in Insekten, sie werden daher im Gegensatz jener Fischer, Jäger genannt. (Martins chasseurs). Temmink nennt sie mit Leach, Dacelo.

Riesen-Jäger, Dacelo giganteus.

Alcedo gigantea. Enl. 663.

Langschwänzig; ein mittelmäßiger Federbusch; Oberleib olivenbraun; Unterleib weißlich, mit dunkelbraunen Querlinien; auf der Mitte der Flügelfedern ein hellbläulichgrüner Fleck. Schwanz rostroth, schwarz gestreift, mit weißer Spitze. In Neuguinea und Neuholland.

Dreizehige Eisvögel. Ceyx. Lacep.

Der Schnabel wie bey den gemeinen Eisvögeln, aber nur drei Zehen. Man kennt nur zwei Arten.

---

232 und 894. — Dea. 116. — Chlorocephala. 783. 2. — Coromanda. Sonn. 218. — Leucocephala, (javanica. Sh.). 757. — Senegalensis. 594 und 356. — Cancrophaga. Sh. 334.

Digitized by Google

Dreizehiger Eisvogel. C. tridactyla.

Alcedo tridactyla. Linn. Pall. spic. VI. pl. II. F. 2. Sonner. pl. XXXII.

Kurzschwänzig; Oberleib und Schwanz fuchsroth; Unterleib gelblichweiß. In Indien *).

Plattschnäbel. Todus. (Todiers).

Kleine, amerikanische Vögel, im Allgemeinen den Eisvögeln etwas ähnlich, allein die Füße sind lang, und der Schnabel zwar auch etwas lang, aber von oben nach unten platt gedrückt, und an der Spitze abgestumpft, der Schwanz länger. Sie leben von Insekten und nisten auf der Erde.

Grüner Plattschnabel. Tod. viridis. Linn.

Enl. 585. 1. 2.

Männchen, Oberleib hellbläulich, Bauch weiß, Brust rosenfarben. Weibchen, Oberleib grün, Unterleib gelblichweiß, Kehle röthlich. In Südamerika **).

---

*) Alcedo tribrachys. Sh. natural. misc. XVI. pl. 681.

**) Tod. cinereus. enl. 585. 3. Edw. 262. — T. maculatus Desmar. T. griseus. id. — T. Sylvia. id. Schon bey den Fliegenfängern ist angeführt worden, daß die Arten Todus regius, paradisaeus, leucocephalus, platyrhynchos und macrochynchos zu Muscipeta gehören, und nicht zu Todus. Temminck setzt einzig Todus viridis unter diese Gattung.

Digitized by Google

Die sonderbarste und merkwürdigste Gattung dieser Abtheilung der Vögel ist die des

Hornvogels. Buceros. Linn. (Les Calaos).

Große Vögel aus Afrika und Ostindien. Der Schnabel lang, dick, sehr groß, messerförmig, am Ende gebogen, die Schnabelschneiden gezahnt; an der Schnabelwurzel sitzen Ansätze, die oft größer als der Schnabel selbst sind, oft aber ist der Schnabel nur stark aufgetrieben, wodurch sie sich den Pfefferfressern nähern. Sitten und übrige Gestalt aber haben sie mehr mit den Raben gemein, die Füße aber ähneln denen der Bienenfresser und Eisvögel in Hinsicht der Verwachsung der äußern Zehen. Die Form des Schnabels und seine Auswüchse ändern sich sehr nach dem Alter; das innere des Schnabels ist zellicht. Die Nasenlöcher liegen an der Basis des Auswuchses, oder vor den Stirnecken, sie sind eirund und offen. Die Zunge kurz, schmal und spitzig, und liegt tief. Sie nähren sich von mancherlei Dingen, machen Jagd auf Mäuse, kleine Vögel, Reptilien, und verzehren selbst das Aas.

Nashornvogel. B. Rhinoceros. Linn.

Enl. 934. Blumenbach naturhist. Abbild. 24. Vaill. Calaos. 1, 2.

Das Horn auf dem Oberschnabel nach der Stirn aufwärts gekrümmt; Leib schwarz, Unterbauch, Steiß und After weiß; Schwanz weiß, mit einer schwarzen Binde. Fast von der Größe eines welschen Hahns. In Ostindien. Soll, wie andere Arten dieses Geschlechtes, die sogenann-

Digitized by Google

ten Krähenaugen (Saamen des Strychnos nux vomica), ein Gift für die meiſten Thiere, ohne Schaden freſſen. Das innere des Schnabelhorns und des ungeheuern Schnabels iſt ganz zellichtes Knochengewebe, daher ſehr leicht, und dient zu einem wahren Luftbehälter *).

Hornvögel ohne Auswüchſe.

Rothſchnäbliger Hornvogel. B. nasutus.

Enl. 260.

Schnabel und Füße roth, erſterer ungezähnelt; am Halſe ſehr wenig Federn, der ganze Unterleib weiß. Der Kopf und Nacken oben ſchwarz, über die Augen ein weißer Streif bis zu den Schultern. Rücken ſchwärzlich, die Deckfedern der Flügel graubraun, weiß und ſchwarz geſcheckt. Schwungfedern ſchwarz, mit einem weißen Fleck; Schwanz, die mittelſten Federn ganz ſchwarz, die andern mit weißer Spitze, die äußerſte faſt ganz weiß; keilförmig. Am Senegal **).

---

*) Buceros africanus. Vaill. Colaos. pl. XVII. F. 2. iſt vielleicht nur eine Altersverſchiedenheit. — Niger. Vaill. 13. — Monoceros. Sh. (malabaricus Lath.) enl. 873. Vaill. 9—12. — Bicornis. id. 7—8. — Cavatus. id. 3—6. — Hydrocorax. enl. 283. ſoll der Junge des Cavatus ſeyn. — Albirostris. Vaill. 14. — Violaceus. V. 19. — Abyssinicus. enl. 779. Vaill. Afriq. 230. 231. — Undulatus. V. col. 20. 21. — Panayensis. enl. 780.—781. Val. 16—18. — Manillensis iſt der Junge. enl. 891. — Fasciatus. Vaill. Afr. 233.

**) Dieſe Beſchreibung, die ich nach einem Vogel machte, der

Dritte Ordnung der Vögel.

Klettervögel. Scansores.

Sie enthält Vögel aus den Ordnungen der Waldvögel, Raben, Spechte und Leichtschnäbel der Systeme, und die Ordnungen der Sittiche (Psittacini), der Sägeschnäbler (Serrati), der Wendezeher (Amphiboli), und der Pfeilzüngler (Sagittilingues), von Illiger. Es sind solche Vögel, deren innere Zehe sich entweder nach hinten nach Willkühr des Vogels biegen kann, oder nach hinten steht, woraus eine Leichtigkeit zum Klettern und zum festern Anhalten entsteht, viele von ihnen sind auch geschickte Kletterer, und der Name Klettervögel kommt den meisten, doch nicht allen mit Recht zu, und auf der andern Seite klettern mehrere Vögel, wie schon ist angeführt worden, sehr geschickt, ohne diesen Fußbau zu haben.

Die Vögel aus dieser Ordnung nisten meistentheils in hohlen Bäumen; sie sind nicht sehr geschickte Flieger; nähren sich wie die Vögel der vorigen Ordnung von Insekten und Früchten, je nachdem ihr Schnabel mehr oder

---

vor mir steht, weicht von derjenigen, die Latham macht, ab, vielleicht ist es nur eine Altersverschiedenheit, doch sah ich mehrere ganz gleiche. A. d. U. Dahin gehören ferner: Buc. javanicus. Vaill. Cal. 22. Afr. 239. — Nasica. Cuv. Vaill. Afr. 236. 237. — Coronatus. enl. 890. Vaill. Afr. 234. 235. — Bengalensis. Vaill. cal. 23. Vaillant glaubt Buc. galeatus. enl. 933. von dem man nur den Kopf kennt, sey ein Wasservogel, gewiß ist es, d. der Schnabel anders gebaut ist, und daß er nicht zellig ist, wie bey Rhinoceros.

Digitized by Google

minder ſtark iſt; einige wie die Spechte, wenden zur Erhaltung ihrer Nahrung ganz eigene Mittel an.

Das Bruſtbein der meiſten Gattungen hat nach hinten zwey Ausſchweifungen; bey den Papageien aber hat es nur ein Loch, bey einigen iſt es ſogar ganz.

Glanzvogel. Galbula.

Sie gleichen den Eisvögeln; der Schnabel iſt lang, dünne, dreieckig, länglich pyramidaliſch, ſpitzig, die Firſte ſcharf, die Kinnladen gleich lang. Die Schnabelſchneide ungezähnt. Die Naſenlöcher nach hinten halb bedeckt, vorn offen, nahe an der Schnabelwurzel. Die Zunge kurz und ſpitzig. Die Füße kurze Kletterfüße, die äußere Zehe länger als die innere, beyde größtentheils mit einander verwachſen. Das Gefieder iſt nicht ſo glatt, wie bey den Eisvögeln, und hat immer Metallglanz. Sie leben einſam in feuchten Wäldern, im niedern Gebüſche, und nähren ſich von Inſekten. Linne zählte ſie zu den Eisvögeln.

Grüner Glanzvogel. Galb. viridis.

Enl. 238.

Alle obern Theile des Körpers und die Bruſt glänzend goldgrün, an der Kehle ein dreieckiger, weißer Fleck. Unterleib roſtfarb. Schwanz keilförmig. Der Schnabel wie bey allen amerikaniſchen Arten, ganz gerade und lang *). In Südamerika.

---

*) Galbula paradisea. enl. 271. — Galb. ruficauda. Cuv. Vaill. oiseaux de Paradis. II. pl. 50. — Galb. albirostris.

Digitized by Google

Im indiſchen Archipel hat es Arten mit kurzem, aber dickerem Schnabel, der etwas gebogen iſt, wodurch ſie ſich den Bienenfreſſern nähern. Die vordern Zehen ſind weniger verwachſen. Vaillant nennt ſie Jacamerops. Dahin gehört: Galbula grandis Lath. Vaill. pl. 54. Vieill. 6. Sein großer Glanzvogel pl. 53. hat keine Schnabelgräthe. Er iſt ganz gelbgrün, auf dem Rücken kupferglänzend.

Spechte. Picus. (Pics).

Dieſe Gattung iſt ſehr ausgezeichnet durch den langen, ſtarken, eckigen, an der Spitze zuſammengedrückten Schnabel, durch welchen ſie die Baumrinde durchhacken können; durch ihre lange, dünne, wurmförmige, ſehr dehnbare Zunge, deren Spitze hornartig und mit rückwärtsgehenden Zacken verſehen iſt. Durch ihr langes, elaſtiſches Zungenbein, welches mit ſeinen zwei Schenkeln um den ganzen Kopf herum geht, und ſich vorn am Stirnbein befeſtigt; durch dieſe elaſtiſchen Fortſetzungen des Zungenbeins, kann die Zunge weit hervorgeſtreckt werden. Zu beyden Seiten der Zunge liegen zwey große, lange Drüſen, welche einen ſehr klebrigen Saft auf die Zunge ergießen. Zwey Rollmuskeln begleiten die Zungenbeine, wie zwey Bänder, und geben ihr die Kraft vorzuſchnellen, und ſich wieder zurückzuziehen. Hinten iſt ſie in einer Scheide, innert welcher ſich die Gänge jener Drüſen öff-

---

Lath. Vaill. 51. Vieill. ois. dorés. I. pl. 4. Die Braſilianer nennen nach Marzgraf dieſe Vögel Jacammaciri, daher der Name Jacamar, welchen Möring zuerſt einführte.

nen, und in welche sich die wurmförmige Zunge bey ihrer Verkürzung zurückzieht. Eine eigene Rinne im Stirnbein bezeichnet den Platz, den die Zungenbeine einnehmen. Der Schwanz besteht aus zehen Federn mit hartem, elastischem Schaft, wodurch er geschickt wird, den Körper beym Klettern zu unterstützen, wie bey den Baumläufern. Sie klettern unter allen Vögeln am besten, wozu ihnen ihre kurzen, stämmigen Beine, und ihre starken Schenkelmuskeln, und spitzigen Nägel vorzüglich helfen. Mit Schnelligkeit beklettern sie die Bäume nach allen Richtungen, und beklopfen mit ihrem Schnabel die Rinde, stecken ihre Zunge in die Spälte und Löcher, um die Insekten hervorzuangeln, mit denen sie sich nähren. Sie können selbst große Löcher in die Bäume hakken. Der Magen ist hautig; sie haben keinen Blinddarm; genießen aber doch auch Früchte. Sie nisten in hohlen Bäumen, oft in selbst gehackten Löchern, und legen ihre Eier, die, wenigstens was die europäischen Arten betrift, alle weiß sind, auf das bloße Holzmehl. Man findet die Spechte in allen Welttheilen, nur in Neuholland hat man sie nicht entdeckt.

Schwarzspecht. Pic. martius. Linn.

Naum. I. 25. F. 49.

Schwarz, am Männchen der ganze Scheitel, am Weibchen nur der Nacken scharlachroth. In Schwarzwäldern des nördlichen Europa, fast so groß wie eine Krähe.

Digitized by Google

Grünſpecht. Pic. viridis. Linn.

Naum. I. 26. F. 50.

So groß wie eine Turteltaube, oben zeiſiggrün, unten gelbgrünweißlich; Scheitel roth; Bürzel gelb. In ganz Europa häufig. Auch das Weibchen hat einen rothen Scheitel.

Grauſpecht. Pic. canus. Gmel.

Naum. I. 26. F. 51. Weibchen. Nachtr. Taf. XXXV. F. 68.

Männchen nur die Stirn und bis über die Augen roth, der übrige Kopf grau, ſonſt die Farben wie am vorigen, nur etwas kleiner. Am Weibchen der Kopf ganz grau. Hin und wieder in Deutſchland, beſonders in gebirgichten Gegenden.

Großer Buntſpecht. Pic. major. Linn.

Naum. I. 27. F. 52.

Schwarz und weißbunt, am After karmoiſinroth, und am Nacken ein karmoiſinrothes Querband, das dem Weibchen fehlt. In ganz Europa in Laubwäldern.

Mittel Buntſpecht. Pic. medius. Linn.

Enl. 611. Naum. Nachtr. IV. Fig. 7.

Schwarz- und weißbunt; Schnabel dünn und zugeſpitzt; After ſtark roſenroth; am Männchen der ganze Scheitel karmoiſinroth; am Weibchen nur der Vorderkopf. Wo der vorige.

Digitized by Google

Weißrückiger Specht. Pic. leuconotus. Bechst.

Naum. Nachtr. 35. F. 69.

Schwarz- und weißbunt, Schnabel stark und lang. Mittelrücken bis an den Schwanz weiß, über die Flügel laufen mehrere weiße Streifen, Hinterbauch, Steiß und Scheitel hochroth, Brust und Seiten mit schwarzen Längsstrichen. Im Norden von Europa, auch hin und wieder in Deutschland.

Kleiner Buntspecht. Pic. minor. Linn.

Naum. I. Taf. 27. F. 54. 55.

Oberleib schwarz- und weißbunt; Unterleib schmutzigweiß, an den Seiten rostgraulich, schwarz geflammt; beym Männchen der Scheitel karmoisinroth, beym Weibchen bräunlichweiß. In Gebirgswäldern. Er geht, wie der Grünspecht, oft auf die Erde und sucht Ameisen.

Die ausländischen Spechte sind zahlreich, und gleichen sich unter einander sehr, selbst durch Vertheilung der Farben, die meisten haben roth oder gelb auf dem Scheitel.

Man kann eine Unterabtheilung unter den Spechten machen, nehmlich

Dreizehige Spechte. Picoides. Laceped.

Es mangelt ihnen die zweyte Zehe nach hinten, sie haben also nur drei Zehen, sonst sind sie gestaltet wie die übrigen Spechte.

Digitized by Google

Dreizehiger Specht. Pic. tridactylus. Linn.

Naum. Nachtr. Taf. 51. Fig. 81. Männchen.

Schwarz- und weißbunt; der Scheitel am Männchen goldgelb, am Weibchen silberweiß, fein, schwarz gestrichelt. In Gebirgswäldern hoher Gebirge.

Man könnte eine zweyte Unterabtheilung von den Spechten machen, welche einen etwas gebogenen Schnabel haben, und sich den Kukukan nähern.

Goldspecht. Pic. auratus. Linn.

Enl. 695.

Schnabel etwas gekrümmt. Graubraun und schwarz in die Quere gestreift, Hinterkopf roth, Steiß weiß; auf der Brust ein schwarzer Halbmond. Flügel- und Schwanzfedern mit goldgelben Schäften. In Nordamerika *).

Eine afrikanische Art: Picus. Arator. Cuv. Vaill. Afr. 255. und 256. soll gar nicht auf Bäume gehen, sondern seine Nahrung am Boden suchen, ob gleich er einen eben so gebauten Schwanz hat, wie die andern.

Wendehals. Yunx. Linn.

Die Zunge ist wie bey den Spechten, aber hat vorn keine Zacken. Der Schnabel gerade, spitzig, rundlich ohne Ecken, der Schwanz hat gewöhnliche Federn. Sie leben wie die Spechte von Insekten, besonders von Ameisen; sind

*) Pic. cafer. Lath.

sind aber nicht so lebhaft wie diese und klettern selten und wenig. Die europäische Art wandert im Herbst weg.

Europäischer Wendehals. Yunx. torquilla. Linn.

Naum. I. Taf. 28. F. 56.

Oberleib grau, mit schwarzen, weißen und rostfarben Strichen und Punkten; Unterleib rostgelb, mit feinen, schwarzen Wellenlinien und dreieckigen Flecken. Den Namen hat er von der sonderbaren Art, den Hals und Kopf zu drehen *).

---

*) Yunx minutissima. Picus minutus. enl. 736. 1. Zwey neue Gattungen werden hier von Temminck eingeschoben, die Gattung Oxyruncus. Der Schnabel kurz, seine Wurzel dreieckig, sehr spitzig. Die Nasenlöcher seitlich an der Wurzel. Die Läufe kurz, fast von der Länge der Mittelzehe, vier Zehen, der äußere mit dem mittlern an der Wurzel verbunden. Diese neue Gattung enthält nur eine neue Art, welche oben grünlich und mit einem kleinen Federbusch versehen, unten hellgrüngelb, schwarz gefleckt, ist aus Südamerika.

Die Gattung Orthonyx. Schnabel sehr kurz, zusammengedrückt, fast gerade, die Spitze ausgeschweift; Nasenlöcher seitlich, offen und durchgehend, mit Borsten. Die Läufe länger als die Mittelzehe. Die Nägel länger als die Zehen, stark, wenig gebogen, an den Seiten gefurcht. Die Flügel sehr kurz, der Schwanz breit und lang. Auch nur eine neue Art, aus den Südländern. Dunkelbraun, mit schwarzen Flecken, am Männchen die Kehle rostfarb, schwarz eingefaßt, am Weibchen weiß.

Kukuke. Cuculus. Linn. (Coucou).

Der Schnabel ist mittelmäßig lang, kürzer als der Kopf, mäßig gebogen zusammengedrückt, weit gespalten, die Schnabelscheiden ungezähnelt. Die Nasslöcher nahe an der Schnabelwurzel, oben mit einer Haut halb geschlossen. Die Zunge pfeilförmig und platt. Der Schwanz keilförmig verlängert aus zehen oder zwölf Federn bestehend. Sie leben von Insekten, und diejenigen, welche in kalten Ländern wohnen, wandern. Die Linneische Gattung muß in mehrere getrennt werden.

Wahre Kukuke. Cuculus.

Der Schnabel mittelmäßig, die Füße kurz, der Schwanz besteht aus 10 Federn. Diese Vögel sind die einzigen, welche nicht selbst brüten, sondern ihre Eier in die Nester anderer insektenfressender Vögel legen; die viel kleiner sind als sie. Die Pflegeltern, selbst die kleinsten sorgen für den jungen Kukuk wie für ihre eigenen Jungen, selbst wenn die Einführung des Pfleglings ihre eigenen Eier zerstörte, wie es fast immer geschieht. Die Ursache dieser Sonderbarkeit, welche auch den Kukuken anderer Welttheile eigen ist, ist unbekannt. Das Klima kann daran nicht schuld seyn, weil auch in warmen Ländern dasselbe geschieht: eben so wenig scheint die Ursache in der Lage des Magens zu liegen, ob schon dieser in der That weiter unten liegt als bey andern Vögeln, und vom Brustbein weniger beschützt wird. Der Blinddarm ist lang, und der untere Luftröhrenkopf hat nur einen eigenen Muskel.

Digitized by Google

Europäiſcher Kukuk. Cuc. canorus. Linn.

Naum. I. Taf. 25. F. 102. Nachtr. IV. F. 9. Junger Vogel.

Aſchgrau; der Unterleib weiß, mit vielen ſchwarzgrauen, wellenförmigen Querſtreifen; der Schwanz ſchwärzlich, mit weißen, eiförmigen Flecken. Der Junge und das Weibchen ſind oben roſtfarb, mit ſchwarzen Querbändern über den ganzen Körper *).

Langſchwänziger Kukuk. Cuc. macrourus. Brehm.

Von der Größe des aſchgrauen Kukuks, der Schwanz länger, keilförmig, auf dem Kopf ein Federbuſch, Schnabel und Füße ſind viel größer. Der Kopf iſt aſchgrau, am Nacken ein gelbweißer Ring, der Oberkörper graubraun, auf den Deckfedern der Flügel weiße Flecken; der

*) Noch bis auf dieſen Augenblick iſt es von den Ornithologen nicht entſchieden, ob der rothbraune Kukuk, der in Europa vorkommt, eine eigene Art ſey, man glaubt, er ſey der zweyjährige Vogel; Cuculus hepaticus. Sonnerat iſt derſelbe Vogel. Cuc. capensis. Vaill. Afr. pl. 200. ſcheint nur eine Varietät des europäiſchen. — Dahin gehören ferner. — C. solitarius. Cuv. Vaill. 206. — Radiatus. Sonn. I. Voy. pl. 79. — Clamosus. Vaill. 204. 205. — Edolius. Cuv. Vaill. 207. 208. — C. serratus. Sparm. M. Carls. iſt das Männchen, melanoleucos. enl. 272. Das Weibchen — Coromandus. enl. 274. 2. Vaill. 213. — Americanus. enl. 816. — Glandarius. Edw. 57. — Flavus. enl. 814.

Digitized by Google

Schwanz mattschwarz, mit weißer Spitze, der ganze Unterleib gelblichtweiß, an Kehle und Oberbrust mit aschgrauen Schäften. Die Federn des Busches sind lang und schmal und ragen fast ein Zoll über den Hinterkopf aus. Dieser Vogel ist ein einzigesmal in Deutschland vorgekommen, und befindet sich in der Sammlung des Herrn Pastor Brehm in Renthendorf. Sehr ähnlich dem C. glandarius, wahrscheinlich derselbe.

Afrika hat einige niedliche, kleine Arten von grüner, mehr oder minder goldglänzenden Farbe; der Schnabel ist etwas mehr zusammengedrückt.

Goldkukuk. Cuc. auratus.

Coucou. Didric. Vaill. Afriq. 210. enl. 657.

Oberleib goldgrün, ins Kupferrothe schillernd, über den Scheitel lauft ein weißer Streif, Ohrgegend weiß, Flügel und Schwanz weiß gefleckt. Unterleib reinweiß, die Seiten und Hosen mit goldgrünen Querstreifen. Etwas größer als eine Lerche. Im südlichen Afrika *).

Noch andere Arten, meistens von gefleckterm Gefieder, haben einen höheren Schnabel **).

---

*) Cuc. Clasii. Vaill. 210. — Lucidus. Lath. Syn. I. pl. 23.

**) C. punctatus. enl. 657. Vaill. 210. Scolopaceus. enl. 586. und maculatus. enl. 764. scheinen Varietäten. — Honoratus. enl. 294. Vaill. 216. — Taitensis. Sparm. M. Carls. 32. — Mindanensis. enl. 277.

Digitized by Google

Die Cuas. Vaill. Coua. (Coccyzus. Vieill.)

Unterſcheiden ſich von den Kukuks nur durch längere Füße, was aber ſie noch mehr auszeichnet, iſt, daß wenigſtens die Arten, welche man näher kennt, in Baumlöchern niſten und ihre Eier nicht in fremde Neſter legen.

Cua von Madagascar. Coua. madagascariensis.

Enl. 815. Cocc. virescens. Vieill.

Mit keilförmigem Schwanze, deſſen Seitenfedern weiße Spitzen haben, olivengrünem ins hellgelbe ſich ziehendem Oberleib, gelblicher Kehle, fuchsrother Bruſt und Oberbauch, braunem Hinterbauch und Steiß. In Madagascar *).

Auch eine amerikaniſche Art mit langem, nur am Ende gekrümmtem Schnabel, kann als eigene Gattung angeſehen werden.

Langſchnäbliger Kukuk. Cuculus. Vetula. Saurothera. Vieill.

Enl. 772.

Schnabel lang und faſt gerade; der Scheitel mit weichen, ſeidenartigen Federn beſetzt, Schwanz lang und

*) Cuc. cristatus. enl. 589. Vaill. 217. — Caeruleus. enl. 295. 2. Vaill. 218. — Naevius. enl. 812. — Cayanus. enl. 211. — Seniculus. enl. 813. — Minor. — Coccyzus. melacoryphus. Vieill. — Coc. minutus. Vieillot. — Coc. chiriri. Vieill. — C. rutilus. V. — C. ruficapillus. V. — C. aurocephalus. Vieill. — Guira. — Geoffroyi.

Digitized by Google

keilförmig, Oberleib graulich olivenfarb; Unterleib ziegelfarben. In Jamaika.

Deutlicher und mit Recht, trennen sich von den Kukuks

Die Spornfüße. Centropus. Illig. Corydonyx. Vieill. (Coucals).

Arten aus Afrika und Indien, welche am Daum einen langen, spitzigen und geraden Nagel haben, wie die Lerchen. Der Schnabel ist kürzer als der Kopf, gebogen von der Wurzel an, stark, zusammengedrückt, ungezähnelt. Die Nasenlöcher mit Federn, fast bedeckt. Der Schwanz keilförmig und lang. Sie nisten in Baumlöchern.

Aegyptischer Spornfuß. Cent. aegyptius.

Cuc. aegyptius et senegalensis. enl. 332. Vaill. 219.

Beynahe so groß wie eine Elster; Kopf und Hinterhals schwarz, Oberleib rostfarb, Unterleib weißgelb. Schwanz schwarzbraun, die Federn zerschlissen, mit steifen, zugespitzten Schäften. In Egypten und am Senegal *).

Eben so sind mit Vaillant zu trennen

---

*) Cuc. philippensis. Cuv. enl. 884. — Nigrorufus. Cuv. Vaill. 220. — Tolu. enl. 295. — Vaill. 219. — Benghalensis. Brown. Ill. XIII. — Rufinus. Cuv. Vaill. 221. — Aethiops. Cuv. Vaill. 222. — Gigas. Cuv. Vaill. 223.

Digitized by Google

Die Courols *). Leptosomus. Vieill. (Vouroug drious).

Der Schnabel ist dick, spitzig, gerade, wenig am Ende der obern Kinnlade gebogen, zusammengedrückt. Die Nasenlöcher schief, in der Mitte jeder Schnabelseite. Der Schwanz hat 12 Federn. Sie nisten in Baumlöchern, leben in Wäldern, und sollen eben so Früchte, wie Insekten fressen.

Afrikanischer Courol. Leptos. Afer.

Cuculus Afer enl. 387. fam. Vaill. 226. 227. Vourong-driou.

Schwanz gleich, unten schwarz; Oberleib kupfergrün; Unterleib grau, Kopf und Hals aschgrau; Scheitel blendend schwarz. In Madagaskar.

Die Anzeiger. Honigkukuke. Indicator. (Les indicateurs).

Der Schnabel ist kurz, hoch, fast kegelförmig, wie bey den Finken. Der Schwanz hat 12 Federn, und ist zugleich etwas keilförmig und etwas gegabelt. Die Haut ist sehr hart und dick, und bewahrt sie vor den Stichen der Bienen; allein die Bienen, welche die Anzeiger immer aufstören, setzen sich ihnen an die Augen, und tödten sie zuweilen. Sie nähren sich von Wachs und Honig, und suchen immer schreiend die Bienenstöcke auf. Diesem Geschrei gehen die Einwohner nach, denen sie also zu Wegweisern dienen. Es giebt zwey afrikanische Arten.

---

*) Courol will sagen Kukuk rolle.

Großer Honigkukuk. Indic. major. Cuv.

Vaill. Afriq. 241.

Der Oberleib roſtgrau; der Unterleib weißlich; auf den Schultern ein gelber Fleck; die drei äußern Schwanzfedern an der Wurzel mit einem ſchwarzen Fleck. Im innern von Südafrika *).

Bartkukuke. Monasa. Vieill. (Barbacous).

Der Schnabel iſt etwas kegelförmig, verlängert, wenig zuſammengedrückt, und an ſeiner Wurzel mit ſteifen Haaren oder bartloſen Federn beſetzt, welches ihnen einige Aehnlichkeit mit den Bartvögeln giebt.

Gelbbrüſtiger Bartkukuk. Mon. tenebrosa.

Enl. 505. Barbacou écaudé de cayenne.

Schwanz keilförmig, nicht lang; Hauptfarbe ſchwarz, Unterrücken und Steiß weiß, Bauch roſtfarb. Am Männchen ein pomeranzenfarbes Querband an der Bruſt. In Cayenne **).

---

*) Indicat. minor. Cuv. Vaill. 242.

**) Cucul. tranquillus. enl. 512. — Cuc. paradisaeus iſt ein Drongo. Edolius malabaricus. Cucul. sinensis iſt Corvus erythropterus. Vaillant hat um die Naturgeſchichte der Kukuke viele Verdienſte.

Digitized by Google

Die Malcohas. Malcoha. Vaill. Phoenicophaeus. Vieill.

Der Schnabel ist sehr dick, an seiner Wurzel abgerundet, gegen seine Spitze gebogen, um die Augen ist ein breiter, nackter Fleck. Bey einer Art stehen die runden Nasenlöcher an der Schnabelwurzel; bey einer andern sind sie schmal und stehen nahe am Rande des Schnabels. Diese Vögel leben in Zeilon, und sollen sich vorzüglich von Früchten nähren.

Rostgrüner Malcoha. Malc. viridirufus.

Malcoha rouvendin. Vaill. Afr. 225.

Auf dem Kopfe lange, weiche, graue Federn, der kahle Fleck um die Augen roth, der Rücken grün, Flügel blau, Unterleib rostfarb. Der Schwanz lang und keilförmig, blau, jede Feder mit rostfarber Spitze.

Grüner Malcoha. Malc. viridis.

Vaill. Afr. 224.

Das Gesicht fast ganz kahl und gelb, die übrigen Kopffedern kurz und wie der Hals graulich. Rücken, Flügel und Schwanz grün, letzterer lang, keilförmig, alle Federn am Ende weiß. Brust und Unterleib weiß. Dahin gehört auch Cuculus pyrrhocephalus.

Rinnenschnabel. Scythrops. Lath.

Der Schnabel ist noch länger und dicker als bey den Malcohas, messerförmig, die Firste gebogen, zu beyden

Seiten mit zwey Rinnen, die der Länge nach laufen, aber nicht tief sind. Dieser Schnabelbau nähert sie den Toukans, aber die Zunge ist nicht zaserig. Man kennt nur eine Art aus Neuholland.

Neuholländischer Rinnenschnabel. Scythr. novae. Hollandiae. Lath.

Scythrops Australasiae. Sh. Phill. 165. et Jonhn. White.

Mit rothen, runzlichen Nasenlöchern und nackten Augenkreisen; Hauptfarbe aschgrau, Schwanz mit schwarzen und weißen Bändern.

Bartvogel. Bucco. (Barbus).

Der Schnabel dick und auf den Seiten aufgeblasen, bald länger, bald kürzer als der Kopf, zusammengedrückt, spitzig, bey einigen ist die Spitze doppelt gezackt, und die Schneide der Oberkinnlade ausgezackt. An der Schnabelwurzel stehen fünf Büschel harter, vorwärtsstehender Bartborsten, nehmlich ein Bündel hinter jedem Nasloche, einen zu jeder Seite der Unterkinnlade, und einen unter dem Schnabel. Die Flügel sind kurz, der Körperbau dick, daher der Flug ungeschickt. Sie leben von Insekten, greifen selbst kleine Vögel an, doch genießen sie auch Pflanzensaamen. Sie nisten in hohlen Bäumen.

Man kann die Bartvögel in drei Gattungen theilen.

Schnurrvogel. Pogonias. Illig. (Barbicans).

Der Schnabel mittelmäßig, dick, an der Wurzel mit Bartborsten, die Schnabelgräthe abgerundet, gebogen, am

Oberſchnabel zwey ſtarke Zähne, die untere Kinnlade in die Quere gefurcht; der Bart ſehr ſtark, man findet ſie in Afrika und Indien. Sie leben mehr von Früchten als die andern Bartvögel.

Großer Schnurrvogel. Pogonias major. Cuv. *).

Bucc. dubius. Enl. 602. Vaill. ois. de Parad. pl. 19.

Oberleib ſchwarz, Unterleib roth, ein Band über die Bruſt, Schenkel und Steiß ſchwarz. Der Schwanz lang. In Afrika.

Eigentliche Bartvögel. Bucco. Linn. (Barbus).

Der Schnabel iſt ganz einfach, kegelförmig, die Firſte abgerundet, in der Mitte etwas erhaben. Sie leben in den Tropenländern beyder Continente, und haben mehrentheils lebhafte Farben. Zur Begattungszeit leben ſie paarweiſe, außer dieſer in kleinen Geſellſchaften.

Großer Bartvogel. B. grandis.

Enl. 871.

Grün, mit verſchiedenem Schiller; After roth, Schwungfedern ſchwarz gemiſcht. In China.

---

*) Pogonias minor. Vaill. ois. de Parad. pl. A. Bucco — niger. — Rubicon. Vaill. — Pogon. Vieilloti.

Digitized by Google

Feuerköpfiger Bartvogel. B. ignicapillus.

Am Oberschnabel ein starker Zahn. Kopf und Kehle feuerroth, ersterer schwarz, letztere weiß gefleckt. Vorderhals und Brust weiß, roth gefleckt, Unterleib schwefelgelb, Oberleib schwarz, am Halse weiß, auf dem Rücken schwefelgelb gefleckt. Schwanz kurz und wie die Flügel schwarzbraun, letztere mit schmalen, schwefelgelben Rändern an den Federn *). Am Senegal.

Tamatias. Tamatia. (Capito. Vieillot).

Der Schnabel ist etwas verlängert und mehr zusammengedrückt, die Spitze der obern Kinnlade übergebogen. Ihr großer Kopf, ihr kurzer Schwanz, ihr großer Schna-

*) Diesen Vogel finde ich nirgends beschrieben, ungeachtet des Zahns scheint er seiner ganzen Form nach zu Bucco nicht zu Pagonias zu gehören. A. d. U. Es gehören ferner hieher: Buc. viridis. enl. 870. — Flavifrons. Cuv. Vaill. ois. de Parad. 55. — Cyanops. Cuv. Vaill. 21. — Lathami. Lath. Syn. I. pl. 28. — Philippensis. enl. 336. — Rubricapillus. Brown. III. XIV. — Rubricollis. Cuv. Vaill. 35. — Torquatus. Cuv. Vaill. 37. — Roseus. Cuv. Vaill. 33. — Niger. enl. 688. 1. — Elegans et maynanensis. enl. 688. — Barbiculus. Cuv. Vaill. 56. Hahn's Vögel. VIII. — Parvus. Vaill. 32. mas. Enl. 746. 2. fem. — Erythronotus. Cuv. Vaill. 57. — Zeylanicus. Brown. III. XV. — Cayennensis. enl. 306. — Peruvianus. Cuv. Vaill. 27. — Nigrothorax. Vaill. 28. vielleicht alle drey nur Varietäten. — Fuscus. Vaill. 43. Einige sind vielleicht nur Geschlechtsverschiedenheiten.

Digitized by Google

bel giebt ihnen ein dummes Anſehen. Sie leben alle in Amerika, und nähren ſich blos von Inſekten. Ihr Naturell iſt träge, es ſind einſame Vögel.

Der gefleckte Tamatia. Tam. maculata. Cuv.

Enl. 746. 2. Bucco Tamatia. Linn.

Der Kopf groß, der Schnabel an der Spitze gleichſam geſpalten; die Hauptfarbe oben rothbraun; unten röthlichweiß, ſchwarz gefleckt; Kehle orangefarb; um den Hals ein gelbrother, ſchwarzgemiſchter Halbmond. Hinter den Augen ein ſchwarzer Fleck. In Cayenne, Braſilien *).

Nagevögel, Kurukus. Trogon. (Couroucous). Linn.

Sie haben wie die Bartvögel Büſchel von Bartborſten, einen kurzen Schnabel, der breiter als hoch iſt, und ſich von der Wurzel an biegt, die obere Firſte iſt ſtumpf, die Schnabelſchneiden gezähnelt. Ihre kurzen Füße ſind mit Federn bis faſt auf die Zehen bedeckt; der Schwanz iſt lang und breit, das Gefieder weich, leicht und dicht. Sie haben daher ein ganz anderes Anſehen als die Bartvögel, meiſt iſt ein Theil ihres Gefieders metallglänzend;

---

*) Das Wort Tamatia ſtammt aus Braſilien, und bedeutet nach Margraf einen Vogel dieſer Art, in Paraguay heißen ſie nach Azara, Chacurus. Es gehören hieher von den Linneiſchen Buccos. — Macrorhynchos. enl. 689. — Melanoleucos. enl. 688. 2. — Collaris. enl. 395.

und das Uebrige mit lebhaften Farben geziert. Sie niſten in Baumlöchern, nähren ſich von Inſekten, leben einſam und ſitzen oft lange ſtill in dichtem Gebüſche, auf niedrigen Aeſten, beſonders in ſumpfigen Waldungen, und fliegen faſt nur am Morgen und Abend. Der Name Curuku drückt ihr Geſchrei aus, ſie heißen ſo in Braſilien. Man findet dieſe Vögel in den warmen Gegenden beyder Continente.

Der rothbauchige Nagevogel. Trog. Curucui. Linn.

Enl. 452. Hahn, Vögel. VII. Lieferung.

Kopf, Hals und Schwanz grün, metallglänzend. Kehle ſchwarz, Deckfedern der Flügel grau, ſchwärzlich in die Quere geſtreift, die äußern Schwanzfedern weiß und ſchwarz geſtreift. An der Bruſt ein weißes Band, Unterleib roth. In Neuſpanien, Peru und Mexiko *).

Madenfreſſer. Crotophaga. Linn. (Anis).

Der Schnabel iſt dick, zuſammengedrückt, gebogen, ohne Zähne, und läuft an ſeiner Firſte oben in eine ſchneidende Gräthe aus, welche über den ganzen Oberſchnabel hinläuft. Von der Seite betrachtet, iſt der Schnabel halb eiförmig. Die Naſenlöcher liegen zur

*) In Amerika ferner: Trog. viridis. enl. 293. — violaceus. Nov. comm. petrop. XI. pl. 16. F. 8. — Strigilatus. enl. 765. — Rufus. enl. 736. — In Aſien, Trog. fasciatus. ind. Zool. pl. 5. — In Afrika, Trog. Narina. Vaill. ois. d'Afriq. 228. 229.

Digitized by Google

Seite. Die Zunge ist platt und spitzig. Der Schwanz lang und keilförmig. Sie leben von Insekten und Körnern; fliegen in Gesellschaften, und haben die sonderbare Gewohnheit, daß mehrere Paare ihre Eier in ein Nest legen, und zusammen brüten. Dieses Nest ist auf Zweige gebaut, und seine Größe richtet sich nach der Zahl der brütenden Paare, welche das Nest bewohnen. Sie lassen sich leicht zahm machen, und lernen selbst reden. Man kennt zwey Arten, beyde in Südamerika. Ihr Fleisch hat einen unangenehmen Geruch.

Kleiner Madenfresser. C. Ani.

Enl. 102.

Schwarzviolet, mit kupfergrünen Federrändern. Der Schwanz lang, keilförmig. Wie die andere größere Art, Cr. major in Brasilien, haben den Namen daher, daß sie die Oestruslarven, die das Vieh plagen, fressen.

Großschnäbel, Pfefferfresser. Rhamphastos. Linn. (Toucans).

Leicht kenntlich durch die ungeheuer großen Schnäbel, welche oft fast so groß und lang als der Körper sind, sie bestehen aus einem leichten, knochenartigen Zellengewebe, und sind mit Luft angefüllt, gegen das Ende gebogen, die Schnabelschneiden unregelmäßig gezähnelt, im Ganzen messerförmig. Die Nasenlöcher liegen an der Stirne, hinter der Schnabelwurzel. Die Zunge ist mittelmäßig lang, schmal und wie eine Feder, mit Bärten zu beiden Seiten. Sie leben nur in den heißen Theilen von Südamerika in

Digitized by Google

kleinen Gesellschaften, nähren sich von Früchten und Insekten, und während der Brütezeit, verzehren sie die Eier und neu ausgekommenen Jungen anderer Vögel. Der besondere Bau des Schnabels nöthigt sie ihre Nahrung auf eigene Art zu sich zu nehmen, wie der Wiedehopf, sie fassen sie mit dem Schnabel, werfen sie auf und fangen sie wieder, um sie zu verschlucken. Ihre Füße sind kurz, ihre Flügel klein; der Schwanz lang. Sie nisten in Baumlöchern.

Die eigentlichen Pfefferfresser. Rhamphastos.

Der Schnabel größer als der Kopf, sie sind meist schwarz, mit lebhaften Farben an der Kehle, Brust und Bürzel. Man hat ehemals diese Theile ihres Gefieders zu verschiedenen Kleiderzierarten und Verbrämungen angewendet.

Gelbkehliger Pfeffervogel. Rh. dicolorus. Linn.

Enl. 269. und 307.

Grünlichschwarz, Kehle gelb, Brust, Oberbauch, Steiß und After roth *). Cayenne, Brasilien.

Araka-

*) Rhamph. Toco. enl. 82. — Tucanus. Edw. 329. — Piscivorus. Edw. 64. Enl. 262. — Maximus. Cuv. Vaill. Touc. pl. 6. — Pectoralis. Sh. enl. 269. und 307. — Aldrovandi. Sh. Alb. II. 25. — Erythrorhynchus. Sh. enl. 262.

Arakaris. Pteroglossus. Illig.

Der Schnabel iſt kleiner, ſtärker gezähnt, und die Subſtanz deſſelben feſter; ſie ſind kleiner, die Grundfarbe ihres Gefieders meiſt grün, an der Bruſt roth oder gelb.

Der Arakari. Pterog, Aracari.

Enl. 166.

Kopf, Hals, Rücken, Flügel und Schwanz ſchwarzgrün, Unterleib gelb, eine Binde am Bauche und Bürzel roth. Oberſchnabel weiß, die Firſte oben ſchwarz. In Braſilien *).

Papageien. Psittacus. Linn. (Les Perroquets).

Der Schnabel dick, hart, von feſtem Gewebe, von allen Seiten abgerundet, an ſeiner Wurzel mit einer Haut bedeckt, durch welche die Naſenlöcher durchgehen. Der Oberſchnabel ſtark gebogen, über den Unterſchnabel weggehend ſehr ſpitzig. Der Unterſchnabel kürzer, vorn mit einem ſchneidenden Querrande um den Oberſchnabel zur Unterlage zu dienen, aufwärts gebogen. Die Zunge dick, fleiſchig und rund. Dieſer Bauch ſcheint ihnen die Leich-

*) Hieher gehören: Rhamph. viridis. enl. 727. 728. — Piperivorus. enl. 579. und 729. Beym Arakari iſt der Schnabel viel größer als der Kopf, und ſo auch bey andern; Cuvier ſagt daher mit Unrecht kleiner als der Kopf, im Ganzen iſt er kleiner, als bey den eigentlichen Großſchnäbeln. A. d. U.

tigkeit zu geben, die menschliche Stimme nachzuahmen, worin sie alle andern Vögel übertreffen. Zu dieser Geschicklichkeit hilft ihnen auch noch die Einrichtung des untern Luftröhrenkopfes, welcher zu beyden Seiten drei eigene Muskeln hat. Die starken Kinnladen haben mehrere und stärkere Muskeln als bey andern Vögeln, sie können daher sehr heftig beißen, und den ganzen Körper am Schnabel aufhängen. Die obere Kinnlade ist auch beweglich eingelenkt, eine Eigenschaft, welche auch noch bey einigen andern Vögeln gefunden wird. Der Darmkanal ist sehr lang, aber ohne Blinddarm. Ihre Nahrung besteht in Früchten aller Art. Sie klettern sehr geschickt und bedienen sich dazu wechselsweise des Schnabels und der Füße. Es sind launische, tückische und oft böse Vögel. Der Körper ist schwer, der Flug ungeschickt. Sie nisten fast alle in hohlen Bäumen, ihre Stimme ist sehr kreischend und lärmend; die meisten sind mit sehr lebhaften Farben geschmückt, grün, roth, blau und gelb, sind die Hauptfarben. Sie haben mit den Affen dasselbe Vaterland gemein, und finden sich nur in den Tropenländern aller Continente, auch in Neuholland, wo die Affen ganz fehlen. Jeder Continent hat aber seine eigenen Arten. Diese sind sehr zahlreich, und oft nahe in einander übergehend; einige Arten sind weit verbreitet, andere haben ein sehr eingeschränktes Vaterland, und finden sich nur auf einzelnen Inseln, da ihr ungeschickter Flug und schwerer Körper ihnen nicht erlaubt, über Meere zu fliegen. Sie lassen sich alle leicht zähmen, pflanzen sich aber in kalten Klimaten nicht fort und werden sehr alt, oft über hundert Jahre. Man ist genöthigt, um sie leichter über-

Digitized by Google

ſehen zu können, mehrere Unterabtheilungen zu machen, die ſich beſonders auf die Form des Schwanzes oder der Federbüſche beziehen.

Papageien mit nackten Backen und langen Schwänzen. Aras oder Araras. (Aras).

An den Backen ſind keine Federn; es ſind Arten, welche in Amerika leben, die meiſten ſehr groß und vom ſchönſten Gefieder, die man deswegen häufig nach Europa bringt. Sie fliegen truppweiſe, und lernen nicht gut ſprechen.

Rother Ara. Psitt. Macao. Linn. Enl.

Wangen nackt, runzlich, weiß. Hauptfarbe brennendroth, Schultern blau und grün; Flügel oben dunkelblau, unten kupferfarben, die beyden mittlern, langen Schwanzfedern roth, mit hellblauer Spitze. Der größte Vogel der Gattung, faſt wie ein Faſan; er lebt häufig in Braſilien, wo er Arara heißt und gegeſſen wird; niſtet auf abgeſtutzte Bäume und brütet zweymal; legt zwey Eier *).

---

*) Dahin gehören (Rothe): Ps. Aracanga. Vaill. I. pl. 2. — Tricolor. V. pl. 5. — (Blaue), Ararauna. Linn. — Hyacinthinus. Lath. — (Grüne). Ambiguus. Bechst. — Militaris. Linn. V. 4. — Severus. Linn. V. 8. — Macavvuanna. Linn. V. 9. 10. 11. — Illigeri. Temm. et Kuhl. Alle aus Amerika.

Sittiche. Perruches. Vaillant. (Conurus. Kuhl).

Der Schwanz länger als der Körper, oder gleich lang, oder etwas kürzer, keilförmig zugespitzt, der Schnabel mittelmäßig, das Gesicht befiedert.

Ara-Sittiche. Perruches. Aras.

Mit nackter Augengegend.

Guyanischer Sittich. Ps. Guyanensis. Linn.

Vaill. 14. 15. Perruche. Ara pavouane.

Grün, das Hinterhaupt blaugrün; Flügel und unterer Theil des Schwanzes grüngelb; der Flügelrand hochroth, der Schwanz etwas länger als der Körper, 11 Zoll lang *). Amerika.

Pfeilschwanz-Sittiche. Perruches à queue en fleche.

Die mittlern Schwanzfedern sehr lang, die Augenkreise befiedert.

Alexanders-Sittich. Ps. Alexandri. Linn. Enl. 642.

Von der Größe einer Turteltaube, grün, Kehle schwarz, am Halse ein röthliches Halsband. In Süd-

*) Auricapillus. Lichtenst. — Squamosus. Lath. — Vittatus. Shaw. — Leucotis. Licht. — Versicolor. Lath. Alle aus Amerika. Solstitialis aus Afrika. Inornatus. Kuhl.

Digitized by Google

Aſien, lernt leicht, aber undeutlich ſprechen. Iſt durch Alexanders Züge nach Europa gekommen *).

Eigentliche Sittiche. Perruches. Vaill.

Mit langem, keilförmigem Schwanz, die Augenkreiſe befiedert.

Der Sittich von Pondichery. Ps. Pondicerianus. Linn.

Vaill. 31. Perruche à poitrine rose. Ps. mystaceus. Schaw. Bimaculatus. Sparr. Mus. Carls.

Der Kopf blaugrün, an den Seiten des Schnabels ein großer Fleck und eine ſchmale Stirnbinde, bis zu den Augen gehend, ſchwarz; Vorderhals, Bruſt und Oberbauch weinrothlich, Unterbauch grün; der Oberleib grün, die Schultern gelb; der Schwanz blaugrün; der Schnabel roth; die Flügel gelbgrün, 13 Zoll lang. In Pondichery **).

---

*) Dahin gehören: Ps. torquatus. Brist. — Annulatus. Bechst. — Erythrocephalus. Linn. — Barbatulatus. Bechst. — Bengalensis. — Papuensis. Linn. — Bitorquatus. Kuhl.

**) Ps. Guaruba. Marg. — Carolinensis. Gmel. — Ludovicianus. L. — Pertinax. L. — Aureus. Gm. — Canicularis. Gm. — Aeruginosus. L. — Viridissimus. Temm. — Rufirostris. L. — Buccalis. Bechst. — Murinus. Gm. — Xanthosomus. Bechst. — Hematopus. L. — Capistratus. Bechst. — Ornatus. L. — Lichtensteinii. Bechst. — Lunatus. Bechst. — Marginatus. Gm. — Macrorhynchus. Gm. — Concinnus. Shaw. — Pusillus. Lath. Discolor.

Digitized by Google

Breitschwänzige Sittiche. Perruches à large queue. Vaill.

Mit langem, gegen das Ende breiterm Schwanz.

Masken-Sittich. Ps. mascarinus.

Der Schnabel roth; der Schwanz so lange als der Leib und etwas abgestuft, am Ende breit; Hauptfarbe braun; das Gesicht schwarz, wie eine Maske; Kopf und Hals aschgrauviolet; die Wurzeln der Seitenfedern des Schwanzes weiß. In Madagascar und auf der Insel Bourbon *).

Rothe oder Lory-Sittiche. Perruches. Loris. Vaill.

Dahin gehören die Arten, deren Hauptfarbe roth ist. Sie leben in Ostindien.

Lath. — Humeralis. Bechst. — Australis. Brown. — Chlorolepidotus. Kuhl. — Undulatus. Schaw. — Ultramarinus. Kuhl. — Chrysostomus. Kuhl. — Pulchellus. Shaw. — Zonarius. Shaw. — Palmarum. Lath. — Cervicalis. Lath. — Smaragdinus. Gmel.

*) Ps. niger. L. — Vasa. Shaw. — Spurius. Kuhl. — Venustus. Brown. — Cyanomelas. Kuhl. — Erythropterus. Lath. — Icterotis. Temm. — Eximius. Lath. — Multicolor. Brown. — Elegans. Lath. — Brownii. Kuhl. — Scapulatus. Bechst. — Tabuensis. Lath.

Digitized by Google

Lory-Sittich. Psitt. Lory. Linn.
Vaill. pl. 123. Enl. 168.

Hals, Bürzel und Schnabel roth, Nacken, Bruſt und Oberrücken blau, Scheitel ſchwarz. Lebt auf den Molukken und wird ſehr zahm *).

Erdſittiche. Pezoporus. Illig. Perruches. ingambes.

Der Schnabel ſchwächer, die Läufe länger, die Nägel an den Füßen gerader. Sie laufen faſt nur auf der Erde, und ſuchen ihre Nahrung im Graſe.

Schöner Erdſittich. Pezop. formosus.

Die Hauptfarbe grün, die Deckfedern der Flügel, und die meiſten Schwanzfedern ſchwarz und gelb gebändert. In Neuholland **).

Sperlingspapageien. Psittacula. Kuhl.

Der Schwanz viel kürzer als der Körper, zugeſpitzt, der Schnabel mittelmäßig, das Geſicht befiedert, der Körper klein.

---

*) Ps. Ruber. Gm. — Grandis. Gm. — Unicolor. Vaill. — Guebiensis. Gm. — Incarnatus. Gm. — Borneus. Linn. — Domicella. Gm. — Garrulus. Linn. — Cyanurus. Shaw. — Coccineus. Briss. — Riciniatus. Bechst. — Novae guineae. Linn.

**) Kuhl rechnet zu dieſer Illigeriſchen Gattung: Ps. Novae Zeelandiae. Lath. — Ulietanus. Lath. — Erythronotus. Kuhl. — Cornutus. Gmel. — Auriceps. Kuhl. Alle aus Auſtralien.

Digitized by Google

Amerikaniſcher Sperlingspapagey. Psit. passerinus.

Von der Größe eines Sperlings, oben dunkelgrün, unten hellgrün, der Steiß und die Schwungfedern der zweyten Ordnung himmelblau. Schwanz grün. Südamerika *).

Wahre Papageien.

Der Schwanz kurz, viereckig; der Schnabel ſtark und krumm; Das Geſicht befiedert; der Kopf groß, ohne Federbuſch. Der Körper dick.

Man kann ſie eintheilen

A. In Großköpfe. Die Größe mittelmäßig, die Farbe nicht grün.

---

*) Ps. St. Thomae. Kuhl. — Tui. Gmel. — Surdus. Illig. — Melanotus. Licht. — Purpuratus Lath. — Melanopterus. Gmel. — Pileatus. Gmel. — Barabandi. Vaill. — Vulturinus. Illig. Alle aus Amerika. — Ps. canus. Gm. — Swinderianus. Kuhl — Roseicollis. Vieill. Aus Afrika. Ps. Galgulus. — Philippensis. Briss. — Vernalis. Sparrm. — Indicus. Gmel. — Torquatus Gmel. — Simplex. Kuhl. — Pullarius. Gmel. — Micropterus. Kuhl. — Malaccensis. Lath. — Incertus. Shaw. Aus Aſien. Taitianus. Gmel. — Sparrmanni. Vaill. — Fringillaceus. Gmel. — Phigy. Bechst. Aus Auſtralien.

Digitized by Google

Grauer Papagei. Ps. erythacus. Linn.

Enl. 311.

Grau, der Schwanz roth, lebt in Afrika, lernt sehr gut sprechen, und kommt häufig nach Europa *).

B. Mit kleinerm Kopf, mittelmäßig großem Körper, und grüner Farbe.

Rothstirniger Papagei. Ps. mitratus.

Princ. Max.

Der Körper hellgrün, Stirn und Vorderkopf hochblutroth, Gesicht, Nacken und Kehle grün, mit Hochroth gemischt; die innere Fahne der Schwungfedern blau, grün gerändert, der Schwanz unten grünblau, oben grün, an der Spitze dunkelblau. In Brasilien **).

C. Rothsteißige. (menstrui).

Mittelmäßige Größe, der Steiß roth.

Rothsteißiger Papagei. Psitt. menstruus.

Gmel.

Kopf, Hals und Unterleib blau, letzterer grünblau, Rücken und Flügel grün, Steiß roth, Schwanz an der Wurzel roth, das Uebrige blau. In Brasilien ***).

---

*) Ps. melanocephalus. L. — Leucogaster. Illig. Aus Amerika. — Senegalus. Gm. Aus Afrika.

**) Ps. Signatus. Shaw. — Cyanogaster. P. M. — Brachyurus. Temm. Aus Amerika. — Spadiocephalus. Kuhl. — Gramineus. Gmel. — Sinensis. Aus Asien. — Levaillanti. Aus Afrika. — Geoffroyi. Vaill. — Néstor. Lath. Aus Australien.

***) Ps. Maximiliani. Kuhl. — Purpureus. Gmel. — Sordidus. Linn.

Digitized by Google

D. Amazonen. Perroquets.

Ziemlich groß, der Körper dick, Hauptfarbe grün.

Gemeiner Papagei. Ps. aestivus.

Enl. 547.

Grün, oben grau und braunschillernd, unten gelbgrün; ein Streif durch die Augen blau, Wangen gelb. Auf den Schwungfedern ein rother Fleck. Die äußern Schwanzfedern blau, die andern grün, alle an der innern Fahne scharlachroth, an der Spitze gelblich *). In Südamerika.

E. Falkenartige. Accipitrini.

Solche, welche die Nackenfedern aufrichten können.

Falkenartiger Papagei. Ps. accipitrinus. Gmel. Linn.

Der Vorderkopf bräunlichrothergelb, Scheitel und Backen heller, braun gestreift; Brust purpurbraun; die Nackenfedern aufstehend, lang; der Unterleib purpurfarb, mit einer bläulichten Binde; der Steiß, die Seiten des Bauches und die untern Deckfedern der Flügel grün, die

*) Ps. Amazonicus, Lath. — Bouqueti. Vaill. — Cyanotis. Temm. — Erythrurus. Kuhl. — Vinaceus. Pr. Max. — Dufresnianus. Vaill. — Autumnalis. L. — Havanensis. Gm. — Leucocephalus. L. — Albifrons. Lath. — Pulverulentus. Gm. — Festivus. Gm. — Cactorum. P. M. Paradisi. — Aurora. — Gerini.

Digitized by Google

Schwanzfedern unten braun. So groß als der Gemeine. In Südamerika.

Kakadus. Kacatua. Vieill.

Papageien mit kurzem, abgestutztem Schwanze, welche sich durch schöne Federbüsche auszeichnen, welche aus zwey Reihen Federn bestehen, welche der Vogel nach Willkühr aufrichten oder niederlegen kann. Sie leben auf den ostindischen Inseln; es sind die gelehrigsten Arten, bewohnen gerne sumpfige Gegenden, und sind meist weiß von Farbe.

Gelbbuschiger Kakadu. Ps. sulphureus. Linn.

Enl. 14.

Weiß, mit langem, schwefelgelbem Federbusch, unter den Augen ein schwefelgelber Fleck, die Wurzelhälfte der Seitenschwanzfedern ebenfalls gelb. In den Molukken *).

Einige Arten, welche neuerlich in Neuholland entdeckt wurden, haben kürzere und weniger bewegliche Federbüsche, aus breiten, nicht sehr langen Federn bestehend. Sie leben vorzüglich von Wurzeln; die Hauptfarben sind schwarz oder braun.

---

*) Indische: Cristatus. enl. 263. — Philippinarum. enl. 191. Moluccensis. Enl. 498. Australische: Galeritus. Lath. — Tenuirostris. Kuhl. — Eos. Kuhl. (Rosenroth).

Digitized by Google

Bankſcher Kakadu. Psit. Bancsii. Lath.

Lath. Synops. Suppl. pl. 63.

Schwarz am Federbuſch und auf den Deckfedern der Flügel gelb punktirt; die Seitenfedern des Schwanzes in der Mitte ſcharlachroth, mit ſchwarzen Streifen. In Neuholland *).

Rüßelpapageien. Proboscigeri. Kuhl. Aras à trompe. Vaill.

Der Schwanz iſt kurz und abgeſtumpft, der Federbuſch beſteht aus langen, ſchmalen Federn, ſie gleichen hierin den Kakadus. Die Backen ſind nackt, wie bey den Aras, der Oberſchnabel ungeheuer groß, der untere ſehr kurz, ſo daß ſie denſelben nie ganz ſchließen können; die Zunge iſt cylindriſch, an der Spitze etwas bohl, gespalten, und kann weit aus dem Schnabel vorgeſtreckt werden. Die Knie ſind kahl, die Läufe kurz und platt, ſo daß ſie ſich beym Gehen zuweilen darauf ſtützen. Man kennt zwey Arten, beyde aus Oſtindien.

Schwarzer Rüßelpapagei. Ps. aterimus. Gmel.

L'Ara noir à trompe. Vaill. pl. 12. 13.

Schwarz, ein Theil über der Ferſe nackt, der Federbuſch etwas heller, die Backen roth. In Zeilon und Neuholland **).

---

*) Galeatus. Lath. — Funereus. Shaw. — Temminki. Kuhl. — Leachii. Kuhl.

**) Ps. Goliath. Kuhl. Die Hälfte größer als der vorige, im Leben grau, nach dem Tode ſchwarz.

Digitized by Google

Gewöhnlich ſetzt man unter die Abtheilung der Klettervögel, zwey einander ähnliche, afrikaniſche Vögel, welche den Uebergang zu den Hühnern zu machen ſcheinen, und beſonders den Hokkos ſich nähern. Linneus hat ſie ſonderbarer Weiſe unter die Kukuke gebracht, denen ſie nicht von Ferne angehören.

Trägvogel, Turako. Corythaix. Illig. Opetus. Vieill.

Der Schnabel kürzer als der Kopf, abgerundet, kegelförmig von der Wurzel an gebogen, die Schnabelſchneiden gezähnelt. Die Naſenlöcher mit rückwärtsliegenden Federn bedeckt, an der Schnabelwurzel liegend. Die Zunge knorplig, platt und ſpitzig. Die Füße Kletterfüße; eine kurze Haut verbindet die Zehen, die äußere Zehe iſt eine Wendezehe. Das Bruſtbein iſt wenig ausgeſchweift. Flügel und Schwanz wie bey den Hokkos, ſie leben wie dieſe auf Bäumen.

Grüner Trägvogel. Coryth. Persa.

Enl. 601. Cuculus persa. Linn.

Schwanz gleich; Kopf mit einem Federbuſch verſehen; Hauptfarbe dunkelgrün, am Unterleib, Steiß und Schultern bläulich purpurfarben. Ein Theil der Flügelfedern karmoiſinroth, Größe einer Elſter. Am Cap, nährt ſich von Früchten, und niſtet in hohlen Bäumen; ſein Geſchrei gleicht etwas dem des Kukuks *).

*) Hieher gehört der große Turako: C. Gigas. Vaill. promer. et guep. pl. 19. Eine andere graubraune Art, mit weißem,

Musafresser. Musophaga. Linn. (Musophages).

Sie heißen so, weil sie hauptsächlich von Früchten der Bananen leben. Der Schnabel kurz, dick, die Wurzel des Oberschnabels geht über die Stirne hin. Die Schnabelschneiden sind stumpf und unregelmäßig gezähnt. Die Nasenlöcher liegen mitten in der Oberkinnlade, sind eirund und offen. Die Zunge kurz und dick. Die Füße Kletterfüße.

Violetfärbiger Musafresser. M. violacea. Lath.

Touraco violet. Vaill. Promer. pl. 18.

Der Augenkreis nackt und roth, das Gefieder violet, Hinterhaupt und große Schwungfedern karmoisinroth; unter dem nackten Fleck am Auge, geht eine weiße Linie. Dieser Vogel findet sich in Guinea und am Senegal.

Vierte Ordnung der Vögel.

Hühnerartige. Gallinaceae.

Diese Ordnung begreift diejenigen Vögel in sich, welche Aehnlichkeit in ihrem Bau mit den Haushühnern haben. Die vordern Zehen sind an der Wurzel durch eine

---

braungesprenkeltem Unterleib, scheint Lathams: Phasianus. Africanus. Temmink setzt die Tourakos unter die Musafresser.

Haut vereinigt, welche kurz und an ihrem Rande gezähnelt ist; der Oberschnabel ist gewölbt, die Nasenlöcher laufen in einem bedeutenden Raume durch eine Haut bis zur Basis des Schnabels, und sind mit einer knorpligen Schuppe bedeckt. Der Körper ist schwer und stark, die Flügel kurz. Das Brustbein hat eine starke Gräthe und ist zu beyden Seiten so stark und so tief ausgeschweift, daß diese Ausschweifungen beynahe die ganze Seite einnehmen. Der Kamm des Brustbeins ist oben schief abgeschnitten, so daß die Spitze des Gabelknochens sich nur durch ein Ligament mit ihm verbindet. Alles Umstände, welche, in dem sie den Brustmuskeln schwache Stütze geben, den Flug schwieriger machen. Der Schwanz besteht meist aus 14 bis 18 Federn, zuweilen sogar aus zwanzig, ausgenommen bey den Hokkos. Der untere Luftröhrenkopf ist sehr einfach; das Geschrei fast aller ist daher unangenehm. Sie haben einen dünnhautigen aber sehr weiten Kropf und einen sehr starken und sehr muskulosen Vormagen. Die Hokkos allein ausgenommen, legen sie ihre Eier in Nester auf der Erde. Ihre Nester bestehen blos aus einigen Stroh- oder Grashalmen ohne alle Kunst zusammengelegt. Die mehrern leben in der Vielweiberei, und das Männchen bekümmert sich nicht um das Brüten. Dieses und die Führung und Sorge für die Jungen, ist allein dem Weibchen überlassen. Die Jungen aller Hühner aber kommen sehr entwickelt aus den Eiern, und laufen sogleich, so wie sie auskriechen, daher sind die Eier groß. Keine Vögel vermehren sich so stark wie die Hühner, und ihre Menge steht mit ihrer großen Nützlichkeit für den Menschen im Gleichgewicht. Sie laufen ausserordentlich

schnell, fliegen desto weniger, schlafen meist gerne an erhabenen Orten, viele aber gehen gar nicht auf Bäume. Sie baden sich oft im Sande. Unter allen Vögeln ist keine Art so nützlich für den Menschen, viele lassen sich zähmen, und sind schon seit den ältesten Zeiten Hausthiere geworden, und durch alle Klimate verbreitet. Alle haben ein gesundes und nahrhaftes Fleisch, und die Eier geben eine eben so gesunde als nährende Kost. Man findet diese Ordnung in heißen und kalten Klimaten. Viele zeichnen sich durch die ausserordentliche Pracht und Reichthum ihres Gefieders aus, doch immer nur die Männchen. Die Weibchen haben keine so schönen Farben, und sind bey den meisten Gattungen viel kleiner und unansehnlicher als die Männchen.

Die Gattungen sind schwer zu bestimmen, die Gattungskennzeichen müssen von der verschiedenen Form der Anhängsel an ihrem Kopfe, oder an der Kehle hergenommen werden. Temmink hat diese sehr natürliche Familie in seinem Werke über die Hühner und Tauben sehr gut auseinandergesetzt, und in seinem Prachtwerke abgebildet.

Pfau. Pavo. Linn. (Paon).

Der Schnabel mittelmäßig, dick, an der Wurzel nackt, die obere Kinnlade gegen das Ende gebogen, gewölbt. Die Nasenlöcher zur Seite, an der Schnabelwurzel offenstehend. Die Zunge fleischig ungespalten. Der Kopf befiedert, mit einem Federbusch, die Deckfedern des Schwanzes am Männchen viel länger als der Schwanz, in einen Kreis aufrichtbar, daher die unterliegenden Theile eigene,

starke Muskeln haben; diese Federn sind mit augenförmigen Flecken geziert. Die Füße stark, am Männchen bespornt. Die Läufe mit Tafelschildern bedeckt, die Zehen geschildert. Die Zehenverbindungshaut schuppig. Die Hinterzehe kürzer als die Mittelzehe. Der Name stammt vom Geschrei.

Federbusch-Pfau. Pav. cristatus. Linn.

Enl. 433. 434.

Dieser Vogel ist seit den ältesten Zeiten aus seinem Vaterlande dem nördlichen Indien, seiner Schönheit wegen in andere Klimate verpflanzt worden. Alexander brachte die ersten nach Europa. Man möchte ihn wohl den schönsten Vogel nennen, sein Gefieder ist unnöthig zu beschreiben, da er so allgemein bekannt ist. Man findet eine ganz weiße und eine geschäckte Varietät. Das Weibchen, gewöhnlich vom Männchen sehr verschieden, bekommt zuweilen im Alter männliche Federn. Das Fleisch ist nur von jungen Vögeln oder Weibchen gut.

Doppelsporniger Pfau. Pavo bicalcaratus et thibetanus. Gmel. (Polyplectron. Temm.) Diplectron. Vieill.

Enl. 492. 493.

Auf dem Kopf hat er nur einen kurzen Federbusch; die Läufe am Männchen haben doppelte, oft sogar dreifache Spornen. Die Deckfedern des Schwanzes sind kürzer und mit doppelten, spiegelförmigen Flecken geziert, die

Schulterfedern haben einfache Flecken. Im nördlichen Indien und Thibet *).

Truthuhn, Puter. Meleagris. Linn. (Dindon).

Der Schnabel kurz und dick, der Oberschnabel übergebogen, gewölbt, an der Wurzel mit einer Wachshaut, die Schnabelhaut verlängert sich in eine weiche, hängende, runde Fleischwarze. Die Nasenlöcher liegen in der Wachshaut. Die Zunge ist fleischig, ungespalten. Kopf und Oberhals ohne Federn, mit Fleischwarzen bedeckt, gefärbt, mit einzelnen Haaren besetzt. An der Gurgel finden sich ebenfalls fleischige, hängende Lappen. An der Brust ist eine Warze, beym Männchen mit einem langen Haarbüschel versehen. Der Schwanz hat 18 Federn, welche in ein Rad geschlagen werden können, wozu auch die Deckfedern helfen. Die Männchen haben schwache Sporen. Nur eine Art.

Gemeiner Truthahn. Meleagris gallopavo. Linn.

Enl. 97.

Dieses Thier, welches in ganz Europa, und in andern Welttheilen als Hausthier verbreitet ist, stammt ei-

*) Der japanische Pfau (Pavo muticus), einzig bekannt nach einem Gemählde, welches im 16ten Jahrhundert aus Japan kam, ist eine höchst ungewisse Art, der eigentliche Pfau ist dort auch. Temmink beschreibt ihn nach einem Exemplar, welches am Cap war.

Digitized by Google

gentlich aus Amerika, wo es in großen Heerden sich findet. Die wilden Truthühner in Virginien sind braungrünlich, mit Kupferglanze. Sein Fleisch ist bekanntlich vortrefflich; im Zorne schlängt er ein Rad, und seine Fleischlappen schwellen roth und blau an, so daß die am Schnabel über denselben herunter hängen. Sie pflanzen sich leicht und in Menge fort.

Die Hokkos. Crax. Linn. Alector. Merrem.

Es sind große Hühner aus Amerika, welche mit den Truthühnern viel Aehnlichkeit haben. Der Schwanz hat 12 Federn, welche lang, steif, breit und abgerundet sind; keine Spornen. Bey mehreren ist die Lage und Richtung der Luftröhre sehr merkwürdig; sie geht ausserhalb dem Brustbein herab und macht eine auch wohl mehrere Krümmungen, ohne sie innert das Brustbein geht. Sie leben in Wäldern von Knospen und Früchten, nisten auf den Bäumen, und steigen darauf; sie sind gesellschaftlich, und leicht zu zähmen. Gmelin und Latham theilen sie in Hokkos und Jakus, aber nach unbestimmten Charakteren.

Sie lassen sich eintheilen

In eigentliche Hokkos und in Pauris.

Wahre Hokkos. Crax. Linn.

Der Schnabel mittelmäßig, dick, zusammengedrückt, an der Wurzel hoch. Der Oberschnabel gewölbt, an der Basis mit einem verschieden gebildeten Höcker und mit einer Wachshaut überzogen. Die Nasenlöcher liegen in dieser Haut und sind oben halb bedeckt. Der ganze Kopf

Digitized by Google

und die Kehle ist mit Federn bedeckt. Der Schwanz mittelmäßig, abgerundet. Kein Sporn. Die Daumenzehe kürzer als die Mittelzehe. Auf Kopf und Nacken stehet ein Federbusch von langen, schmalen, gekräuselten, an der Spitze vorwärts gebogenen Federn. Sie haben die Größe des Truthahns, steigen wie dieser gerne auf Bäume. Man hat sie in Amerika zum Hausthier gemacht, die ursprüngliche Farbe hat sich an diesen gezähmten, wie bey allen Hausthieren mannigfaltig verändert.

Der brasilische Hokko oder Mitu. Crax. Alector.

Enl. 86. Mitou Poranga. Margrav. Hocco Mitu-poranga.

Schwarz, der Unterbauch weiß, die Wachshaut des Schnabels wachsgelb. Die Luftröhre macht nur eine leichte Krümmung, vor ihrem Eintritt in die Brusthöhle. In Brasilien, Mexiko und Peru. Man hat sie häufig in England gezähmt, sie vermischen sich mit anderm Hausgeflügel, ertragen aber doch das Klima nicht gut.

Der Kugelträger. Crax. Globicera. Linn.

Edw. pl. 295. Hoazin du Mexique de Fernaudes? Hocco Teucholi.

Auf der Schnabelwurzel ist eine knopfförmige Erhöhung, wie eine Kirsche, von gelber Farbe und sehr hart, der wahrscheinlich wie der Schnabelhöcker der vorigen Art, mit dem Alter größer wird. Die Größe und Farbe, wie am vorigen. Der Federbusch ist schwarz und weiß. Zu-

Digitized by Google

weilen ist der Körper bey dieser und der vorigen Art weiß oder rothgelb gewellt. Beym Weibchen oft der ganze Unterkörper rothgelb, so beschreibt sie Azara. In Meriko.

Rother Hokko. Crax rubra. Linn.

Enl. 125. Hocco Coxolitli.

Lebhaft kastanienbraun, Kopf und Hals verschiedenartig weiß und schwarz gefleckt. In Peru *).

Die Pauris. Ourax. Cuv.

Der Körper ist kürzer und dicker, und die Wurzelhaut desselben, so wie der größte Theil des Kopfs, mit kurzen, dichtanliegenden Federn, sammetartig bedeckt.

Gehelmter Pauri. Ourax galeatus.

Pauxi galeata Temm. Crax Pauxi Linn. Enl. 78. Oiseau à pierre.

Er hat an der Schnabelwurzel eine eiförmige Erhabenheit, fast so groß als der Kopf, hellblau von Farbe, und so hart wie Stein; der Schnabel roth. Der Vogel ist schwarz, Unterbauch und Schwanzende weiß. Er nistet auf der Erde. Sein wahres Vaterland soll Meriko seyn, er wird aber in Amerika häufig gezähmt gehalten, und war ehemals in den Hühnerhöfen der reichen Holländer nicht selten. Von allen Arten hat diese die längste Luftröhre, sie steigt, wenn sie an das Brustbein gekommen

*) Hieher gehört: Crax caruculata. Temm. Hocco à barbillions.

ist, ausserhalb demselben herab bis ans Ende desselben rechts, biegt sich dann links, und kommt zurück und lauft dann neben dem herabsteigenden Theil aufwärts und geht über den Gabelknochen weglaufend in die Brusthöhle. Die Ringe sind alle zusammengedrückt. Die Größe wie ein Truthahn.

Der Mitu. Ourax. Mitu.

Pauxi Mitu. Temm.

Die Schnabelerhöhung besteht aus einem hornartigen Stücke. Er ist kleiner als der vorige. Der obere Theil des Körpers ist schwarz mit Purpurschimmer, der Schwanz hat weiße Endigung. Der Unterleib ist kastanienbraun. Der Schnabel schön roth. In Brasilien. Die Stimme dieser Vögel, so wie der Hokkos und der Jakus, ist lauttönend und sehr stark, sie lassen sie sehr oft hören.

Die Jakus. Penelope. Merrem.

Der Schnabel mittelmäßig lang, dünner als bey den vorigen Gattungen, an der Wurzel etwas zusammengedrückt, höher als breit, die Firste niedergedrückt, die Spitze übergebogen, gewölbt. Augenkreis und ein Fleck unter der Gurgel nackt, zuweilen aufgeblasen. Die Wachshaut oft undeutlich, und die Schnabelschneide nicht erreichend, doch auf die Wangen sich ausdehnend. Der Schwanz mittelmäßig lang, platt und abgerundet, aus zwölf Federn bestehend. Die Daumenzehe kürzer als die Mittelzehe. Die Größe im Allgemeinen, wie bey den Fasanen. Sie sind alle in Amerika zu Hause, wo sie die Stelle der

Fasanen vertreten. Sie haben keine Spornen. Die Luftröhre steigt bey den meisten unter der Haut, bis unter und hinter das Brustbein, kommt nachher zurück, um sich noch einmal zu krümmen, erst dann steigt sie wieder aufwärts und geht über den Gabelknochen weg in die Lungen.

Das Gefieder variirt oft in den Farben, so, daß es schwer ist, die Arten zu bestimmen, diejenigen besonders, welche Federbüsche haben, spielen verschieden in Braun, oder Bronze (Penelop. Jacupema. Merr.), bey einigen ist die Brust gefleckt (cristata Linn.); andere sind schwarz und gefleckt und am Federbusch und den Deckfedern der Flügel haben sie weißes (Pipile und Cumanensis). In ihrem Vaterlande heißen sie Jakus und Guans.

Der Guan. Penel. Cristata. Lath.

Penel. Gouan. Temm.

Mit einem Federbusch, der Körper ist oben und unten grünröthlich, kupferglänzend, Bürzel und Unterleib kastanienbraun, Hals und Brust weiß gefleckt; die Schläfen nackt und violet; Kehle und Kehlfleck roth und behaart. Im warmen Amerika *).

Der Marail. Penel. Marail. Lath.

Enl. 338.

Schwarzgrünlich, der Bauch rothgelb. Die Luftröhre bey beyden Geschlechtern macht nur einen kleinen Bogen, ehe sie in die Brust geht.

---

*) Dahin gehören: Penel. obscura. Illig. Jacuhu. Az. — Supercilliaris et Péoa. Temm. — Pipile. (Leucolophos et cumanensis. Merr et Jaquin).

Die Parraquas. Ortalida. Merrem.

Unterscheiden sich von den Jakus nur dadurch, daß sie an der Gurgel und um die Augen fast nichts nacktes haben.

Der Parraqua. Ortal. Parraqua. Mer.

Penelop. Parraqua. Temm. Phas. Motmot et Parraqua. Lath. Enl. 146.

Oben braun bronzirt, unten grauweißlich, auf dem Kopf rostfarben. Die Stimme dieses Vogels ist sehr stark, und spricht seinen Namen aus, er schreit fast immer. Die Luftröhre geht unter der Haut bis fast zum Unterleib und kehrt erst dann in die Brust zurück *).

Der Hoazin. Opistocomus. (Hofmannseg). Sasa. Vieillot.

Dieser Vogel, welchen man gewöhnlich zu den Fasanen zählt, muß nothwendig eine eigene Gattung ausmachen. Temmink und Vieillot werfen ihn gar aus der Ordnung der Hühner hinaus, und stellen ihn unter die Sperlingsvögel nach Menura, er scheint indeß doch den Hühnern anzugehören. Illiger nennt ihn deutsch Schopfhuhn. Der Schnabel ist mittelmäßig, dick, etwas kegelförmig,

*) Der Satyr oder Napoul aus Indien, den einige zu den Jakus rechnen, gehört wohl eher zu den Fasanen, und wird dort angeführt werden, er unterscheidet sich zu sehr von den Jakus, schon das Vaterland trennt ihn von denselben, da diese nur in Amerika vorkommen.

Digitized by Google

zusammengedrückt, an der Wurzel nackt, die Oberkinnlade abgerundet, gegen die Spitze bogenförmig gebogen, die Unterkinnlade etwas aufwärtsgehend. An den Füßen gar keine Verbindungshaut, wie sonst bey allen Hühnerarten. Die Hinterzehe kürzer als die Mittelzehe. Der Schwanz lang, abgerundet, mit 10 Federn.

Gehaubtes Schopfhuhn. Opistoc. cristatus.

Enl. 337. Phas. cristatus. Hoazin.

Auf dem Kopf ein Federbusch mit langen, sehr schmalen, zerschlissenen Federn. Braungrünlich, oben weiß gesprenkelt, am Hals und Schwanzende rothgelb, am Bauche kastanienbraun. Man findet ihn in Guyana in sumpfigen Gegenden, er steigt auf Bäume, lebt von den Blättern und Saamen einer Art von Arum. Sein Fleisch riecht stark nach Biebergeil, und wird blos als Köder für einige Arten Fische gebraucht *).

Fasan. Phasianus. Linn.

Der Hauptcharakter dieser Familie ist, daß die Backen nackt und mit einer rothen Haut bedeckt sind, es gehören dahin zwei Gattungen, welche Linneus unter eine vereinigt hatte.

Hahn. Gallus. (Coq.).

Der Schnabel mittelmäßig, etwas dick, die Oberkinnlade gewölbt, an der Spitze bogenförmig gekrümmt. Die Wachshaut undeutlich, die Nasenscheidung bedeckend, und

*) Temminck setzt diesen Vogel, indem er ihn aus den Hühnern ausstößt, unter seine Abtheilung, Omnivores.

sich in einen fleischigen Kamm erhebend, An den Backen entstehen zwey hängende Fleischlappen. Die Nasenlöcher liegen an der Wurzel, oben mit einer gewölbten Schuppe, halb bedeckt. Die Zunge kurz, spitzig, an der Spitze etwas gezähnelt. Der Schwanz mittelmäßig lang, aufstehend, zusammengedrückt, mit 14 Federn, welche in zwey Reihen über einander stehen. Die Deckfedern des Schwanzes verlängern sich am Männchen, und stehen über den Schwanz vor.

Dahin gehört unser Haushuhn, welches über die ganze Erde verbreitet ist, und in Hinsicht der Farbe und Größe unendlich varirt; bey einigen ist der Kamm durch einen dicken Federbusch ersetzt; einige sind bis auf die Zehen befiedert; bey andern ist der Kamm, die Backenlappen und die Knochenhaut des ganzen Scelettes schwarz; es giebt sogar Racen, welche 5 bis 6 Zehen durch mehrere Generationen fortpflanzten. Das Haushuhn stammt aus Indien, und war in der neuen Welt, bey deren Entdeckung unbekannt, in der alten Welt aber, ist es seines ausgedehnten Nutzens wegen seit den ältesten Zeiten verbreitet. Man kennt mehrere Stammracen.

Das Riesenhuhn. Gallus giganteus. Temm.

Doppelt so groß als das gemeine Haushuhn. Kamm und Kehllappen roth. Nach Marsden und Dampiers Zeugnissen ist er so groß, wie ein Truthahn, und Marsden sah einen, der mit seinem Schnabel die Höhe einer Speisetafel erreichte. Temmink hat einen Fuß dieses Hahns in natürlicher Größe abgebildet. Hist. de gallinac. T. II. p. II. In keiner europäischen Sammlung ist ein

Original vorhanden. Dieſes Thier lebt in Java und Sumatra und heißt dort Jako. Von ihm ſcheinen abzuſtammen: das holländiſche Huhn, Gall. patavinus, und das paduaniſche Huhn, welche an Größe ihm gleich kommen.

Das bankiviſche Huhn. Gall. Bankiva. Temm.

Der Kamm gezähnelt, zuſammengedrückt, am Halſe lange hängende Federn, vom ſchönſten rothgolden. Der Schwanz abgeſtuft und aufſtehend; die Halsfedern lang, an der Spitze abgerundet; Kopf und Rücken rothgelb, die Flügelfedern braun und ſchwarz gemiſcht; Unterleib und Schwanz ſchwarz, Kamm und Lappen roth. Lebt in Java. Von ihm ſcheinen die gemeinen Haushühner abzuſtammen. Dann das Haubenhuhn (Gall. cristatus). Das Bantamhuhn (Gall. pusillus). Das Zwerghuhn (G. pumilio), welche Varietäten in Deutſchland gefunden werden.

Sonnerats-Huhn. Gall. Sonnerati.

Sonnerat voy. 2. Atl. 117. 118.

Der Kamm iſt gezähnelt, zuſammengedrückt, am Kinn ein Bart; die Ohren nackt, der Schwanz zuſammengedrückt aufſtehend; die Halsfedern ſind lang, ihre Schäfte werden nach unten zu breiter, und verwandeln ſich in knorplichte Scheiben, deren drei an einer Feder auf einander folgen, ſie ſind von gelber Farbe; die Deckfedern der Flügel ſind roth kaſtanienbraun, am Ende ebenfalls breiter, mit knorplichten, bräunlichen Scheiben; die Bruſt braunröthlich;

Digitized by Google

der übrige Körper grau, weiß und rostfarb gesprenkelt; die Schwanzfedern violet glänzend. Das Weibchen ist kleiner, ohne Kamm und Kehllappen; der Kopf befiedert; der Körper dunkler gefärbt, braun und rostfarb gesprenkelt. Diese Art lebt wild in den Gates-Gebirgen von Hindostan. Eine Halsfeder und eine Deckfeder der Flügel ist abgebildet in Temm. Gallinac. T. 2. Taf. III. F. 1. 2.

Das Mohrenhuhn. Gall. Morio.

Kamm und Kehllappen und selbst die Knochenhaut am Scelet schwarz, der Körper mit mancherlei Farben bezeichnet. Ist gezähmt und stammt aus Indien.

Das Wollhuhn. G. lanatus.

Mit wolligen haarartigen Federn, weiß, Kamm und Lappen roth violet, Oberhaut und Beinhaut schwarz, Schnabel und Füße blau. Stammt aus China und Indien.

Das Strupphuhn. G. crispus.

Mit rückwärtsstehenden, gekräuselten Federn. Stammt aus Asia, Java, Japan.

Das gabelschwänzige Huhn. G. furcatus.

Der Kamm ungezähnelt; das Kinn mit einem Bart; der Schwanz aufstehend und gabelförmig, die Halsfedern kurz und abgerundet; der Körper oben grün mit Goldglanz, unten schwarz. Die Schwungfedern braun und pomeranzenfarb gebändert. Das Weibchen ohne Kamm und Bart. Lebt in Java.

Digitized by Google

Buntes Huhn. Gall. varius. Shaw.

Schwarz, am Hals grüngolden, mit schwarz gemischt, der Kamm ungezähnt, am Halse ein kleiner Bart, ohne Lappen. In Java.

Kluthuhn. Gall. ecaudatus.

Der Kamm ungezahnt, an der Unterkinnlade mit zwei Bärten; kein Schwanz, der Bürzel mit längern Deckfedern bedeckt; der Körper auf beyden Seiten braun und pomeranzenfarb. Lebt in Zeilon, von ihm stammt das gemeine Kluthuhn unserer Höfe.

Fasan. Phasianus. Linn.

Der Schnabel mittelmäßig, dicklich, an der Wurzel nackt, die Oberkinnlade gewölbt, gegen die Spitze abwärts gebogen. Die Nasenlöcher an der Wurzel, zur Seite, mit einer Schuppe oben bedeckt. An den Wangen eine nackte, warzige Haut, die Füße vierzehig, mit einem Sporn versehen. Der Schwanz lang, keilförmig, besteht aus 18 Federn. Die Flügel kurz.

Gemeine Fasanen.

Der Schwanz ist lang, abgestuft, und die Federn desselben laufen in zwey Reihen, und decken eine die andere.

Digitized by Google

Colchiſcher Faſan. Phas. colchicus. Linn.

Enl. 121. 122. Naum. I. Taf. 21. und 22. Fig. 40. 41.

Soll nach der Sage von den Ufern des Fluſſes Phaſis, durch die Argonauten nach Europa gebracht worden ſeyn. Er findet ſich aber jetzt in den meiſten gemäßigten Ländern von Europa, theils mit Sorgfalt gehegt, theils wild. Der Kopf und Hals des Männchens ſind dunkelgrün, am Hinterhaupt zwei federbuſchartige Erhöhungen. Das übrige Gefieder am Männchen iſt rothgelb mit Goldglanz, und mit grün gemiſcht; das Weibchen iſt bräunlich, dunkler gemiſcht und gefleckt. Es giebt eine weiße und eine gefleckte Varietät.

Aus China erhielt man in neuern Zeiten mehrere andere Arten, welche ſich in Europa fortgepflanzt haben, nemlich:

Halsbandfaſanen.

An jeder Seite des Halſes iſt ein glänzend weißer Fleck.

Silberfaſan. Phas. Nycthemerus. Linn.

Enl. 123.

Weiß, Federbuſch, Gurgel, Bruſt und Bauch ſchwarz, ins violete ſchillernd; der Schwanz keilförmig und zuſammengedrückt, faſt wie bey den Haushühnern. Jede weiße Feder iſt mit einer ſchwarzen, ſehr feinen Linie geziert. Urſprünglich aus China. Zähmt ſich leicht, iſt in vielen Gegenden häufig. Das Weibchen iſt bräunlich, dunkel-

Digitized by Google

braun gewellt; die Seitenschwanzfedern weiß und schwarz gefleckt.

Goldfasan. Phas. pictus. Linn.

Enl. 217.

Der Federbusch schön gelb und lang, die Federn des Hinterkopfs verlängern sich und bilden einen Mantelkragen, der den ganzen Hinterhals bedeckt und aufsteht, von der schönsten Pomeranzenfarbe, mit schwarzen Querlinien, über die Schultern geht eine grüngoldene Binde. Hinterrücken und Deckfedern des Schwanzes gelb, die Flügel rostfarb, mit einem blauen Fleck, der ganze Unterleib herrlich feuerroth. Der Schwanz lang, keilförmig, braungrau gefleckt.

Das Weibchen hat einen kurzen Federbusch und ist rostfarb schwarz gewellt, am Bauche heller. Auch dieser schöne Vogel stammt aus China, läßt sich leicht zähmen und pflanzt sich in Europa fort *).

Argus. Phas. Argus. Linn. Argus. Temm. Monaulus. Vieill.

Argus giganteus. Temm.

Ein großer Fasan aus dem mittäglichen Asien. Der Schnabel ist länger als der Kopf, zusammengedrückt, an der Wurzel gerade und nackt, die obere Kinnlade gewölbt

*) Temminck rechnet hierher: Phasian. torquatus aus China. — P. leucomelanos? aus Ostindien. — Phas. superbus Linn. von dem man aber nur einige Federn in Sammlungen hat aus China.

und am Ende übergebogen. Der Schwanz mittelmäßig lang, aufwärtsstehend, zusammengedrückt, aus 12 Federn bestehend, von denen die mittlern am Männchen länger sind. Die Schwungfedern der zweiten Ordnung sind sehr lang, am Männchen doppelt so lang als die Schwungfedern der ersten Ordnung, die erste Schwungfeder ist die kürzeste. Diese langen Federn sind zugleich breit, und in ihrer ganzen Länge mit augenförmigen Flecken, wenn die Flügel ausgebreitet sind, so giebt es dem Vogel ein ganz eigenes Ansehen. Der Körper ist rothbraun, schwarz gewellt, der Rücken und die Deckfedern des Schwanzes gelblich, die Augen braun, die Schäfte der Flügelfedern blau; der Schwanz braunschwarz, weiß gefleckt. Lebt in Sumatra, Siam und Malacka.

Fasanen mit einem Kehllappen.

Der Satyr oder Napoul. Ph. Satyrus. Temm.

Penelope satyra. Gmel. et Penel. Napoul. Gmel. Faisan cornu.

Der Körper oben und unten braunröthlich, mit weißen Flecken, welche in einem schwarzen Ringe liegen. Nasen, Stirne und Augenbraunen mit haarartigen, schwarzen Federn bedeckt; der Scheitel roth; an der Kehle eine dehnbare, blaue, braungestreifte Kehllappe; hinter den Augen zwei schwielige, blaue Hörner, welche mit der Spitze rückwärts schauen; Füße und Spornen weißlich; der Schwanz hat 20 Federn. Das Weibchen hat einen befiederten Kopf, keine Hörner und keine Kehllappe, Kopf und Hals oben blau-

blauschwarz; die Federn verlängert, bilden einen hängenden Busch, der übrige Körper wie beym Männchen. Dieser Vogel findet sich in den thibetanischen Gebirgen.

Straußtrager. Temmink. (Houppifères).

Sie haben wie alle bisherigen Arten nackte Backen, tragen den Schwanz wie die Haushühner. Auf dem Kopf steht ein aufrichtbarer Strauß oder Federbusch, nur an der Spitze mit einer Fahne, wie bey den Pfauen, die Läufe sind länger als bey den Hühnern.

Macartneysches Huhn. Gallus. Macartnyi. Temm.

Phas. ignitus. Lath.

Schwarz, stahlblauglänzend, am Hinterrücken feuerfarb, ins Rostfarbe übergehend, die Seitenfedern des Körpers rostfarb, feuerfarbglänzend; die mittlern Schwungfedern rothgelb. Das Weibchen dunkel rostfarb, oben mit schwarzen Querlinien, die Federn weiß gerandet, die Kehle weiß. Die Wangen am Männchen nackt und blau, die Haut an der Unterkinnlade vorspringend, bildet eine Art Lappen, der Schnabel ist gelb; die Füße grau, am Männchen mit starken Spornen. In den Wäldern von Sumatra. (Durch Lord Macartny bekannt gemacht).

Federbuschtrager. Lophophorus. Temm.

Der Schnabel länger als der Kopf, dick, gebogen, an der Wurzel breit; die Oberkinnlade gewölbt, verlängert, bogenförmig an der Spitze. Die Nasenlöcher an der

Schnabelwurzel seitwärts, mit einer mit Federn bedeckten Haut, oben halb geschlossen. Die Füße stark, vierzehig, die Läufe oben befiedert, am Männchen gespornt. Die Flügel kurz.

Blendender Federbuschträger. Lophoph. refulgens. Temm.

Phasianus impeyanus. Lath. Ind. ornith. IV. Taf. 66.

Der Körper oben glänzend purpurfarben, die Federn am Rande mit Goldglanze; unten schwarz, mit Metallglanze; auf dem Scheitel ein Federbusch von dreizehn langen, dünnen, bartlosen Federn, welche am Ende ein Blatt bilden, welches schön grüngolden glänzt, ganz ährenförmig. Ueberhaupt glänzen die Federn des Busches und des Rückens mit allen Farben von Gold, Kupfer und metallischgrün und blau, so, daß dieser Vogel zu den allerschönsten Geschöpfen gehört. Der Schwanz ist zimmetfarben, platt und abgerundet. Der Schnabel braun, die Füße schwarzblau. Die Augenränder mit grünen, glänzenden Federchen bedeckt. Lebt in den hindostanischen Gebirgen, durch Lady Impey bekannt gemacht.

Rurul. Cryptonix. Temm. Liponix. Vieill.

Der Schnabel kurz, dick, zusammengedrückt, der Oberschnabel an der Spitze gebogen. Die Nasenlöcher länglich, an der Seite des Schnabels, mit einer nackten Haut halb bedeckt. Die Füße vierzehig ohne Sporn, der Hinterzehe ohne Nagel. Der Schwanz kurz und abgerundet. Die Flügel kurz.

Digitized by Google

Rurul von Malacca. C. coronatus. Temm.

Columba cristata. Gmel. et Lath. Phasian. cristatus. Sparrm. Mus. Carls. III. 64. Perdix coronata. Tetrao viridis.

Am Hinterhaupt steht ein aufrechtstehender Federbusch von langen, rostfarbnen, nackten Federn; und auf der Stirn stehen sechs lange Borstenfedern; am Scheitel steht eine weiße Binde, der Körper ist schwarzviolet; auf Rücken und am Bürzel dunkelgrün; die Schläfen nackt, die Kehle gefleckt; die Flügel bräunlich. Das Weibchen hat am Nacken keinen Federbusch; ist oben und unten grün, die Flügel kastanienbraun. In Sumatra *).

Perlhuhn. Numida. Linn.

Der Schnabel kurz und dick; die Oberkinnlade gewölbt, an der Spitze gekrümmt, an der Wurzel eine Wachshaut. Die Nasllöcher in der Wachshaut, an der Schnabelseite, mit einem Knorpel halb bedeckt. Der Kopf nackt, hin und wieder mit einigen haarartigen Federn, auf dem Scheitel steht ein schwieliger Helm oder Gräthe. Die Füße vierzehig ohne Sporn. Der Schwanz hängend, aus 14 bis 16 Federn bestehend, von den großen Deckfedern bedeckt; die Flügel kurz, und der ganze Körper nach hinten rundlich.

Gemeines Perlhuhn. Num. meleagris. Linn.

Enl. 108.

Der ganze Körper grau, mit runden, weißen Flecken bedeckt, wie mit Perlen. Kopf und Oberhals nackt. Auf

*) Cryptorix rufus aus Indien, gehört hieher.

der Stirn steht ein kegelförmiger, nach hinten gebogener Höcker. Lebt in Afrika, Guinea. In Europa häufig in Hühnerhöfen, hat ein treffliches Fleisch, ist aber sehr zänkisch und macht sich durch sein beständiges Geschrei wiederlich *).

Waldhuhn. Tetrao. Linn.

Der Schnabel kurz und dick, an der Wurzel nackt, die Oberkinnlade gewölbt, und bogenförmig gekrümmt. Die Nasenlöcher an der Wurzel, oben mit einer gewölbten Schuppe halb verschlossen, und mit Federchen bedeckt. Die Zunge kurz und spitzig. Die Augenbraunen nackt, warzig und roth. Der Schwanz mittelmäßig lang, aus 18 starken Federn bestehend. Kein Sporn.

Auerhühner. Lagopus. Briss. Coqs de Bruyere.

Auerwaldhuhn. Tet. Urogallus.

Naum. I. Taf. 17. F. 36. Tetras Auerhahn. Temm.

Die Füße sind bis auf die Zehen befiedert, die Zehen sind lappig gefranzt. Hals und Rücken am Männchen grau, feinschwärzlich gewellt. Die Brust grünschillernd, Unterleib schwarz, Steiß weiß gemischt. Flügeldeckfedern rostfarb, schwärzlich gesprenkelt. Die Achseln weiß. Der Schwanz schwarz und abgerundet. Das Weibchen viel kleiner, rostfarb, schwarz und grau in die Quere gestreift; die Schwungfedern rostfarb, schwarz gebändert, die Brust rostfarb. In gebirgichten Schwarzwäldern. Nistet am

*) Numida mitrata. Lath. — N. cristata. Lath., beyde in Afrika.

Boden im Gestruppe und in jungen Holzschlägen; nährt sich von Knospen und Beeren. Sein Fleisch ist vortrefflich. Die Luftröhre macht zwey Biegungen, ehe sie in die Brust tritt. Lebt in der Vielweiberei, und findet sich im ganzen nördlichen Europa.

Mittleres Waldhuhn. Tetr. medius. Temm.

Sparrm. Mus. Carls. Fasc. I. 15. Leißler. Nachtr. zu Bechstein, 2 Heft. Tetras Rakelhahn. Temm.

Der Schwanz halb gabelförmig, Hals, Brust, Nacken schwarz, mit schönem Purpurglanz; der Körper oben schwärzlich, graulich besprengt, mit Purpurschimmer; unten schwarz, weiß gefleckt, der Schwanz schwarz, schmal, weiß gesäumt. In den Wäldern des Nordens von Europa und Asien, auch in Deutschland und der Schweiz. Das Weibchen unbekannt.

Birkwaldhuhn. Tetr. Tetrix. Linn.

Naum. I. Taf. 18. F. 37. 38. Tetras Birkhahn. Temm.

Der Schwanz sehr stark gegabelt, die äußersten Federn rückwärts gebogen; der Körper schwarzblau, unten schwarz, die Schultern weiß. Das Weibchen kleiner; graulich rostfarb, schwarz und grau in die Quere gestreift. Die Größe, wie die des Haushuhns. In gebirgichten Wäldern; fast von ganz Europa, doch weit mehr im Norden, auch in Nordasien.

Digitized by Google

Canadiſches Waldhuhn. Tetr. Canadensis. Lath.

Tetr. canace. Lath. Enl. 131. und 132. Edw. 118. und 71.

Schwärzlich, dunkelbraun und graulich gefleckt. Der Schwanz abgerundet und am Ende roſtfarb. In Nordamerika.

Mantelwaldhuhn. Tetr. Cupido.

Enl. 104. Edw. 248.

Mit einem ſchwachen Federbuſch, der Körper braunroth, ſchwarz und weißlich in die Quere geſtreift; am Oberhals längere Federn; welche einen Mantel bilden; der Schwanz mit ſchwarzer Endbinde. Dem Weibchen fehlt der Kragen. In Nordamerika *).

Haſelwaldhuhn. Tetr. Bonasia. Linn. **).

Naum. I. Taf. 20. F. 39.

Auf dem Scheitel des Männchens ein Federbuſch, der Körper oben roſtröthlichbraun, ſchwarz und graulich gemiſcht; unten graulich, mit ſchwarzer Kehle; hinter jedem

---

*) Tetrao phasianellus aus Nordamerika. — Tetrao umbellus et togatus aus Nordamerika. Sie leben in Polygamie.

**) Tetr. Canus. Gm. Sparrm. Mus. Carls. pl. 16., iſt nur eine weißlichte Varietät. Tetr. nemesianus et betulinus. Scop. ſcheinen nur Junge oder Weibchen von Tetrix und Bonasia zu ſeyn.

Digitized by Google

Ohr ein weißer Fleck, der unter dem Schwarzen der Kehle sich durchzieht. Der Unterleib ist graulich, mit schwarzen, halbmondförmigen Flecken. Der Schwanz grau, mit schwarzen Punkten und einem schwarzen Endbande, ausgenommen an den beyden mittlern Federn. Am Weibchen die Kehle weißlich. Im mittlern Europa in Gebirgswäldern, lauft mehr, als es fliegt. Lebt in der Einweiberei.

Schneehuhn. Tetr. Lagopus. Linn. Naum.

Männchen im Winter weiß, Zügel und Schwanz schwarz, die Schäfte der Flügelfedern schwarz. Weibchen ganz weiß, ausgenommen am Schwanze. Mausert zweimal, im Sommer wird das Männchen an Kopf, Hals, Rücken, Deckfedern der Flügel und Brust braun, schwärzlich und graulich gewellt, oder auch graulich gegen den Herbst. Das Weibchen rostfarb und schwarz in die Quere gestreift. Im Sommer sind die Männchen fast jeden Monat anders gefärbt. Bauch- und Flügelfedern bleiben immer weiß, der Schwanz schwarz, mit weißer Endbinde. Auf den höchsten europäischen und amerikanischen Alpen, im Winter oft unter dem Schnee. Nährt sich von Knospen, Beeren der Alpenrose, und selbst von Tannennadeln, und lebt in der Einweiberei. Die Füße sind bis auf die Nägel befiedert.

Weißes Schneehuhn. Tetr. albus.

Tetr. saliceti. Temm. Lagopede de la baie de Hudson. Moraſthuhn.

Kaum größer als das Alpenschneehuhn. Im Winter beyde Geschlechter ganz weiß, ausgenommen am Schwan-

Digitized by Google

ze, der schwarz ist, nur die mittlern Federn desselben sind weiß. Im Sommer schön kastanienbraun; Flügel, Unterleib und Füße weiß, Rücken- und Deckfedern der Flügel rostfarb, schwarz und weiß gestreift; der Schwanz schwarz. Im Norden von Europa in morastigen Gegenden in Weidengebüschen.

Schottisches Waldhuhn. Tetrao scoticus. Lath.

Größer als das Schneehuhn und weiße Waldhuhn, ganz kastanienbraun, an der Brust fast rein, sonst schwarz und rostfarb, fein gewellt, am Bauche auch mit einigen weißen Querstreifchen, die Füße heller. Flügel und Schwanz mehr braungrau. Wird im Winter nicht weiß. Häufig in Schottland.

Gangas. Pterocles. Temm. Oenas. Vieill.

Der Schnabel mittelmäßig, dünner als beym Waldhuhn, gerade, zusammengedrückt, nur an der Spitze übergebogen. Die Nasenlöcher an der Wurzel länglich, oben mit einer Haut halb geschlossen, mit Federchen bedeckt, unterhalb offen. Die Füße schwach, vorn behaart, vierzehig; die Zehen kurz, die Hinterzehe sehr kurz. Der Schwanz keilförmig. Die Flügel ziemlich lang, die erste Schwungfeder am längsten. Der Kreis um die Augen nackt, nicht roth *).

*) Temmink verwechselt in seiner Naturgeschichte der Hühner das schottische Waldhuhn mit dem vorigen, jetzt aber ist er von seinem Irrthum überzeugt. — Hieher gehört auch Tetr.

Sand-Ganga. Pter. arenarius. Temm.

Tetrao arenarius. Pall. Naum. Nachtr. VII. Fig. 15.

Der Körper oben ziegelfarben, ins Weiße spielend, mit eiförmigen, gelblichten Flecken bestreut: Die Kehle dottergelb, mit einem schwarzen, halbmondförmigen Fleck an der Gurgel; an der Brust ein schwarzes Halsband, Unterleib und Steiß schwarz; die Schwanzfedern schwarz und grau gebändert, mit weißen Spitzen, die beyden mittlern spitzig, und haben auf zimmetbraunem Grunde rothgelbe Streifen. Findet sich in Asien um das kaspische Meer, im südlichen Europa in Andalusien, Arragonien, und in der Barbarei.

Weißbauchiger Ganga. Pter. setarius. Temm.

Tetr. Alchata. Lath. Caudacutus. Gm. Enl. 105. 106.

Mit schwarzer Gurgel; an der Brust ein breiter, rostfarb pomeranzengelber, und schwarzgesäumter Gürtel; der Körper oben olivenfarb, gelb, schwarz und rostfarb gefleckt; die Deckfedern der Flügel kastanienbraun gefleckt; der Unterleib weiß. Das Weibchen mit weißer Gurgel, und nur halbem, schwarzem Halsband. Der Schwanz keilförmig, die beyden mittlern Schwanzfedern zugespitzt und doppelt so lang als die andern. Wohnt im südlichen Europa, in Syrien und Arabien *).

---

lapponicus, wenn es wirklich eine vom Schneehuhn verschiedene Art ist, welches noch in Zweifel gezogen werden darf.

*) Pterocles bicinctus. Temm. — Quadricinctus. Tetr. indicus Gmel. — Tachypetes. Tetr. Namaqua. Lath et senegalus. Linn.

Digitized by Google

Rebhühner. Perdix. (Perdrix).

Der Schnabel kurz, etwas dick, und etwas zusammengedrückt, an der Wurzel nackt. Der Oberschnabel gewölbt, und etwas gebogen. Die Nasenlöcher mit einer gewölbten Schuppe halb geschlossen, nackt. Die Läufe nackt, die Füße vierzehig, am Männchen oft ein Sporn, oder auch nur ein Höcker, oder kein Sporn. Der Kopf befiedert, unter den Augen oder ein Kreis um dieselben nackt und warzig. Der Schwanz kurz niedergebogen, die Flügel kurz.

A. Francoline.

Der Schnabel ist länger, stärker, der Schwanz größer, die Läufe bespornt.

Der Francolin. Perd. Francolinus *).

Enl. 147. 148. Tetrao Francolinus. Linn.

Mit rothen Füßen. Der Körper oben schwarzbraun, die Federn rostfarb gerandet. Hals und Unterleib schwarz, am Hals und in den Weichen mit runden, weißen Flecken; unter dem Auge ein weißer Streif, und unter dem Kopf ein rostfarbes Halsband. Das Weibchen schwärzlich, rostgelb gefleckt. Im südlichen Europa, in Asien und Afrika.

---

*) Tetrao pondicerianus. Sonn. 11. voy. 11. 163. — Perlatus. Briss. pl. XXVIII. — Perd. thoracica. Temm. — Perd. Afra. Temm. — Clamator. Temm. — Longirostris. Temm.

Digitized by Google

Einige ausländiſche Frankoline haben einen doppelten Sporn *), andere eine nackte Kehlhaut **), und noch andere haben beyde Charaktere; einige aber gar keine Spornen ***).

B. Eigentliche Rebhühner.

Der Schnabel iſt weniger ſtark; die Männchen haben kurze Spornen oder einfache Höcker, welche den Weibchen fehlen. Sie leben in der Einweiberei.

Graues Rebhuhn. Perd. cinerea.

Tetrao Perdix. Linn. Naum. II. Taf. III. F. 3.

Der Körper oben grau, roſtfarb und ſchwarz gemiſcht, der Kopf roſtfarb, Hals und Bruſt bläulich grau; auf der Bruſt des Männchens ein großer kaſtanienbrauner Doppelfleck. Der Unterleib weißlich. In ganz Europa in Feldern, auch in einem Theil von Aſien †).

Stein-Rebhuhn. Perd. saxatilis.

Enl. 231. Perdrix grecque.

Oben graublau, roſtfarb überlaufen; Kehle und Vorderhals weiß, ſchwarz geſäumt, Stirne ſchwarz, Bruſt

*) Perdix. Adansonis. Bicalcaratus. Linn. enl. 137. — Ceylonensis. Ind. Zool. pl. XIV. — Spadicea. Sonn. 11. 169.

**) Perd. nudicollis et rubricollis. enl. 180.

***) Perd. javanicus.

†) Perdix damascena und Perdix montana ſollen nur Varietäten ſeyn? Beyde finden ſich in Europa.

grau, Unterleib hell roſtgelb, die Seitenfedern etwas verlängert, blaugrau, gegen das Ende mit einem roſtgelben, zu beiden Seiten ſchwarz eingefaßten Streif, und kaſtanienbrauner Spitze; Schwanz roſtfarb; Schnabel und Füße roth. Das Männchen hat zur Begattungszeit einen ſtumpfen Höcker an den Läufen. In den höhern Alpen in felſigen Gegenden, niemals auf den Ebenen. Das Fleiſch iſt weiß, zart und vortrefflich.

Klippenrebhuhn. Perd. petrosa. Temm.

Tetrao petrosus. Gmel. Perdrix rouge de Barbarie.

Der Körper oben rothgrau, auf den Deckfedern der Flügel ſind die Federn blaugrau, lebhaft roſtroth eingefaßt. Kopf und Nacken kaſtanienbraun, ein Streif über die Augen bis nach dem Nacken. Wangen und Kehle weißgrau. Von den Ohren weg nach unten, liegt ein faſt dreieckiger, kaſtanienbrauner Fleck, der ſich mit dem der andern Seite verbindet, und die graue Kehle wie ein Halsband einfaßt, dieſes Halsband iſt mit dreieckigen, weißen Flecken beſtreut. Unterhals bläulichgrau, Bruſt roſtroth, Unterleib roſtgelb, die Seitenfedern etwas länger und wie beym vorigen. Im wärmern Europa und Afrika in ſteinigten Gegenden.

Rothes Rebhuhn. Perd. rubra.

Tetrao rufus. Perdrix rouge. Enl. 150.

Oberleib roſtgrau, Stirn weiß, Nacken kaſtanienbraun, Kehle und Backen reinweiß, über die Augen ein weißer Streif. Durch die Augen geht ein ſchwarzer Streif, der

ſich hinter den Augen bald umbiegt und die weiße Kehle als ein anfangs ſchmales, am Hinterhals breites, halbmondförmiges Halsband einſchließt, und mit einem zweyten, weißgrauen, ſchwarzgefleckten umgeben iſt. Die Bruſt blaugrau, Unterleib roſtgelb, die Seitenfedern verlängert, abgerundet, blaugrau, dann mit einem weißen unter dieſem mit einem ſchwarzen, halbmondförmigen Streif und lebhaft kaſtanienbrauner Spitze. Der Schwanz wie bey dem vorigen roſtroth, Schnabel, Füße und ein Fleck zu beyden Seiten des Auges roth. Im größten Theile von Frankreich und dem ſüdlichen Europa, auch in Aſien *).

Wachtel. Coturnix.

Der Schnabel kurz, wenig gewölbt; zuſammengedrückt, an der Wurzel nackt, breiter als hoch. Die Naſenlöcher an der Wurzel, mit einer gewölbten, nackten Schuppe halb bedeckt. Der Kopf ganz befiedert. Die Füße vierzehig, ohne Sporn, unbefiedert; der Schwanz kurz, unter den längern Bürzelfedern verborgen.

Europäiſche Wachtel. Cot. dactylisonans. Temm.

Naum. II. Taf. 4. F. 4. Tetrao Coturnix. Linn.

Der Körper oben grau, roſtfarb, weißlich und ſchwarz gemiſcht, die Federſchäfte gelb; unten ſchmutzigweiß; auf dem Scheitel eine weißliche Längslinie; die Augenbraunen

*) Perd. Gularis. Temm. — Javanica. Temm. — Gingica. Temm.

Digitized by Google

weiß; die Gurgel roſtfarb, mit ſchwärzlichem Halsband: Am Weibchen weiß. In Europa, Aſien und Afrika. Das einzige Huhn in Europa, welches im Herbſt wandert, und ſpät im Frühjahr zurückkehrt, und welches ungeachtet ſeines ſchweren Körpers, doch über das Mittelmeer fliegt.

Die Rebhühner und Wachteln in Amerika haben einen dickern, kürzern, gewölbtern Schnabel; der Schwanz iſt etwas größer. Sie ſitzen auf Geſträuche, bey Verfolgung ſelbſt auf Bäume. Vieillot macht daraus die Gattung Odontophorus. Dahin gehört

Der Tocro. Perd. dentata. Temm. *).

Tetrao Guianensis. Gmel.

Der Körper oben röthlichgrau, mit ſchwarzen Flecken und Strichen; die Augenbraunen roſtfarb; unten blaß roſtgelbgrau, undeutlich geſtrichelt; der Schwanz braun, ſchwarz geſtreift. Die Oberkinnlade mit einem Zahn. Im warmen Amerika **).

Von den bisher angeführten Hühnern muß man trennen

---

*) Dahin gehören: Coturnix perlata. Tetrao striatus. Gmel. — C. textilis. Temm. Tetr. coromandelicus. — C. excalfactoria. Temm. Tetr. chinensis et manillensis. — C. torquata. — C. grisea. Temm. Tetr. griseus. — C. novae Guineae. Temm. Tetr. nov. Guineae.

**) Perdix borealis Temm. Tetr. virginianus, marylandicus et mexicanus et Coyolcos. Gmel. et marylandicus. — Perdix. cristata. enl. 126. — Perdix Sonninii. Temm. — Perd. Falclandica. Temm. — Perd. californica. Temm.

Digitized by Google

Die dreizehigen Hühner. Hemipodius. Temm.

Sie haben keine Hinterzehe, der Schnabel ist zusammengedrückt, dünne, spitzig, an der Spitze gebogen. Die Nasenlöcher an der Schnabelseite, linienförmig, mit einer Haut halb geschlossen. Die Füße dreizehig, die Zehen ohne Verbindungshaut. Der Schwanz kurz, unter den Deckfedern verborgen. Die Flügel kurz. Sie bilden zwey Gattungen.

Laufhuhn. Turnix. Bonnat. Ortygis. Illiger.

Die Nasenlöcher mit einer nackten Haut bedeckt, welche bis zur Mitte des Oberschnabels reicht. Der Schwanz kurz. Der Körper wachtelartig.

Andalusisches Laufhuhn. Tur. tachydromus. Temm.

Tetrao Andalusicus. Gmel.

Der Körper oben schwarz, rothgelb in die Quere gestreift, und jede Feder weiß gesäumt, unten weißlich rostfarb, auf dem Scheitel ein rostgelber Längsstreif; die Augenbraunen bräunlichroth. Dieser Vogel findet sich in Andalusien, und in der Barbarey. Er lauft sehr schnell.

Laufhuhn mit halbmondförmigen Flecken. Tur. lunatus. Temm.

Tetrao gibraltariensis. Gmel. Perdix gibraltarica. Lath.

Der Körper oben braunschwarz gestreift, die Deckfedern der Flügel gefleckt, die Kehle weiß, schwarz gestreift;

an der Brust schwarze, halbmondförmige Flecken *). In Andalusien, und in der Barbarei.

Fausthuhn. Syrphactes, Illig.

Die Nasenhaut wenig gewölbt, die Nasenlöcher mit Federn bedeckt. Die kurzen Läufe mit Federn bedeckt.

Abweichendes Faustuhn. Syrph. paradoxus.

Tetrao paradoxus. Pall.

Die Zehen sind sehr kurz, und durch eine Haut einen Theil ihrer Länge nach verbunden, die Flügel sehr lang und spitzig. Der Schwanz mittelmäßig lang. Sie bewohnen die Wüsten des mittlern Asien, und weichen so vom allgemeinen Bau der Hühner ab, daß man nicht weiß, ob man sie dazu zählen soll.

Die Tinamus. Crypturus. Illig. Tinamus. Lath.

Ynambus. Azar. Cryptura. Vieillot.

Der Schnabel mittelmäßig, gerade, etwas niedergedrückt, breiter als hoch, die Spitze abgerundet, stumpf, die Schnabelfirste breit. Die Nasenlöcher in der Mitte des Oberschnabels an der Seite, eiförmig und offen. Die Füße

*) Hemipodius nigrifrons. Temm. aus Indien. — Pugnax aus Java. — Nigricollis aus Madagascar. — Thoracicus aus Luzon. — Maculosus. aus Neuholland. — Fasciatus aus den Philippinen. — Hottentottus aus Afrika, alle von Temminck beschrieben.

Füße vierzehig gespalten, die Hinterzehe sehr kurz, die Läufe unbefiedert, schuppig und rauh. Gar keiner oder ein sehr kurzer, verborgener Schwanz. Die Flügel kurz. Der Hals lang, mit Federn bedeckt, deren Spitze zerschlissen und etwas gekräuselt ist, welches diesem Theil ein ganz eigenes Ansehen giebt. Die Hinterzehe kann den Boden nicht berühren. Um das Auge ein kleiner, kahler Fleck. Sie wohnen alle in Amerika, sitzen auf niedrige Aeste, leben von Früchten und Insekten und haben ein vortreffliches Fleisch. Ihre Größe gleicht nach den verschiedenen Arten bald dem Fasan, bald nur der Wachtel.

Rostfarben Tinamus. Cryp. rufescens. Temm.

Der Körper oben graulich rostfarb, die Federn schwarz und weiß in die Quere gestreift, der Flügelrand rostroth; Obrgegend schwarz; der Unterleib gelbroth, braun gewellt; Seiten und Bauch graulich. Kein Schwanz.

In Paraguai. (L'Ynambougouazu. Az.) *).

Tauben. Columba. Linn.

Sie machen den Uebergang von den Hühnern zu den sperlingsartigen Vögeln. Wie die Hühner ist der Schna-

*) Tin. brasiliensis. Temm. Tetrao major. Gmel. — T. Tao Temm. — T. cinereus. Temm. Tetr. cinereus. Gmel. — T. variegatus. Temm. — Undulatus. Temm. — Adspersus. Temm. — Obsoletus. Temm. — Tataupa. Temm. — Strigulosus. Temm. — Sauvi. Tin. Sovi. Lath. — Nanus. Temm. Carapé. Azar.

bel gewölbt, und die Nasenlöcher stehen unter einer weiten Haut, und sind mit einer knorpelartigen Schuppe bedeckt, welche die Schnabelwurzel aufbläßt. Das Brustbein ist tief und doppelt ausgeschnitten, ob schon nach einer etwas verschiednen Lage, als bey den Hühnern; der Kropf ist sehr ausgedehnt, und der untere Luftröhrenkopf hat einen einzigen Muskel. Die Zehen haben keine andere Verbindungshaut, als die Fortsetzung der Zehenhaut. Der Schwanz besteht aus 12 Federn. Sie fliegen gut. Sie leben alle in der Einweiberei; nisten auf Bäumen oder in Felsenlöchern, und legen nur wenige, meistens nur zwey weiße Eier, brüten aber mehreremal im Jahre; Männchen und Weibchen lösen einander in diesem Geschäfte ab. Sie nähren ihre Jungen, indem sie ihnen die im Kropf eingeweichten Körner in den Schnabel stecken. Im Kropfe beyder Geschlechter sondert sich, während die Jungen gefüttert werden, eine käsige Feuchtigkeit ab. Linne hat nur eine Gattung aus den Tauben gemacht, welche man aber in neuern Zeiten in drei zu vertheilen versucht hat. Viele sind seit den ältesten Zeiten Hausvögel, und alle haben ein gutes Fleisch.

Hühnertauben. Lophyrus. Vieill. Colombi gallines. Vaill.

Sie nähern sich mehr als die anderen Unterabtheilungen den Hühnern, durch ihre höhern Füße, und durch die Gewohnheit in Truppen zu leben. Sie halten sich auf der Erde auf, sitzen nicht auf Bäume. Ihr Schnabel ist dünne und biegsam. Die Zehen sind ganz getrennt.

Digitized by Google

Lappentaube. Lophyr. carunculatus. Vieill.

Colombi galline à barbillon. Vaill. Afriq. 278.

Grau, die Stirn- Kehllappen roth, Bauch und Bürzel weiß, der Schwanz braun, die äußern Federn weiß gerändelt. Das Weibchen hat eine befiederte Stirn und keine Kehllappen. Diese Taube lebt in Südafrika, und nähert sich durch die Kehllappen den Hühnern am meisten.

Kronentaube. Lophyr. coronatus. Vieill.

Colombi galline goura. Colombi hocco Vaill. Enl. 118.

Die Augenringe schwarz, auf dem Kopf ein großer Federbusch von zerschlissenen Federn, der Körper ist blaugrau, die Schultern rostfarb. Ueber die Flügel ein weißer Streif. Fast von der Größe des Puters. Sie lebt in den Molukken, man hält sie in Java in Hühnerhöfen und hat es auch in Europa versucht, allein sie pflanzen sich nicht fort.

Nicobarische Hühnertaube. Loph. nicobaricus.

Vaill. Afr. VI. enl. 491. Colombi galline à Camail.

Der Körper vom schönsten Goldgrün, die Halsfedern schmal und lang hängend, der Schwanz weiß. Einer der schönsten Vögel. In verschiedenen Theilen Ostindiens *).

*) Hieher gehören: Columba cyanocephala. Lath. aus Amerika. — C. montana. Lath. aus Amerika. — Martinica. —

Wahre Tauben. Columba.

Die Füße sind kürzer als bey den vorigen, der Schnabel eben so dünne und biegsam. Die Flügel lang und spitzig.

Ringeltaube. Col. Palumbus. Linn.

Naum. I. Taf. 14. F. 33. Pigeon-ramier.

Auf beyden Seiten des Halses steht ein weißer Fleck. Körper blaugrau, am Hinterhalse grün schillernd, die Brust weinröthlich, an den Flügeln ein weißer Streif. Sie bewohnt die Laubhölzer und zieht im Herbst in großen Schaaren weg.

Holztaube. C. Oenas. Linn.

Naum. I. Taf. 15. F. 34 Pigeon deserteur.

Nasenhaut roth, Hauptfarbe bläulich, auf jedem Flügel ein doppelt schwärzlicher Fleck, die Spitze des Schwanzes schwärzlich, die Brust weinröthlich. Zieht im Herbst weg.

Feldtaube. C. livia. Brisson.

Enl. 510. Biset ou pigeon de roche.

Graubläulich, die Augengegend schillernd, auf den Flügeln ein doppelt schwarzer Streif. In Italien und

---

Erythrothorax. Temm. aus Amerika. — Cruenta aus den Molucken. — Jamaicensis Linn. Talpacoti. Temm. — Passerina. Lath. aus Amerika. — Hottentotta. Vaill. 283. — Minuta. Lath. — Picui. Azar. aus Amerika.

Sardinien in Felsenhöhlen. In Deutschland, wohl nirgends mehr wild. Von ihr stammen unsere gemeinen Haustauben ab, mit den meisten ihrer zahlreichen Varietäten, doch mögen manche auch durch Vermischung mit verwandten Arten entstanden seyn.

Turteltaube. Col. Turtur. Linn.

Raum. I. Taf. XVI. F. 35.

Oben rothgelb, braun gefleckt, am Nacken ein weiß und schwarzer Fleck, Hals graulich, Unterleib weinröthlich. Die kleinste europäische Art.

Lachtaube. C. risoria. Linn.

Enl. 244.

Weiß röthlichgelb, am Nacken ein schwarzes Halsband. Stammt wahrscheinlich aus Afrika, ist aber in Europa gezähmt und einheimisch geworden.

Die Arten der Tauben sind zahlreich, man könnte sie nach der Bekleidung der Füße in nacktfüßige und federfüßige eintheilen, auch nach den Nacktheilen, welche sich um die Augen finden *). Man könnte auch diejenigen

*) Hieher gehören: C. Spadicea. — Aenea. — Arquatrix. — Armillaris. — Littoralis. — Chalcoptera. — Cristata. — Picazuro. — Maculosa. — Caribaea. — Leucocephala. — Miniata. — Speciosa. — Corensis. — Aegyptiaca. — Guinea. — Madagascariensis. — Gymnophtalmos. — Franciae. — Zealandica. — Rubricapilla. — Auricularis. — Eimensis. — Elegans. — Cincta. — Asiatica. — Rufina. Aurita. — Javanica. — Jambos. — Violacea. — Melano-

Arten trennen, welche einen etwas keilförmigen Schwanz haben; dahin gehört die nordamerikaniſche Wandertaube (Col. migratoria. enl. 176.), welche in ſo ungeheuern Schaaren wandert, daß die Aeſte der Bäume von der Laſt der Tauben abgebrochen werden, die ſich darauf ſetzen, ferner die caroliniſche Taube (C. carolinensis. enl. 175.). Die domingiſche Taube (C. dominicensis. enl. 487.) und die Cap-Taube (Col. capensis. enl. 140.) und andere.

Von den andern Tauben aber trennen ſich die

Dickſchnäbligen Tauben. Vinago. Cuv. (Colombars).

Sie haben einen dickern, nicht biegſamen Schnabel, der auf den Seiten zuſammengedrückt iſt; die Füße ſind kurz, die Zehen lang und mit wulſtigen Häuten verſehen. Sie leben alle von Früchten, und in großen Wäldern in der warmen Zone des alten Continents.

Die Gewürztaube. C. aromatica. Linn. Enl. 164.

Olivengrün, Schultern und kleine Deckfedern der Flügel purpurglänzend, Schwungfedern ſchwarz, die Deck-

---

cephala. — Larvata. — Holosericea. — Sinica. — Viridis. — Erythroptera. — Mystacea. — Superba. — Purpurata. — Tympanistria. — Caerulea. — Brunnea. — Afra. — Geoffroi. — Cinerea. — Bitorquata. — Vinacea. — Surinamensis. — Picturata. — Tigrina. — Cambayensis. — Malabarica. — Alba. — Squamosa. — Malaccensis. — Macroura. — Melanoptera. — Maugei. — Alle von Temminck in ſeinem Werke über die Tauben beſchrieben.

federn der zweyten Ordnung gelb, die mittlern Schwanzfedern grün, die Seitenfedern grau. In Indien, Java, Zeilon *).

Fünfte Ordnung der Vögel.

Sumpfvögel. Laufvögel. Stelzenläufer. Grallae. Linn. (Echassiers).

Sie haben ihren Namen von ihrer Lebensart erhalten, und sind dazu gebaut, theils um schnell laufen, theils um in sumpfigen Gegenden herumwaden zu können. Die Schenkel sind nach dem Unterschenkel hin nackt, und die Unterschenkel oder Läufe sind bey den meisten lang, sie können daher ziemlich tief ins Wasser gehen, an seichten Orten herumwaden, und mit ihrem langen Hals und langen Schnabel Insekten oder Schalthiere und Würmer auffischen. Die Schnabellänge steht meist im Verhältniß zur Länge der Füße. Diejenigen mit starkem Schnabel, leben von Fischen oder Reptilien; diejenigen mit schwachem Schnabel, von Insekten und Würmern. Nur wenige leben zum Theil von Saamen und Gras, und finden sich dann auch in vom Wasser entfernten Gegenden. Meist ist die Mittelzehe an der Wurzel mit der äußern durch eine kurze Haut verbunden; zuweilen finden sich zwey solcher Häute, oder sie mangeln auch gänzlich, und die

*) C. militaris. Temm. — C. australis. enl. III. — C. vernans. enl. 138. — C. psittacea. Temm. — Calva. Temm. — Abyssinica. Lath. Walia. Bruce. Vaill. Afriq. 176. 177.

Zehen sind ganz gespalten; auf der andern Seite giebt es welche, welche wahre Schwimmfüße haben, entweder belappte oder mit einer Haut verbundene Zehen. Die Hinterzehe mangelt einigen. Alle diese Eigenschaften des Baues beziehen sich auf ihre Lebensart, welche sie bald mehr, bald weniger an Gewässer und Sümpfe bindet. Die meisten haben lange, spitzige Flügel, und fliegen leicht und schön, sie strecken ihre langen Beine im Flug nach hinten, während andere Vögel sie an den Leib anziehen. Nur eine Familie, welche sich überhaupt sehr auszeichnet, macht eine Ausnahme von den meisten dieser Eigenschaften, und fliegt gar nicht, nehmlich die der Strauße. Die meisten Vögel dieser Abtheilung, wenn sie in kältern Ländern wohnen, sind Zugvögel, und bringen den Winter in wärmern Ländern zu. Einige haben ein sehr angenehmes Fleisch, andere hingegen taugen nicht zur Speise. Ihre Gattungen und Arten sind über alle Klimate ziemlich gleichmäßig verbreitet, doch leben einige ausschließend in den tropischen Ländern, und in den heißesten und dürrsten Gegenden. Andere dagegen sind fast auf der ganzen Erde verbreitet, da sie allenthalben Nahrung finden.

Man kann aus dieser Ordnung, fünf Hauptfamilien und einige abgesonderte Gattungen machen.

Die kurzflüglichen. Brevipennes. Cuv. Proceri. Illig.

Ob schon ihr Bau sie ganz den Sumpfvögeln nähert, so entfernt sie ihre Lebensart doch ganz von ihnen, es sind Vögel, denen die Kürze ihrer Flügel gar nicht erlaubt zu

fliegen, also wahre Erdvögel. Schnabel und Nahrung nähern sie den Hühnern.

Es scheint fast als ob die Natur nicht im Stande gewesen sey, so große Muskelkräfte hervorzubringen, um so ausgebreitete Flügel zu leiten, als nöthig gewesen wäre, die schwere Masse der Strauße in die Höhe zu heben. Da nun diese Vögel nicht fliegen können, so ist ihr innerer Bau auch sehr verschieden. Statt der großen Brustmuskeln, welche man bey den jungen Vögeln wahrnimmt, deren Flügel lang sind, bemerkt man hier kaum einige unbedeutende Muskelchen, welche die kleine Flügel bewegen, das Brustbein ist kurz und ganz gewölbt, die vorspringende Gräthe fehlt, es ist gar nicht ausgeschweift. Der Gabelknochen ist gar nicht vorhanden, die Ribben sind breit, aber ohne Verbindungsfortsätze, wie sonst bey allen anderu Vögeln vorhanden sind. Die Brust ist daher schlank und sehr mager, die Flügel haben äußerst kleine Knochen, und keine Kraft; dagegen ist alle Muskelkraft in den Schenkeln vereinigt, außerordentlich dicke Muskeln bedecken das Becken, die Lenden und die Schenkel. Sie laufen mit außerordentlicher Schnelligkeit und bedienen sich ihrer Füße zur Vertheidigung. Ihre Verbreitung ist auf die tropischen Gegenden beschränkt. Sie haben keine Hinterzehe. Zwo Gattungen.

Strauß. Struthio. Linn. (Autruches).

Der Schnabel mittelmäßig lang, platt, nicht sehr breit, vorn stumpf abgerundet. Die Nasenlöcher lang; die Zunge kurz, dick, an der Spitze getheilt, fast halb-

Digitized by Google

mondförmig. Die Flügel ohne Schwungfedern, mit langen, schlaffen, biegsamen Federn bedeckt, doch sind die Flügel groß genug um den Lauf zu befördern, am letzten Gliede ist ein doppelter Sporn oder Nagel. Die Füße Wadfüße, stark, zum schnellen Laufe tauglich, sehr lang, nur zweyzehig, die eine Zehe hat 4, die andere 5 Gelenke; die innere Zehe ist doppelt so lang als die äußere, letztere ohne Nagel, der Nagel der innern Zehe ist dagegen dick und lang. Die Fußhaut ist schuppig. Die Federn am ganzen Körper sind zerschlissen, mit schmalen Schäften, die Bärte, ob schon mit kleinen Nebenbärtchen versehen, schließen nicht an einander, wie bey andern Vögeln die Bärtchen der Flaumfedern. Die Augen sind groß, die Augenlieder haben Wimpern. Der Schlundkopf ist weit, der Schlund sehr muskulos, der Kropf ist sehr groß und bildet zugleich den Vormagen, er ist mit vielen Drüsen versehen, und durch eine Verengerungsfalte vom Magen getrennt; auch der Magen ist sehr drüsig, die innere Haut hart und runzlich, hängt nicht mit der mittlern zusammen, und ist durch die Ausführungsgänge jener Drüsen durchlöchert. Außerordentlich starke Muskeln unterstützen ihn. Der Darmkanal ist lang und weit, der Blinddarm doppelt. Der Mastdarm ist weit, etwa ein Fuß lang, an seinem Ende mit fleischigen Fibern, und öffnet sich in einen weiten Sack, in welchem man wirklichen Harn findet, die von den Nieren kommenden Harnleiter ergießen sich hier. Dieser erste Sack steht mit einem zweyten kleinern in Verbindung, durch welchen Harn und feste Exkremente gehen. Diese letztern gleichen dem Schafmist, und bestehen aus kleinen unzusammenhän-

genden Bohnen. Die Zeugungsorgane nähern sich denen der Säugethiere, der männliche Strauß hat eine große Ruthe, welche oft von außen zu sehen ist, an der man übrigens weder Eichel noch Vorhaut, noch irgend eine Höhle bemerkt, sie liegt im zweyten Sack und tritt bey der Begattung aus dem After über einen Zoll vor.

Man kennt zwey Arten, aus denen man zwey Gattungen machen könnte.

Strauß der alten Welt. Struth. Camelus. Linn.

Enl. 457.

Seine Füße haben nur zwey Zehen. Es ist der größte Vogel und erreicht eine Höhe von 6 bis 7 Fuß, und ein Gewicht von 80 bis 100 Pfund. Sie leben in großen Truppen in den Sandwüsten Afrikas, und waren ehemals auch in Asien häufig, wo er aber jetzt sich nicht mehr finden soll. Er ist äußerst gefräßig, seine eigentliche Nahrung besteht in Körnern und Kräutern, allein er, verschlingt ohne Unterschied Dinge aus dem Thier- und Pflanzenreich, ja selbst ganz unverdauliche Dinge wie Kieselsteine, Eisen, Kupferstücke und Holz. Er wird sehr fett. In seinen Schenkeln hat er eine große Muskelkraft, und kann mit den Füßen große Steine nach hinten auf eine bedeutende Weite schleudern. An Schnelligkeit übertrift er alle bekannten Thiere im Laufen, wobey er die Flügel ausbreitet.

Das ganze Gefieder ist aus zerschlissenen Federn, mit weichen, hängenden Bärten zusammengesetzt. Die einen

sind wollig und sitzen unmittelbar auf der Haut, die andern sind länger und besonders die Schwanzfedern welche weiß sind, wie die an den Flügeln, die übrigen sind schwarz, bey Jungen grau, sie werden bekannt sehr als Putz gesucht.

Die Straußenhenne legt sehr viel Eier bis auf dreißig, und die Vermehrung dieser Thiere würde sehr groß seyn, wenn nicht so viele Eier und Junge von Menschen und Thieren verzehrt würden, jedes Ei wiegt bis auf drei Pfund. Zur Begattungszeit trift man nie mehr als 4 bis 5 beysammen an, ein Hahn und die übrigen Hennen, diese legen alle ihre Eier in dasselbe Nest, welches aus einer runden, aufgescharten Vertiefung besteht; die Eier stehen alle auf der Spitze, damit so viel möglich Platz haben. Die Hennen brüten wechselsweise bey Tag, bey Nacht das Männchen allein, um das Nest herum aber werden mehrere Eier in den Sand gelegt, um den Jungen zur ersten Nahrung zu dienen. Die Eier und selbst die Fötus im Ei, geben eine sehr nahrhafte Speise *). Auch die Strauße selbst werden hin und wieder gegessen. Man kann die Jungen zähmen, sogar, daß man auf ihnen reiten kann.

---

*) Lichtenstein hat das Vorurtheil wiederlegt, daß die Strauße nur außert den tropischen Ländern brüten, unter dem Tropenhimmel dagegen, dies der Sonne überlassen. A. d. U.

Digitized by Google

Amerikaniſcher Strauß. Struthio. Rhea. Linn. *).

Nandu oder Churi. Annal. du Mus. XII. XXXIX.

Faſt um die Hälfte kleiner als der Strauß, etwa 5 Fuß hoch. Das Gefieder gleicht dem des afrikaniſchen Straußes, doch iſt es dünner und einfärbig grau, die Flügel heller, kein Schwanz, die Bürzelfedern aber länger und über den Hintern gebogen. Die Füße dreizehig. Es ſoll ganz weiße, auch ſchwarze geben. Am Halſe des Männchens ſind zwey ſchwarze Streifen. Dieſer Vogel iſt eben ſo häufig in Südamerika, als der Strauß in Afrika, in Braſilien, Buenos Ayres, Monte Video, Paraguai bis zur Magelhans-Straße. Sie leben in Truppen von 20 bis 30. Sind nicht ſehr ſcheu, laufen ſo ſchnell als ein Pferd, laſſen ſich leicht zahm machen, ſo daß ſie bey den Häuſern herum laufen und vom Felde wieder kommen. Sie freſſen Körner, Gras, Gemüße, aber auch Steine. Wie beym Strauße legen mehrere Weibchen in ein Neſt, ein Weibchen legt 17 bis 20 Eier, doch ſoll immer nur eines brüten, andere Eier werden um das Neſt herum gelegt, um den Jungen zur Nahrung zu dienen. Die Eier ſind gelblich, auch das Männchen ſoll brüten; wird das Neſt entdeckt, ſo zertreten ſie die Eier. Junge und Eier ſchme-

*) Briſſon, Illiger und Vieillot, machen eine eigene Gattung Rhea daraus, vorzüglich weil er drey Zehen an den Füßen hat, welche alle mit Nägeln verſehen ſind. Der Name Toujou oder Toujoujou, den ihm Büffon und Briſſon geben, gehört dem Jabiru.

cken ſehr gut. Die Federn werden ebenfalls zum Putz nach Europa gebracht.

Caſuar. Casuarius. Briss. (Casoars).

Der Schnabel mittelmäßig niedergedrückt, vorn mit einer halbgewölbten, ſtumpfen Spitze. Die Naſenlöcher liegen hinter der Mitte des Schnabels, und ſind rundlicht. Die Zunge am Rande gezähnelt. Die Flügel ſind noch kleiner als am Strauße, blos zerſchliſſene, kurze, oder aber nackte Schäfte, welche zum Laufe durchaus nichts beytragen. Die Federn ſind lang, an den meiſten Orten kommen aus einem Kiele zwey Federn hervor. Die Füße Wadfüße, ſtark, dreyzehig, zum Laufen geſchickt. Die Zehen mit 3, 4 und 5 Gliedern, und mit Nägeln verſehen: die Mittelzehe iſt die längſte, und ihr ſtumpfer, dreyeckiger Nagel iſt doppelt ſo groß als die übrigen, und ſpitziger. Die Füße netzförmig geſchuppt. Die Federn an einigen Theilen faſt haarartig.

Man kennt ebenfalls zwey Arten, welche zwey Gattungen bilden könnten.

Gehelmter Caſuar. Cas. orientalis.

Struthio. Casuarius. Linn. Ed. 313. Friſch 105.

Er iſt nicht ſo groß als der Strauß, aber plumper, da der Körper faſt die Schwere des Straußkörpers hat, aber die Füße und der Hals kürzer ſind. Der Schnabel iſt ſeitlich zuſammengedrückt, auf dem Kopf ſteht eine ſtarke, knöcherne Hervorragung, welche mit einer hornartigen Subſtanz bedeckt iſt: Kopfhaut und Oberhals ſind

Digitized by Google

nackt, himmelblau und feuerroth, mit hängenden Fleischlappen wie beym Puter; am Flügel stehen einige nackte Schäfte, fünf bis sieben an der Zahl, so hart wie Stacheln, der mittlere hat einen Fuß Länge und drey Linien im Durchmesser; sie scheinen dem Vogel als Waffen zu dienen; der Nagel an der innern Zehe ist viel größer als die übrigen. Die Federn am ganzen Körper sind lang und zerschlissen, schwarz und von ungleicher Länge, besonders lang an den Schenkeln, sie hängen auch über den Steiß hinab und versehen den Schwanz. Vorn an der Brust steht, wie bey den Straußen eine große, harte, nackte Schwiele. Die Beine sind sehr stark, er braucht sie zur Vertheidigung und schlägt damit nach hinten aus, wie ein Pferd. Er läuft so schnell als der Strauß, wobey er starke Sprünge macht. Der innere Bau ist vom Strauße verschieden; der Darmkanal ist kurz, der Blinddarm klein; ihm mangelt der Mittelmagen zwischen Kropf und Vormagen, seine Kloake ist verhältnißmäßig nicht größer, als bey andern Vögeln. Der Geschmackssinn ist nicht entwickelter als am Strauße, auch er verschlingt alles, was ihm vorkömmt, bricht es aber oft wieder von sich. Apfel und Eier liebt er sehr und verschlingt sie ganz, er lebt in der Freiheit von Gras, Kohl, abgefallenen Früchten, und soll selbst junge Hühner und Enten verschlucken, aber keine Körner. Sein Geschrei ist houhou, doch schwach und dumpf. Die Eier sind grüngelb, kleiner und länglicher als am Strauß, mit dunkelgrünen, erhöheten Flecken, er soll sie nicht brüten? Das Männchen hat eine Ruthe, wie das Straußmännchen. Man findet ihn in den großen Wäldern von Ceram und auf Aroe, auf

Amboina ist er gezähmt, er wird aber nie so zahm, als der Strauß. Die Jungen sind braun.

Neuholländischer Casoar. Casuar novae Hollandiae.

Peron voyage. pl. XXXVII. Rhea novae Hollandiae. Temm.

Ohne Helm, ohne Carunkeln, der Schnabel plattgedrückt, fast dreieckig, vorn stumpf. Kopf und Hals befiedert, der Vorderhals jedoch, ist eine Strecke lang schwielig und wenig befiedert, auch der Kopf ist wenig befiedert, und hat einen Federbusch von aufgerichteten, gekräuselten Haaren, und die Federn des Hinterhalses stehen dünne, gleichen Haaren, und bilden an der Mitte des Hinterhalses eine Art von kurzer Mähne, von schwarz und weißen Federn. Die Brust kropfartig vorstehend, mit langen, zerschlissenen, schmutzig weißen, mit schwarzer Spitze hin und wieder beendigten Federn dicht besetzt, nach dem Bauche hin und am Bauche, werden die Federn braungelb, mit schwarzer Spitze. Die Flügelfedern sehr zerschlissen, brandgelb, mit schwarzer Spitze, alle gleich lang, wie abgeschnitten. Der ganze Rücken und die Weichen, sind mit langen, schmalen, weichen, wenig zerschlissenen Federn besetzt, bey denen immer zwey aus einem Schaft kommen und sehr dicht stehen, sie sind hellbräunlich, mit schwarzer Spitze, gegen die Weichen sind sie am längsten und fast schwarz. Am Bürzel hangen lange, schwarze, zerschlissene, borstenartige Federn, welche beym Berühren, wie dürres Heu knistern. Der Schwanz fehlt. Die

Schwiele

Schwiele auf der Bruſt iſt groß und eiförmig. Hinter dem After ſitzt eine große, runde, faſt wie ein Apfel geſtaltete, knorplichte Drüſe, in welcher man jedoch keinen Ausführungsgang wahrnimmt, ſie ſteht in Verbindung mit der großen Cloake, welche faſt wie beym Strauß gebildet iſt. Die Füße ſtark, mit ſtumpfen Nägeln, und wie die Beine mit netzförmigen, rauhen Schuppen bedeckt. Die Oberſchenkel ſind ſo dick, wie ein recht dicker Mannsſchenkel. Der Schnabel hat in der Mitte eine Firſte, und endigt ſich in einen abgerundeten Nagel. Der Schlund iſt weit; die Zunge klein, dreieckig, gezähnelt. Die Luftröhre weit, und hat ſehr breite Hautringe, dagegen ſehr ſchwache Knorpelringe, ſie iſt nach unten gegen die Bronchien etwas erweitert, hat aber keinen untern Luftröhrenkopf. Der Schlund iſt ſehr weit, ſtark, muskulos, erweitert ſich da, wo er in die Bauchhöhle tritt, und bildet erſt einen weiten Schlauch, der ſich dann etwas verengert und in den eigentlichen Magen übergeht, dieſer iſt nicht weit, aber von ſtarken Muskeln umgeben, und ſeine innerſte Haut ſehr hart mit Querrunzeln und faſt knorplich; der Darmkanal iſt weit aber kurz, der Blinddarm doppelt. Die Länge iſt über 6 Fuß, das Gewicht 65 bis 70 Pfund. Der ganze Flügel iſt mit dem Armknochen am Scelet noch nicht 6 Zoll lang und endigt mit einem krummen Sporn. Das Fleiſch iſt eßbar und gleicht dem Rindfleiſch, das der Jungen iſt vortrefflich. Dieſer Caſoor läßt ſich leicht zähmen, lebt von Gras und Kräutern, lauft ſo ſchnell wie der beſte Windhund und lebt in kleinen Truppen in Neuholland. Die Jungen ſind braun und weiß geſtreift.

Unter dieser Abtheilung werden in den Systemen gewöhnlich einige Vögel angeführt, deren Daseyn aber gar sehr zweifelhaft ist, die wenigstens jetzt höchst wahrscheinlich gar nicht mehr existiren, daher auch nicht geordnet werden können. Sie bilden die Linneische Gattung.

Dudu. Didus.

Der Schnabel ist verlängert, dick, gerade, die Oberkinnlade in der Mitte, quer eingedrückt, mit zwey schiefen Runzeln, an der Spitze übergebogen, die Unterkinnlade steigt aufwärts. Die Nasenlöcher in der Mitte des Schnabels, hinter der hintern Querrunzel, fast an der Schnabelschneide, schief. Die Flügel ohne Schwungfedern und der Schwanz aufrechtstehend, aus weichen, überhängenden Federn gebildet. Die Füße sind stark, vierzehig, gespalten. Die Nägel gebogen und kurz. Der Körper sehr plump. Die erste Art, die Dronte (Did. ineptus Linn.) ist nur bekannt nach einer Beschreibung, welche Clusius, (nach den Nachrichten der Holländer, in ihren ersten Seefahrten am Ende des 16ten Jahrhunderts nach Ostindien, davon gaben), uns aufbewahrt hat, und nach einem Oelgemählde aus jener Zeit, von Edwarts copirt (pl. 294.). Sie fanden das Thier auf der damals unbewohnten Insel Mauritius. Er hatte etwa die Größe eines Schwans, die ganze Gattung scheint verschwunden zu seyn, und man hat jetzt nur noch einen Fuß davon im Brittischen Museum, und einen Kopf in der Ashmolischen Sammlung in Oxford. Der Schnabel hatte einige Aehnlichkeit mit dem der Pinguins, und die Füße würden denen der Fettgänse gleichen, wenn sie Schwimmhäute hätten.

Digitized by Google

Die zweyte Art: Der Einsiedler (Did. solitarius) beruhet nur auf dem Zeugnisse des Leguat. Reise. I. p. 98. eines Mannes, der die bekanntesten Thiere als Monstra abbildete.

Der dritte Vogel endlich der Nazarvogel (Did. Nazarenus), wurde durch Franz Couche bekannt, der ihn für die Dronte hält, ihm aber nur drey Zehen giebt. Alle diese Vögel sind aber von der Erde verschwunden *).

---

*) Zu dieser Abtheilung muß die von Shaw aufgestellte Gattung Apteryx, gerechnet werden. Der Schnabel ist sehr lang, gerade, walzenförmig, stumpf, der ganzen Länge nach gefurcht, nur an der Spitze gebogen, und etwas aufgetrieben, an der Wurzel mit einer Wachshaut, und mit Haaren besetzt; der Unterschnabel gerade, an der Spitze walzenförmig; an der Schnabelwurzel sehr lange Borstenhaare; die Nasenrinne verlängert sich bis zur Spitze des Schnabels. Die Nasenlöcher scheinen sich an der Spitze des Oberschnabels mit zwey kleinen Löchern zu öffnen, welche als die Mündung zweyer Röhren zu betrachten sind, welche durch die Schnabelsubstanz fortlaufen. Die Füße sind kurz, bis auf die Kniee befiedert; drei Zehen stehen nach vorn und sind ganz gespalten, die Mittelzehe so lang als der Lauf oder die Ferse; die Hinterzehe kurz, mit einem geraden, kurzen, dicken Nagel versehen. Die Flügel kurz, zum Fluge untauglich, und in einen krummen Nagel sich endigend. Kein Schwanz.

Eine Art: Apt. australis (Shaw. t. 1057 et 1058.), aus den Südländern. Die Kenntniß der Gattung beruhet auf einem einzigen Exemplar, welches in einer Sammlung sich findet.

Die Familie der

Brachvögel. Feldlaufer. Pressirostres. Cuv. Campestres. Illig.

Enthält diejenigen Vögel mit Wadfüßen, welche keine Hinterzehe haben, oder bey denen er wenigstens so kurz ist, daß sie die Erde nicht berührt; der Schnabel ist mittelmäßig lang, und stark genug, um damit Würmer in der Erde aufzusuchen; die Arten, bey welchen er am schwächsten ist, laufen auf Wiesen und neugeackerten Feldern umher, um darin Nahrung zu suchen. Diejenigen, bey welchen er stärker ist, fressen auch Würmer und Gras. Illiger bezeichnet sie mit dem Namen der Feldlaufer und Uferlaufer, die erste Gattung wird von den meisten noch unter die Hühner gerechnet.

Trappen. Otis.

Schnabel kürzer als der Kopf, gerade, fast kegelförmig, zusammengedrückt, die Oberkinnlade gegen die Spitze etwas gewölbt. Die Nasenlöcher offen stehend, eiförmig, nahe an einander. Die Zunge knorplig, spitzig, gefranzt. Die Füße lange, starke Lauffüße, dreizehig, die Zehen mit einer sehr kurzen Haut verbunden, wie bey den Hühnern. Die Schenkel unten nackt, überhaupt der ganze Körperbau, selbst der Geschmack ihres Fleisches, wie bey den Sumpfvögeln; ihre kleinsten Arten nähern sich sehr den Regenpfeifern. Die Läufe sind netzartig geschuppt, die Flügel kurz, sie fliegen wenig und schwer, und bedienen sich ihrer Flügel zum Laufen, wie die Strauße. Sie nähren sich von Körnern, Gras, Würmern und Insekten.

Digitized by Google

Große Trappe. Otis tarda. Linn.

Naum. II. Taf. 1. F. 1.

Oberleib lebhaft gelbroth, mit schwarzen Querstreifen, der Unterleib grauweißlich. Das Männchen, welches der schwerste europäische Vogel ist, hat an den Ohren lange auswärtsstehende Federbüschel. Diese Art bewohnt die Ebenen von Europa, lebt in kleinen Truppen, und nistet in Getreidefeldern. Das Fleisch ist vortrefflich.

Kleine Trappe. Ot. Tetrax. Linn.

Canepetière. Enl. 20 und 25. Naum. II. Taf. 2. Fig. 2.

Von der Größe eines Haushuhns, oben braunröthlich, schwarz gesprenkelt, unten weißlich. Das Männchen hat einen schwarzen Hals, mit zwei weißen Halsbändern. Mehr im wärmern Europa, weniger weit verbreitet.

Die meisten ausländischen Arten haben einen dünnern Schnabel als die unsrigen, unter diese gehört

Die Kragentrappe. Ot. Houbara. Gm.

Des fontaines, Academie des sciences. 1787. I. pl. X.

In Afrika und Arabien, hat am Halse einen schönen Federkragen *). Sehr selten in Spanien.

Regenpfeifer. Charadrius. Linn.

Sie haben ebenfalls keine Hinterzehe, einen mittelmäßig langen Schnabel, der gegen die Spitze etwas aufgetrieben ist. Man kann sie in zwey Gattungen trennen.

---

*) Otis Afra. Lath. Syn. II. pl. 79. — Bergalensis. Edw. 250. — Arabs. id. 12.

Digitized by Google

Dickfuß. Oedicnemus. Cuv.

Die Schnabelspitze ist an beyden Kinnladen aufgetrieben, und die Vertiefung für die Nasenlöcher, geht nur über die Hälfte der Schnabellänge. Es sind große Arten, welche vorzüglich in steinigen und trockenen Gegenden leben, und sich von Schnecken und Insekten ernähren. Sie haben mit den kleinen Trappenarten Aehnlichkeit. Ihre Füße sind netzartig geschuppt.

Lerchengrauer Dickfuß. Oedicn. Crepitans *).

Naum. II. Taf. 9. F. 13.

So groß wie eine Schnepfe, mit großen gelben Augen, graurothlich, jede Feder mit einem braunen Fleck in der Mitte, der Bauch weiß, über dem Auge ein brauner Streif.

Eigentliche Regenpfeifer. Charadrius.

Der Schnabel kürzer als der Kopf, dünn, gerade, rundlich, an der Wurzel mit einer Art Wachshaut, an der Spitze nackt, etwas dicker, und kegelförmig zugespitzt. Die untere Kinnlade etwas gewölbt. Die Nasenlöcher ausgehöhlt, die Rinne nimmt auf jeder Seite zwey Drittheile der Schnabellänge ein, welches denselben schwächer macht. Sie leben in zahlreichen Truppen, in feuchten Gegenden,

*) Oedinemus magnirostris. Cuv. — Longipes. Cuv. — Grallarius. Temm. sind drey neue Arten, welche dieser Gattung beyzufügen sind.

Digitized by Google

und an den Ufern der Seen und Flüße. Sie ſchlagen mit den Füßen auf die Erde, um die Würmer hervorzuſchrecken, von denen ſie ſich nähren. Die europäiſchen Arten niſten meiſtens im Norden, und ziehen durch Mitteleuropa nur durch.

Goldregenpfeifer. Char. Auratus. Meyer.

Charad pluvialis et apricarius. Linn. Naum. II. 10. 11. Fig. 14 und 15.

Schwärzlich, gelbgrün oder goldgelb gefleckt, im Winter der Unterleib weiß, im Sommer Hals und Unterleib ſchwarz. Mauſert zweimal. In ganz Europa auf Brachfeldern und Heiden.

Mornell-Regenpfeifer. Charad. Morinellus. Linn.

Naum. II. 12. Fig. 16.

Oberleib graubraun, mit roſtfarbener Federeinfaſſung; über den Augen ein weißer Streifen, der im Nacken zuſammenlauft; am Unterhals ein ſchwarzbrauner, unter dieſem ein breiterer, weißer Ring. Die Bruſt am Männchen rothbraun, der Schwanz aſchgrau. Das Weibchen lerchenfarb. Auf Brachfeldern und Viehtriften, im Herbſt in Deutſchland, niſtet in Norden.

Halsbandregenpfeifer. Charad. Hiaticula. Linn.

Wolf und Meyer, Vög. Deutſchl. I. B. Heft 15. Taf. 6.

Schnabel, Augenlieder und Füße pomeranzengelb; auf der Stirne ein ſchwarzes, hinter dieſem ein weißes Band,

Digitized by Google

welches von einem schwarzen Scheitelband begränzt wird, um den Hals ein weißes, unter diesem ein schwarzes Halsband, Unterleib weiß, oben grau. An Flüssen, Teichen und Seen, mit sandigen Ufern.

Weißstirniger Regenpfeifer. Char. Albifrons. Meyer.

Charad. cantianus. Lath. Wolf und Meyer, V. D. I. Heft. 15. Taf. 4.

Schnabel schwarz, die Füße bleifarbig; Stirn und Halsband weiß; der Hinterkopf hell rostbraun, Oberleib grau, Unterleib weiß. An denselben Orten, aber mehr im nördlichen Europa.

Kleiner Regenpfeifer. Char. minor. Meyer.

Char. curonicus. Gmel. Wolf und Meyer, V. D. Heft 15. Taf. 5.

Schnabel schwarz, Augenlieder zitrongelb, Füße fleischfarben. Das schwarze Stirnband sehr schmal, das schwarze Scheitelband weit unter die Augen herablaufend. Oberleib grau, Unterleib weiß. An denselben Orten.

Aehnliche Vertheilung der Farben finden sich auch an ausländischen Regenpfeifern, viele haben geschilderte Beine; sie machen eine eigene kleine Unterabtheilung, die meisten Arten haben an den Flügeln einen hornartigen Stachel, oder Fleischlappen am Schnabel; einige haben beydes.

Digitized by Google

Gestachelter Regenpfeifer. Charad. Spinosus.

Enl. 801.

Größe des Goldregenpfeifers, Scheitel und Kehle schwarz, am Hinterkopf ein kleiner Federbusch; Oberleib grau, Unterleib weiß, an der Brust ein schwarzer, halbmondförmiger Fleck, die Deckfedern der Flügel schwarz. Am Flügel ein halb Zoll langer Dorn. In Aegypten *).

Kiebitzen. Vanellus. Meyer. Tringa. Linn. (Vanneaux).

Der Schnabelbau wie bey den Regenpfeifern, allein sie haben eine Hinterzehe, welche aber so klein ist, daß sie den Boden nicht berührt.

Die erste Abtheilung

Kiebitz, Regenpfeifer. Squatarola. Cuv. (Vanneaux pluviers).

Die Hinterzehe kaum merklich, der Schnabel ist oben aufgeblasen, die Nasenrinne kurz, wie bey den Dickfüßen. Die Füße sind netzförmig geschildert; die inländischen haben einen kurzen, weiß und schwarz gestreiften Schwanz. Sie sind oft in Gesellschaft der Regenpfeifer.

---

*) Arten ohne Dorn: Char. coronatus. enl. 800. — Mit Stacheln, Ch. cayanus. — Mit Lappen, Char. pileatus. enl. 834. — Bilobus. enl. 880. (Cristatus. Edw. 47. ist wahrscheinlich mit Spinosus eins). Es gehören noch hieher: Char. cayanus. — Melanocephalus und mehrere neue Arten, welche sich alle an den Meeresufern finden.

Digitized by Google

Schwarzbauchiger Kiebitz. Vanell. melanogaster. Meyer.

Enl. 853. 854 und 923. Naumann Nachtr. VIII. Fig. 17. Tring. squatarola, helvetica et varia.

Stirn, ein Streif über den Augen und Kehle weiß, Bruſt grau, braun geſtrichelt, Oberleib ſchwarzgrau, weißlich oder grünlich gefleckt, je nach dem Alter, Unterleib weiß; im Sommer oben weiß, ſchwarz gefleckt, Hals und ganzer Unterleib ſchwarz, Stirn und Seiten des Halſes reinweiß, Steiß weiß. An Flüſſen, Seen, freyliegenden Teichen, auf großen Heiden und auf Saatfeldern. Niſtet wahrſcheinlich in Rußland, ſehr ſelten in Nordholland.

Eigentliche Kiebitzen. (Vanneaux).

Die Hinterzehe iſt deutlicher, die Läufe geſchildert, wenigſtens zum Theil, die Naſenrinne geht über zwey Drittheile des Schnabels weg. Sie brauchen dieſelbe Liſt, wie die Regenpfeifer, um die Würmer hervorzulocken.

Gemeiner Kiebitz. Vannellus cristatus. Meyer.

Tringa. Vannellus. Linn. Naum. II. Taf. 14. Fig. 18.

Von der Größe einer Taube, der Kopf oben ſchwarz, mit einem langen, aus ſpitzigen Federn beſtehenden Federbuſch, Backen und Halsſeiten weiß, Vorderhals ſchwarz, Bruſt und Unterleib weiß, Oberleib grau, grün bronzirt, an der Schwanzwurzel ein roſtbraunes, an ſeinem Ende ein ſchwarzes Band, die Mitte weiß, die Füße dunkelroth.

Digitized by Google

Ueber das ganze, mittlere Europa zerſtreut, wandert im Herbſt, findet ſich in Sümpfen, auf den Wanderungen auch auf Feldern, oft in unzählbaren Schaaren. Seine Eier werden ſehr geſucht, er niſtet in Sümpfen.

In den warmen Ländern giebt es Arten, deren Flügel, wie bey den Regenpfeifern, mit Stacheln bewaffnet ſind, und andere, welche Fleiſchlappen an der Kehle haben; ihre Läufe ſind geſchildert. Bey der geringſten Beunruhigung erheben dieſe Vögel ein großes Geſchrei, ſie vertheidigen ſich muthig gegen Raubvögel *).

Regenlaufer. Pluvianus. Vieill.

Der Schnabel kürzer als der Kopf, ſtärker als bey den Regenpfeifern und Kiebitzen, nicht aufgetrieben, gerade, mit undeutlicher Rinne für die Naſenlöcher, zugeſpitzt. Die Füße dreizehig.

Senegaliſcher Regenlaufer. Pluvian. senegalensis.

Charadrius melanocephalus. Lath. Le Pluvian. Buff. enl. 918.

Er iſt nicht größer als der kleine Regenpfeifer, aber ſein Hals iſt länger. Der obere Theil des Kopfes, Hinterhals und Oberrücken ſind ſchwarz. Durch die Augen geht ein ſchwarzer Streif, der ſich mit dem ſchwarzen des

*) Dahin gehören: Parra cayennensis. Gmel. enl. 836. — Parra ludoviciana. enl. 835. — Parra goensis. Gmel. enl. 807. — Parra senegala. Gmel. enl. 362. — Parra dominica. Gmel. — Tringa cayennensis et senegala.

Digitized by Google

Halses vereinigt. Vorderhals und ein Strich über dem Auge röthlichgelb. Unterleib weiß, Flügel, Steiß und Schwanz aschfarb, die Schwungfedern schwarz und weiß. Am Senegal.

Austernfischer. Haematopus. Linn. (Huitriers).

Der Schnabel länger als der Kopf, nicht sehr dick, stark, gerade zusammengedrückt, die Spitze keilförmig. Die Nasenlöcher linienförmig in der Seitenrinne, nahe an der Wurzel; die Rinne sehr tief, geht nur über die Hälfte des Schnabels, die Nasenlöcher bilden eine Ritze. Die Zunge kurz. Die Beine mittelmäßig hoch, die Läufe netzartig geschildert, die Füße dreizehig, die äußern mit der mittlern durch eine Haut verbunden.

Der rothfüßige Austernfischer. Haemat. ostralegus. Linn.

Enl. 919.

Schnabel, Füße und Augenlieder roth. Kopf, Hals, Oberleib und Schwanzspitze schwarz, Unterleib, ein Streif über die Flügel, und bey Jungen ein Halsband weiß. Von der Größe einer Ente, der Schnabel so stark, daß sie damit die Schalen der Austern öffnen können, von denen sie sich nähren. An den Meeresküsten des nördlichen Europa, zuweilen auch an Flüßen und Seen.

In Neuholland findet man eine Art, welche niemals etwas weißes an der Kehle hat, und ganz schwarz ist. Haem. niger und eine Art in Südamerika, H. palliatus.

Digitized by Google

Laufer. Cursorius. Meyer. Tachydromus. Illig. (Coure vite).

Schnabel rundlich, von der Wurzel bis zur Spitze unterwärts gekrümmt und spitzig, über den Naſenlöchern eine kleine Erhöhung, kürzer als der Kopf; die Mundöffnung weit. Die Naſenlöcher eiförmig ohne Rinne, die Zunge ſpitzig, die Füße dreizehig, die Zehen an der Wurzel mit einer kurzen Haut verbunden.

Iſabellfarbiger Laufer. Curs. isabellinus. Meyer.

Enl. 795. Charad. gallicus.

Der Körper iſabellfarbig, hinter den Augen ein doppelter, ſchwarzer Streifen, der Schwanz kurz, an der Spitze ſchwarz, (die mittlere ausgenommen) mit einem weißen Fleck. Hin und wieder in Europa äußerſt ſelten, man hat erſt fünf Exemplare in den verſchiedenſten Gegenden geſehen. Er frißt Inſekten und Würmer. Hieher gehört Cursor. bicinctus. Temm. aus Afrika, und C. asiaticus. Lath. enl. 892.

*) Schreivogel. Dicholophus. Illig. Microdactylus. Geoff.

Cariama.

Der Schnabel länger als der Kopf, an der Wurzel rundlich, der Oberſchnabel gewölbt, abwärts gekrümmt.

---

*) Hieher möchte wohl das Geſchlecht Flachſchnabel Burhinus. Illiger. Charad. magnirostris. Lath. zu zählen ſeyn. Der

Die Nasenlöcher an der Wurzel, mit einer Haut bedeckt, die vordere Oeffnung ablang und offenstehend. Die Mundöffnung bis unter die Augen gespalten. Dieser Schnabelbau giebt ihnen das Ansehen von Raubvögeln. Auf dem Kopf steht ein Federbusch von schmalen, langen, in zwey Reihen stehenden Federn. Durch die langen Beine nähern sie sich den Reihern, aber die Zehen sind sehr kurz, die Hinterzehe klein, nicht auf die Erde reichend. Die Zehen sind durch eine kurze Haut verbunden. Die Füße geschildert.

Gehaubter Schreivogel. Dichol. cristatus.

Annal. du Mus. XIII. pl. 26. Palamedea cristata Gmel. Saria d'Azara.

Rothgelb, braun gewellt; zerschlissene Federn an der Schnabelwurzel, bilden einen vorwärtsstehenden Federbusch. Sie fliegen selten und schlecht, die starke Stimme gleicht der eines jungen Puters. Das Fleisch schmeckt sehr gut, man hat daher diesen Vogel an verschiedenen Orten gezähmt. Er übertrift an Größe den Reiher, lebt von Eidechsen und Insekten, welche er an erhabenen Orten, und am Rande der Wälder aufsucht. Sein Vaterland ist Südamerika.

Mit messerförmigen Schnäbeln. Cultrirostris. Cuv.

Der Schnabel dick, lang, stark, meistens mit schneidenden Rändern und scharfer Spitze. Linneus stellte alle

---

Schnabel ist mittelmäßig lang, dick und platt, die Füße dreizehig, der Vogel lebt in Neu-Holland, ist aber noch nicht hinlänglich bekannt.

dieſe Vögel unter die Gattung Reiher. Ardea. Viele Arten haben die Luftröhre beym männlichen Geſchlecht verſchieden gebogen; der Blinddarm iſt kurz, und den wahren Reihern fehlt er.

Man kann ſie in drei Unterabtheilungen bringen. Kraniche, Reiher und Störche. Die erſte Abtheilung könnte man ſelbſt alle unter eine Gattung bringen.

Kraniche. Grus. Cuv. (Grues).

Der Schnabel iſt gerade, die Mundöffnung nicht weit; die Rinne für die Naſenlöcher iſt breit und ausgehöhlt, und nimmt faſt die Hälfte des Schnabels ein. Die Beine ſind geſchildert; die Zehen mittelmäßig lang, die Verbindungshaut der Zehen nicht lang. die Hinterzehe berührt kaum den Boden. Bey den meiſten iſt ein größerer oder kleinerer Theil des Kopfes nackt. Sie leben mehr auf trockenem Boden, und mehr von Pflanzennahrung als die eigentlichen Reiher, der Vormagen iſt muskulos und der Blinddarm lang. Der untere Kehlkopf hat nur einen Muskel auf jeder Seite.

Trompetenvogel. Psophia. Linn. Agami.

Der Schnabel kürzer als der Kopf, dick, faſt kegelförmig, zuſammengedrückt, platt, ſpitzig, die obere Kinnlade gegen die Spitze abſchüßig gebogen und etwas gewölbt. Die Naſenlöcher nahe an der Schnabelwurzel, ausgehöhlt, oben und hinten mit einer Haut halb bedeckt. Die Zunge platt, knorplicht, an der Spitze gefranzt. Der Kopf und Hals nur mit kurzem Flaum befiedert, der Au-

Digitized by Google

genkreis nackt. Die Deckfedern der Flügel hängend und weich.

Cayennischer Trompetenvogel. Psoph. crepitans. Linn.

Enl. 169.

Von der Größe eines Haushuhns. Der Rücken grau ins röthliche fallend, der Hals und Unterleib schwarz, an der Brust ein goldglänzend blauer Fleck. Der Vogel hat seinen Namen von der Eigenschaft, daß er einen dumpfen und tiefen Ton von sich giebt, der anfangs aus dem After zu kommen scheint. Dieser Vogel lebt in Cayenne, läßt sich sehr leicht zähmen, lauft seinem Herrn nach, wie ein Hund, und soll die andern Bewohner eines ganzen Hühnerhofes in Ordnung halten. Er fliegt schlecht, lauft aber sehr schnell; lebt in Wäldern von Körnern und Früchten, nistet auf der Erde am Fuß der Bäume, sein Fleisch ist angenehm.

Einige andere Kraniche mit kurzem Schnabel, reihen sich an den Trompetenvogel an.

Der Pfauenkranich. Grus pavoninus.

Ardea pavonia Linn. Enl. 263.

Von schlankem Bau, vier Fuß hoch, grau, der Bauch schwarz, der Bürzel rothgelb, die Flügel weiß; die Backen nackt und weiß, der Hinterkopf lebhaft rosenroth und mit einem Busch gelber, zerschlissener Federn geziert; den er nach Willkühr ausbreiten kann. Dieser schöne Vogel, dessen Geschrei auffallend dem Ton einer Trompete gleicht,

kommt

kommt aus dem westlichen Theil von Afrika, wo man ihn oft in den Hütten erzieht. Er nährt sich von Körnern. In seinem wilden Zustand sucht er überschwemmte Gegenden, und fängt da Fische. Man hält ihn wohl ohne Grund für den balearischen Kranich des Plinius.

Die Numidische Jungfer. Grus. Virgo.

Ardea Virgo. Linn. Enl. 241.

Gleicht dem vorigen an Schlankheit und Größe. Er ist graulich, der Hals schwarz, mit zwey schönen Federbüschen, welche aus den verlängerten, zerschlissenen, weißen Ohrfedern entstehen. Man weiß nicht wo er eigentlich zu Hause ist. Diejenigen, welche man gezähmt hat, machen sich durch sonderbare und lächerliche Geberden bemerklich. Im November 1802 wurde einer bey Cavalimaur in Piemont geschossen.

Bey den eigentlichen Kranichen ist der Schnabel so lang als der Kopf.

Grauer Kranich. Grus cinerea. Meyer.

Naum. II. Taf. 2. F. 2. Enl. 769. Ardea. Grus. Linn.

Mehr als vier Fuß hoch, grau, die Kehle schwarz, der Hinterkopf roth, nackt, nur mit Haaren bedeckt, auf dem Bürzel lange, weiche, gekräuselte Federn. Lebt im Sommer im Norden von Europa, zieht aber im Herbst von Norden nach Süden in großen Schaaren, welche eine bestimmte Ordnung im Fluge halten. Er lebt von Getreide, genießt aber eben so gerne Insekten und Würmer,

welche sie in sumpfigen Gegenden aufsuchen. Die Alten schrieben viel von den Kranichen, da sie auf ihrem Zuge hauptsächlich Griechenland und Kleinasien berühren *). Sehr merkwürdig sind die vielfachen Biegungen seiner Luftröhre im Brustknochen, ehe sie in die Brust tritt.

Zwischen Kraniche und Reiher gehören

Die Schnepfenreiher. Aramus. Vieill. (Courlan ou Courliri.

Der Schnabel ist dünner und die Mundöffnung weiter als bey den Kranichen, der Schnabel wird gegen den letzten Drittheil seiner Länge dicker, und die Zehen sind zwar lang, aber ganz ohne Verbindungshaut. Sitten und Lebensart wie bey den Reihern.

Kurlan, Schnepfenreiher. Aram. scolopaceus.

Ardea scolopacea. Gmel. et Lath.

Schön braun, mit grünlichem und röthlichtem Schimmer an den Schwung- und Schwanzfedern, an jeder Halsfeder mit einem weißen Schaftflecken. In Südamerika.

---

*) Zu diesem Geschlecht gehören der canadische Kranich: Ardea. Canadensis. Edw. 133. — Der Kranich mit dem Halsband, 865. Ard. Antigone. — Der weiße Kranich, Grus. Americanus. enl. 889. — Der Riesenkranich, Grus giganteus. Pall. et. 11. N. 30. t. 1. — Der Kranich mit Kehllappen, Ard. carunculata.

Digitized by Google

Sonnenreiher. Eurypyga. Illig. Helias. Vieill. (Caurale).

Der Schnabel länger als der Kopf, gerade, verlängert, kegelförmig, spitzig, zusammengedrückt, die Oberkinnlade zu beyden Seiten mit einer tiefen und breiten Rinne, welche nach vorn sich verliert, die Spitze nach vorn etwas gebogen. Die Nasenlöcher in der Rinne nahe an der Wurzel, länglicht, linienförmig, oben mit einer Haut bedeckt. Die Zunge schmal, hornartig, spitzig. Die Füße mittelmäßig lang, die Hinterzehe kurz.

Der Sonnenvogel. Eurypyg. Helias.

Ardea Helias. Linn. Enl. 702. Helias phalaenoides. Vieill.

Das Gefieder ist bandirt durch braune, rothgelbe, rostfarbe, graue und schwarze Bänder und Linien, und hat also ein sehr angenehmes Aeußere. Der Schwanz ist breit, und hat gegen seinem Ende eine schöne, rostfarbe und schwarze Binde. Der Hals lang und dünne, die Beine kurz. Dieses alles unterscheidet ihn in seinem Aeussern von den übrigen Sumpfvögeln. Der Körper hat die Größe und Form eines Rebhuhnkörpers. Man findet ihn an den Flüssen von Guiana.

Die zweyte Familie der reiherartigen Vögel ist mehr fleischfressend, der Schnabel ist stärker, die Zehen länger.

Kahnschnabel. Cancroma. Linn. (Savacou).

Der Schnabel mittelmäßig lang, dick, breit, niedergedrückt, eiförmig, oben mit einer deutlichen Firste und an

Digitized by Google

der Spitze mit einem Nagel, fast löffelförmig; die Kinnladenäste gehen weit nach hinten, die Schnabelschneiden scharf; die Nasenlöcher liegen nahe an der Wurzel des Schnabels in eine Rinne, welche längs der Firste hinlauft, sie sind schmal, oben mit einer halbgewölbten Haut bedeckt. Die Füße lang, vierzehig, die Zehen alle lang gesäumt, mit einer kurzen Haut, nur am Anfang verbunden. Die Zunge klein. Diese Vögel sitzen auf Bäume an den Ufern der Flüsse, und stürzen sich auf die Fische, welche ihre gewöhnliche Nahrung ausmachen. Ihr Gang ist langsam, und sie stehen gewöhnlich mit eingezogenem Halse, wie die Reiher.

Der Löffel-Kahnschnabel. Canc. cochlearia. Linn.

Enl. 38 et 369.

Etwa so groß wie eine Henne, weißlich, mit grauem oder braunem Rücken, rostfarbem Unterleib, weißer Stirne, schwarzem Scheitel, bey alten Männchen sich in einen langen, hängenden Federbusch verlängernd. In Südamerika.

Reiher. Ardea. Linn. (Herons).

Der Schnabel bis unter die Augen gespalten, länger als der Kopf, stark, gerade, zusammengedrückt, sehr spitzig, am Oberschnabel eine Furche, in welcher die Nasenlöcher liegen. Die Schnabelfirste an der Spitze etwas abschüßig. Die Schnabelschneiden öfter gezähnelt, an der Oberkinnlade vor der Spitze etwas ausgeschweift. Die Nasenlöcher nahe an der Wurzel, oben hinterwärts mit einer

Digitized by Google

Haut bedeckt. Die Zunge mittelmäßig, ablang, platt und spitzig. Zügel und Augenkreise ohne Federn. Die Füße lang geschildert, die Zehen alle sehr lang, die Verbindungshaut der äußern Zehe mit der mittlern stark, der Nagel an der Mittelzehe mit schneidendem und gezähneltem Rande. Der Magen sehr groß, wenig muskulos, der Blinddarm sehr klein. Es sind träge, langsam fliegende, aber dennoch sehr scheue Vögel, welche auf Bäumen, Felsen, einige auch auf der Erde an den Ufern der Flüße und Seen, oder in Sümpfen nisten. Sie sitzen oft auf Bäume, ihr Koth verbrennt die Bäume. Die Arten sind in beyden Festländern zahlreich. Man kann sie nicht füglich anders, als nach ihren Federn und der Dicke ihres Halses abtheilen.

Dünnhälsige Reiher, mit dünnem, unten mit hängenden, langen Federn geziertem Halse.

Grauer Reiher. Ardea cinerea. Linn.

Ardea major et cinerea. Linn. Naum. III. Taf. 28 und 29. Fig. 33 und 34.

Graubläulich, am Hinterhaupt ein schwarzer, hängender Federbusch; vorn weiß, mit schwarzen, perlförmigen Flecken. Bey Alten der Scheitel weiß. Dieser große Reiher ist gemein an Seen und Flüssen, und bleibt oft im Winter auch bey strenger Kälte, in gemäßigten Gegenden. Er schadet den Fischen sehr, und wurde ehemals durch Falken auf der sogenannten Reiherbeize gejagt. Nistet auf Bäumen und Felsen.

Digitized by Google

Purpurreiher. Ard. purpurea.

Ard. purpurea, purpurata, rufa et caspia. Gmel. Naum. Nachtr. 45. F. 89. 90.

Oberſchnabel dunkelbraun, Unterſchnabel, Zügel und Augenſtern gelb, Scheitel ſchwarz, mit langem, hängendem Federbuſch; der Oberleib aſchgrau, mit olivengrünem Schimmer. Unterleib rothbraun, mit purpurfarbem Anſtrich, die Seiten dunkelrothbraun; vom Mittelrücken laufen lange, ſchmale, roſtfarbe Federn über die Flügel. Die Füße grünbräunlich. In Deutſchland als Zugvogel, brütet in Holland. Häufig am kaſpiſchen und ſchwarzen Meer. Neſt im Rohr.

Großer Silberreiher. Ard. Egretta. Linn.

Ardea alba, egrettoides, Xanthdactylos. Gmel. Naum. Nachtr. 46. F. 91.

Schneeweiß, mit kleinem Federbuſch, die Rücken- und Schulternfedern bey alten Vögeln ſehr lang und zerſchliſſen, und reichen weit über den Rücken und Schwanz hinaus. Selten in Deutſchland, häufiger in Ungarn, aber auch außer Europa, in Südamerika. Niſtet auf der Erde *).

*) Das Muſeum in Bern beſitzt zwei in der Schweiz geſchoſſene, weiße, große Reiher, welche faſt die Größe eines Kranichs haben, ohne lange Schulterfedern, ich möchte ſie faſt für eine eigene Art halten. A. d. U.

Digitized by Google

Kleiner Silberreiher. Ard. garzetta. Linn.

Ardea aequinoctiolis et garzetta. Gmel. Naum. Nachtr. 41. F. 92.

Viel kleiner als der vorige, der Kopf mit einem langen Federbusch, reinweiß wie der vorige, mit langen Schulterfedern. Selten in Deutschland, und nur auf dem Zuge im Frühjahr. Häufiger im warmen Europa, wo er auch nistet *).

Reiher mit kürzern Beinen, Krabbenfresser, Crabiers.

Rallenreiher. Ard. ralloides. Meyer.

Ard. castanea, comata, squaiotta, Marsigli, pumila. Gmel. Crabier de Mahon. Naum. Nachtr. XXII. F. 44. und 45.

Der Hinterkopf mit einem langen, aus vielen weißen, schwarzgesäumten Federn bestehenden Federbusch, der Rücken braunroth, die Schulterfedern gelb, lang, schmal und zerschlissen. Unterleib gelblich. Auf dem Zuge im mittlern und wärmern Deutschland, der Schweiz und in Italien, wo er wahrscheinlich auch brütet, in Sümpfen und an Seen. Häufig am kaspischen und schwarzen Meer.

---

*) Ardea nivea ist kleiner als garzetta, hat einen ganz andern Federbusch aus zerschlissenen Federn, feineren Schnabel und Füße, und lebt in Amerika.

Digitized by Google

Kleiner Reiher. Ard. minuta. Linn.

Ardea danubialis. Gmel. Naum. III. 28. F. 37. und Nachträge XII. F. 25. 26. Blongios de Suisse.

Kopf, Rücken, Schwungfedern und Schwanz schwarzgrün, Vorderhals und Flügeldeckfedern lehmfarben. Das Weibchen auf dem Rücken braun, und so auch die Jungen. Im starken Geröhr, im mittlern und wärmern Deutschland, zieht im Herbst weg.

Dickhälsige Reiher. Rohrdommel mit dicken Halsfedern.

Rohrdommel-Reiher. Ardea stellaris.

Naum. III. 27. F. 36.

Rostgelb, schwarz gefleckt und gestreift, die Halsfedern stark und lang. Am Unterleib bläsſer. In Sümpfen und Rohrteichen im ganzen mittlern Europa, nistet im Sumpf und macht ein fürchterliches Geschrei, daher der Name Rohrdommel, Rohrochse, Rohrrind.

Der Nachtreiher. Ard. Nycticorax. Linn.

Le Bihoreau. Ard. maculata, badia, grisea. Gmel. Naum. III. 27. F. 35. Nachtr. 48. F. 93. 94.

Kopf-, Rücken- und Schulterfedern schwarz, grünglänzend, Unterrücken, Steiß, Flügel und Schwanz rein aschgrau; Unterleib weißlich. Am Nacken drei in einandergerollte Federn, die wie ein Zopf bilden. Die Jungen sind grau.

Digitized by Google

Die dritte Familie der reiherartigen Vögel, hat einen dickern, glattern Schnabel, und stärkere Verbindungshäute zwischen den Zehen.

Störche. Ciconia. (Cigogne).

Der Schnabel stärker, dicker und mehr walzenförmig als bey den Reihern, gerade, glatt, zusammengedrückt, an jeder Seite des Oberschnabels eine Längsfurche, spitzig und lang. Die Nasenlöcher eng und verlängert, an der Schnabelwurzel nahe an der Firste. Die Zunge klein, spitzig, tief im Schlunde liegend. Vor der nackten Augenhaut noch eine befiederte Stelle. Unter dem Schnabel an der Kehle ein nackter, ausdehnbarer Sack. Der Hals kürzer als bey den Reihern. Mit dem Zusammenschlagen der breiten Schnabelschneide, können sie ein lautes Geklapper machen, sonst geben sie außer einem Zischen keinen Ton von sich. Der Magen ist wenig muskulos, der Blinddarm so klein, daß man ihn kaum bemerkt; der untere Kehlkopf hat keine eigenen Muskeln; die Bronchien sind länger und bestehen aus mehr ganzen Ringen, als gewöhnlich bey den Vögeln.

Europäische Störche sind:

Der weiße Storch. Ciconia alba.

Naum. III. 22. F. 31. Ardea ciconia. Linn.

Weiß, die Schwungfedern schwarz. Schnabel und Füße roth. Augenstern braun. Dieser Vogel ist durch ganz Europa verbreitet, und ein Zugvogel der früh ankommt, aber im Herbst früh wieder wegzieht, und den Winter in Afrika zubringt, wo er noch einmal nisten

Digitized by Google

soll *)? Er findet sich nur in Gegenden, wo es nasse Wiesen, Flüsse und Sümpfe giebt, lebt von Insekten, Fröschen, Mäusen, Fischen, Schlangen, und wird vom Volke geschont und verehrt, er nistet vorzüglich gern auf Kirchthürmen und Dächern.

Der schwarze Storch. Cic. nigra. (Cicogne brune).

Naum. III. 23. F. 32.

Schwarz, in kupferroth und purpurschillernd, der Bauch weiß, Schnabel und Füße bey Alten roth. Hin und wieder in Europa in abgelegenen Sümpfen und in Wäldern, nahe bey denselben.

Storch Maguari. Cic. maguari. Temm.

Cicon. americana. Ardea Maguari. Gmel.

Kopf, Hals, Rücken, Schwanz und Unterleib weiß; die Federn am Unterhals lang und hängend, Flügel und obern Deckfedern des Schwanzes schwärzlich, mit grünem Schein; ein großer, ausdehnbarer Fleck an der Kehle, und die Haut um die Augen hochroth, der Schnabel an der Wurzel grüngelb, an der Spitze aschgraublau; Füße roth, Nägel braun, Regenbogenhaut weiß. In Amerika, zuweilen aber auch in Europa, man hat in Frankreich mehrere getödtet.

---

*) Nicht blos in Afrika, was sogar von einigen noch bezweifelt wird, sondern auch in Syrien, und selbst in Spanien soll der Storch überwintern, und aus Japan nicht wegziehen. Ardea leucocephala ist ebenfalls ein Storch.

Digitized by Google

Riesen-Storch. Cicon. Argala.

Ard. Argala. Lath. dubia. Gmel. Lath. Synops. pl. 79.

Weiß, der Rücken schwarzbronzirt. Die größte Art. An Kopf und Hals ist nur ein grauer Flaum, unter der Mitte des Halses hängt ein Sack, wie eine große, dicke Wurst; der Schnabel ist gelblich und verhältnißmäßig größer als bey andern Arten, er fängt damit selbst kleine Vögel im Fluge. Er findet sich im nördlichen Afrika in kleinen Truppen an der Mündung der Flüsse. Soll auch in Bengalen sich finden.

Jabiru. Mycteria. Linn.

Linneus hat sie schon von den Reihern getrennt, sie sind den Storchen verwandt, ja selbst diesen näher als den Reihern, Illiger trennt sie auch nicht von den Störchen; Schnabelöffnung, Nasenlöcher, die geschuppten Füße, die starken Verbindungshäute der Zehen und Lebensart, sind ganz wie bey den Störchen. Das einzige unterscheidende Merkmal ist, daß der Schnabel leicht nach oben gebogen ist.

Amerikanischer Jabiru. Myct. americana. Linn.

Enl. 817.

Sehr groß, weiß, Kopf und Hals ohne Federn, mit einer schwarzen Haut bekleidet, am Hinterhaupt nur einige weiße Federn; Schnabel und Füße schwarz. Lebt im mittäglichen Amerika, am Ufer von Teichen und Sümpfen, von Reptilien und Fischen *).

*) Dahin gehören: M. asiatica. — Senegalensis et australis.

Digitized by Google

Schattenvogel. Scopus.

Der Schnabel länger als der Kopf, dick, gerade, mit scharfer, deutlicher Firste, welche gegen die Spitze sich biegt, und an der Wurzel etwas aufgeblasen ist, die Nasenlöcher liegen in einer Rinne, welche längs der Firste bis zum Ende lauft.

Gehaubter Schattenvogel. Scop. Umbretta.

Enl. 796.

So groß wie eine Krähe, umbrafarbig, das Männchen hat am Hinterhaupt einen Federbusch. Am Senegal.

Klaffschnabel. Anastomus. Illig. Hians. Lacepede.

Sie haben die Gestalt der Störche, der Schnabel ist länger als der Kopf, dick, zusammengedrückt, die Kinnladen in der Mitte des Schnabels von einander abstehend und klaffend, so, daß ein leerer Raum entsteht. Dieser Bau erscheint zum Theil als Wirkung der Reibung, denn man sieht deutlich die hornigen Fibern wie abgenutzt. Linne hat sie zu den Reihern gezählt. Es sind zwey Arten bekannt.

Der amerikanische Klaffschnabel. Anast. pondicerianus.

Ardea pondiceriana. enl. 932.

Weiß, die Flügel schwarz, Schnabel und Füße grüngelb. In Südamerika.

Digitized by Google

Der orientaliſche Klaffſchnabel. Anast. coromandelinus.

Ard. coromandeliana. Sonn. voy. II. 219.

Graubraun, Flügel und Schwanz ſchwärzlich. An der Küſte von Coromandel. Temmink hält dieſen für den alten Vogel der vorigen Art?

Nimmerſatt. Tantalus.

Illiger macht aus dieſer Gattung und dem Ibis die Familie Sichelvögel, und nennt dieſelbe Schlukker. Der Schnabel iſt lang, ſtark, ſeine Wurzel geht tief ins Geſicht, zuſammengedrückt, etwas ſchmächtig, gegen die Spitze bogenförmig gebogen, überhaupt ſichelförmig, und auf jeder Seite leicht ausgeſchweift. Die Naſenlöcher nahe an der Wurzel, gegen den Schnabelrücken länglicht, eiförmig. Die Zunge ſehr kurz, tief im Schlunde. Das Geſicht, und oft auch ein Theil des Halſes nackt. Die Füße ſind wie bey den Storchen.

Amerikaniſcher Nimmerſatt. Tant. loculator. Linn.

Enl. 863.

So groß, wie ein Storch, aber ſchlanker; weiß, Schwung- und Schwanzfedern ſchwarz, Schnabel und Füße ſchwarz, eben ſo die nackte Haut an Kehle und Kopf. Er lebt in beyden Amerikas, wo er zur Regenzeit eintrift, und ſchlammige Waſſer beſucht, wo er beſonders Aale findet. Sein Gang iſt langſam, und ſein Naturell überhaupt träge und dumm.

Digitized by Google

Afrikaniſcher Nimmerſatt. Tant. Ibis.

Enl. 339.

Weiß, auf den Flügeln mit purpurfarbigem Schein, der Schnabel gelb, die Haut des Geſichts und an der Kehle roth. Dieſer Vogel wurde lange Zeit für den Ibis der Alten Egyptier gehalten, aber neuere Unterſuchungen haben gezeigt, daß jenes ein viel kleinerer Vogel war, welcher zur Gattung Ibis gehört, von welchem ſpäter die Rede ſeyn wird. Dieſer Nimmerſatt iſt in Egypten ſelten, und kommt häufiger vom Senegal.

Ceyloniſcher Nimmerſatt. Tant. leucocephalus.

Encyclop. methodique, Ornith. pl. 66. F. 1.

Der größte Vogel der ganzen Gattung, er hat den dickſten Schnabel, welcher wie die Geſichtshaut gelb iſt, der Körper iſt weiß, Schwungfedern und ein Gürtel an der Bruſt ſchwarz. Am Hinterrücken ſtehen lange, roſenfarbe Federn, welche er in der Regenzeit verliert. In Ceylon.

Löffler. Platalea. Linn. (Spatules ou Pallettes).

In Hinſicht des Körperbaues nähern ſie ſich den Störchen, aber der Schnabel iſt lang und an der Spitze breit, löffelförmig abgerundet, an der Wurzel runzlicht, an beyden Kinnladen lauft zur Seite eine Rinne, welche an der Spitze einen ſtumpfen Nagel bildet. Die Schnabelſchnei-

Digitized by Google

den sind breit, und in die Quere gestreift. Die Nasenlöcher liegen nahe an der Schnabelwurzel in einer Rinne, ganz auf dem Schnabelrücken, und sind ablang. Die Zunge sehr kurz, klein, dreieckig. Die Beine sind netzartig geschuppt. Die Verbindungshäute der Zehen stark. Sie haben zwey kleine Blinddärme, der Magen ist wenig muskulos, der untere Luftröhrenkopf ohne eigene Muskeln. Der breite Schnabel benimmt ihm seine ganze Stärke, und macht ihn nur geschickt im Schlamme zu wühlen. Sie leben von kleinen Fischen und Insekten.

Weißer Löffler. Platal. leucorodia. Linn. Naum. Nachtr. Taf. 44. Fig. 87. 88.

Weiß, der junge Vogel ohne Federbusch, die Schwungfedern schwarz gesäumt, der alte Vogel mit einem starken Federbusch, weißen Schwingen, an der Brust ein breiter, rothgelber Gürtel. Am häufigsten in Holland, aber dennoch besucht er auf seinen Zügen ganz Europa, nistet auf Bäumen.

Rosenrother Löffler. Plat. Ajaja. Linn. Enl. 165.

Mit nacktem Gesicht, das Gefieder rosenfarb nach verschiedenen Graden, im Alter am dunkelsten. In Südamerika *).

Die Familie der Langschnäbler. Longirostres.

Diese Familie besteht aus einer großen Anzahl Sumpfvögel, welche meistentheils in die Linneische Gattung

*) Platal. tenuirostris. Temm. Sonner. voy. I. Tab. 51. 52

Schnepfen oder Strandlaufer begriffen sind, wovon einige eine so kurze Hinterzehe haben, daß sie den Boden nicht damit berührt. Eine kleine Zahl wurde von Linne der Gattung Regenpfeifer beigesellt, weil sie gar keine Hinterzehe haben. Alle diese Vögel haben ungefähr dieselbe Gestalt, dieselben Gewohnheiten, ja fast dieselbe Farbenvertheilung, daher ist es nicht leicht die Arten zu bestimmen, um so mehr, als die meisten eine doppelte Mauser haben, und im Sommer ein ganz anderes Kleid tragen als im Winter, und oft ein eben so verschiedenes Jugendkleid. Der Schnabel ist im Allgemeinen schwach, dünne und lang, und hauptsächlich geschickt, um im Schlamme damit Würmer und kleine Insekten zu suchen. Die Verschiedenheit des Schnabelbaues dient zur Unterscheidung der Gattungen. Die Linneische Gattung Schnepfe Scolopax, zerfällt in folgende Gattungen.

Ibis. Ibis. Laceped. et Illig, Falcinellus. Bechst.

Sie unterscheiden sich von der Gattung Nimmersatt dadurch, daß ihr Schnabel zwar wie bey jenen gebogen, aber viel dünner und schwächer ist, und an seiner Spitze keine Ausschweifung hat. Er ist viereckig, rundlich, gebogen, die Spitze stumpf. Zwey tiefe Furchen enthalten die Nasenlöcher und gehen bis zur Spitze, wodurch der Schnabel in drey Theile getheilt wird. An der Wurzel ist derselbe fast viereckig. Die Nasenlöcher liegen nahe an der Wurzel, sind enge, und mit einer Haut umgeben. Die Zunge kurz und dreieckig. Immer ist ein Theil des Kopfes zuweilen auch des Halses nackt. Die Füße haben

starke

Digitized by Google

ſtarke Verbindungshäute, und die Hinterzehe iſt lang genug, um den Boden zu berühren.

Bey einigen ſind die Füße kürzer und ſchuppig; dies ſind die größern und ſtärkern Arten, ſie haben zugleich einen größern Schnabel. Dieſe Vögel machen große Reiſen, mauſern nur einmal und leben von Inſekten und Würmern.

Der heilige Ibis. Ibis religiosa. Cuv.

Abou Hannès. Bruce voy. pl. 35. Tant. Aethiopicus. Lath. Cuv. recherches sur les ossements fossiles. Tom. I.

Die berühmteſte Art, welche die alten Egyptier in ihren Tempeln erzogen, und göttlich verehrten: nach dem Tode wurden die Körper dieſer Thiere einbalſamirt. Die Urſache dieſer Verehrung wird verſchieden angegeben. Einige ſagen, weil ſie die ſchädlichen Schlangen verzehrten; andere, weil das Gefieder einige Aehnlichkeit mit der Farbe des Mondes habe; und noch andere führen zum Grunde an, weil ſeine Erſcheinung das Anwachſen des Niles verkünde. Man glaubte lange Zeit, dieſer Ibis ſey der Linneiſche Tantalus, Ibis aus Afrika; allein genauere Unterſuchungen zeigten, daß es dieſe Art ſey. Er hat die Größe einer Henne, das Gefieder iſt weiß, Schnabel, Füße, Schwungfedern und die zerſchliſſenen Halsfedern ſchwarz, ſo auch die nackten Theile des Halſes und Kopfes: in der Jugend ſind dieſe letzten Theile, wenigſtens der obere Theil des Geſichtes, mit ſchwarzen Federn beſetzt. Die Alten und Belon, reden auch von einem ſchwarzen Ibis, den die neuen Naturforſcher nicht beſtimmt kennen.

Vielleicht ist es der folgende, mit geschilderten Füßen und dünnerem Schnabel.

Brauner Ibis. Ibis Falcinellus.

Courlis vert. Tantal. falcinellus. Lath. Naumann Nachtr. Taf. 28. Fig. 57.

Der Leib kastanienbraun, der Oberleib schwarzgrün. Man findet diesen Vogel im wärmern Europa; sie nähren sich von Insekten, Würmern, Weichthieren, zuweilen auch von Pflanzensubstanzen, eben so wenig als der vorige von Schlangen. Auf seinen Zügen ist er in Ungarn, Polen und der Türkey häufig. Nach Egypten kommt er regelmäßig, nistet in Asien.

Rother Ibis. Ibis rubra.

Tant. ruber. Courli rauge du Bresil. Enl. 80 u. 81.

Dieser schöne Vogel bewohnt die heißen Theile Südamerikas; die brennend scharlachrothe Farbe seines Gefieders zeichnen ihn aus, doch hat nur der alte Vogel dieses sehr lebhafte Kleid. Die Jungen sind anfangs mit schwärzlichem Flaum bedeckt, dann werden sie grau, dann weißlich, und erst nach zwei Jahren roth, und immer glänzender, je älter sie werden. Diese Art wandert nicht, und findet sich in Schaaren an den sumpfigen Mündungen der Flüsse. Man kann sie leicht zähmen *).

*) Alle Tantali Lathams, außer die drei oben angeführten, werden von Cuvier zu den Ibisarten gerechnet: Cayennensis. enl. 820. — Mexicanus. — Melanopis. — Albicollis. enl. 976. — Griseus. — Fuscus. — Albus. — Igneus. — Cal-

Digitized by Google

Brachvogel. Numenius. Cuv. (Courlis).

Schnabel lang, dünne, gebogen, zuſammengedrückt; die obere Kinnlade gefurcht, bis drey Viertheile ihrer Länge. Die Naſenlöcher in der Rinne, linienförmig. Das ganze Geſicht befiedert. Die Zunge ſehr kurz und klein. Die Füße lang und dünne. Der Oberſchnabel geht etwas über den untern vor, und biegt ſich nach unten.

Europäiſche Art.

Großer Brachvogel. Num. Arquata. Bechſt.

Courlis d'Europe. Scolopax arquata. Linn. Naum. III. 5. F. 5.

Von der Größe einer Krähe, braun, jede Feder mit weißlichem Rande; Bürzel weiß, der Schwanz weiß und braun gebändert. Sie leben in trockenen, ſandigen Gegenden, doch immer nahe an Gewäſſern und Sümpfen, nähren ſich von Regenwürmern, Inſekten, Schnecken. Ihr Flug iſt leicht und hoch, ſie wandern in *) großen Schaaren. Man findet ſie faſt allenthalben in Europa. Das Fleiſch iſt mittelmäßig.

Man hat mit den Brachvögeln, wegen der ähnlichen Schnabelkrümmung zwey andere Arten verbunden, welche davon getrennt werden müſſen.

---

vus. enl. 867. — Manillensis. — Minutus. — Cristatus. enl. 841. — Bengalensis. — Caffrensis. etc.

*) Numen. — Borealis et longirostris.

Digitized by Google

Regenvögel. Phaeopus. Cuv. (Courlieus).

Der Schnabel ist gegen sein Ende zusammengedrückt, die Furchen laufen bis zum Ende, man könnte sie Sandlaufer mit langem und gekrümmtem Schnabel nennen.

Europäischer Regenvogel. Phaeop. boreaiis.

Numenius phaeopus. Bechst. Meyer. Temm. Scolop. borealis. Gmel. Naum. III. 10. F. 10. Courlis. Corlieu. Temm.

Kleiner als der vorige, fast ein Drittheil, die Farbe eben so. Im Norden beyder Welten, auf dem Zuge im mittlern Europa, nistet im arktischen Kreise und in Asien.

Sichelschnäbler. Falcinellus. Cuv. (Bécasseau. Temm.).

Der Schnabel ist niedergedrückt, und behält die Furchen bis zur Spitze, wie bey den Regenvögeln, aber kürzer, keine Hinterzehe. Es sind Sanderlinge mit gekrümmtem Schnabel.

Kleiner Sichelschnabel. Falcin. pygmaeus.

Numen. pygmaeus. Bech. Tringa platyhincha. Temm. Naum. Nachtr. Taf. 4. F. 12.

Schnabel länger als der Kopf, wenig gebogen, fast von derselben Farbe, wie die vorigen, aber blos von der Größe einer Lerche. In den Sümpfen von Nordamerika und Europa, auf dem Zuge zuweilen in Deutschland. Nistet wahrscheinlich innert dem arktischen Kreise.

Digitized by Google

*) Schnepfe. Scolopax. (Bécasse).

Schnabel lang, gerade, dünn, zusammengedrückt, weich, die Spitze stumpf, weich, der Oberschnabel länger als der untere, da sein Ende etwas aufgeschwollen ist. Die Rinne für die Nasenlöcher, geht fast bis zur Spitze. Auch am Unterschnabel ist eine Rinne. Die weiche Spitze des Oberschnabels ist sehr empfindlich, wird nach dem Tode hart und runzlich. Die Nasenlöcher liegen nahe an der Wurzel und sind linienförmig. Die Zunge mittelmäßig, schmal und spitzig. Die Füße nicht sehr lang, gespalten. Der Kopf ist zusammengedrückt, befiedert, die großen Augen stehen sehr weit nach hinten, welches dem Vogel ein dummes Ansehen giebt, welche Eigenschaft sie aber auch durch ihre Fähigkeiten nicht wiederlegen. Die Mundöffnung ist enge. Die Flügel mittelmäßig lang.

---

*) Dahin gehört die Gattung

Erolie. Erolia.

Der Schnabel an der Wurzel cylindrisch, länger als der Kopf, gebogen, an der Spitze etwas stumpf; die obere Kinnlade an der Seite gefurcht, die Nasenlöcher linienförmig, an der Schnabelwurzel in der Furche. Die Zunge kurz und spitzig. Die Füße nur dreizehig, die hintere Zehe mangelt, der mittlere ist mit der äußern durch eine Haut am ersten Gelenke verbunden.

Nur eine Art.

Gefleckte Erolie. Erolia variegata.

Der Körper oben grau und weiß gefleckt; die Brust weiß, braun gestrichelt, Flügel und Schwanz schwärzlich; Schnabel und Füße schwarz. Vom Senegal.

Digitized by Google

Einige Arten leben in Wäldern, andere in Sümpfen; sie nähren sich von Schnecken, kleinen Käfern und Würmern, leben einsam und nisten größtentheils im Norden, ziehen daher im Herbst gegen Süden, und im Frühjahr zurück. Sie mausern nur einmal.

Waldschnepfe. Scolop. rusticola. (Rusticola. Vieill.).

Naum. III. 1. Fig. 1. Bécasse.

Der Oberleib rostfarb, grau und schwärzlich gestreift und gefleckt, der Unterleib schmutzig weiß, mit schwärzlichen Querbändern. Hinten am Kopfe 4 breite, röthlich schwarze, und vier schmale, weißliche Querbänder. Diese sehr bekannte Schnepfe lebt im Sommer in Norden, oder auf den Gebirgen des mittlern Europa paarweise, in sumpfigen Wäldern, und wird auf ihrem Striche in ganz Europa angetroffen. Einzelne Paare nisten fast allenthalben, die meisten aber in Norden. Auch in Amerika ist sie anzutreffen, nebst andern *).

Die andern Schnepfen leben in Sümpfen, und heißen Sumpfschnepfen.

Heerschnepfe. Scol. gallinago. Linn.

Naum. III. 3. F. 3. Bécassine.

Viel kleiner als die Waldschnepfe, über den Kopf laufen zwey schwärzliche Streifen, in deren Mitte und zu

*) Dahin gehören: Scolopax minor und paludosa, Enl. 895. Beyde aus Amerika und kleiner als die unsrige.

beyden Seiten ein roſtgelber, der Hals iſt braun, roſtgelb gefleckt, der Rücken ſchwärzlichbraun, mit zwey roſtgelben Längsbändern, die Flügel braun, grau gewellt, der Unterleib weißlich, auf den Seiten bräunlich gewellt. Sie lebt in Sümpfen und ſumpfigen Wieſen, oder auch an Quellen und Flußufern, fliegt ſchnell und hoch, und läßt dann ein lautes Geſchrei gleich dem Meckern einer Ziege hören, daher heißt ſie auch Himmelsziege.

Doppelſchnepfe. Scolop. major. Gmel.

Naum. III. 2. Fig. 2.

Ein Drittheil größer als die vorige, die grauen und roſtfarben Streifen oben ſind kleiner, die braunen unten dagegen größer und zahlreicher. Wohnt in Norden in großen Sümpfen, zieht alle Jahre regelmäßig durch viele Gegenden Europas.

Meerſchnepfe. Scolop. gallinula. Linn.

Naum. III. 4. Fig. 4.

Von der Größe einer Lerche, der Hals aber länger, hat auf dem Kopf nur einen ſchwarzen Streif, im Nacken ein halbes, graues Halsband, die dunkeln Streifen ſind violetglänzend, die Seiten des Halſes und die Bruſt braun gefleckt. Sie niſtet nur in wenigen Gegenden des mittlern Europas, und wahrſcheinlich häufiger in Norden, doch findet man ſie faſt das ganze Jahr in einigen Gegenden. Alle dieſe Schnepfenarten, und beſonders auch dieſe, haben bekanntlich ein vortreffliches Fleiſch.

Digitized by Google

Graue Schnepfe. Scol. grisea. Gmel.

Auf den Schwanzfedern ſind zahlreiche, weiß und ſchwarze Bänder. Scheitel, Hals, Bruſt und Deckfedern der Flügel ſind graubraun, ohne Flecken; vom Auge zum Schnabel geht eine graubraune Binde, Augenbraunen, Kehle, Bauch und Schenkel reinweiß. Rücken und Schultern hellbraun, dunkelbraun geändert. Steiß und Bürzel weiß, mit ſchwärzlichen, halbmondförmigen Flecken. In England, Schweden und Nordamerika. Nilſon nennt ſie Scolop. Paykullii, Latham Scol. noveboracensis.

Krummſchnabelſchnepfen. Rhynchaea. Cuv.

Schnepfen aus Afrika und Oſtindien, deren Schnabelkinnladen ungefähr gleich lang ſind, der Oberſchnabel iſt aber gegen die Spitze leicht gebogen, die Naſenlöcher-Rinnen laufen bis ans Ende des Oberſchnabels, ohne eine ungerade Linie. Die Geſtalt iſt wie bey den Schnepfen, aber die Farben ſind lebhafter, und auf Flügeln und Schwanz ſind Augenflecken.

Capiſche Krummſchnabelſchnepfe. Rhynch. capensis.

Scolop. capensis. Gmel. Enl. 270. Bécassine du Cap.

Kopf grau, durch die Augen ein weißer Streif, der Hals faſt zimmetfarb, an der Bruſt ein ſchwarzes Halsband; Unterleib weißlich, Rücken und Flügel aſchfarbig, ſchwarz gewellt, an den Deckfedern der Flügeln gelbliche Flecken. Am Vorgebirge der guten Hoffnung *).

*) Dahin gehören: Scolop. capensis. Var. a. Lath. Synops.

Digitized by Google

Sumpflaufer. Limosa. Bechst. (Barges).

Schnabel sehr lang, etwas aufwärts gebogen, biegsam, stumpf, gegen die Spitze platt; die beyden Kinnladen gefurcht, die Nasenfurche geht bis an die weiche Spitze. Die Nasenlöcher liegen auf der Seite, und gehen durch. Die Füße lang, dünn, ob dem Knie eine große Strecke nackt, vierzehig; die mittlere Zehe mit dem äußern durch eine Haut verbunden, welche bis ans erste Gelenk geht. Die Flügel mittelmäßig lang. Es sind große Vögel, sie leben in Sümpfen, und an sumpfigen Flußufern, von Würmern und Insekten. Sie sind Zugvögel, welche gesellschaftlich wandern. Mausern zweymal.

Europäische Arten.

Schwarzschwänziger Sumpflaufer. Lim. melanura. Leisler.

Scolopax limosa. Linn. belgica. Aegocephala. Gmel. Naum. III. 11. F. 11. Nachtr. XXXVII. F. 73. Grande barge rousse.

Der Schwanz an der Wurzel schwarz, an der Spitze weiß, der Nagel der Mittelzehe lang und gezähnelt. Auf den Flügeln ein weißer Spiegel. Der Oberkörper einfärbig braungrau; Kehle, Vorderhals, Brust und Seiten hellgrau. Unterleib weiß. Im Sommerkleide ist Hals und Brust lebhaft rostroth, Brust und Seiten mit feinen zikzak Wellenlinien; der Rücken schwarz, jede Feder mit einem

---

pl. 83. — Scol. sinensis. enl. 881. — Madagascariensis. enl. 922. — Maderaspatana. Lath. — Rallus Bengalensis. Lath.

Digitized by Google

roſtrothen Endbande, Deckfedern der Flügel grau, Bürzel und Schwanz ſchwarz, Unterleib weiß. Am häufigſten in Holland, wo er auch niſtet, aber auf dem Zuge faſt in ganz Europa. Sein Geſchrei iſt ſehr laut.

Roſtrother Sumpflaufer. Lim. rufa.

Scolop. leucophaea. Lath. Lapponica. Linn. Totanus leucophaeus et glottis. Bechst. et Meyeri. Barge aboyeuse. Enl. 900. Naum. III. 6. F. 6. jung.

Kopf, Nacken und Rücken dunkelbraun, gelbweiß kantirt. Geſicht, Hals, Bruſt, Bauch weiß, Seiten der Bruſt rothgrau, mit braunen Längsflecken. Der Schwanz mit braunen und weißlichen Bändern. Im Sommerkleid wird der ganze Unterleib roſtfarb, nur an der Bruſt mit einzelnen ſchwarzen Flecken. Seltener im mittlern Europa. Niſtet tief in Norden *).

**) Strandlaufer. Calidris. Cuv. Tringa. Auct. (Maubeches).

Der Schnabel an der Spitze niedergedrückt, die Naſenrinne ſehr lang, wie bey den Sumpflaufern, aber der Schnabel im Allgemeinen nicht länger als der Kopf. Die

---

*) Limosa alba. Recurcirostra alba aus Amerika, gehört hieher. A. d. U.

**) Illiger vereint in ſeiner Gattung Actites, die Gattungen Limosa, Tringa, Totanus, die Kiebitze nennt er dagegen Tringa. Temmink hat noch am beſten die Verwirrung gelöſt, die hier herrſcht. A. d. U.

Digitized by Google

Zehen ſind leicht geſäumt, ohne Verbindungshaut. Die Hinterzehe berührt kaum den Boden; die Beine ſind mittelmäßig lang, der Körper etwas dick, daher der Gang ſchwerfälliger als bey den Sumpflaufern, und ihr Körper viel kleiner. Sie mauſern meiſt zweimal. Temmink nennt ſie Bécasseaux. Leben in Sümpfen, wandern in kleinen Truppen, nähren ſich von Inſekten.

Roſtrother Strandlaufer. Calid. ferruginea.

Bécasseau maubèche grise. Tringa cinerea, grisea et canutus. Tringa islandica. Gm. Naum. Nachtr. 9. Fig. 19. 20.

Hauptfarbe grau, jede Feder mit ſchwarzen und weißen Halbcirkeln eingefaßt, der Schwanz aſchgrau. Im Sommerkleid wird der ganze Hals und Unterleib lebhaft roſtroth; Schultern- und Rückenfedern ſchwarz, roſtroth und grauweiß gefleckt, der Schwanz aſchgrau. Niſtet im arktiſchen Kreiſe beyder Welten, man findet dieſen Vogel auf ſeinen Zügen in Deutſchland, Holland u. ſ. w.

Violetſchillernder Strandlaufer. Calid. maritima.

Tring. maritima. Tringa nigricans.

Aſchgrau, der Unterleib weiß gefleckt, die Bruſt ſchwärzlich, in die Quere geſtreift, die Deckfedern der Flügel dunkelgrau, weiß gerändert, der Rücken grau, ins Violete ſchimmernd. Der Augenliederrand weiß. Dieſer Vogel iſt an den Meeresküſten von Holland, und im nördlichen Frankreich zuweilen anzutreffen, ſehr ſelten in Deutſchland. Niſtet wahrſcheinlich im Norden.

Digitized by Google

Temminkiſcher Strandlaufer. Calid. Temminkii. Leisler.

Bécasseau temmia.

Der Schnabel unmerklich gegen die Spitze gekrümmt, kürzer als der Kopf, der Schwanz keilförmig. Der ganze Oberkörper braunſchwärzlich, heller geründelt. Kehle und Unterleib weiß, Kopf und Bruſt grauröthlich. Im hochzeitlichen Kleide ſind alle Rückenfedern in der Mitte ſchwarz, roſtfarb geründelt, Stirn, Vorderhals und Bruſt roſtfarbig, mit kleinen grauen Längsflecken. Unterleib reinweiß. Bewohnt den arktiſchen Kreis, auf ſeinen Wanderungen in Deutſchland, und vielleicht auch in andern europäiſchen Ländern. Größe eines Sperlings.

Kleiner Strandlaufer. Calid. minuta.

Tringa minuta Leisler. Naum. III. 21. F. 30. Bécasseau échasse.

Der Schnabel gerade, die Spitze etwas löffelförmig. Im Sommer Scheitel ſchwarz, gelbröthlich gefleckt. Rücken ſchwarzbraun, mit roſtrothen Federrändern, Schwanz hellgrau, Kehle, ein Fleck über den Augen, Bruſt und Unterleib weiß. Im Winter- und Jugendkleid, der Scheitel braun, roſtfarb gefleckt, Stirn, ein über die Augen laufender Streif, der ganze Unterkörper weiß, die Kropfgegend an den Seiten grau, roſtfarb überlaufen. Hinterhals hellgrau. Oberrücken ſchwarz, ſchön roſtroth eingefaßt, Schulterfedern ſchwarz, mit breiter, weißer Einfaſſung. An den Flüſſen in Deutſchland und in andern europäiſchen Gegenden auf dem Zuge. Niſtet wahrſcheinlich im Norden.

Digitized by Google

Meerlerchen. Pelidna. Cuv. Alouettes de mer.

Sind Strandlaufer mit etwas längerm Schnabel als der Kopf, die Füße haben weder Säume noch Verbindungshäute. Sie gleichen den Lerchen in Hinsicht auf Größe und Farbe. Leben in Truppen am Ufer des Meeres und wandern: mausern zweymal, geben eine schmackhafte Speise und brüten in Norden, wo sie ihre Eier in den Sand legen.

Bogenschnäblige Meerlerche. Pelidn. subarquata.

Numenius ferrugineus et subarquatus. Bécasseau cocorli. Temm. Naum. III. Taf. 20. F. 27. und Taf. 21. Fig. 28.

Der Schnabel bogenförmig, nach unten gekrümmt, viel länger als der Kopf. Im Herbstkleide oben lerchenfarb; Kopf und Hals grau, mit dunklern Längsflecken. Die Deckfedern der Flügel röthlichgrau, weißlich kantirt, Hals und Brust weiß, an den Seiten grau, mit dunklern Flecken. Unterleib weiß. Im Sommer Oberleib rostroth, schwarz und weiß gefleckt, Unterleib und Hals rostbraun, hin und wieder mit abgebrochenen, weißen Querbändern. Steiß weiß, Schwung- und Schwanzfedern grau. An den Ufern des Meeres und der Landseen, besonders in Holland, wo sie, doch selten, nistet. Auf ihren Zügen hin und wieder in Deutschland. Auch am Senegal und in Nordamerika.

Digitized by Google

Gemeine Meerlerche. Pelidn. variabilis.

Numenius et Tringa variabilis, Tringa Alpina. Brunette. Naum. III. Taf. 21. F. 29. Bécasseau variable. Tring. cinclus.

Kurzbeiniger als die vorige. Der Schnabel etwas unterwärts gebogen, an der Spitze etwas dicker. Der Oberleib schwärzlich, rostfarb und weiß gefleckt, Kehle und Unterleib weiß, Brust und Vorderhals grauröthlich, schwarz gefleckt. Im Sommerkleid wird die Brust schwarz, die Federn am Oberkörper kastanienbraun gerändert. Variirt ausserordentlich. In Sümpfen, auf dem Zuge häufig im mittlern Europa, nistet in Holland und an der Nord- und Ostsee, nährt sich von sehr kleinen Insekten *).

Senkvogel. Erenetes. Illig.

Schnabel mittelmäßig, dünne, weich, walzig, gerade. Ober- und Unterschnabel gleich lang, die Spitzen etwas löffelförmig, rauh. Nasenlöcher an der Wurzel in einer Seitenfurche, klein. Beine lang, schwach, mit doppelt verbundenen Zehen. Die Hinterzehe reicht auf die Erde.

---

*) Herr Brehm unterscheidet von diesem unter dem Namen Tringa pygmaea einen kleinern Vogel, mit kürzerem Schnabel, bedeutend kürzern Füßen, der aber dieselben Farbenveränderungen erleidet, aber fast um ein Drittheil kleiner ist. Seine Eier sind viel birnförmiger und kleiner. Er findet sich an denselben Orten, und scheint wirklich verschieden.

A. d. U.

Digitized by Google

Stein-Senkvogel. Erennetes petrificatus. Illig.

Kehle, Mitte des Halſes und der Bruſt weiß, über die Augen ein weißer, durch dieſelben ein brauner Streifen; Körper grau, mit ſchwärzlichen Binden. In Braſilien.

Kampfſtrandlaufer. Machetes. Cuv. (Combattans).

Sind wahre Strandlaufer, in Hinſicht auf Körperbau und Schnabel, aber die Verbindungshäute zwiſchen der mittlern und äußern Zehe, iſt wie bey den Sumpflaufern und Sandlaufern. Man kennt nur eine Art.

Kampfſtrandlaufer. Malchetes pugnax.

Tringa pugnax, le Combattant, paon de Mer. Naumann III. Taf. 13 bis 17. Fig. 13 bis 22.

Das Winterkleid bey Männchen und Weibchen iſt lerchenfarbig, der Unterleib weiß. Das Männchen bekommt zur Begattungszeit lange Nacken und Halsfedern, welche wie ein Kragen ſich aufrichten können, und variirt ſo in der Farbe, daß nicht zwey einander gleich ſind. Den Namen erhalten dieſe Vögel von den wüthenden Kämpfen, welche die Männchen im Frühjahr ſich liefern. Die Größe iſt ungefähr die der Mittelſchnepfe. Die Füße ſind immer gelblich, das Geſicht iſt zur Begattungszeit nackt, mit gelben oder röthlichten Fleiſchwärzchen beſetzt. Sie ſind im ganzen nördlichen Europa gemein, und beſuchen auf ihren Zügen das ganze mittlere Europa.

Digitized by Google

Sonderling. Arenaria. Bechst. Calidris. Illig.

Der Schnabel rundlich, gerade, dünne, vor der Spitze etwas breiter, von gleicher Länge mit dem Kopf. Die Naſenlöcher klein und länglich eirund, die Füße nur dreizehig, die Zehen geſpalten.

Grauer Sonderling. Arenar. calidris. Meyer.

Charudrius calidris et rubidus. Gm. Naum. Nachtr. XI. Fig. 25.

Vom Schnabel bis zu den Augen eine ſchwärzliche Linie, der Oberleib weißgrau, ſchwarzbraun gefleckt, Unterleib, Stirn und ein Streif über die Augen weiß. Im hochzeitlichen Kleide iſt Geſicht und Scheitel ſchwarz gefleckt, jede Feder roſtfarb eingefaßt, Hals, Bruſt und Seiten röthlichgrau, mit ſchwarzen Flecken, der Rücken roſtfarb, mit ſchwarzen Flecken. Größe einer Lerche. Längs den Meeresküſten, im Frühjahr und Herbſt, beſonders in Holland und England, ſelten an den Flüſſen und Seen Deutſchlands. Niſtet innert dem arktiſchen Kreiſe. Lebt von Inſekten.

Waſſertretter. Phalaropus. (Crymophilus. Vieill.).

Schnabel breit, breiter als bey den Strandlaufern, niedergedrückt, an der Wurzel platt, ſonſt hat er daſſelbe Verhältniß, und dieſelben Furchen, wie bey den Strandlaufern; die Zehen ſind mit breiten Häuten, wie bey den Waſſerhühnern belappt. Mauſern zweimal.

Breit-

Breitschnäbliger Wassertretter. Phalarop. platyrhynchos. Temm.

Tringa fulicaria et hyperborea et glacialis. Gmel. Phalarop. rufus. Bechst Edw. 142. Tringa lobata.

Der Schwanz abgerundet. Oberleib im Winter grau, Stirn, Vorderhals und ganzer Unterleib weiß, Nacken, Flügel und Schwanz schwärzlich. Im Sommer werden die obern Theile statt grau braunschwärzlich, mit breiten, rostfarben Rändern; Unterleib rothgelb. Hin und wieder auf dem Zuge im mittlern Europa, häufig in Sibirien, an den Ufern des Eismeers, am Caspischen Meer. Nistet innert dem arktischen Kreise *). Nahrung Wasserinsekten.

Lappenfuß. Lobipes. Cuv.

Die Füße wie bey der vorigen Gattung, aber der Schnabel dünn, zusammengedrückt, nicht breit, vorn spitzig, von der Länge des Kopfs, die Spitzen etwas gegen einander gebogen.

---

*) Der graue Wassertreter und der rothe, welche Cuvier als zwey verschiedene Arten anführt, sind sichee nur nach der Jahrszeit verschieden, dagegen hat Cuvier Recht, die beyden Temminklischen Wassertretter in zwey Gattungen zu bringen, da der Schnabelbau sehr verschieden ist, doch ist es besser, sie nach einander zu ordnen. A. d. U.

Langhalsiger Lappenfuß. Lobipes hyperboreus.

Tringa hyperborea et fusca. Naum. Nachtr. XI. Fig. 24.

Nacken, ein Strich hinter dem Auge, Hinterhals und Rücken dunkelgrau, auf letzterm die Federn roſtgelb gerändert, Flügel und Schwanz ſchwärzlich, ganzer Unterleib reinweiß, im Sommer werden die Seitentheile des Halſes lebhaft roſtfarb, über die Flügel ein weißer Streif. Selten in Deutſchland und dem mittlern Europa. Häufig in Schottland, auf den Orkaden und Hebriden, und in Lappland.

Steindreher. Strepsilas. Illig. Tourne pierres.

Der Schnabel mittelmäßig, dünn, gerade, kegelförmig zugeſpitzt, oben mit platter Firſte. Die Naſenlöcher an der Seite, in einer kurzen Rinne, oben mit einer Haut halb bedeckt, durchgehend. Die Zunge kurz. Die Beine niedrig, die Zehen ohne Verbindungshaut, die Hinterzehe berührt kaum den Boden. Der Schnabel iſt etwas ſtärker als bey den Waſſertrettern, und erlaubt ihnen kleine Steine umzukehren, um darunter Würmer zu ſuchen, von denen ſie ſich nähren.

Halsband-Steindreher. Streps. collaris.

Tringa interpres. Coulond-chaud. Naum. Nachtr. VIII. F. 18.

Oberleib ſchwarz und roſtfarb bunt, Deckfedern der Flügel roſtfarb, ein Band im Nacken, und ein breites

Digitized by Google

Band am Unterhals schwarz, Flügel schwarz, Schwanz weiß, mit einer breiten, schwarzen Binde, Unterleib weiß. An den Ufern des Meers, der Seen und Flüsse des nördlichen Europa, selten im mittlern Europa und in Italien. Nistet im Norden. Soll sich auch in Nord- und Südamerika finden.

Wasserlaufer. Totanus. Chevaliers.

Schnabel mehr oder weniger lang, gerade, schwach aufwärts gekrümmt, hart, schneidend, der ganzen Länge nach zusammengedrückt, zugespitzt; beyde Kinnladen an der Wurzel gefurcht; das Ende der Oberkinnlade leicht auf die untere gekrümmt. Die Nasenlöcher seitlich, in der Rinne. Die Füße lang, dünne, über dem Knie nackt, die Füße vierzehig, die mittlere Zehe mit der äußern durch eine Haut verbunden. Die Flügel mittelmäßig.

Diese Vögel wandern in kleinen Schaaren, leben an den Ufern des Meeres, der Flüsse und Seen, nähren sich von Insekten, Würmern, kleinen Schalthieren, selten von kleinen Fischen. Mausern zweimal.

Brauner Wasserlaufer. Totan. fuscus. Leisler.

Chevalier Arlequin ou noir. Tot. natans et maculatus. Bechst. Scolopax cantabrigiensis et curonicus. Gmel. Naum. III. 8. F. 8. Nachtr. XXXVII. F. 74.

Hauptfarbe braun, weißlich gesäumt und gefleckt. Der alte Vogel fast schwarz, mit weißlichen Querstreifen. Beine und Schnabel dunkelbraun. An Meeresufern, Flüssen und Seen, nistet im arktischen Kreise, findet sich auch in Nordamerika.

Digitized by Google

Rothfüßiger Wasserlaufer. Tot. calidris. Bechst.

Cheval. Gambette. Tringa striata et Gambetta. Naum. III. 9. F. 9.

Füße und Unterschnabel roth. Hauptfarbe graulich olivenfarb, schwärzlich in die Quere gefleckt, Kehle, Hals und Brust weiß, schwarz gefleckt, Unterleib weiß. Steiß und untere Deckfedern der Flügel weiß, Schwungfedern schwarzgrau, Schwanz weiß, schwarz gebändert. Im ganzen mittlern Europa häufig auf sumpfigen Wiesen, an Flüssen und Seen; nistet auch da, findet sich aber auch sehr nördlich.

Teich-Wasserlaufer. Tot. stagnatilis. Bechst.

Naum. III. Taf. 18. F. 23.

Hauptfarbe grau, schwarz gefleckt. Steiß und Schwanz weiß, letzterer schwarz, zikzakartig gebändert. Ein Strich über den Augen, Backen und ganzer Unterleib weiß, Mittelhals schwarz gefleckt. Schnabel und Füße schwarz, sehr dünne und schwach. Im Norden von Europa an Meeren und Flüssen, selten im mittlern Europa.

Punktirter Wasserlaufer. Totan. Ochropus. Temm.

Chevalier Cul blanc. Tring. ochropus et litorea. Naum. III. 19. F. 24.

Hauptfarbe dunkelbraun, mit olivengrünem Schimmer, und weißen und schwärzlichen Punkten, Bürzel und

Digitized by Google

Schwanz weiß, letzterer mit drey schwarzen Bändern. Unterleib weiß, Brust dunkler gefleckt, Füße grünlich. An den Ufern süßer Wasser, nistet in Mitteleuropa.

Wald-Wasserlaufer. Totan. glareola. Temm.

Chevalier sylvain. Tring. glareola. Naum. III. 19. Fig. 25.

Füße grüngelb, Augenkreis weiß; Hauptfarbe dunkelbraun, mit vielen weißlichen und hellrostfarben, rundlichen Flecken, der ganze Unterleib weiß, Unterhals mit braunen Strichen und Flecken. Ein Drittheil kleiner als der vorige. Auf dem Zuge in einigen Ländern des mittlern Europa, nistet innert dem arktischen Kreise.

Gefleckter Wasserlaufer. Tot. macularia. Temm.

Chevalier perlé. Naum. Nachtr. XXXVIII. F. 76.

Oberleib olivenbraun, mit schwarzen Längs- und Querlinien, Unterleib weiß, mit runden, braunen Flecken. Zufällig auf den Wanderungen am baltischen Meer, und einigen Gegenden Deutschlands, niemals in Holland. Fortpflanzung unbekannt.

Trillernder Wasserlaufer. Totan. hypoleucos. Temm.

Chevalier guignette. Tringa cinclus et hypoleucos. Naum. III. 20. F. 26.

Der ganze Oberleib olivenfarb, zikzakartig, in die Quere schwarz gestreift, Unterleib weiß, Hals und Brust

Digitized by Google

braun gestrichelt. In ganz Europa an Seen und Flüssen, selten am Meer, nistet in Mitteleuropa und im Norden.

Grünfüßiger Wasserlaufer. Tot. glottis. Bechst.

Cheval. aboyeur. Tot. fistulans, griseus et chloropus. Naum. III. 7. F. 7.

Der Schnabel stark, sehr zusammengedrückt, etwas aufwärts gebogen, an der Spitze beyde Kinnladen gerade; an der Wurzel höher als breit. Hals und Unterleib weiß, an Hals und Brust schwärzlich gefleckt und gestreift; Rücken und Deckfedern der Flügel braunschwärzlich, weißlich kantirt, Hinterrücken weiß, Schwanz weiß, schwarz gebändert. Füße und Schnabel grünlich. An sumpfigen und steinigen Fluß- und Meeresufern, auch in Deutschland, nährt sich von kleinen Fischen, Fischrogen und Schalthieren. Nistet innert dem arktischen Kreise.

Schwimmfüßiger Wasserlaufer. Totan. semipalmatus. Temm.

Schnabel dick, sehr stark; auf dem Flügel ein weißer Spiegel; die Füße mit halben Schwimmfüßen. Der Körper oben hellbraun, am Schafte der Federn dunkler; Vorderhals und Brust grau, mit kleinen, braunen Streifen; Kehle und Unterleib reinweiß; Deckfedern der Flügel dunkel graubraun; Bürzel weiß, die beyden mittlern Schwanzfedern braun, die übrigen weiß, mit braunen Zickzackflecken. Füße bleifarben. Im nördlichen Europa, viel

Digitized by Google

häufiger in Nordamerika, wo noch eine andere ähnliche, größere Art lebt. (Encyclop. method. pl. 71. F. 1.).

Langschwänziger Wasserlaufer. Tot. macrourus. Naum.

Tot. Bartramia. Wils. Tring. macroura. Naum. Nachtr. 38 Fig 75 Männchen.

Größe der Wachholderdrossel, der Körper schlank, der Schwanz lang und keilförmig zugespitzt. Der Schnabel so lange als der Kopf, an der Wurzel breit und dick; Zügel, Strich über die Augen und Wangen rostgelblich weiß; Kehle, Brust und Unterleib weiß; Seiten gelblich und wie der Hinterhals schwarz gefleckt. Der Oberleib dunkelbraun, die Federn weißgelb gerändert. Die langen Schwanzfedern rostgelb, mit dunkelbraunen Querbändern. In Nordamerika, ward in Holland und Deutschland geschossen.

Strandreuter. Himantopus. (Échasses).

Macrotarsus. Lacep.

Der Schnabel lang, rund, dünn und spitzig, noch mehr als bey den Wasserlaufern; die Nasenrinnen laufen nur über die Hälfte des Schnabels. Die Nasenlöcher schmal. Die Beine ausserordentlich lang und dünne, so, daß sie biegsam sind, und den Gang beschwerlich machen.

Digitized by Google

Schwarzflüglichter Strandreuter. Himant. atropterus.

Échasse à manteau noir. Charadrius himantopus. Linn. Naum. III. 12. F. 12.

Schnabel schwarz, Füße roth; Nacken, Rücken und Flügel schwarz, alles Uebrige weiß. Das Schwarze bey Jungen schwarzgrau. Man findet diesen Vogel, wiewohl selten, in ganz Europa, an den Ufern des Meeres und der Seen; häufig *) in Asien am Meer und Seen; er lebt von Wasserinsekten.

Säbelschnabel. Recurvirostra. (Avocettes).

Der Schnabel flach zusammengedrückt, pfriemenförmig, nach vorn zu stark aufwärts gekrümmt, sehr spitzig, mit biegsamer Spitze. Die Nasenlöcher schmal und durchsichtig. Die Zunge kurz. Die Füße lang, die Hinterzehe kurz und hochstehend, die Zehen mit Schwimmhäuten verbunden, so, daß man diese Vögel wohl den Wasservögeln beyzählen könnte, wenn ihre langen Füße und ihre Lebensart sie nicht den schnepfenartigen Sumpfvögeln beyzählen würde. Sie nähren sich von Aßeln und kleinen Krebsen, und von Insekten, kleinen Schalthieren und Würmern.

---

*) Dahin gehört: Recurvirostra himantopus. Wils. pl. 58. — H. malanurus aus Südamerika. — H. nigricollis aus Nordamerika. — H. Leucurus aus Mexiko.

Digitized by Google

Blaufüßiger Säbelschnäbler. Recurvir. Avocetta. Linn.

Schön weiß, Stirn, Scheitel, Hinterhals, eine Querbinde über die Flügel, ein Streif auf dem Rücken, die vordern Schwungfedern schwarz. In ganz Deutschland und Mitteleuropa selten. Sehr häufig in Holland und in Norden, auf nassen, oder vom Meer überschwemmten Wiesen *).

Die Familien der Langzeher. Macrodactyli.

Die Zeben der Füße sind sehr lang, wodurch die Vögel dieser Ordnung vorzüglich geschickt werden, auf Sumpfgräsern zu laufen und selbst zu schwimmen, besonders diejenigen Arten, welche gesaumte Füße haben. Sie haben indeß keine Verbindungshaut zwischen den Zehen, nicht einmal zwischen den äußern. Der Schnabel ist mehr oder minder von der Seite zusammengedrückt, und bald länger, bald kürzer, doch immer stärker, als bey den meisten Vögeln der vorigen Familie. Der Körper dieser Vögel ist auch sehr platt auf den Seiten, welches von der Schmalheit des Brustbeins herrührt; die Flügel sind mittelmäßig lang oder kurz, daher der Flug ungeschickt. Die Hinterzehe ist ziemlich lang.

---

*) Recurvirost. Americana mit isabellfarbem Kopf. — Rec. Orientalis. Cuv. ganz weiß, mit schwarzen Flügeln und rothen Füßen, findet sich an den Indischen Meeren. — Rec. rubricollis aus Australien.

Man kann sie in zwey Abtheilungen bringen, je nachdem ihre Flügel bewaffnet sind oder nicht.

Spornflügel. Parra. (Jacanas) Linn.

Klauenspreizer. Illig.

Der Schnabel von mittelmäßiger Länge, etwas dick, gerade, zusammengedrückt, an der Spitze etwas aufgeblasen, zu beyden Seiten mit einer breiten Rinne, an der Wurzel mit einer Wachshaut, welche bey einigen Lappen bildet. Die Nasenlöcher liegen in der Rinne, und durchdringen die sie bedeckende Wachshaut. Die Flügel haben einen starken Sporn. Die Füße haben vier sehr lange Zehen, welche bis an die Wurzel getrennt sind, auch die Nägel sind sehr lang und spitzig, die Franzosen nennen sie daher Chirurgen.

Es sind zänkische und viel schreiende Vögel, welche in den Sümpfen heißer Länder leben, und mit Leichtigkeit und Schnelligkeit, mit ihren langen Zehen über die Wassergräser laufen.

Die amerikanischen Arten haben an der Schnabelwurzel jene wachshautähnliche Membran, welche einen Theil der Stirne bedeckt.

Der gemeine Spornflügel. Parr. jacana. Linn.

Enl. 322.

Schwarz, auf dem Rücken rothbraun, die ersten Schwungfedern grün, unter dem Schnabel Fleischlappen.

Digitized by Google

Er iſt ſehr gemein in ganz Südamerika, er hat ſehr ſcharfe Spornen *).

Metallglänzender Spornflügel. Parr. aenea.

Hahn, Vögel aus Amerika u. ſ. w.

Schwarz, blau und violet ſchimmernd, auf dem Rücken grün bronzirt, Bürzel und Schwanz blutroth, die erſten Schwungfedern grün; hinter dem Auge ein weißer Fleck. Die Spornen klein und ſtumpf.

Man hat eine Art in Oſtindien entdeckt, welcher die Wachshaut mangelt, und ſich überdies durch beſondere Verhältniße in den Federn auszeichnet.

Langſchwänziger Spornflügel. Parr. chinensis.

Encyclop. méth. ornith. pl. 61. F. 1.

Braun, der Kopf, Vorderhals und Deckfedern der Flügel weiß, der Hinterhals mit ſeidenartigen, goldgelben Federn. An der Spitze einiger Flügelfedern ſind kleine geſtielte Anhängſel, vier ſolche, an den Federn des langen, ſchwarzen, den Körper an Länge, übertreffenden Schwanzes. Sonnerats Chirurgus von Lüzon (Parr. Luzoniensis) iſt der junge Vogel, der auſſer der Verſchiedenheit des Gefieders, noch keinen ſo langen Schwanz hat.

---

*) Parra variabilis. enl. 846. iſt der junge Vogel. — Parra brasiliensis et nigra, exiſtiren nur auf das etwas ungewiße Zeugniß des Marcgrav. — Parra viridis ebenfalls. — Parra africana. Lath. ſcheint nicht verſchieden von variabilis.

Kamischi. Palamedea. Linn.

Die Gestalt fast wie bey den Spornflügeln, aber viel größer, an jedem Flügel haben sie zwey starke Sporen; die Zehen sind lang, gespalten, mit langen, starken Nägeln, vorzüglich an der Hinterzehe ist der Nagel lang und gerade, wie bey den Lerchen. Die Schnabelöffnung ist nicht weit, der Schnabel wenig zusammengedrückt, nicht aufgeblasen, der Oberschnabel leicht gebogen. Die Beine netzförmig geschuppt.

Der gehörnte Kamischi. Palamed. cornuta.

In Brasilien Anhima, in Cayenne Camuche. Enl. 454.

Größer als eine Gans, schwärzlich, an den Schultern rosirothe Flecken; auf dem Scheitel steht eine sonderbare Zierde, bestehend in einem langen, dünnen, beweglichen Federkeil. Dieser Vogel lebt in überschwemmten Gegenden von Südamerika, und seine starke Stimme schallt weit. Er lebt paarweise, und beyde Gatten sind sehr treu. Seine Nahrung besteht in Gras und Saamen von Wasserpflanzen, ob schon der Magen wenig muskulos ist, und es ist falsch, daß er sich von Reptilien nähre.

Chaia. Chauna. Illig. Opistolophus. Vieill.

Parra chavaria. Linn.

Schnabel kürzer als der Kopf, dick, fast kegelförmig, die Oberkinnlade gewölbt, gebogen. Die Nasenlöcher offen, ablang, durchgehend. Der Kopf dicht mit Flaum

besetzt, die Zügel ohne Federn, am Nacken ein Federbusch; die Flügel mit zwey Spornen. Die Füße lang und stark, vierzehig, die Zehen lang.

Der Chaia aus Paraguai. Chaun. chavaria.

Parra chavaria. Linn. Chaïa du Paraguai. Az.

Nahe verwandt mit dem Kamischi; ohne Horn auf dem Scheitel; dagegen am Hinterhaupt ein Kreis von aufgerichteten Federn, Kopf und Oberhals mit Flaum besetzt. Das Gefieder ist schwärzlich. Er nährt sich von Wasserkräutern; die Indianer von Charthagena haben gewöhnlich einige unter ihren Hühnern und Gänsen gezähmt, da sie sehr kühn seyn sollen, und im Stande seyen, sogar die Raubvögel abzutreiben. Eine sonderbare Eigenschaft dieses Vogels ist es, daß seine Haut, selbst an den Schenkeln von Luft aufgeblasen ist, welche zwischen ihr und den Muskeln sich findet, so, daß sie beym Berühren ein Geräusch macht. Nach Illiger, der aber den Vogel nicht gesehen hat, soll er zwischen den Zehen Verbindungshäute haben, daher er ihn von der Gattung des Kamischi trennt.

Diejenigen Arten dieser Familie, welche keine Spornen an den Flügeln haben, begreift Linneus unter den Gattungen Wasserhuhn und Ralle, die erste Gattung hat an der Schnabelwurzel eine Art von Schild, welcher über die Stirne hingeht, bey den andern hingegen findet dies nicht statt. Allein die neuern Systematiker haben diese beyden Gattungen wieder in mehrere getheilt.

Digitized by Google

Die Rallen. Rallus. Linn. (Râles).

Schnabel mittelmäßig lang, länger als der Kopf, gerade, pfriemförmig zugespitzt, an den Seiten zusammengedrückt, an der Spitze etwas übergebogen. Die Nasenlöcher schmal und länglich. Die Zunge an der Spitze runzlich und rauh. Die Zehen ziemlich lang, ganz gespalten, die Hinterzehe kurz, kaum den Boden berührend.

Wasserralle. Rallus aquaticus.

Naum. IIIXXX. Fig. 41.

Schnabel roth, die Füße fleischfarben; der Oberleib schwarz und olivenbraun gefleckt; der Unterleib aschgraublau, die Seiten schwarz, mit weißen Querstrichen. Dieser Vogel ist im ganzen mittlern Europa häufig auf nassen Wiesen, an flachen Bachufern und Teichen. Sie wandern im Winter nicht alle weg; nähren sich von Insekten und kleinen Schneckchen, auch grünen Wasserpflanzen. Sie laufen sehr schnell und mit ausgespannten Flügeln über die Wasserpflanzen weg, schwimmen sogar, fliegen aber schlecht und ungern. Das Fleisch schmeckt sumpfig *).

Schnarrer. Crex. Bechst. Gallinula. Temm.

Der Schnabel kürzer als der Kopf, an den Seiten zusammengedrückt, der Oberschnabel vorn etwas gekrümmt,

---

*) Dahin gehören: R. Virginianus. Edw. 279. — Longirostris. enl. 849. — Variegatus. enl. 775. — Philippensis. enl. 774. — Torquatus. — Carolinus. Edw. 144. — Fulica. cayennensis. enl. 352. — Rallus fuscus. enl. 773., welche aber schon einen kürzern Schnabel hat. — Australis. — Capensis.

Digitized by Google

der Unterſchnabel vor der Spitze etwas erhöht. Die Naſenlöcher lanzetförmig, in einer Vertiefung liegend. Die Zehen mittelmäßig lang und ganz getrennt; der Leib zuſammengedrückt.

Wieſenſchnarrer. Crex. pratensis. Bechst.

Naum. II. V. Fig. 5. Gallinula Crex. Temm.

Oberleib roſtfarb, mit ſchwarzbraunen Längsflecken. Deckfedern der Flügel, Schwung- und Schwanzfedern roſtroth; Kehle weißlich, Bruſt rothgrau, Unterleib ſchmutzig weiß, an den Seiten roſtfarb geſtreift. In naſſen Wieſen, und im Sommergetreide. Nahrung Inſekten und Kräuter.

Rohrhuhn. Gallinula.

Schnabel kurz, an den Seiten zuſammengedrückt, am Grunde des Oberſchnabels bey einigen ein in die Stirn hineingehender, hautiger Fortſatz, die obere Kinnlade abſchüßig zugeſpitzt. Die Naſenlöcher länglich eirund in einer Furche liegend. Die Füße an den Seiten etwas platt, mit langen, ganz getrennten Zehen, die bey einigen einen ſchmalhautigen Rand haben. Der Körper ſehr zuſammengedrückt. Flügel und Schwanz kurz.

Punktirtes Rohrhuhn. Gall. Porzana.

Naum. III. T. 31. F. 42.

Oberſchnabel gelbgrün, an der Wurzel roth. Unterſchnabel gelb. Scheitel und Kehle aſchgrau; Ober- und Unterrücken braun, weiß gefleckt. An Flüſſen, Seen, Tei-

Digitized by Google

chen, Brüchen. Macht aus Binsen ein unkünstliches Nest auf Schilf auf Grashügelchen. Lebt von Insekten und Schnecken, auch von Sämereien *).

Kleines Rohrhuhn. Gall. pusilla.

Naumann III. Taf. 31. F. 43. A. 6.

Wangen, Hals und Brust graublau, der Oberleib rostbraun, einzeln schwarz und gefleckt; die untern Schwanzdeckfedern schwarz, mit weißen Querbinden. An Seen und Teichen im Rohr. Nahrung Insekten, Schneckchen, Sämereien.

Rohrhühner, bey welchen die Schnabelwurzel einen Schild auf der Stirne bildet, die Füße mit einem schmalen Saum **).

Naumannisches Rohrhuhn. Gallinul. Naumanni.

Gall. Bailonii. Temm.

Die Flügel reichen bis zum Ende des Schwanzes; Schnabel und Füße schön hellgrün. Kehle, Halsseiten, Brust und Bauch graublau, ohne Flecken, Oberleib grau-

lich

*) Cuvier sagt von ihm, es tauche und schwimme sehr gut, allein hier irrt er sich gewiß, dies gilt einzig vom grünfüßigen Rohrhuhn.

**) Dahin gehören: Rallus phoenicurus. enl. 896. — Cayennensis. enl. 753. und 368. — minutus. — enl. 847. — Jamaicensis. Edw. 278. — Gallinula flavirostris. — Martinica und viele neue.

Digitized by Google

lich olivenfarb, jede Feder in der Mitte schwarz; auf der Mitte des Rückens ein großer, schwarzer Fleck, mit wenigen weißen Streifen; Unterleib und Seiten mit undeutlichen, weißen Querstreifen. Das Weibchen ist an Backen, und um die Augen hellgrau; Kehle weißlich, Hals, Brust und Bauch grauröthlich. Ziemlich gemein in Deutschland und Italien.

Grünfüßiges Rohrhuhn. Gall. chloropus. Poule d'eau.

Naum. III. 29. F. 38. 39.

Oben dunkelolivenbraun, unten dunkelgraublau, an den Seiten des Unterleibes weiß gestreift. Schnabelwurzel zur Begattungszeit schön roth, Schnabelspitze gelb. Füße grün, Kniebänder roth und gelb. Die Jungen sind olivenfarb. An Seen und Teichen, im dichten Rohr, schwimmen und tauchen gut. Findet sich auch in Südamerika.

Sultanshühner. Porphyrio. Briss. (Talèves et Poules sultanes).

Der Schnabel ist verhältnißmäßig zu seiner Länge höher; die Zehen sehr lang, ohne deutlichen Saum, der Schild auf der Stirne stark, bald abgerundet, bald viereckig erhöhet. Sie stehen auf einem Fuß, und bringen die Nahrungsmittel mit dem andern zum Schnabel. Die Farben der Federn sind schöne Schattirungen von violet, blau oder meergrün.

Gemeines Sultanshuhn. Porph. violaceus.

Enl. 810. Porph. hyacinthinus. Temm.

Mit rothem Schnabel, der Körper schön blauviolet, der Rücken indigblau. Ist auf mehreren Inseln des mittelländischen Meeres Hausthier geworden, und würde eine schöne Zierde der Hühnerhöfe werden *). In Sicilien und Calabrien häufig, seltener in Dalmatien und Ungarn auf Seen.

Wasserhühner. Fulica. Linn. (Foulques ou Morelles).

Sie haben einen kurzen, dicken, messerförmigen Schnabel, die Nasenlöcher liegen in einer Rinne. Der Stirnschild ist stark, die Füße haben lange Zehen, mit einer ausgeschweiften Seitenhaut; es sind sehr gute Schwimmer; sie leben daher in Sümpfen und Teichen. Ihr dichtes Gefieder und ihre ganze Bildung eignet sie zu ihrer Lebensart, und sie machen eine schickliche Verbindung zwischen Sumpf- und Schwimmvögeln.

Schwarzes Wasserhuhn. Ful. atra.

Naum. III. 30. F. 40. Ful. aterrima et aethiops.

Schwärzlich graublau, der Stirnschild weiß. Ist fast über die ganze Erde verbreitet, auf Seen und Teichen und in Sümpfen **).

---

*) Fulica martinicensis et flavirostris gehören zu Fulica, dagegen gehören zu Porphyrio. Porph. smaragnotus. Temm. aus Afrika. — Proph. melanotus. Temm. aus Neuholland.

**) Ful. leucoptera — armillata aus Südamerika.

Digitized by Google

Saumfuß. Podoa. Illig. Heliornis. Vieillot.

Der Schnabel mittelmäßig, dick, messerförmig, die Firste abschüßig. Die Nasenlöcher in einer breiten Rinne. Die Füße Wadfüße, kurz, stark, vierzehig, mit langen gelappten Zehen, die Hinterzehe so lang als das erste Gelenk der Mittelzehe. Schnabel und Füße nähern diesen Vogel den Wasserhühnern, allein die Kürze der Füße, und der lange Schwanz zeigen noch deutlicher den Uebergang von den Sumpf- zu den Wasservögeln, als bey den Wasserhühnern. Linne setzte ihn unter die Anhingas, er macht einen schicklichen Uebergang zu den Steißfüßen.

Der Sonnenvogel. Podoa. surinamensis. Illig.

Le Grebifoulque de Cayenne. Enl. 893.

Oben braun, unten weiß, Scheitel und Hinterhals schwarz, Kehle und ein Streif über die Augen weiß, der Unterschnabel aus zwey langen Laden bestehend, an welchen eine nackte, ausdehnbare Sackhaut sitzt. Größe einer Kriechente. Frißt Fische und Insekten. Lebt in Surinam, man kann ihn zähmen *).

Diese Ordnung der Sumpfvögel schließt sich durch einige Gattungen, welche sehr schwer mit den anderen zu ordnen sind, und wovon jede für sich eine Familie bildet.

Scheidenvogel. Chionis. Illig. Vaginalis. Lath.

Schnabel kürzer als der Kopf, stark, fast konisch, die Schnabelwurzel und ein Theil der Nasenlöcher mit einer

*) Heliorn. Senegalensis. Vieill. ist die zweite Art.

hörnenen, vorn beweglichen Scheide bedeckt, welche zu beyden Seiten ausgeschnitten ist. Die Nasenlöcher zum Theil von der Scheide bedeckt, eiförmig, schief, durchgehend. Das Gesicht nackt und warzig. Die Flügel mit einer knorrigen Vorragung. Die Füße stark, kurz, mit kurzer Hinterzehe, die Vorderzehen mit einer kurzen Haut verbunden.

Weißer Scheidenvogel. Chion. alba.

Weiß, Füße röthlich oder bräunlich. Die Wangen mit gelblichen Warzen. Lebt heerdenweise an der Küste von Neuseeland, frißt Fische, Schalthiere und Aas. Größe einer Taube. Lath. Synops. übersetzt von Bechstein, pl. 93.

Kappenvogel. Cereopsis. Illig.

Der Schnabel kurz, dick, gewölbt, übergebogen. Die Nasenlöcher an der Wurzel. Der ganze Kopf mit einer rauhen Haut überzogen, welche die Schnabelwurzel und die Nasenlöcher bedeckt. Die Flügel mittelmäßig, knorrig. Die Füße vierzehig, mittelmäßig lang, die Zehen mit einer kurzen Schwimmhaut verbunden, die Hinterzehe dünn und hochstehend.

Neuholländischer Kappenvogel. Cereop. Novae. Hollandiae.

Graubraun, unten bräunlichweiß, Schnabel schwarz, Füße gelbroth. Größe einer kleinen Gans. In Neuholland.

Digitized by Google

Giarol. Glareola.

Schnabel kurz, dick, die Mundöffnung weit, der Oberschnabel mit erhabenem, an der Spitze übergebogenem Rücken, faſt wie bey den Hühnern. Die Naſenlöcher an der Wurzel, ſchief ſtehend. Die Flügel ſehr lang und ſpitzig und der Schwanz gegabelt, wie bey den Schwalben oder Meerſchwalben. Die Füße mittelmäßig, die Läufe geſchildert, die äußern Zehen mit einer ſehr kurzen Schwimmhaut verbunden, die Hinterzehe berührt den Boden. Sie fliegen in Truppen und mit Geſchrei an den Ufern der Flüſſe und Seen. Leben von Waſſerinſekten und Würmern.

Halsband-Giarol. Glareol. torquata. Meyer.

Glareola austriaca et naevia. Naum. Nachtr. XXIX. F. 58. 59.

Braun oben, Kehle weiß, ſchwarz eingefaßt, Unterleib weiß, Bruſt rothgrau, Schnabel ſchwarz, an der Wurzel roth, Augenlieder roth. Größe einer Amſel. Im ſüdlichen Deutſchland, Oeſtreich, Italien, der Schweiz, und am Caſpiſchen Meere *).

Flamingo. Phoenicopterus. (Flammant).

Eine der Gattungen, deren Bildung ſehr abweichend iſt. Der Schnabel iſt länger als der Kopf, dick, höher als

*) Dahin gehören nur zwey ausländiſche Arten: Glareol. grallaria. Temm. und Glareol. lactea. Temm.

Digitized by Google

breit. Der Unterschnabel eiförmig verlängert und in einen halb cylindrischen Kanal sich endigend, viel größer als der Oberschnabel, welcher ablang und platt ist, und auf dem untern, wie der Deckel auf einer Büchse aufliegt. Die hautige Rinne für die Nasenlöcher, nehmen einen großen Theil der Seiten des Oberschnabels ein, und gehen bis zum Buge, welchen der Schnabeldeckel in die Quere macht, um den untern Theil fester zu schließen; die Nasenlöcher bilden eine durchgehende Längsspalte. Die Ränder des Oberschnabels sind in die Quere gezähnelt; dieses und die sehr dicke Zunge, giebt dem Schnabel auch eine entfernte Aehnlichkeit mit einem Entenschnabel. Die Füße sind außerordentlich lang und dünne, vierzehig, die vordern Zehen mit einer vollständigen Schwimmhaut verbunden, die hintere Zehe sehr kurz. Der Hals sehr dünne und lang, viel dünner als der Kopf. Ohne diese außerordentliche Länge der Beine, könnte man die Flammants unter die Schwimmvögel zählen. Sie leben von Weichthieren, Insekten, Fischrogen, welche sie mit ihrem langen Halse auffischen. Wenn sie fressen wollen, so stellen sie den Rücken des Schnabels auf den Boden, um die Brute mit dem Oberschnabel desto besser fassen zu können. Sie machen ihr Nest in tiefen Sümpfen, auf Hügelchen, und bauen es hoch aus Gras zu einem Kegel auf, in dessen Spitze eine Vertiefung für die Eier befindlich ist, und setzen sich nun so mit dem Leib darauf, daß die Beine zu beyden Seiten herabhängen, so, daß sie eigentlich auf den Eiern reiten.

Digitized by Google

Rother Flammant. Phoenicopt. ruber.

Enl. 68.

Scheint über die ganze Erde, jenseits des 45. Grades verbreitet zu seyn; er ist drei bis vier Fuß hoch, im ersten Jahre weiß; im zweiten weiß, mit rosenrothen Flügeln, im dritten wird er brennend roth. Die Schwungfedern schwarz; der Schnabel gelb, an der Spitze schwarz, die Füße rothbraun.

Die Flammants leben in zahlreichen Schaaren an den Meeresküsten des Mittelmeeres, und verfliegen sich sogar nach der Schweiz und nach Deutschland *).

Sechste Ordnung.

Vögel mit Schwimmfüßen. Palmipedes.

Die Füße sind zum Schwimmen eingerichtet, und stehen daher hinten am Körper: Die Läufe sind kurz und zusammengedrückt, und entweder drey oder alle vier Zehen sind durch Schwimmhäute verbunden. Ihr Gefieder ist dicht anliegend, glänzend, und mit einem öhlichten Saft überzogen; die Haut dicht mit Flaum besetzt, so, daß sie nicht naß werden, und vor der Kälte des Wassers, worin sie leben, hinlänglich geschützt sind. Es sind die einzigen Vögel, deren Hals die Länge der Füße zuweilen um sehr

*) Einige halten den amerikanischen Flamingo, da er kleiner ist, für eine eigene Art? Sicher ist dagegen Phoenicopt. parvus aus Indien, eine eigene Art.

Digitized by Google

viel übertrift, dadurch sind sie im Stande schwimmend, oft in bedeutender Tiefe ihre Nahrung zu suchen. Das Brustbein ist sehr lang, und schützt den größten Theil der Eingeweide: es hat auf beyden Seiten nur eine Ausschweifung oder ein eiförmiges, mit einer Haut bedecktes Loch. Der Magen ist im Allgemeinen muskulös, die Blinddärme lang; der untere Luftröhrenkopf einfach, aber bey einer Familie mit knochichten oder knorplichten, kapselförmigen Auftreibungen versehen.

Man kann diese Ordnungen in vier Familien abtheilen.

Die erste Familie begreift

Die Taucher oder Kurzflügler. Brachypteri. Cuv. Pygopodes Illig.

Auf der einen Seite haben sie einige Aehnlichkeit mit den Wasserhühnern; allein die Füße stehen so weit hinten am Körper, daß sie nur mit Mühe und mit ganz aufgerichtetem Körper gehen können. Die meisten von ihnen sind schlechte Flieger, ja einige können der Kürze ihrer Flügel wegen gar nicht fliegen, daher sind sie als wahre Wasservögel zu betrachten, so wie die Strauße Erdvögel, die Schwalben Luftvögel genannt, werden können. Ihr Gefieder ist sehr dicht anliegend, bey einigen sehr glatt und silberglänzend. Sie tauchen unter, indem sie mit den Füßen das Wasser aufwärtsstoßen, und mit ihrem keilförmigen Körper leicht durchdringen, die Flügel aber brauchen sie dann als wahre Floßen. Der Magen ist ziemlich muskulös, die Blinddärme mittelmäßig. Am untern Luft-

Digitized by Google

röhrenkopf haben sie zu beyden Seiten einen eigenen Muskel.

Linneus hat unter dem Namen

Taucher. Colymbus.

Alle diejenigen Wasservögel begriffen, welche einen glatten, geraden, zusammengedrückten, spitzigen Schnabel haben, mit linienförmigen Nasenlöchern. Sie zerfallen aber in folgende Gattungen.

Steißfuß. Podiceps. Lath. Colymbus. Briss. et Illiger. Grèbes.

Sie haben statt wahrer Schwimmhäute; belappte Füße. Der Schnabel mittelmäßig, dünne, rundlich, gerade, konisch zugespitzt. Die Nasenlöcher an der Schnabelwurzel, auf der Seite, in einer Grube, ablang, hinten mit einer Haut geschlossen, durchgehend. Die Füße kurz, auseinanderstehend, stark, vierzehig, die Zehen mit einer breiten, eiförmigen Schwimmhaut umgeben, platt; die Hinterzehe hat ebenfalls eine Schwimmhaut. Diese Schwimmhäute sind geschildert, am Rande fein gefranzt. Der Nagel der Mittelzehe ist platt. Der Schenkelknochen hat nach oben bey dieser und der folgenden Gattung einen Fortsatz am Knie, wodurch die starken Muskeln mehr Kraft bekommen. Man braucht die glänzende, gefiederte Haut als Pelzwerk. Der Schwanz fehlt ganz.

Diese Vögel leben auf Seen und Teichen, tauchen schnell, lange und tief, fliegen schlecht, nisten in Rohr und machen ein schwimmendes Nest, sie legen drey bis

Digitized by Google

vier Eier. Sie ſollen ihre Jungen bey Gefahr unter die Flügel nehmen. Man findet faſt immer Federn in ihrem Magen, welche ſie ſich ſelbſt ausrupfen. Sie nähren ſich von Fiſchen und Inſekten. In der Jugend ſind ſie geſtreift, im Alter und im Frühjahr bekommen die meiſten am Kopf ſonderbare Federzierarten.

Europäiſche Arten ſind:

Der große Hauben-Steißfuß. Podic. cristatus.

Colymb. cristatus et urinator. Gmel. Naum. III. Taf. 69. F. 106.

So groß wie eine Ente, oben ſchwarzgrau, der Unterleib glänzend ſilberweiß, über die Flügel ein weißer Streif. Zur Begattungszeit bekommt der Kopf zwey lange Federbüſche von ſchwarzgrauer Farbe, und überdem geht unter dem Kopf durch ein langer, aus dicht ſtehenden, zerſchliſſenen Federn beſtehender, zum Theil fuchsrother Kragen; Häufig auf ſtehenden Gewäſſern von ganz Europa.

Gehörnter Steißfuß. Podic. cornutus. Meyer.

Col. obscurus et caspicus. Gmel. Naum. III. Taf. 71. F. 109. jung.

Ein Drittheil kleiner als der vorige, die Farbe in der Jugend und im Winter eben ſo, im hochzeitlichen Kleide wird der Scheitel roſtroth, und von ihm erheben ſich wie zwey Hörner, zwey lange, fuchsrothe Federbüſche; Kehle

Digitized by Google

und großer Halskragen schwarz, der Oberhals rostroth. Auf Seen und Teichen, mehr im östlichen Europa, häufig in England und im Norden. Auch in Amerika an den Meeresküsten.

Ohren-Steißfuß. Pod. auritus. Lath.

Grébe oreillard. Naum. III. 70. F. 108.

Noch kleiner als der vorige. Kehle und Hals glänzend schwarz, an den Ohren ein Büschel rostfarber, langer Federn; Oberleib schwarzgrau, Unterleib weiß, Brust und Seiten kastanienbraun. Im Norden von Deutschland, in Frankreich und Italien, auf Seen und Teichen.

Graukehliger Steißfuß. Pod. subcristatus. Bechst.

Colymb. parotis et rubricollis. Naum. III. 70. F. 107.

Scheitel schwarz, Kehle grau, Hals und Brust kastanienbraun, Bauch weiß, Oberleib schwarzgrau. Auf Seen und Teichen im nördlichen Deutschland, auch in der Schweiz.

Kleiner Steißfuß. Podic. minor.

Le castagneux. Colymb. hebridicus, pyrenaicus et fluviatilis. Naum. III. 71. F. 110. 111. 112.

Schmutzig röthlichgrau, der Unterleib und Kehle weiß, Brust röthlichgrau. Die Alten im Sommer oben braunschwarz, der Hals kastanienbraun; kein Federbusch. Auf Flüssen, Teichen und Seen des süßen Wassers in ganz Europa, auch im nördlichen Asien und Amerika.

Digitized by Google

Seetaucher. Colymbus. Lath. Eudytes Illig.

Mergus. Briss. Plongeons.

Die Gestalt des Körpers wie bey den Steißfüßen, allein die Füße sind mit einer vollkommenen Schwimmhaut versehen, und die Nägel der Zehen spitzig. Sie haben einen kurzen, keilförmig abgerundeten Schwanz. Es sind Vögel, welche sich auf den nordischen Meeren aufhalten, eine beträchtliche Größe erreichen, sich von Fischen nähren, und nur im Winter die Seen landeinwärts besuchen. Sie mausern doppelt.

Eistaucher. Colymb. glacialis.

Colymb. Immer. et torquatus. Naum. III. Taf. 76. F. 103. Nachtr. 31. F. 61.

Der junge Vogel, welcher gewöhnlich im Winter die Seen des mittlern Europa besucht, ist oben dunkelgrau, auf Schultern und Rücken hellgrau gewölkt. Der ganze untere Theil des Körpers ist weiß. Im Alter wird der Hals sammetschwarz, violetglänzend, unter der Kehle ein halbes Band, weiß und schwarz gestreift, und am Hinterhals ein breiteres, ähnliches, doch nach vorn sich nicht schließendes Band; der übrige Theil des Oberleibs schön schwarz, überall mit runden, perlartigen Flecken und Punkten. Seiten der Brust weiß, schwarz gestreift; Unterleib reinweiß. Bewohnt den arktischen Kreis beyder Welten, wird so groß wie die größte Gans. Nistet auf kleinen Inseln im Norden.

Digitized by Google

Arktiſcher Taucher. Colymb. arcticus.

Naumann III. Taf. 68. F. 105. und Nachtr. 30. F. 60.

Kleiner als der vorige, das Jugendkleid ganz wie beym vorigen. Im Alter Kopf und Hinterhals ſchön grau, Kehle und Hals ſammetſchwarz, an der Kehle ein weiß und ſchwarzer Fleck, Seiten des Halſes und der Bruſt weiß, ſchwarz geſtreift, der Unterleib weiß; der Oberleib ſchwarz, mit viereckigen, weißen Flecken. Lebt wo der vorige.

Rothkehliger Taucher. Colymb. rufogularis. Meyer.

Colymb. septentrionalis et stellatus. Naum. III. 67. F. 104. Nachtr. 31. F. 62.

Kleiner als die beyden vorigen, im Jugendkleid oben ſchwarzgrau, über den Rücken mit kleinen weißlichen Flecken. Unterleib weiß. Im Alter der ganze Hals grau, unter der Kehle ein viereckiger roſtrother Fleck, Hinterhals weiß geſtreift, Rücken und übriger Oberleib grau, undeutlich weiß gefleckt, Unterleib weiß. In den arktiſchen Meeren beyder Welten, kommt in ſeinem Jugendkleide auf die Seen Deutſchlands und der Schweiz häufig, niemals aber im Alterkleide.

Lummen. Taucherhühner. Uria. Briss et Illig. Guillemots.

Der Schnabel gerade, pfriemenförmig zugeſpitzt, an der Spitze des Oberkiefers etwas unterwärts gebogen und ausgehöhlt, der Unterkiefer etwas kürzer, die merklich zu-

Digitized by Google

sammengedrückte Schnabelwurzel mit kurzen Federn bedeckt. Die Nasenlöcher gleich breit, in einer Grube am Grunde des Schnabels. Die Zunge dünn und nicht gezähnelt, der Rachen gezähnt, die Füße dreizehig, nicht zusammengedrückt. Die Flügel noch kürzer als bey den Tauchern, so, daß sie kaum recht flattern können. Sie leben von Fischen, nisten auf Felsenabsätzen und legen große Eier.

Troillumme. Uria. Troile. Lath.

Colymb. Troile. Grand Guillemot. Naum. III. Taf. 46. Fig. 99.

Der Schnabel grünlichschwarz, der Rachen gelb, die Füße gelbbraun. Der Oberleib nach dem Alter mausegrau, dunkelbraun, oder schwärzlich, der Unterleib weiß. Größe einer Ente. In den weiten arktischen Meeren beider Welten; im Winter in großen Truppen, an den Küsten von England, Norwegen und Frankreich, selten steigen sie in die Flüsse.

Gryll = Lumme. Ur. Grylle *).

Colymb. Grylle et minor. Naum. III. Taf. 64. F. 100. a et b.

Der Schnabel etwas kürzer, der Rücken desselben mehr gebogen und ohne Ausschnitt; die Verbindung der

*) Cuvier trennt die Grylumme von der vorigen als Gattung, allein die genaueste Vergleichung zeigt eine vollkommene Uebereinstimmung im Bau des Schnabels, einige unbedeutende

untern Kinnlade iſt ſehr kurz. Die Flügel ſtärker, und die Schwimmhäute etwas ausgeſchnitten. Von der Größe einer ſtarken Taube. Der alte Vogel iſt ganz ſchwarz, auf den Flügeln ein weißer Fleck, die Füße roth. Der junge Vogel iſt am Unterleib weiß, am Oberleib ſchwarz, weiß gefleckt. Bewohnt dieſelben Gegenden, wo der vorige.

Franks Taucherhuhn. Uria. Francisi. Leach.

Der Schnabel kurz und dick; der Körper weiß; der Rücken braunſchwarz, die Flügel ſchwärzlich; die Kehle braun, der Schnabel ſchwarz, an der untern Kinnlade ein weißer Streif. Füße ſchwarz. Auf den Ferroe-Inſeln *).

Zwerg-Taucherhuhn. Cephus.

Der Schnabel ſehr klein, kaum die Hälfte ſo lang als der Kopf, gewölbt, abgerundet, wenig zuſammengedrückt, oben etwas übergebogen, kürzer als bey keinem andern Schwimmvogel. Der Körperbau wie bey den Lummen.

Abweichungen abgerechnet, daher kann dieſe Trennung nicht gebilligt werden. Ganz anders iſt es mit Uria alle, den Herr Cuvier nur in der Note anführt, dieſer hat einen ganz andern Schnabelbau und dieſen möchte ich Cephus nennen, er macht eine eigene Gattung aus. Dahin gehört Uria marmorata. A. d. U.

*) Die Beſchreibung nach eines neuen Taucherhuhns Uria Brunichii, konnte ich noch nicht erhalten. A. d. U.

Digitized by Google

Kleines Zwergtaucherhuhn. Ceph. Alle.

Alca et Uria. Alle. Temm. Guillemot nain. Temm. Naum. Taf. 65. F. 102.

Etwas größer als eine Miſteldroſſel. Hals und Oberleib ſchwarz, Unterleib weiß, über die Flügel ein weißer Streif. Dieſer Vogel iſt bis zum Polareis angetroffen worden, häufiger in Amerika, in kalten Wintern häufig an den engliſchen, auch an den franzöſiſchen und holländiſchen Küſten. Nährt ſich von Meerinſekten und kleinen Krabben. Wurde ſogar in der Schweiz geſchoſſen.

Alken. Alca. Linn. (Pinguins).

Der Schnabel ſehr zuſammengedrückt und ſehr hoch, mit ſchneidendem Rücken, meiſt in die Quere gefurcht; ſie haben ganze Schwimmhäute und keine Hinterzehe, wie die Lummen. Alle bewohnen die nordiſchen Meere. Sie leben von Fiſchen und Meerinſekten. Man kann ſie wieder abtheilen in

Papageitaucher. Mormon. Temm. Fraterculą. Briss. (Macareux).

Der Schnabel kürzer als der Kopf, an der Wurzel dick, und höher als lang, die ganze Länge des Geſichts einnehmend, zuſammengedrückt, oben ſchneidend, die Firſte bogenförmig, über den Kopf vorragend. Die Kinnladen in die Quere gefurcht. Die Näſenlöcher auf der Seite, am Rande der Kinnlade, linienförmig und nackt. Die Füße kurz, auseinanderſtehend, dreizehig, mit einer Schwimmhaut ganz verwachſen. Die Zunge ſpitzig, ungezähnt. Die Flügel kurz. Schwanzfedern 14 bis 16.

Grau-

Digitized by Google

Graukehliger Papageitaucher. Morm. fratercula. Temm.

Alca arctica, labradorica et canogularis. Auct. Naum. III. Taf. 65. Fig. 101.

Hals und Oberleib schwarz, Backen und Kehle grau. Unterleib weiß, Füße roth. In den Polargegenden beyder Welten, im Winter und Frühjahr an den Küsten von England, Holland und Frankreich, nie auf süßen Wassern. Nistet innerhalb dem arktischen Kreise; selten südlicher *).

Alken. Alca. (Pinguecas).

Der Schnabel kürzer als der Kopf, etwas länger als hoch, messerförmig zusammengedrückt, die Seiten gefurcht und gefaltet, die Oberkinnlade an der Spitze gekrümmt, die Unterkinnlade oben schief abgeschnitten. Die Nasenlöcher unter Federn verborgen, am obern Rande. Die Zunge ablang, spitzig; die Flügel kurz, mit kurzen oder sehr kurzen Schwungfedern. Schwanzfedern 12 bis 16. Sie fliegen gar nicht, tauchen aber desto besser. Sie finden sich in den nordischen Meeren und kommen nie aufs Land, als zur Brütezeit, auch nie in süße Wasser.

---

*) Dahin gehören: Alca cristatella. — Tetracula et Psittacula jung und alt Cirrhata, alle aus den Meeren von Kamtschatka, und dem nördlichen stillen Meer. — Glacialis Die beiden ersten bilden bey Temmink eine neue Gattung, Phaleris.

Digitized by Google

Tordalk. Alca torda. Meyer.

Alca balthica, Pica et Unisulcata. Enl. 1003. 1004.

Oben schwarz, unten weiß, über die Flügel geht eine weiße Linie. Beym Männchen ist auch die Kehle schwarz. Vom Auge geht zum Schnabel eine weiße Linie. Größe einer Ente. In den arktischen Meeren, im Winter an den Küsten von Holland und Frankreich.

Großer Alk. Alca impennis. Linn.

Enl. 367.

Nähert sich in der Größe einer Gans. Die Farbe wie bey dem vorigen, aber der Schnabel ganz schwarz, mit acht bis zehen Furchen, und zwischen Schnabel und Auge ein eiförmiger, weißer Fleck. Die Flügel sind sehr klein, die Schwungfedern sehr kurz. Er soll nur ein großes, purpurfarb gefleckes Ei legen. In den nördlichen Meeren, sehr selten an den europäischen Küsten.

Floßenflügler. Impennes.

Der Schnabel messerförmig. Die Flügel floßenartig, ohne Schwungfedern. Die Füße auseinanderstehend, meist vierzehig.

Pinguin. Aptenodytes. Forst. (Manchots).

Sie können gar nicht fliegen, die kleinen Flügel haben kaum Spuren von Schwungfedern, welche beym ersten Blick wie Schuppen aussehen. Die Füße stehen weiter nach hinten als bey irgend einem andern Vogel, der Vogel kann darauf nur stehen, wenn er sich auf die Läufe

Digitized by Google

ſtützt, welche ſo breit ſind, wie die Sohle eines Säugethiers, inwendig an dieſen Läufen finden ſich drei an ihren Enden zuſammenhaltende Knochen. Die Hinterzehe ſteht einwärts gerichtet, die drei vordern Zehen aber ſind durch die Schwimmhaut ganz verbunden. Man findet ſie nur in den Meeren der ſüdlichen Halbkugel, ſie kommen nur aufs Land um zu niſten, und ſchleppen ſich mühſam zu ihren Neſtern.

Nach ihrem Schnabelbau kann man ſie in drey Gattungen bringen.

Fetttaucher. Aptenodytes. Cuv.

Der Schnabel dünne, lang, ſpitzig; die Oberkinnlade ein wenig gegen die Spitze gebogen, bis auf ein Drittheil ihrer Länge mit Federn bedeckt, an der Gränze der Federn liegen die Naſenlöcher, von welchen eine Furche bis ans Ende geht.

Großer Fetttaucher. Apten. patagonica. Gm. Enl. 975.

So groß wie eine Gans, oben graublau, unten weiß; Geſicht und Kehle ſchwarz, mit einem citrongelben Streif eingefaßt. Lebt in großen Schaaren in der Gegend der Magellansſtraße bis nach Neu-Guinea. Sein Fleiſch, ob ſchon ſchwarz, iſt eßbar.

Fettgänſe. Catarrhactes. Briss. (Gorfous).

Der Schnabel ſtark, wenig zuſammengedrückt, ſpitzig, die Firſte abgerundet, die Spitze etwas gebogen; die von

den Naſenlöchern auslaufende Furche, endigt ſich ſchief am Rande.

Goldhaarige Fettgans. Catarrh. Crysocoma.

Gorfou sauteur. Enl. 984. Blumenbach Abbild. 46.

Wie eine große Ente, oben ſchwarz, unten weiß, an jeder Seite des Hinterkopfs ein weißer oder gelber Federbuſch. Man findet ihn bey den Malouiniſchen Inſeln bis nach Neu-Holland. Er ſpringt zuweilen im Schwimmen, wie ein Fiſch über das Waſſer, und legt ſeine Eier in ein Erdloch *).

Floßentaucher. Spheniscus. Briss. (Sphénisques).

Der Schnabel zuſammengedrückt, gerade, unregelmäßig gefurcht an ſeiner Wurzel, das Ende der Oberkinnlade gebogen, das der untern abgeſchnitten, die Naſenlöcher in der Mitte des Schnabels; ſie ſind bedeckt.

Capiſcher Floßentaucher. Sph. demersus.

Ap. demersa. Enl. 382 und 1005.

Oben ſchwarz, unten weiß, Schnabel braun, mit einem weißen Streif in der Mitte; am Männchen die Augenbraunen weiß, die Gurgel ſchwarz, eine ſchwarze Linie zieht ſich von der Bruſt bis zu den Seiten des Unterleibs.

*) Gorfou iſt verdorben Goir Fugel, ſo heißen die großen Alken auf den Ferroe-Inſeln. Dahin gehören: Aptenod. Catarrhactes. Edw. 49. — Ap. papua. Sonnerat. 1. voy. pl. 115. — A. torquata. ib. 114. — Ap. minor Lath. pl. 103.

Digitized by Google

Er bewohnt besonders die Gegenden vom Cap, und nistet in niedrigen Felsen, stolpert, wenn er gehen will, und kriecht oft auf allen Vieren.

Die Familie

Der Langflügler. Longipennes.

Sie enthält die Vögel, welche auf dem hohen Meere anzutreffen sind, und die vermöge ihrer vollkommenen Flugwerkzeuge sich in alle Zonen verbreiten und von den Seefahrern allenthalben angetroffen werden. Ihre Hauptkennzeichen sind: Die Hinterzehe steht frey oder mangelt ganz; die Flügel sind sehr lang, und der Schnabel ungezähnelt, aber am Ende oft mit einem Hacken versehen, bey andern dagegen ganz gerade. Der untere Luftröhrenkopf hat nur einen eigenen Muskel auf jeder Seite. Der Magen ist muskulos, die Blinddärme kurz.

Sturmvögel. Procellaria.

Der Schnabel ist am Ende hackenförmig gekrümmt, und seine Spitze scheint mit dem übrigen Theil, wie eingelenkt; die Nasenlöcher vereinigen sich in eine Röhre am Rücken des Oberschnabels; die Füße haben statt der Hinterzehe einen an der Ferse selbst sitzenden Nagel. Unter allen Schwimmvögeln trift man diese beständig am weitesten von den Küsten an. Bey starken Stürmen sind sie daher genöthigt, ihre Zuflucht auf Felsen und Schiffe zu nehmen; daher glaubt man, ihre Erscheinung verkünde Sturm, und heißt sie Sturmvögel. Sie laufen oft über das Wasser hin, mit Hilfe ihrer Flügel, schwimmen aber selten oder nie. Sie machen ihr Nest in Felsenlöchern,

Digitized by Google

und spritzen auf diejenigen, die sich ihrem Neste nähern, durch den Mund einen öhlichten Saft aus, mit welchem ihr Magen immer angefüllt zu seyn scheint. Die größere Zahl bewohnt die Meere gegen den Südpol.

Man nennt hauptsächlich diejenigen Sturmvögel, deren untere Kinnlade vorn abgeschnitten ist.

Riesen-Sturmvögel. Procell. gigantéa. Gm.

Petrel géant. Quebranta huessos ou Briseur d'os. Lath. Synops. pl. 107.

Uebertrift an Größe eine Gans, lebt in hohen, südlichen Breiten. Der Oberleib ist braun, der Unterleib weiß.

Capischer Sturmvogel. Procell. capensis. Linn.

Le Damier. Gefleckter Sturmvogel. Enl. 964.

Von der Größe einer kleinen Ente. Oben schwarz, weiß gefleckt, unten weißlich. In den Meeren der südlichen Erdkugel.

In den europäischen Meeren kommen vor:

Der Eissturmvogel. Procell. glacialis.

Enl. 59. Pétrel fulmar.

Oben schön, bläulicht, silbergrau, unten weiß, Schnabel und Füße gelb. Von der Größe einer Ente. Lebt immer auf dem hohen Meer, kommt nur an die Küste um zu nisten, welches in den Polargegenden geschieht. Er-

Digitized by Google

ſcheint zufällig an den engliſchen und holländiſchen Küſten: Nährt ſich von Wallfiſchfleiſch, Aas, Weichthieren und Seeinſekten, welche auf der Oberfläche ſchwimmen.

Kleiner Sturmvogel. Procell. pelagica. Linn.

Petrel pigmé, oiseau de Tempéte. Deutſche Ornithologie.

Nicht größer als eine Lerche, mit langen Füßen. Ganz braunſchwärzlich, nur der Bürzel iſt weiß. Man findet dieſen Sturmvogel faſt auf allen Meeren, man hat ihn auch einigemale mitten in Deutſchland und der Schweiz angetroffen. Lebt von kleinen Inſekten und Würmern, welche auf der Oberfläche des Meeres ſchwimmen. Niſtet in Felſenlöchern innert dem arktiſchen Kreiſe *).

Puffine. Puffinus. Cuv. (Puffins).

Sturmvögel, deren untere Schnabelſpitze ſich unten umkrümmt und mit der Spitze des Oberſchnabels gleich lauft, und bey denen die Naſenlöcher, obſchon röhrenförmig, doch keine gemeinſchaftliche Oeffnung haben, ſondern zwey beſtimmte Naſenlöcher. Der Schnabel iſt verhältnißmäßig länger.

Engliſcher Puffin. Puffin. anglorum.

Procellaria puffinus. Gmel. Enl. 962. Procell. anglorum. Temm. Petrel Mancks.

Oben grau, unten weiß, Flügel und Schwanz ſchwärzlich: Von der Größe einer Taube oder Schnepfe. Er

*) Eine etwas größere, ſonſt ganz ähnliche Art, lebt in den ſüdlichen Meeren, und darf nicht mit dieſer verwechſelt werden.

Digitized by Google

niſtet in den Felſen an den engliſchen und ſchottiſchen Küſten *).

Grauer Puffin. Puff. cinereus.

Procellaria. Puffinus. Linn. Procellar. cinerea. Gm. Petrel. Puffin. Temm.

Schnabel an der Wurzel niedergedrückt, oben gefurcht, an der Spitze zuſammengedrückt. Kopf, Wangen, Nacken und Rücken hellgrau; alle Rückenfedern heller gerändelt; Schultern, Flügel und Schwanz ſchwärzlich aſchgrau; Schwingen ſchwarz; Unterleib weiß, an Seiten und Bruſt grau gewellt, Schnabel und Füße gelblich. Größe einer Ente. Faſt in allen Meeren, auch an den Küſten Spaniens.

Dunkler Puffin. Puff. obscurus.

Procellar. obscura. Temm. Petrel obscur.

Schnabel ſehr dünne, Schwanz abgerundet. Scheitel, Nacken, und überhaupt alle obern Theile, Flügel, Schwanz und Schenkel ſchwarzbraun, ſammetartig; das Schwarze bildet mit dem Weißen am Halſe halbmondförmige Flecken, der Unterleib reinweiß. Größe einer Schnepfe. In den ſüdlichen Gegenden beyder Welten, ſelten im Mittelmeer an den europäiſchen Küſten, nie im Norden.

---

*) Dahin gehören: Procell. pacifica, vielleicht mit aequinoctialis derſelbe Vogel.

Digitized by Google

Nach etwas unvollständigen Beschreibungen Forsters, giebt es unter den dem südpolarischen Meere angehörigen Vögeln dieser Familie, noch zwey Gruppen, welche eben so viele Gattungen bilden.

Kropftaucher. Halodroma. Illig. Pelecanoides. Lacep.

Sie haben dieselbe Schnabelform, wie die Sturmvögel, aber an der Kehle eine ausdehnbare Haut, wie bey den Scharben, und keine Hinterzehe, wie bey den Albatroßen.

Schwarzbrauner Kropftaucher. Hallod. Urinatrix.

Größe einer Misteldroßel, oben schwarzbraun, unten weiß, der Schnabel fast ein Zoll lang und schwarz. Bey Neuseeland.

Flaumtaucher. Pachyptila. Illig. (Prions. Lacep.).

Der Bau wie bey den Sturmvögeln, die Nasenlöcher getrennt, wie bey den Puffins, der Schnabel an der Wurzel breit, und die Schneiden gezähnelt, wie bey den Enten. Die Zunge groß und dick.

Breitschnäbliger Flaumtaucher. Pachyp. vittata.

Größe einer Taube, oben bläulich aschfarben, Schwungfederspitzen und Schwanzende braunschwarz, unter den

Digitized by Google

Augen ein dunkelschwarzer Streif. Um Neuseeland. Dahin gehört auch Procell. caerulea. Gmel. *).

Albatroß. Diomedea.

Es sind die schwersten aller Wasservögel. Der Schnabel länger als der Kopf, dick, stark, schneidend, mit ausgezeichneten Nähten, er endigt sich in einen dicken Hacken, der wie mit dem Schnabel vergliedert erscheint. Die Nasenlöcher walzenförmig, kurz, zur Seite der Schnabelwurzel liegend, nach oben sich öffnend. Die Zunge sehr kurz, fleischig, lanzettförmig zugespitzt. Die Füße kurz, hinter der Mitte des Körpers, stark, dreizehig, ohne Hinterzehe. Die Nägel stumpf, selbst der kleine Nagel fehlt, der bey den Sturmvögeln vorhanden ist. Sie bewohnen die südliche Halbkugel, fressen Fische und Weichthiere.

Wandernder Albatroß. Diomedea exulans, Linn.

Enl. 237.

Größer als ein Schwan, sein Gefieder ist weiß, die Schwungfedern schwarz, er ist sehr häufig jenseits dem Wendekreis des Krebses. Die Engländer nennen ihn Kriegsschiff, die Holländer am Cap Seeschaf. Er ist ein großer Feind der fliegenden Fische, nistet auf Erdhügeln,

*) Auch die Arten mit gegabeltem Schwanz, die man aber nicht genau kennt, müssen vielleicht von der Gattung Procellaria getrennt werden: Proc. Fregatta. Rochef antill. pl. 152. — Proc. furcata. — Proc. marina. — Procell. fuliginosa.

Digitized by Google

legt zahlreiche, große und eßbare Eier. Seine Flügel klaftern 12 bis 13 Fuß; ſeine Stimme ſoll ſo ſtark, wie die Stimme des Eſels ſeyn. Er ſoll unter allen Vögeln der einzige ſeyn, der aus der ſüdlichen in die nördliche Halbkugel wandert, und ſo die Reiſe um die Erdkugel macht, man ſieht ihn daher in Kamtſchatka und den Kuvilen *).

Raubmeve. Lestris. Illig. Stercorarius. Briss. (Labbes) **).

Der Schnabel mittelmäßig, rundlich, die Spitze backenförmig gekrümmt. Die Naſenlöcher hautig, größer als bey den eigentlichen Meven, die Oeffnung derſelben mehr gegen die Schnabelſpitze hingebend und am Rande des Kiefers: Am Schwanze ſind immer einige Federn länger. Sie verfolgen mit Wuth die kleinen Meven, um das zu erhaſchen, was jene gefangen haben, ja ſie ſollen ſogar ihren Koth verſchlucken, daher heißen ſie auch Schmarotzermeven und Kothmeven.

Die Polarraubmeve. Lest. catarractes. Larus. Skua.

Sie hat faſt die Größe einer Gans, einen kurzen aber ſehr ſtarken Schnabel, ſcharfe Nägel, und einen ſehr rau-

---

*) Man hat mehrere Arten von Albatroß angetroffen, welche mehr oder weniger braun ſind, Diom. spadicea. enl. 963. — Chlororhynchos. Lath. Synop. pl. 100. — Fuliginosa; allein die ſyſtematiſche Stellung derſelben iſt noch dunkel.

**) Die Raubmeven ſchließen ſich ihres Schnabelbaues wegen, eher an die vorigen Gattungen an, als die eigentlichen Meven, und müſſen ihnen alſo vorgehen. A. d. U.

Digitized by Google

hen Tarsus. Oberleib dunkelbraun, rostfarb gerändert, Kopf und Hals aschgrau, der Unterleib blaß rostfarben. Die Schwungfedern der zweyten Ordnung über die Hälfte weiß. Im Norden von Europa, selten an den englischen Küsten, noch seltener tiefer im Lande.

Der Struntjäger. Lest. parasitica.

Brunich ornithologia borealis. I. p. 38. Enl. 991.

Bald einförmig, braun, bald mit weißem Unterleibe, gelblicher oder reinweißer Brust, Hals, Kehle und Nacken. Die mittlern Schwanzfedern stark verlängert. Der Tarsus nicht rauh, die Nägel schwach, wenig gekrümmt. Im Norden von Europa, an den Küsten von Schweden und Norwegen, selten und zufällig in Deutschland und der Schweiz einzeln.

Die Breitschwänzige Schmarotzermeve. Lest. pomarina.

Lestris pomarina. Temm. Larus crepidatus. Meyer. Naum. III. Taf. 33. F. 49.

Der Tarsus rauh, die Nägel sehr gekrümmt und scharf, 20 bis 22 Zoll lang, meist einfarbig olivenbraun, bey jüngern der ganze Körper schwarzbraun, mit hell rostfarbigen Federrändern, die mittelsten Schwanzfedern länger. Im Norden bis Spitzbergen und Grönland, einzeln im Herbst an den deutschen, holländischen und französischen Küsten, und an den Seen der Schweiz.

Digitized by Google

Büffons Schmarotzermeve. Lest. Buffoni.

Hals, Brust und Bauch weiß, etwas schmutzig, an dem weißen Nacken, an den Seiten der Brust und des Halses, mit einigen grauen Federn. Die Schwungfedern äußerlich dunkel braungrau, an der innern Fahne heller, die Kiele weiß. Die Schwanzfedern braungrau, an der Wurzel weiß, die mittlern Schwanzfedern sehr lang. Stirn und Scheitel dunkel braungrau schwärzlich. Schultern, Deckfedern der Flügel und des Schwanzes und Rücken bläulich aschgrau. Füße schwarz. Dieser Vogel, der wie die übrigen alle auch in der Schweiz vorkommt, ist eine bestimmt verschiedene Art, und von Boje und Temmink dafür anerkannt worden, sein eigentlicher Wohnort ist der arktische Kreis.

Meve. Larus. (Goelands. Mauves, Mouettes).

Schnabel messerförmig, zusammengedrückt, mit etwas gebogener Spitze. Unterkiefer mit hervorragendem Kinnwinkel, Nasenlöcher lang, schmal, seitwärts, in der Mitte des Schnabels, durchbrochen. Der Schwanz gerade, kurz. Die Füße ziemlich lang, im Gleichgewicht, bis über das Knie nackt, die Hinterzehe kurz, den Boden nicht berührend. Zunge zugespitzt, etwas gespalten. Es sind sehr gefräßige Vögel, welche längs den Ufern der Meere, und an Flüssen, Seen und Teichen umherschwärmen, sich von allen Arten Fischen, Insekten und Aas ernähren. Sie fliegen schön und vortrefflich, nisten im Sand oder in Felsenspalten, legen wenig Eier, höchstens drey. Wenn sie sich den Ufern nähern, giebt es meist stürmische Witte-

Digitized by Google

rung. Sie sind zahlreich in allen Meeren, und gehen sehr tief gegen die Pole hin.

Die in Europa lebenden Arten sind:

Mantelmeve. Larus marinus. Gmel.

Lar. naevius. Gmel. Goeland. à manteau noir. Naum. III. Taf. 36.

Der alte Vogel ist weiß, Rücken und Flügel schwarzbläulich. Schnabel und Füße gelb, an der Ecke des Unterschnabels ein pomeranzenfarber Fleck. Der junge Vogel ist an Hals und Unterleib grau gefleckt, auf dem Rücken röthlichgrau, die Federn heller kantirt. In den nördlichen Meeren häufig. Größe einer Gans.

Heringsmeve. Lar. fuscus.

Larus flavipes. Meyer. Frisch. Taf. 218.

Hat fast ganz dieselbe Farbe, wie die vorige in Alter und Jugend, nur ist das Schwärzliche des Rückens mehr braun. In Norden, selten an der holländischen und englischen Küste.

Der Bürgermeister. Lar. Consul. Meyer.

Larus glaucus Temm.

Wahrscheinlich die größte Meve der nördlichen Halbkugel, weiß, der Mantel blaugrau, die Schwingen völlig weiß. Schnabel gelb, Füße und Schwimmhäute fleischroth. In der Nachbarschaft der nördlichen Eisfelder sehr häufig. Junge Vögel wurden mehrmals an der Ostsee geschossen.

Digitized by Google

Blaurückige Meve. Lar. glaucus.

Naum. III. Taf. 35. F. 50. Lar. argentatus. Gmel. et Temm.

Rücken-, Schultern- und Flügeldeckfedern schön, hell, aschgrau. Schnabel gelb, Augenliederrand pomeranzenfarb, Füße fleischfarb. Der übrige Körper weiß. Der junge Vogel ist gefleckt. Fast so groß wie eine Gans. Sehr häufig in Norden, auch an der holländischen und französischen Küste, wo sie brütet, und die Eier gegessen werden. Viel kleiner als die vorige.

Weiße Meve. Lar. eburneus.

Reinweiß, in der Jugend schwarz gefleckt, viel kleiner als die vorige. Sie geht so weit nach Norden, als man die Meere befahren kann. Kommt aber sogar auf die Seen der Schweiz.

Schwarzköpfige Meve. Lar. melanocephalus. Natt.

Schnabel groß und stark. Im Winter Kopf, Hals, Schwanz, die Hälfte der Schwungfedern und Unterleib reinweiß, Rücken, Flügel, Schwungfedern der zweyten Ordnung und untere Hälfte der Schwungfedern hell bläulich grau. Im Sommerkleide der ganze Kopf und Oberhals tief schwarz, Hals und Bauch schön rosenfarb. Am adriatischen Meere, sehr gemein in Dalmatien. Der Schnabel ist karminroth, die Füße corallenroth. Etwas größer als die Lachmeve.

Digitized by Google

Meve mit bleigrauem Kopf. Lar. atricilla. Linn.

Kopf und Oberhals bleifarben, oben und unten an den Augen ein weißer Fleck, Unterhals, Bruſt, Bauch und Schwanz reinweiß. Mantel, Rücken und Flügel bleigrau. Die Schwungfedern, welche über den Schwanz ausgehen ſind ſchwarz. Schnabel und Füße lakroth. An den Küſten von Spanien.

Meve mit braunem Geſicht. Lar. capistratus. Temm.

Das Winterkleid völlig wie bey der Lachmeve, im Sommer iſt die Stirne ſchmutzig graubraun; Scheitel, Wangen, Ohrengegend und Kehle hellbraun, Hinterhaupt, Nacken und Vorderhals reinweiß. Schnabel blaue, und [illegible] braunröthlich. In den nördlichſten Gegenden beyder Welten, gemein auf den Orkaden und an den ſchottiſchen Küſten, ſeltener an den engliſchen. Kleiner als die Lachmeve.

Große Meve. Lar. ichtyaetus. Linn.

Sie hat die Größe der Bernakelgans. Kopf und Hals zur Hälfte ſchwarz, Augenlieder weiß, Rücken und Steiß hellgrau, die großen Schwungfedern weiß, mit ſchwarzer Spitze, Schwanz und Unterleib weiß. Schnabel an der Wurzel gelb, gegen die Spitze karmoiſinroth, Spitze gelb, Füße rothbraun. Am Caſpiſchen Meere, höchſt wahrſcheinlich auch im öſtlichen Europa?

Sturm.

Digitized by Google

Sturmmeve. Larus canus. Meyer.

Lar. procellosus. Bechst. hybernus et cinereus. Naum. III. Taf. 34. F. 48.

Der alte Vogel iſt reinweiß, Flügeldeckfedern und Rücken ſchön aſchgrau. Der Junge hat am Hals ſchwärzliche, an den Deckfedern der Flügel roſtfarbe Flecken. Sie brütet im Norden, ſchwärmt aber im Winter auf allen Seen der Feſtländer umher.

Dreizehige Meve. Lar. tridactylus. Lath. Naum. Taf. 33. F. 47. Lar. Rissa. Gmel.

Weiß, Nacken, Rücken und Flügel hell aſchgrau, die vordern Schwungfedern ſchwarz geſpitzt; die Hinterzehe unvollkommen. Die Jungen ſind am Halſe mit einem ſchwärzlichen Fleck, und mit eben ſolchen an den Flügeln verſehen, und der Schwanz hat eine ſchwarze Endbinde. Selten im innern des Landes, brütet häufig in Norden.

Rothfüßige Meve. Larus. ridibundus. Linn.

Lar. Canus, canescens, cinerarius et erythropus. Naum. III. Taf. 23. Fig. 44. 45. Nachtr. 36. F 70.

Schnabel und Füße roth. Im Winter Mantel blaugrau; an den Ohren ein ſchwarzer Fleck, Flügelſpitzen ſchwarz; im Frühjahr der Kopf und die Kehle ſchwarzbraun. In der Jugend ſind die Flügel roſtfarb gefleckt, der Schwanz mit ſchwarzer Endbinde. Während der Brütezeit mit ſchönem, roſenrothem Anfluge am Unterleib. An den Meeresufern und auf den meiſten Landſeen und Flüſſen.

Kleine Meve. Lar. minutus.

Naum. Nachtr. Taf. 36. F. 72.

Das Gefieder und seine Aenderungen wie bey der vorigen, aber der Vogel nicht größer als eine Misteldrossel. Mehr im wärmern Europa, aber auch sehr häufig in Rußland, Liefland und Finnland. Zuweilen auch in der Schweiz. Der Unterleib ist im frischen Zustand rothgelb, diese Farbe verschwindet nach dem Tode.

Schwalbenmeve. Xema. Leach.

Der Schnabelbau wie bey den Meven, der Schwanz gegabelt wie bey den Seeschwalben, überhaupt macht diese Gattung eine Mittelgattung, zwischen Seeschwalbe und Meve.

Schwarzköpfige Schwalbenmeve. Xem. Sabini.

Roß - Nordpol. Reise.

Von der Größe einer Taube. Der Schnabel schwarz, an der Spitze gelb. Der Kopf und Kehle schwarz, Hals und Unterleib reinweiß, Rücken und Deckfedern der Flügel schön aschgrau, die hintersten Schwungfedern weiß, die langen, äußern schwarz, mit weißer Spitze. Der Schwanz stark gegabelt und weiß. In Grönland.

Meerschwalbe. Sterna. Linn. Hirondelles de mer.

Sie haben ihren Namen von ihren sehr langen und spitzigen Flügeln, von ihrem gegabelten Schwanze, und

Digitized by Google

ihren kurzen Füßen, welches ihnen ein schwalbenartiges Ansehen giebt. Der Schnabel ist ziemlich gerade, zusammengedrückt, spitzig, ohne Krümmung oder Vorsprung; die Nasenlöcher liegen an der Wurzel, sind lang und durchgehend; die Zunge dünn und spitzig; die Füße schwach und kurz, die Schwimmhäute tief ausgeschnitten, die Hinterzehe klein; sie schwimmen wenig; fliegen mit großer Geschicklichkeit und Schnelle; erheben ein starkes Geschrei; und fangen mit vieler Geschicklichkeit die auf der Oberfläche des Wassers schwimmenden Weichthiere, Insekten und kleinen Fische, von denen sie sich nähren. Viele finden sich auch auf Seen, Flüssen und Teichen im Innern des Landes.

Die europäischen Arten sind:

Großschnäblige Seeschwalbe. Stern. caspia. Temm.

Sterna megarhynchos. Meyer.

Der Schnabel groß, stark, lebhaft roth. Stirne und ein Theil des Kopfes reinweiß, Hinterkopf schwarz und weiß gefleckt, Nacken-, Rücken- und Deckfedern der Flügel graublau, die Schwungfedern graubraun, alles Uebrige reinweiß, Schwanz gegabelt hellgrau. Füße schwarz. Im baltischen Meere, im Caspischen und dem Archipel. Sehr selten an den holländischen und französischen Küsten, und noch seltener im Innern des Landes.

Kentische Seeschwalbe. Ster. cantiaca. Gmel.

Stern. Stubberica et canescens.

Schnabel lang, schwarz, Spitze gelb. Schwanz sehr gegabelt. Die Stirne weiß, der Scheitel schwarz. Rü-

cken sehr hellgrau, Unterleib weiß. Schwungfedern grau. An den Ufern des Meeres, selten im Innern des Landes an Seen, nistet in großen Schwärmen, wie die vorige auf Inseln.

Gemeine Seeschwalbe. Sterna hirundo. Linn. Naum. III. Taf. 37. F. 52.

Kopf und Nacken schwarz, Mantel und Flügel hellgrau; Schwanz sehr gegabelt, so wie der ganze Unterleib weiß. Schnabel und Füße roth. Auf Landseen und Teichen häufig. Zieht im Winter südlich.

Langschwänzige Seeschwalbe. Ster. macroura. Naum.

Sterna arctica. Temm.

Stirn, Scheitel und die langen Nackenfedern tief schwarz, der übrige Oberkörper wie bey der gemeinen Seeschwalbe, das Graue nur etwas dunkler, Kehle und Vorderhals ebenfalls grau. Ein kleiner Theil des Unterleibs, Steiß und ein Streif unter den Augen reinweiß. Schwanz stark gegabelt und die Seitenfedern länger, als bey der gemeinen Seeschwalbe. Füße und Schnabel roth. In den arktischen Gegenden, auch an den Küsten von England, und an der Westsee von Naumann entdeckt.

? Schillingische Seeschwalbe. Stern. Schillingii. Brehm.

Von der Größe und Farbe der Kentischen Seeschwalbe, ihr Schnabel ist aber nur halb so lang, ganz schwarz, unten mit einem durchschimmernden, rothen Fleckchen.

Digitized by Google

Füße ſchwarzröthlich überlaufen; die Schwanzfedern nur ausgeſchnitten, die Seitenfedern nicht ſehr lang. Bis dahin nur auf einer Inſel der Oſtſee zu zwey Paaren, von Herrn Schilling angetroffen. Sehr wahrſcheinlich iſt ſie eins mit Sterna anglica.

Schwarze Meerſchwalbe. Stern. nigra.

Sterna obscura, fissipes et naevia. Naum. III. Taf. 37. F. 53 et 54.

Kopf und Hals ſchwarz, Vorderhals, Bruſt und Bauch ſchwarzgrau, Oberleib und Schwanz dunkel aſchgraubläulich. Schnabel ſchwarz, Füße röthlichſchwarz. Auf Meeren und Landſeen von ganz Europa, zieht im Winter ſüdlich.

Weißſchwingichte Meerſchwalbe. Ster. leucoptera.

Der Körper ſchön ſchwarz, Flügel und Schwanz weiß; Schnabel und Füße corallenroth. Am Mittelmeer, und auf ihren Zügen auf den Schweizerſeen, häufig auf denen von Lugano, Como und dem Langenſee.

Kleine Seeſchwalbe. Stern. minuta.

Naum. III. Taf. 38. F. 55 und 56.

Stirn weiß, Scheitel und Nacken ſchwarz, Mantel und Flügel grau, das Uebrige weiß, Schnabel und Füße roth. An den Ufern der Nord- und Oſtſee, ſehr ſelten auf den Seen im Innern.

Digitized by Google

Englische Seeschwalbe. Stern. anglica. Montagu.

Sterna aranea. Wils.

Schnabel sehr kurz, dick und schwarz; Füße lang und schwarz; Schwanz wenig gegabelt. Stirne, Kopf, Hals und Unterleib reinweiß, vor den Augen ein schwarzer Halbmond, und hinter den Augen ein schwarzer Fleck, Mantel, Rücken, Flügel- und Schwanzfedern, hellblaugrau. Sehr häufig auf Seen und Teichen von Ungarn und der Türkey, auch in Amerika, selten an den Meeresküsten.

Schnurrbärtige Seeschwalbe. Sterna leucopareia. Natterer.

Schnabel und Füße lakroth, der ganze Oberkopf bis zu den Augen ist im Sommer schwarz, unter den Augen ein breiter, weißer Schnurrbart, der bis zu den Ohren geht, Kehle weißgrau, Brust aschgrau, Bauch und Seiten schwarzgrau; Mantel, Rücken, Flügel und Schwanz dunkel aschgrau, Bürzel und untern Deckfedern der Flügel weiß, bey Jungen ist der Kopf weiß, nur hinter den Augen ein schwarzer Fleck. Im südlichen Ungarn und Dalmatien. (Sterna delamotta. Encyclop. methodique. 1820).

Dougals Seeschwalbe. Stern. Dougalli. Moutag. *).

Schnabel schwarz, Füße pomeranzenfarb, Schwanz viel länger als die Flügel. Scheitel und Nacken schwarz;

*) Sterna philippensis. Sonn. I. Voy. pl. 85. scheint nicht

Rücken, Schultern und Flügel hellgrau, Hals, alle untern Theile und der Schwanz reinweiß, auf der Bruſt leicht roſenroth, die Seitenfedern des Schwanzes ſehr lang, reichen 2 Zoll über die Flügel hinaus. Häufig an den Küſten von England, Schottland, ſelten an den Küſten der Picardie.

Man kann von den Meerſchwalben trennen

Die Noddis.

Deren Schwanz nicht gegabelt und nicht viel länger, als die Flügel iſt. Der Schnabel hat unten einen leichten Vorſprung und nähert ſich dem der Meven.

Die dumme Seeſchwalbe. Stern. stolida. Linn. *).

Enl. 997.

Braunſchwarz, der Kopf oben weißlich. Zwiſchen den Wendekreiſen, ſetzt ſich auf Schiffe und iſt ſo dumm, daß ſie ſich mit den Händen fangen läßt.

Scheerenſchnabel. Rhynchops. Linn. Bec en ciseau.

Sie gleichen in Hinſicht ihrer kurzen Füße den Seeſchwalben, ihre Flügel ſind eben ſo lang, und der Schwanz

---

verſchieden von stolida. — Sterna fuscata ſcheint auch zu den Noddis zu gehören.

*) Stern. brevirostris aus Südamerika. — Chloripoda. id. — Superciliaris. — Maculata, beyde in Paraguay.

gegabelt; sie unterscheiden sich aber von allen Vögeln, durch ihren sonderbaren Schnabelbau. Der Schnabel ist länger als der Kopf, gerade, messerförmig; der Unterkiefer länger als der obere, an der Spitze abgestumpft; beyde Laden bilden einfache Platten, deren Schneiden auf einander passen. Die Nasenlöcher stehen nahe an der Wurzel, sind ausgehöhlt, einfach, offenstehend, ablang. Die Zunge kurz, schmal, spitzig. Die Füße stehen im Gleichgewicht. Sie können sich nur von solchen Gegenständen ernähren, welche sie von der Oberfläche des Wassers, im Fluge durch ihren Unterschnabel erhaschen. Man kennt nur zwey Arten.

Schwarzer Scheerenschnabel. Rhynch. nigra. Linn.

Enl. 357.

Scheitel und Oberkörper schwarz. Eine Flügelbinde, die äußern Schwanzfedern und Unterleib weiß. Schnabelwurzel und Füße roth. Größe einer Taube. In den ost- und westindischen Meeren. Man hat noch eine zweyte Art entdeckt, mit gelbem Schnabel (Rh. flavirostris). Am Senegal und der Gambia.

Die Familie der Schwimmvögel, mit ganzen Schwimmfüßen.

Totipalmipedes. Steganopodes.

Bey dieser Familie ist auch die Hinterzehe mit in die Schwimmhaut verwachsen. Ungeachtet dieser sonderbaren Bildung, welche die Füße noch mehr zum Rudern geschickt macht, als bey den übrigen, sitzen sie doch auf Bäume. Die Füße sind kurz, die Flügel lang, sie fliegen gut.

Digitized by Google

Linneus hat daraus nur drey Gattungen gemacht, welche aber in mehrere getheilt werden müssen.

Pelikane. Pelecanus. Linn. Pélicans.

Diese Abtheilung befaßt alle diejenigen, bey denen ein Theil der Schnabelwurzel von Federn entblößt ist. Die Nasenlöcher bestehen aus Spälten, deren Oeffnung kaum merklich ist. Die Haut an der Kehle ist mehr oder minder ausdehnbar; die Zunge sehr klein. Der eigentliche Magen ist klein, und bildet mit den andern Magen einen großen Sack. Ihre Blinddärme sind mittelmäßig oder klein.

Wahre Pelekane. Pelecanus. Illig. Onocratalus. Briss.

Der Schnabel hat eine außerordentliche Länge, ist gerade und sehr breit, über die Mitte des Oberschnabels lauft eine abgerundete Firste, die an der Spitze in einen gekrümmten Nagel endigt. Die beyden Schenkel des Unterschnabels sind biegsam, an ihnen ist ein großer Sack befestigt. Längs der Schnabelfirste lauft eine Rinne, in welcher die Nasenlöcher verborgen liegen. Der Kreis um die Augen, ist wie die Kehlhaut, nackt. Die Zunge klein und knorplig, an der Spitze stumpf. Der Schwanz abgerundet, die Flügel groß; die Füße kurz, stark, vierzehig, alle mit einander verwachsen.

Digitized by Google

Der große Pelekan. Pelecanus. Onocratalus. Linn.

Naum. Nachträge. Taf. 63.

So groß wie ein Schwan, aber schwerer am Körper, der Hals dicker, und der Kopf groß. Die Farbe weiß, ins Fleischfarbe fallend. Der Hacken am Schnabel kirschroth, die Gräthe blau. Dieser große Vogel, ist fast über die ganze, alte Welt verbreitet, nistet in Sümpfen, lebt blos von lebenden Fischen. Er soll einen Vorrath von Fischen und Wasser im Kropfe tragen. Man kennt noch nicht genau die Veränderungen, welche das Alter im Gefieder dieses Vogels hervorbringt. Bekannt ist die Fabel der Alten, daß der Pelikan seine Jungen mit seinem Blute tränke *). Im Alter wird er schön gelb.

Scharben, Cormorans. Carbo. Meyer. Halieus. Illig. Phalacrocorax.

Der Schnabel länger als der Kopf, gerade, zusammengedrückt, oben rundlich, mit deutlicher, in einen krummen Nagel auslaufenden Firste, der Unterschnabel ist ab-

*) Der rosenrothe Pelikan: Pelec. roseus. Sonn. I. voy. pl. 54. scheint nicht verschieden zu seyn. Pelec. manillensis ist nach Sonnerat der junge roseus. Eben so gleichen sich Pelec. fuscus. Edw. 93. und der auf pl. enlum. 965. abgebildete, den man für roseus hält, der aber mehr dem Pelec. manillensis gleicht. — Pelec. philippensis. 965. enl. et Briss. sind junge Onocrotalus. Der auf enl. 957. abgebildete, scheint eine eigene Art zu seyn. — Trachyrhynchos.

Digitized by Google

geſtutzt, die Zunge ſehr klein; die Kehlhaut wenig dehnbar; die Naſenlöcher wie eine ſchmale Linie, welche gar nicht durchbrochen zu ſeyn ſcheint. An der zweyten Zehe iſt der Nagel gezähnelt. Die Cormorans leben von Fiſchen.

Wahre Cormorans, mit rundem, aus 14 Federn beſtehendem Schwanze.

Cormoran-Scharbe. Carbo carmoranus. Meyer.

Naum. Nachtr. Taf. 64.

Braun, auf dem Rücken ſchwarz gewellt, an der Schnabelwurzel ein weißer, ſchwarz eingefaßter Fleck. Kopf und Hals ſchwarz, mit einzelnen ſchmalen, weißen Federn, Unterleib ſchwarz, am Männchen, am Nacken ein kleiner Federbuſch. Von der Größe einer Gans. Niſtet in ganzen Schaaren in Felslöchern oder auf Bäumen. Die Eier ſind ſehr klein. Auf Meeren und Seen.

Krähen-Scharbe. Carb. graculus et africanus. Gmel.

Sparm. Mus. Carlsoni an. III. LXI.

Etwas kleiner. Oben am Halſe, Kopf, Rücken und Unterleib ſchwarzgrünlich, am Halſe kleine, faſt unmerkliche, ſeltene, weiße Fleckchen; Rücken und Flügel dunkelgrau; jede Feder ſchwarz bandirt; Augenkreis und kleiner Kehlſack gelbröthlich.

In den nordiſchen Meeren, aber auch im Mittelmeer. Viel ſeltener, als der vorige.

Digitized by Google

Kleine Scharbe. Carb. pygmaeus. Temm.

Ganz schwarz, in Grüne schillernd; um jede Feder geht ein schwarzes Band, vorzüglich auf den Flügeln, welches, wie gefirnißt scheint; Augenkreis und der kleine Kehlsack gelb. Bedeutend kleiner als die vorigen beyden. In den östlichen Gegenden des nördlichen Europa, nicht selten in Ungarn, selten an den holländischen und englischen Küsten. Auch in Amerika.

Gehaubte Scharbe. Carb. cristatus. Temm. *).

Das ganze Gefieder schön, glänzend, dunkelgrün; auf Rücken und Deckfedern der Flügel bronzirt, jede Feder mit schwarzem Rande. Im hochzeitlichen Kleide, mit einem schönen Federbusch breiter Federn, am Halse und den Schenkeln nichts weißes, Kehlsack schön gelb. Schnabel dünn, länger als der Kopf.

Im Norden von Europa, gemein in Norwegen, Schweden, an großen Seen.

Fregatte. Tachypetes. Vieill.

Der Schwanz gabelförmig, die Füße kurz, die Schwimmhäute tief eingeschnitten, die Flügel außerordentlich groß, der Schnabel an der Spitze beyder Kinnladen gebogen. Die Flügel sind so groß, daß man den Vogel auf viele

*) Carb. fuscescens in Australasien. — Sinensis in China. — Niger in Ostindien. — Leucogaster in Rußland. — Vigua in Südamerika u. s. w.

Digitized by Google

hundert Meilen weg, vom Lande fliegend antrift. Sie leben vorzüglich in den Tropenländern, und machen Jagd auf fliegende Fiſche, und verfolgen beſonders die Tölpel und Meven, um ſie zu zwingen, ihre Beute von ſich zu geben, welche ſie dann auffangen.

Der Fregattvogel. Tachypetes aquilus.

Enl. 961.

Schwarz, von der Größe eines Haushuhns, unter der Gurgel und Hals mehr oder minder weiß, der Schnabel roth. Seine Flügelbreite beträgt bis auf 12 Fuß *).

Tölpel, Sula. (Fous ou Boubies). Dysporus. Illig.

Der Schnabel etwas länger als der Kopf, dick, gerade, verlängert, kegelförmig zugeſpitzt, etwas zuſammengedrückt, die Kinnladen gleichlang. Am Oberſchnabel eine Längsrinne. Die Schnabelſchneiden etwas gezähnelt; die Zähne ſtehen nach hinten. Die Naſenlöcher faſt unſichtbar. Kehle und Augenkreis nackt, erſtere wenig ausdehnbar; der Nagel der Mittelzehe ſägenförmig gezähnelt; die Flügel viel kürzer, als bey den Fregatten. Die Füße kurz. Sie heißen Tölpel, weil ſie ſo außerordentlich dumm ſind, und ſich von Menſchen und andern Vögeln angrei-

*) Unbeſtimmt ſind die Arten: Pelecan. minor. Edw. 309. und leucocephalus. Buff. Ois. VIII. pl. 30. und Pelec. Palmerstonii. Lath. Die letztern ſind wahrſcheinlich nur gemeine Fregatten in verſchiedenen Altern.

Digitized by Google

fen laſſen, beſonders von den Fregatten, welche die Tölpel mit den Flügeln ſchlagen, um ſie zu zwingen, ihnen die Fiſche, welche ſie gefangen haben, zu überlaſſen.

Weißer Tölpel. Sula alba. Meyer.

Naum. Nachtr. Taf. 56. Fig. 106.

Größer als eine Gans. Weiß, die erſten Schwungfedern und die Füße ſchwarz, der Schnabel grün, auf dem Kopf okergelb. Die jungen Vögel ſind grau oder braun, mit lanzetförmigen, weißen Flecken. In den arktiſchen Gegenden beyder Welten, häufig in Schottland, Norwegen und den Hebriden. Auch an den holländiſchen Küſten kommen ſie einzeln vor. Die andern Arten der Tölpel, von denen einige den Tropenländern angehören, ſind noch nicht gehörig beſtimmt *).

Schlangenhalsvogel. Plotus. Linn. Anhinga.

Der Schnabel verlängert, gerade, ſehr ſpitzig, zuſammengedrückt, die Kinnladen gleich lang. Die Schnabelſchneiden nach der Spitze zu etwas gezähnelt. Der Hals ſehr lang und dünne, der Kopf klein. Die Augenkreiſe und die Kehle federlos: Die Zunge kurz. Die Sitten und der ganze übrige Bau, wie bey den Cormorans; ſie niſten auf Bäumen wie dieſe.

---

*) Dahin gehört Pelecan. piscator.

Digitized by Google

Schwarzbauchiger Anhinga. Plat. melanogaster.

Enl. 959.

Hals und Bruſt bräunlich. An Kopf und Hals eine weiße Seitenlinie. Rücken und Schultern ſchwarz, weiß geſtrichelt. Schwanz lang und abgerundet, die Schwanz- und Deckfedern der Flügel gefurcht. Zieht den Hals in die Schultern, und ſchießt ihn auf die Fiſche plötzlich los. In Südamerika *).

Tropikvogel. Phaeton. Linn. Paille en queue.

Am Schwanze ſind zwey dünne, ſchmale, ſehr lange Federn, von Ferne wie Strohhalme. Der Kopf hat nichts nacktes. Der Schnabel mäßig, meſſerförmig, zuſammengedrückt. Kiefern gleich, ſpitzig. Die Ränder mit ſchiefen Kerben. Die Naſenlöcher ſind halb geſchloſſene Ritzen an der Schnabelwurzel; Geſicht und Kehle befiedert; Flügel lang. Leben geſellig zwiſchen den Wendekreiſen, nähren ſich von Fiſchen, brüten auf der Erde. Ihr Erſcheinen zeigt den Schiffern die Nähe der Tropen. Sie ſitzen auf Bäume, fliegen mit ihren langen Flügeln ſehr weit.

---

*) Ein anderer Anhinga iſt auf den illuminirten Tafeln 107 abgebildet, er lebt am Senegal. — Enl. 960. ſcheint eine Altersverſchiedenheit vom melanogaster.

Großer Tropikvogel. Phaet. aethereus.

Enl. 998 und 369.

Weiß, Nacken-, Rücken- und Flügeldeckfedern schwarz gestrichelt. Augenbinde und Schäfte der Schwanzfedern schwarz, Schnabel roth. Größe einer Taube. Fliegt sehr hoch, die Schwanzfedern dienen den Südseeinsulanern als Trauerschmuck *).

Die Familie mit gezähnten Schnäbeln. Lamellirostres. Lamellosodentati.

Der Schnabel ist dick, mit einer weichen Haut überzogen, welche das Hornartige desselben bedeckt, diese Haut ist sehr empfindlich, und scheint ein vollkommenes Tastorgan zu seyn; die Schnabelschneiden sind durch quergehende Plättchen gezähnelt. Die Zunge breit und fleischig, an ihren Rändern gezähnelt. Die Flügel sind mittelmäßig lang, sie leben auf süßen Wassern und auf Meeren. Bey den meisten macht die Luftröhre der Männchen verschiedene Erweiterungen, oder ist da, wo die Bronchien sich theilen mit einer zum Theil knöchernen, zum Theil hautigen Trommel von verschiedener Form und Größe versehen. Der Vormagen ist groß, der Magen sehr muskulos, die Blinddärme lang.

Entenartige Vögel. Anates.

Sie haben einen nicht sehr langen, breiten, vorn mit einem Nagel versehenen Schnabel, dessen Schneiden mit einer

*) Phaeton phoenicurus. enl. 979 ist der alte Vogel, aethereus im mittlern Alter; melanorhynchus jung. — Candidus.

einer Reihe dünner, querliegender Plättchen beſetzt ſind, damit das Waſſer bey geſchloſſenem Schnabel ablaufen könne, welches ſie mit ihrer Nahrung in denſelben bekommen. Man hat ſie in drey Gattungen getheilt, deren Uebergänge aber unmerklich ſind. Linne begriff ſie alle unter der Gattung Ente, Anas.

Schwäne. Cygnus. (Cygnes).

Der Schnabel iſt vorn und hinten gleich breit, höher als breit an der Wurzel, die Naſenlöcher in der Mitte derſelben; der Hals ſehr lang. Es ſind die größten Vögel der Gattung. Sie leben von Körnern und Waſſerpflanzenwurzeln. Ihr Darmkanal und die Blinddärme ſind ſehr lang. Die Luftröhre hat keine Trommel. Füße vierzehig.

Der Höcker-Schwan. Cygn. gibbus. Bechst.

Naum. III. Taf. 39. Stummer Schwan, Anas. Olor. Linn.

Der Schnabel pomeranzenfarb, an der Wurzel ein ſchwarzer Höcker. Saum, Naſenloch, Nagel ſchwarz. Füße ſchwarz. Der Körper ganz weiß. In der Jugend grau, der Schnabel bleifarb. Dieſe Art iſt häufig gezähmt, und eine Zierde der Teiche und Flüſſe. Er lebt von Waſſerpflanzen und Waſſerinſekten, ſelten von Fiſchen. In ſeinem wilden Zuſtande, lebt er in den öſtlichen Gegenden von Europa auf Meeren und Flüſſen. Er fliegt gut, hoch und ſchnell, ſchwimmt ſehr geſchickt, und bedient ſich ſeiner Flügel als Segel, und als mäch-

tige Waffen zu seiner Vertheidigung. Nistet auf Teichen, und in Binsen, und legt 6 bis 8 grünliche Eier.

Der Singschwan. Cygn. musicus. Bechst.

Naum. Nachtr. XIII. F. 27.

Der Schnabel ohne Höcker, gelb an der Wurzel, schwarz an der Spitze, der Hals sehr lang, und wird immer aufrecht getragen: Der Körper weiß, auf dem Kopf etwas gelblich. Die Füße schwarz. Die Luftröhre geht in den Sattel des Brustbeins, welcher hohl ist, biegt sich darin trompetenförmig, und geht nun wieder aufwärts in die Brusthöhle, bey beyden Geschlechtern. Er kann damit angenehme Töne von sich geben, daher Singschwan. Bewohnt den arktischen Kreis. Auf seinen Zügen besucht er die Küsten von Holland und Frankreich und die Seen des mittlern Europa.

Schwarzer Schwan. Cygn. plutonius.

Anas plutonia et atrata.

Von der Größe unsers Schwans, aber weniger schön gebaut, ganz schwarz, die Schwungfedern der ersten Ordnung weiß. In Neuholland. Der Schnabel und eine nackte Haut an seiner Wurzel ist roth.

Von den Schwanen kann man nicht wohl einige Arten von Gänsen trennen, welche zwar eine weniger schöne Form, aber einen ähnlichen Schnabelbau haben. Einige haben Schnabelhöcker an der Wurzel.

Digitized by Google

Schwanengans. Cygn. Guineensis.

Enl. 347. Anas cygnoides. Linn.

Sie ſtammt aus Afrika, iſt grauweißlich, der Mantel graubraun, das Männchen hat einen dicken Schnabelhöcker, und eine befiederte Wamme oder Sack an der Kehle. Sie begattet ſich leicht mit den Hausgänſen, und wird in Hühnerhöfen gehalten.

Spornflüglichte Gans. Cyg. gambensis. Linn.

Lath. Synops. Taf. 109.

Sie hat lange Füße, auf der Stirn ein Höcker, und zwey dicke Spornen am Flügelgelenke. Sie iſt oben ſchwarz, mit Purpurglanz. Gurgel, Vordertheil des Körpers, und die untere Seite der Flügel weiß *). In verſchiedenen Gegenden von Afrika.

Gänſe. Anser. (Oies).

Der Schnabel mittelmäßig lang oder kurz, vorn ſchmäler als hinten, an der Wurzel höher als breit; die Beine länger als bey den Enten, und mehr im Gleichgewicht, daher gehen ſie leichter. Sie leben von Körnern

*) Dahin gehören, die canadiſche Gans, Anas canadensis. Linn. enl. 346. und die bronzirte Gans, Anas melanotos. enl. 927. — A. candidus aus Paraguay. — Griseus aus Diemensland. — Semipalmatus aus Neuholland. — Melanoleucos. u. ſ. w.

und Kräutern. Sie haben keine Trommel an der Luftröhre, keine besondere Krümmung.

Bey den eigentlich sogenannten Gänsen ist der Schnabel so lang als der Kopf; die Plättchen geben den Schnabelschneiden das Ansehen, als ob sie mit spitzigen Zähnen versehen seyen.

Graugans. Wilde Gans. Anser cinereus.

Naumann. III. Taf. 41. F. 60. Oie cendrée.

Der Schnabel einfärbig gelb, die Augenlieder blaßroth; die Füße fleischfarben, gelblich. Hals und Unterleib aschgrau. Der Rücken dunkelbraun, jede Feder mit graugelbem Rande; die Deckfedern der Flügel hellgrau. Im nördlichen Deutschland, und tiefer nach Norden, selten im Innern des Festlandes. Die Stammrasse unserer Hausgänse.

Saatgans. Ans. segetum.

Naum. Taf. 42. F. 61. Oie ordinaire. Temm.

Der Schnabel schwarz, in der Mitte mit einem pomeranzengelben Band, Füße roth. Kopf und Oberhals graubraun, Unterhals und Unterleib hellgrau; Mantel graubraun, mit weißlichen Kanten. Bürzel schwarzbraun, Steiß weiß. Im arktischen Kreise, zieht in großen Schaaren nach Deutschland, Frankreich, Holland u. s. w.

Weißstirnige Gans. Ans. albifrons.

Naum. III. 43. F. 62. Oie rieuse.

Schnabel gelb, Stirne weiß, Hals röthlichgrau. Mantel dunkelgrau, gelb gerändert. Unterleib weiß, schwarz

gefleckt, Seiten grau, Steiß weiß. Im arktiſchen Kreiſe, ſehr gemein im Winter in Holland, ſeltener in Deutſchland und im Innern des Landes.

Weißwangichte Gans. Anser leucopsis.

Naum. III. Nachtr. Taf. 39. F. 77. Oie bernache.

Nacken, Hals und Bruſt ſchwarz, die Seiten des Kopfs und die Kehle weiß, Unterleib weißgrau; Mantel dunkelgrau, weiß gerändert. Im arktiſchen Kreiſe. Niſtet ſehr nordwärts. Im Winter ſehr häufig in Holland, ſelten im Innern von Deutſchland und Frankreich.

Ringelgans. Anser bernicla.

Naum. Nachträge. Taf. 39. F. 78. Oie cravant.

Kopf, Hals und Bruſt ſchwarz, am Halſe ein unvollkommenes weißes Halsband. Der übrige Körper dunkel aſchgrau. Schwungfedern ſchwarz. Steiß weiß. Im arktiſchen Kreiſe, niſtet ſehr nahe am Pole. Im Winter häufig in Holland, ſeltener in Frankreich, noch ſeltener im Innern von Deutſchland.

Rothhalsgans. Ans. ruficollis.

Friſch-Vögel. Taf. 1. F. 57.

Der Schnabel klein, kegelförmig, braun, der Nagel ſchwarz. Zwiſchen Schnabel und Augen ein weißer Fleck, an den Seiten des Halſes ein ähnlicher; der Vorderkopf und Scheitel ſchwarz; Vorderhals und Bruſt braunroth, an der letztern ein weiß und ſchwarzes Band; Rücken, Flügel und Füße ſchwarz. In Nordaſien am Eismeer, kommt zuweilen in kalten Wintern nach Deutſchland.

Digitized by Google

Schneegans. Anser hyperboreus.

Oie de neige. Naum. Nachträge. 23. F. 46.

Weiß, Schnabel und Füße roth, die Schwungfedern mit schwarzer Spitze. Im arktischen Kreise. Regelmäßig auf ihren Zügen im östlichen Europa, sehr selten in Preußen, Schlesien und Oestreich.

Egyptische Gans. Anser aegyptiacus.

Naum. III. Taf. 53.

Schön bunt, Hals und Unterleib röthlich, schwärzlich gewellt, auf der Brust ein kastanienbrauner Fleck, und am Halse ein solches Halsband. Mantel fuchsroth, Spiegel weiß, Flügel und Schwanz grün. Stammt aus Egypten, wird in Europa hin und wieder gehalten, fliegt gern weg, und ist schon einigemal in Deutschland geschossen worden.

Enten. Anas. Meyer. (Canards).

Der Schnabel ist breiter als hoch an der Wurzel, und eben so breit oder breiter an der Spitze als am Kopf. Die Nasenlöcher stehen gegen der Mitte des Schnabels. Die Füße sind kurz und stehen sehr nach hinten, daher der Gang wacklichter als bey den Schwanen und Gänsen; der Hals kürzer; die Luftröhre hat eine knorplichte oder knöchernen Trommel am untern Luftröhrenkopf, die linke Seite ist meist größer als die andere.

Die Arten der ersten Abtheilung haben an der Hinterzehe eine Flügelhaut, und der Kopf ist dick, der Hals

Digitized by Google

kurz, die Füße mehr nach hinten stehend, die Flügel kleiner, der Schwanz steifer, die Läufe mehr zusammengedrückt, die Zehen länger, die Schwimmhäute mehr ganz. Sie gehen schlecht, leben meist von Fischen und Insekten, und tauchen oft.

Enten mit breiten, aufgeblasenen Schnäbeln.

Trauerente. Anas nigra. Linn.

Naum. Nachtr. Taf. XIV. F. 28. 29. La macreuse. An. cinerascens.

Ganz schwarz, der Schnabel sehr breit, mit einem Höcker, in der Mitte pomeranzengelb. Das Weibchen braun. Sie lebt in großen Schaaren an den Küsten von England, Holland und Frankreich, von zweyschaligen Conchilien. Nistet im arktischen Kreise.

Sammetente. Anas fusca. Linn.

Naum. III. Taf. 60. F. 91. Nachtr. 15 und 16. Double macreuse.

Schwarz, Spiegel und ein Fleck über den Augen weiß. Schnabel gelb, mit schwarzem Höcker. Weibchen grau, statt schwarz. Die Luftröhre des Männchens hat in der Mitte eine runde, platte, knöcherne Kapsel. Sehr häufig im Norden, wandert im Winter nach den Seen im Innern von Deutschland, oder an die französischen und holländischen Küsten.

Digitized by Google

Brillenente. Anas perspicillata. Linn.

Enl. 995. Macreuse à large bec.

Schwarz, der Nacken weiß, die nackte, gelbe Haut des Schnabels geht bis zu den Augen. In Nordamerika, sehr selten im nördlichen Europa.

Wammenente. Anas lobata.

Nat. misc. VIII. pl. 255.

In Neuholland schwarz und weiß gemischt, unter dem Schnabel eine fleischige Wamme. In Neuholland.

Weißköpfige Ente. An. leucocephala.

Naum. Nachtr. 61. Anas mersa. Pall.

Braun, Kopf, Gesicht und Kehle weiß, Scheitel und ein Halsband schwarz, Schwanz lang, mit nackten, steifen Schäften. Schnabel sehr breit und blau, Flügel sehr kurz. Im östlichen Europa, häufig in Rußland, Finn- und Estland, sehr selten in Deutschland.

Schellenten. Clangulae. (Garrots).

Der Schnabel kurz, vorn schmäler, bey einigen spitzige und lange Schwanzfedern.

Eisente. Anas glacialis. Linn.

Naum. III. Taf. 52. F. 76. a. b. Anas hyemalis. Canard de terre neuve.

Schnabel schwarz, mit pomeranzenrother Binde. Kopf, Hals und Oberrücken weiß, an den Seiten des Hal-

Digitized by Google

ſes ein ſchwarzer Streif, Bruſt, Flügeldeckfedern und die beyden langen Schwanzfedern ſchwarz. Rücken und Unterleib weiß. Der Schnabel ſehr kurz. Die Luftröhre iſt unten verknöchert und hat auf der einen Seite fünf viereckige Fenſter, welche ganz hautig ſind, unter dieſen erſt bekommt ſie noch eine knöcherne Capſel. Im Eismeere von Spitzbergen und Island, auf dem Zuge an den Küſten der Oſtſee.

Stellerſche Ente. Anas. Stelleri. Pall.

Anas dispar. Mus. Carlson.

Weiß, Augenlieder, Kehle, Oberhals, Halsband und Rücken ſchwarz; im Nacken ein grüner Fleck. Das Weibchen hellbraun, dunkelbraun gewellt, auf den Flügeln ein doppelter, weißer Streif. Im nördlichen Aſien, ſelten in Schweden.

Kragenente. An. histrionica. Linn.

Naum. III. 52. F. 77. Canard arléquin. Anas minuta.

Schwarzgrau, das Männchen mit doppeltem, weißem Kragen, an Hals und auf dem Rücken einige weiße Streifen. Augenbraunen und Seiten des Unterleibs rothbraun. Das Weibchen dunkelbraun, grau gewölkt. In den arktiſchen Gegenden beyder Welten, und im öſtlichen Europa, ſelten in Deutſchland.

Digitized by Google

Die Schellente. An. clangula. Linn.

Naum. III. Taf. 55. An. glaucion.

Kopf, Rücken und Schwanz schwarz. Ein runder Flecken zu den Seiten des Schnabels und der übrige Körper weiß. Am Weibchen der Kopf braun, der Körper grau. Im Norden, alle Winter aber auf den großen Landseen, taucht vortrefflich, zuweilen nistet sie auch in Deutschland und Holland. Die Luftröhre des Männchens hat in der Mitte eine große Erweiterung, deren Ringe beweglich sind, auch gegen die Theilung erweitert sie sich wieder *).

Eiderenten.

Der Schnabel ist länger als bey den Schellentenseine Aeste gehen tief in die Stirne hinein, ein Federkreis umgiebt ihn, vorn ist er aber doch schmäler.

Eiderente. An. molissima.

Naum. III. Taf. 56.

Zu beyden Seiten des Kopfs ein sichelförmiger, schwarzer Fleck; Seiten des Halses grün, Oberleib weiß, Unterleib schwarz. Das Weibchen braun, schwarz gefleckt. Die männliche Luftröhre hat am untern Luftröhrenkopf eine knöcherne Erhabenheit, die aber nicht groß ist. Im Eismeer sehr häufig in Grönland und Spitzbergen: Auch in

---

*) Dahin gehören: Anas albeola. enl. 948. Anas. bucephala. Catesb. I. 95. ist dieselbe Ente.

Digitized by Google

Schweden, selten in Deutschland. Liefert die zarten, theuern Eiderdaunen.

Königsente. Anas spectabilis.

Naum. III. 40. F. 58.

Der Schnabel roth und macht mit seiner Wurzel auf der Stirne einen abgerundeten Vorsprung, der schwarz eingefaßt ist. Der Kopf graulich. Von der untern Schnabelwurzel lauft ein schwarzer Streif nach dem Hinterhals. Oberrücken weißlich, Brust rosträthlich, Mittelrücken, Schwanz und Unterleib schwarz, Deckfedern der Flügel weiß, die Füße roth. An denselben Orten, wo die vorige ist, aber eine eigene Art.

Moorenten. (Millouins).

Der breite und platte Schnabel hat nichts besonders. Die Luftröhren der Männchen endigen sich immer mit Erweiterungen und haben unten eine, auf der linken Seite liegende, zum Theil hautige Capsel, welche durch knöcherne Rippen gebildet wird.

Tafelente. Anas ferina.

Naum III. Taf. 58. Millouin commun.

Kopf und Hals rostroth, Brust, Oberrücken und Steiß schwarz, der Körper grau, fein schwarz gewellt. Schnabel bleigrau. Im Norden, im Winter häufig auf den deutschen Seen, nistet zuweilen auch da im Schilf. Die Luftröhre ist fast allenthalben gleich breit.

Digitized by Google

Kolbenente. Anas rufina.

Naum. Nachtr. Taf. 32.

Kopf und Seiten des Oberhalses und Kehle roſtfarb, Hinterhals, Bruſt und Bauch ſchwarz, Seiten und Schultern weiß. Rücken lederfarbröthlich. Schnabel und Füße roth. Das Weibchen ganz rothgrau, der Hals weißlich. Am Caſpiſchen Meere, regelmäßig im Winter auf den Schweizerſeen, auch an den Küſten des ſüdlichen Frankreich.

Bergente. Anas marila. Linn.

Anas fraenata. Mus. Carls. Naum. III. Taf. 59. Fig. 90.

Kopf und Oberhals ſchwarz, mit grünem Schiller, Bruſt und Oberrücken ſchwarz; der übrige Theil des Oberleibs grau, fein ſchwarz gewellt, Schwanz ſchwarz, Unterleib und Spiegel weiß, Schnabel bleifarb. Das Weibchen iſt braun ſtatt ſchwarz, und hat um den Schnabel einen weißen Ring. In Sibirien und im Norden beyder Welten, im Winter in kleinen Truppen auf den Seen von Europa. Die Luftröhre anfangs weit, wird unten enger.

Weißaugige Ente. Anas leucophthalmos.

Nyroca et africana. Gmel. Naum. III. Taf. 59. Fig. 89.

Hals, Bruſt und Seiten des Unterleibs kaſtanienbraun, der übrige Oberleib ſchwarzgrau, der Spiegel und Unterleib weiß. Augenſtern weiß. Schnabel und Füße

Digitized by Google

bleifarb, am Halſe ein dunkleres Halsband. Die Luftröhre iſt in der Mitte ausgedehnt. Im Norden beyder Welten, im Winter auf unſern Seen, niſtet zuweilen bey uns.

Hauben-Ente. Anas fuligula. Linn.

Morillon. Naum. III. Taf. 56.

Schwarz, mit einem Federbuſch, Spiegel und Bauch weiß, am Weibchen iſt das Schwarze braun, das Weiße am Bauche gelblich. Im Norden beyder Welten, im Winter häufig auf Seen, geht bis nach Italien, taucht ſehr gut. Die Luftröhre des Männchens hat nur unten eine ſchwache Erweiterung *).

Die Enten der zweyten Abtheilung, deren Hinterzehe keine Membrane hat, haben einen kleinern Kopf, einen längern Hals, einen gleich breitern Schnabel, weniger breite Füße, ſchlankern Körper. Sie gehen beſſer, ſuchen Waſſerpflanzen auf, und freſſen Sämereien, doch auch Fiſche und andere Waſſerthiere. Die Trommeln ihrer Luftröhren ſind klein und meiſt aus Knochen beſtehend.

Löffelenten. (Souchets).

Der Schnabel iſt lang, der Oberſchnabel bildet einen deutlichen, halben Cylinder, und iſt am Ende breit. Die Plättchen ſind rund, dünne, daß ſie faſt haarförmig erſcheinen. Sie leben von Würmchen, welche ſie im Schlamme aufſuchen, beſonders in Bächen.

---

*) Unter dieſe Abtheilung gehört: Anas Spinosa. enl. 967 und 968.

Gemeine Löffelente. An. clypeata.

Naum. III. Taf. 49. Fig. 70 und 71.

Hals und Kopf schwarzgrün, Brust weiß, Bauch kastanienbraun, Rücken braun, Flügel weiß und graublau, Spiegel grün. Das Weibchen hellbraun, dunkelbraun gefleckt, Deckfedern der Flügel graublau. Die Füße bey beyden roth, Schnabel schwarz. Luftröhre wenig aufgeblasen. Sehr häufig in Holland, wo sie nistet. Auf dem Frühjahrsstriche in Deutschland und Frankreich.

Brandenten.

Der Schnabel gegen sein Ende sehr platt, an seiner Wurzel mit einem Höcker.

Brandente. An. tadorna.

Deutsche Ornithologie von Borkhausen ꝛc.

Naum. Nachträge. Taf. 55.

Kopf dunkelgrün, Hals, Flügeldeckfedern, Rücken, Seiten, Schwanzwurzel und Steiß weiß. Brust lebhaft rostroth, Schultern, Spitze der Schwungfedern und Mittelbauch schwarz, Spiegel purpurfarb. Schnabel roth, mit einem Höcker, Füße fleischfarb. Im Norden von Europa, an den Meeresküsten von Holland, Dännemark sehr häufig; nistet in den Dünen, oft in Kaninchenhöhlen. Die Luftröhre hat zwey Trommeln.

Einige Arten dieser Abtheilung haben nackte Theile am Kopf, und oft auch einen Höcker an der Schnabelwurzel.

Digitized by Google

Biſamente. An. moschata. Linn.

Enl. 989.

Urſprünglich aus Braſilien, wo ſie noch wild gefunden wird, und wo ſie auf Bäume ſitzt, man hält ſie jetzt aber häufig auf unſern Hühnerhöfen, da ſie ſehr groß iſt. Sie vermiſcht ſich mit den Hausenten. Ihre Farben ſind gewöhnlich ſchwarzgrün und weiß, der Schnabel fleiſchfarb, das Nackte des Kopfes roth und drüſig, die Federn am Hinterhals bilden eine kurze Mähne. Die Trommel an der Luftröhre iſt rund, platt und liegt ganz links.

Spießente. An. acuta. Linn.

Le Pilet. Naum.

Kopf braun, mit Violetglanz, Hals ſehr dünne und lang, der Hinterhals und Rücken grau, fein ſchwarz gewellt, Unterleib weiß. Spiegel purpurfarb, grün, oben mit einem roſtfarben Band, unten mit einem weißen begränzt; Schwanz ſchwarz, die mittlern Federn lang, ſchmal und ſpitzig. Das Weibchen iſt braun, mit halbmondförmigen, ſchwärzlichen Flecken. Die Trommel an der Luftröhre klein. Im Norden beyder Welten, im Winter über ganz Europa zerſtreut.

Wilde Ente. Stockente. An. boschas. Linn.

Naum. III. Taf. 44.

Am Schwanze des Männchens einige gerollte Federn. Schnabel gelb, Füße rothgelb, Kopf des Männchens ſchwarzgrün, am Halſe ein weißes Halsband, Körper grau,

Digitized by Google

fein schwärzlich gewellt, Bürzel und Steiß schwarz, Spiegel purpurfarb, weiß eingefaßt. Weibchen braun, dunkelbraun gefleckt. Ueber ganz Europa verbreitet, Stammente unserer Hausente. Nistet im Rohr, zuweilen auf Baumstämmen. Die Luftröhre hat eine große Trommel.

Eine sonderbare Varietät von ihr, ist die krummschnäblige Ente (Anas aduncа), mit bogenförmig gekrümmtem Schnabel.

Chinesische Ente. Anas galericulata. Linn.

Enl. 805 und 806.

Kleiner als eine Pfeifente, Scheitel schwarzgrün, mit einem Federbusch, Augengegend weiß, Hals und Brust kastanienbraun, am Flügelbug schwarz und weiß gestreift, Unterleib weiß, an den Seiten braunroth, schwarz gestreift, die Flügel schwarzbraun, weiß geründelt, einige Federn an den Flügeln sind sonderbar breit, und stehen wie Merkursflügel, zu beyden Seiten in die Höhe. Sie stammt aus China, wird aber in Menagerieen häufig gezogen.

Die Brautente. An. sponsa. Linn.

Enl. 980 und 981.

Ein starker Federbusch; Kopf schwarzgrün, vom Schnabel geht eine schmale, weiße Linie über den ganzen Kopf weg, eine zweyte kürzere, lauft über die Ohren; Kehle und Gurgel weiß, Unterhals und Brust kastanienbraun, weiß gefleckt; Unterleib weiß; Seiten schwarz gewellt. Der Rücken glänzend braun. In Mexiko und in Nordamerika,

ist

Digitized by Google

iſt ebenfalls nach Europa verpflanzt. Die Trommeln beyder Arten ſind rundlich und nicht groß.

Einige andere ausländiſche Arten haben zwar ganz den Charakter der Enten, aber höhere Beine als ſelbſt die Gänſe, ſie ſitzen und niſten auf Bäumen *).

Schnatterente. An. strepera.

Naum. III. Taf. 46.

Graulich, fein ſchwarz gewellt, Deckfedern der Flügel kaſtanienbraun, Spiegel grün, Bürzel und Steiß ſchwarz. Im Norden von Europa in Sümpfen, häufig in Holland, ſeltener in Deutſchland. Luftröhrenbau faſt wie bey der Hausente.

Pfeifente. Anas. Penelope. Linn. **).

Naum. III. Taf. 50. F. 72. 73.

Kopf und Oberhals roſtfarben, Unterhals und Bruſt weinröthlich, Oberleib grau, fein ſchwarz gewellt; Deckfedern der Flügel weiß, Spiegel grün, Unterleib weiß, Schwanzgegend ſchwarz. Im Norden, niſtet aber auch in Holland. Die Trommel mittelmäßig aber knöchern.

Rothe Ente. An. rutïla. Pall.

An. Casarca. Gmel. Naum. Nachtr. 23. F. 47.

Kopf und Hals roſtgelb, Augengegend und Kehle weiß, der übrige Körper roſtroth, Spiegel weiß, Schwung-

*) Anas arborea. enl. 804. — Autumnalis. 826. — Viduata. enl. 808.

**) A. paecilorhyncha, Indian. Zool. pl. XIV. — Americana. enl. 955. — A. Bahamensis. Catesb. 93.

und Schwanzfedern schwarzgrün, am Männchen ein schwarzes Halsband. In Persien, Indien, und dem südlichen Rußland, kommt zuweilen nach Ungarn und Schlesien.

Kriechente. An. crecca. Linn.

Naum. III. 48. Petite. Sarcelle.

Kopf und Hals roth, von den Augen nach dem Hals geht ein sichelförmig grüner Fleck, Körper grau, fein schwarz gewellt, Brust weißlich, schwarz gefleckt, Spiegel grün. Die kleinste europäische Ente. Häufig in ganz Europa.

Knäckente. A. querquedula. Linn. *).

Naum. III. 47. Sarcelle ordinaire. Anas circia. Gm.

Größer als die vorige, Hals rostfarb, weißlich gefleckt, durch die Augen ein sichelförmiger, weißer Streif, Brust hellbraun, jede Feder schwärzlich gefleckt. Flügeldeckfedern graublau, über die Flügel hangen schmale, schwarz und weiße Federn, Seiten des Unterleibs weiß, schwarz gewellt. Häufig in ganz Europa.

---

*) Anas discors. enl. 966. 403. — A. manillensis. Sonn. I. voy. pl. 55. — Neuentdeckte Arten sind: A. cyanoptera. — Flavirostris. — Rubrirostris. — Versicolor. — Ipecutiri. — Melanocephala. — Peposaca und Platalea. — Leucophris. — Torquata. — Bicolor. — Spinicauda, alle aus Südamerika. — Rubida. — Valisneria aus Nordamerika. — Carunculata. — Sabata. — Membranacea aus Neuholland.

Digitized by Google

Säger. Tauchgänse. Mergus. Linn. (Harles).

Diese Gattung begreift diejenigen Arten, deren Schnabel schmächtiger und walzenförmiger ist als der der Enten, und an den Schneiden mit spitzigen, sägenförmigen Zähnchen versehen, welche nach hinten stehen; die Spitze des Oberschnabels ist gebogen. Körperbau und Gefieder gleicht übrigens dem der Enten; der Magen ist weniger muskulos, der Darmkanal und die Blinddärme kürzer.

Die Trommel an der Luftröhre der Männchen ist sehr groß, zum Theil hautig. Sie leben auf Meeren, Flüssen und Seen, ihre Nahrung sind Fische. Es sind in Europa drey Arten einheimische. Männchen und Weibchen sind so verschieden, daß man aus beyden Geschlechtern, verschiedene Arten gemacht hat. Sie nisten im Norden in Felslöchern und im Schilf, und legen wie die Enten viele Eier.

Große Tauchgans. Merg. merganser. Linn.

Naum. III. Taf. 61. F. 93. Grand harle. Merg. castor. Gmel.

Das Männchen hat fast die Größe einer Gans, das Weibchen die einer Hausente. Beym Männchen ist der Kopf dunkelgrün, die langen Federn desselben bilden eine Holle, Oberrücken und Schwungfedern schwarz, Deckfedern der Flügel weiß, so wie die Schwungfedern der ersten Ordnung, Hinterrücken und Schwanz grau, der ganze Unterleib schön gelb, Schnabel und Füße roth. Weibchen, Kopf und Oberhals rostfarb, mit Federbusch am

Digitized by Google

Nacken, Oberleib aschgrau, auf den Flügeln ein weißer Fleck, Schwungfedern schwarz. Im arktischen Kreise beyder Welten: Im Winter an den Seeküsten von Holland und Frankreich und auf den Seen im Innern, wo sie sogar zuweilen nistet.

Gezopfter Sägetaucher. Merg. Serrator. Linn.

Naum. III. Taf. 61. F. 94. Harle huppé.

Der Kopf des Männchens schwarzgrün, mit einem Federbusch; der Oberleib schwarz, der Spiegel weiß, mit zwey schwarzen Streifen. Ein weißes, breites Halsband. Die Brust rostfarb, weißlich gefleckt, Unterleib weiß. Unterrücken grau. Bey Jungen und Weibchen ist der Kopf braun. Bewohnt dieselben Gegenden, wo der vorige.

Weißer Säger. Merg. albellus. Linn.

Naum. III. Taf. 63. Merg. minutus et mustelinus.

Männchen weiß, mit einem weißen, in der Mitte schwarzen Federbusch. Ein Streif durch die Augen. Rücken und verschiedene Streifen gegen die Brust und an den Flügeln schwarz, Hinterrücken und Schwanz grau. Weibchen viel kleiner, mit braunem Kopf ohne Federbusch, oben grau: Deckfedern der Flügel weiß, Spiegel schwarz, weiß eingefaßt. Schnabel und Füße bey beyden grau.

Unter den ausländischen Arten ist keine ganz bestimmt, als die gehaubte Tauchgans: Merg. cucullatus. enl. 936 und 976 aus Carolina und eine neue aus Brasilien, deren Federbusch aus acht schmalen Federn besteht. Merg. octosetalus.

Digitized by Google

Zusätze und Verbesserungen.

Zu Seite 144.

12. Grauer Maki. Lemur cinereus.

Petit maki. Buff. Griset.

Rücken, Kopf, Schwanz und Aeußeres der Schenkel grau, gelblich überlaufen; Backen grau, heller als an der Stirne; Kinn, Hals und Brust, und das Innere der Schenkel schmutzig weiß; Schwanz einfärbig grau, etwas lang behaart. In Madagaskar.

Zu Seite 156.

15. Javanischer, fliegender Hund. Pteropus javanicus.

Roussette kalou. Leschenault.

Der obere Theil des Halses rostfarb, rußbraun überlaufen, der übrige Pelz schwarz; auf dem Rücken mit einzelnen, weißlichen Haaren. Flugweite 5 Fuß. Länge 1 Fuß. Das größte Thier der ganzen Ordnung, lebt in großen Gesellschaften auf Java, an Baumästen so fest angeklammert, daß, wenn man es tödtet, es doch hängen bleibt.

16. Leschenaults fliegender Hund. Pter. Leschenaultii.

Pelz graulich, ganz einfärbig, am Bauche etwas heller, an der Wurzel der Flughaut weißlich. Flugweite 1 Fuß 6 Zoll. In Pondichery.

Digitized by Google

Zu Seite 159.

9. Das Taschenohr. Molossus Perotis. Princ. Max.

Der Körper dick und stark, an der Brust eine dicke, nackte Drüse, welche eine Feuchtigkeit ausschwitzt. Die Ohren sehr groß, wie doppelt, in der Mitte durch einen hohen, dicken Knorpel, in zwey kleine Taschen getheilt. Der Schwanz lang, das Haar sanft und kurz, oben dunkelröthlich graubraun, unten blässer. Flugweite 21 Zoll. Ostküste von Brasilien.

10. Spitzschwänziges Hundsmaul. Moloss. acuticaudatus.

Schwanz lang, fast ganz in der Schenkelflugbaut eingehüllt, welche eine scharfe Spitze bildet. Pelz braunschwarz. Die Flügel sehr breit. Länge 3 Zoll, davon der Schwanz die Hälfte. In Brasilien.

Zu Seite 160.

2. Gestreifter Kantenlefzer. Noctilio vittatus. Princ. Max.

Sehr kurzhaarig, graubraun, über den Rücken bis zum Schwanze, lauft ein hellgelblich, weißer Längsstreif. In alten Gebäuden an der Ostküste von Brasilien.

Zu Seite 164.

Zungenfresser. Glossophaga.

Das Gebiß ist wie bey den Blattnasen. Der Kopf lang, etwas kegelförmig. Die Zunge sehr lang, gerollt,

Digitized by Google

ſchmal, ausdehnbar, die Seitenränder vorſpringend, zum Saugen dienlich. Auf der Naſe ein kleiner, lanzenförmiger Anhang. Bald ohne, bald mit einem Schwanz verſehen. Die Schenkelflughaut ſehr klein; die Flügel mittelmäßig. Sie ſaugen das Blut leichter aus den Thieren als die Blattnaſen, und bewohnen das warme Amerika. Dahin gehört

1. Die Speernaſe. Phyllost soricinum. S. 162.

2. Zungenfreſſer mit eingehülltem Schwanze. Glossoph. Amplexicaudata. Geoff. memoir. du Mus. IV. pl. 18. A.

Die Schenkelflughaut breit, der Schwanz kurz, mit einem Knoten endigend, Braunſchwarz, unten heller. Bey Rio Janeiro.

3. Langſchwänziger Zungenfreſſer. Glossoph. Caudifer. Geoff. Mem. du Mus. IV. pl. 17.

Die Schenkelflughaut ſehr kurz, der Schwanz darüber ſtark vorragend. Pelz braunſchwarz. Bey Rio Janeiro.

4. Ohngeſchwänzter Zungenfreſſer. Glossoph. ecaudata. Geoff. Memoir d. Mus. IV. pl. 18. B.

Die Schenkelflughaut ſehr kurz, kein Schwanz. Pelz dunkelbraun. Bey Rio Janeiro.

Digitized by Google

Zu Seite 169.

2. Carolinische Faltennase. Rhinop. carolinense. Geoff.

Braun, Schwanz lang, sehr dick. Die Ohren mittelmäßig, fast dreieckig, der Schwanz mit der Hälfte in die Schnabelflughaut verwachsen. In Südcarolina?

Zu Seite 170.

3. Grabflieger aus Isle de Franze. Taph. mauritianus. Geoff.

Pelz oben kastanienbraun; unten rostfarb; das Ohrläppchen hat einen vertieften Rand. Nicht in der Barbarey, wie die Note sagt, sondern in der Insel Frankreich.

Taphozous aegyptiacus in derselben Note, ist wahrscheinlich dasselbe Thier mit Senegalensis.

Nach Grabflieger

Fliegende Ratte. Myopteris. Geoff.

Oben und unten zwey Vorderzähne, oben 4 unten 5 Backenzähne. Die untern Vorderzähne zweylappig. Die Nase einfach; die Schnauze platt, kurz und dick. Die Ohren breit, mit einem Ohrdeckel. Schenkelflughaut mittelmäßig. Schwanz lang, an seiner Wurzel in die Flughaut verwachsen, an der Spitze frey.

Digitized by Google

1. Daubentons fliegende Ratte. Myopter. Daubentonii.

Rat volant. Daubent. Mem. de l'acad. roy. an. 1759. Geoff. Descript. de l'Egypt. Tom. 2. p. 113.

Scheitel und Oberleib braun; Unterleib schmutzig weiß, etwas gelb überlaufen. Länge ohne den Schwanz 3 Zoll. Vaterland?

Zu Seite 180.

31. Blauflüglichte Fledermaus. Vespert. cyanopterus. Rafinesque.

Mit dem Schwanz 3 Zoll lang, Breite 10 Zoll. Oben zwey unten sechs Vorderzähne; die Ohren länger als der Kopf. Oben dunkelgrau, unten graublau, die Flügel dunkelgraubläulich. Nordamerika.

32. Schwarzrückige Fledermaus. Vespert. melanotus. Rafinesque.

Länge mit dem Schwanz 4 Zoll, Breite 12½ Zoll. Die Ohren abgerundet, mit einem Ohrdeckel; Pelz oben schwärzlich, unten weißlich. Nordamerika.

33. Mönchs-Fledermaus. Vespert. Monachus. Rafinesq.

Länge 4 Zoll, Breite 1 Fuß. Die Ohren klein und in dem sehr langen Haar verborgen. Der Schwanz ganz in der Schenkelflughaut verwachsen. Der Pelz oben dunkelrothgelb, unten heller. Flughaut dunkelgrau: Die Füße schwarz; Vorderzehen und Nase rosenroth. Nordamerika.

Digitized by Google

34. Fledermaus mit schwarzem Gesicht. Vespert phaiops. Rafinesq.

Länge 4½ Zoll, Breite 13 Zoll. Der Schwanz abgestumpft, oben 4 unten 6 Vorderzähne. Pelz oben dunkelbraun, unten heller; Gesicht, Ohren und Flughaut schwarz. Nordamerika.

35. Großohr. Vespert. Megalotis. Rafinesque.

Länge 4 Zoll; Breite 12 Zoll. Pelz oben dunkel, unten hellgrau. Ohren sehr lang und doppelt, der Ohrdeckel eben so lang. Wahrscheinlich der Vespert. auritus nahe verwandt. Nordamerika.

36. Carolinische Fledermaus. Vesp. carolinensis.

Ohren ablang, von der Größe des Kopf, zum Theil behaart; Ohrdeckel halbherzförmig; Pelz oben kastanienbraun, unten gelb. Der Bechsteinischen Fledermaus nahe verwandt. Bey Charlestown in Süd-Carolina.

37. Fledermaus mit gerändelten Ohren. Vesp. emarginatus.

Vesp. murinus. Leisler.

Ohren ablang, von der Größe des Kopfs, am Rande ausgeschnitten; Ohrdeckel klein. Pelz oben graurothlich, unten grau. Flugweite 9 Zoll. In England um Douvre und in Frankreich um Abbeville und Charlemont.

Digitized by Google

38. Maugeiſche Fledermaus. Vespert. Maugei.

Ohren ſehr breit, vereinigt, gegen die rundliche Spitze ausgeſchnitten; Pelz oben braunſchwärzlich, unten hellbraun; Hintertheil des Körpers weiß; Flughaut grau. Größe des Kurzmauls. In Porto Ricco nach Mauge.

Unter dem Namen Atalapha, ſtellt Rafinesque noch eine neue Sippe der Fledermäuſe auf, und giebt als Charakter an.

Gar keine Vorderzähne. Die Naſe einfach. Die Ohren mittelmäßig, getrennt, mit Ohrdeckeln. Der Schwanz lang, die Schenkelflughaut, in welcher er ganz verwachſen iſt, etwas überſtehend. Dahin gehört

Die neujorkiſche Fledermaus. Vespert. noveboracensis. Seite 178. und

Die ſizilische Fledermaus. Atalaph. Sicula.

Die Unterlippe hat eine Warze; der Pelz oben rothbraun, unten rothgrau; Flügel und Schnauze ſchwärzlich. In Sicilien.

Zu Seite 186.

? 13. Halsband-Spitzmaus. Sorex. collaris.

Schwarz, mit weißem Halsband. An der Mündung der Schelde und der Maas, auf Inſeln häufig.

14. Güldenſtedtiſche Spitzmaus. Sor. Güldenstedtii. Pall.

Mit kleinen Ohren, rundem, faſt nacktem Schwanz, der mit ſteifen Haaren beſetzt iſt. Pelz bräunlich. In Taurien.

Digitized by Google

15. Angenehm riechende Spitzmaus. Sorex suaveolens. Pall.

Graubräunlich, der Schwanz sehr dünne, rund, mit sehr kurzen Haaren, zwischen denen längere stehen, bedeckt. Sehr gemein in Taurien in Gärten und Wäldern.

16. Gmelinische Spitzmaus. Sor. Gmelini. Pall.

Ohne sichtbare Ohren, röthlichbraun, der Schwanz gleichfärbig, rund, mit Borstenhaaren. In Taurien.

Zu Seite 210.

20. Afrikanisches Wiesel. Mustela africana.

Oberkörper braunröthlich; unten blaßgelb, mit einer schmalen, braunröthlichen Längslinie auf der Mitte des Bauchs. Länge des Körpers 10 Zoll, des Schwanzes 6 bis 7 Zoll. Afrika? Nahe mit dem kleinen Wiesel verwandt, aber größer.

Zu Seite 211.

Cuvier führt als bloße Varietäten des Mephitis Chinga oder Putorius an.

A. Yzquiepatl. Mit mehrern weißen Streifen.

B. Polecatl oder Putois. Catesby, mit fünf weißen Streifen, unser Mephitis putorius.

C. Conepate. Mit sechs weißen Streifen.

D. Conepatl von Hernandes. Mit zwey weißen Streifen.

Digitized by Google

E. Mapurito von Mutis. Gulo Mapurito. Humboldt.

Unſer Gulo Mapurito Seite 203.

F. Chiliſches Stinkthier. Mephitis chilensis. Geoff.

Die ganze Länge 1 Fuß 5 Zoll. Kaſtanienbraun, mit zwey weißen Streifen an der Seite des Körpers, welche hinter dem Kopf ſich in Form eines halben Mondes vereinigen; der Schwanz ſehr dicht behaart, weiß und braun. In Chili.

G. Unſer Mephitis Chinga. Zwey ſehr breite Streifen, beſonders hinten; der Schwanz ſehr langhaarig weiß, mit etwas wenigem ſchwarz; an der Stirn ein weißer Längsſtreifen, der ſich mit den Seitenſtreifen verbindet. Der Körper übrigens braun, mit zwey weißen Flecken an Schultern und Bauche. In Chili.

H. Der Chinue des Fechille. Mit zwey weißen Streifen, welche an den Seiten ſich verlieren. In Braſilien in Erdlöchern, auch bey Buonos Aires.

I. Stinkthier, Jaguare von Azara. Braunſchwarz, mit zwey weißen Streifen, welche bis zum Schwanz gehen, einige haben gar keine.

K. Der Polekat des Kalm: Skunk der Amerikaner. Schwarzbraun, mit einer weißen Rückenlinie, und eine Linie an jeder Seite. Zuweilen ganz weiß. In Nordamerika.

L. Die Zorille des Gemelli-Carreri. Schwarz und weiß, mit einem ſehr ſchönen Schwanz.

Digitized by Google

M. Der Mapurito von Gumilla oder Masutiliqui der Indier. Schwarz, weiß gefleckt, der Schwanz sehr behaart. Aus Südamerika.

N. Der Stinker des Dupraz. Das Männchen ganz schwarz, das Weibchen weiß gesäumt. In Louisiana.

O. Die Orthula des Fernandes. Schwarz und weiß, und an einigen Stellen falb. In Mexiko.

P. Der Tepemartla. Kein falbes, der Schwanz weiß und schwarz geringelt. In Mexiko.

Q. Stinkthier aus Quito. Gulo. Quitensis. Humboldt.

Geht auf der Sohle. Der Körper schlank, etwa zwey Fuß lang, der Schwanz sehr buschig; der Körper schwarz, mit zwey weißen Streifen, welche vom Scheitel bis zum Schwanze gehen. Die Augen groß und blau; die Zunge mit stachlichten Wärzchen; die Ohren klein, spitzig und schwarz; der Schwanz ein Drittheil kürzer als der Körper, schwarz und weiß. Die Nägel an den Vorderfüßen sehr stark. Schläft am Tage, jagt des Nachts auf Vögel und Insekten. In Quito.

R. Stinkthier mit abgebrochenen Streifen. Meph. interrupta. Rafinesque.

Braun, zwey kurze weiße Streifen auf dem Kopf; acht andere auf dem Rücken, die vier vordern parallel, die vier hintern rechtwinklich, und nach entgegengesetzten Richtungen laufend. Ein Fuß lang. In Louisiana selten.

Digitized by Google

Zu Seite 214.

? 11. Grauer Otter. Lutra cinerea. Illig.

Ganz grau. Von Wurmb bey Batavia entdeckt.

Zu Seite 217.

Nach dem ſchwarzen Wolf.

Wolf aus Java. Can. javanicus.

Braunfalb, auf dem Rücken, an Füßen und Schwanz ſchwärzlich: Ohren ziemlich klein. Von Leſchenault aus Java gebracht.

Der mexikaniſche Wolf Xaloiitzcuintli von Hernandes oder Cuetlachtli des Fernandes, iſt verſchieden von unſerm rothbraunen Wolf, den Desmareſt Canis jubatus nennt, dieſen aber Canis mexicanus. Er iſt grau, mit falben Flecken, vom Rücken gegen die Seiten, gehen mehrere ſchwarze Streifen. Von der Größe unſers Wolfs, aber mit größerm Kopf. In den warmen Gegenden von Neuſpanien.

Die Gattungen nudus et gibbosus Seite 218, exiſtiren wahrſcheinlich gar nicht.

Nach dem Wolfsfuchs S. 219.

Krabbenfreſſender Fuchs. Can. cancrivorus.

Oben grau und ſchwarz gemiſcht; unten weißgelblich; Ohren braun; Halsſeiten hinter den Ohren falb; Füße und Schwanzende ſchwarz. Von der Größe eines Schäferhundes. Lebt von Agutis und Pakas. Im franzöſiſchen Guyana, in kleinen Truppen.

Digitized by Google

Nach dem Capiſchen Schakal, Seite 219.

Senegaliſcher Schakal. Canis Anthus.

Geoffr. et Cuv. mammif. Livr. 17.

Oben grau, mit einigen gelblichten Flecken, unten weiß, der Schwanz geht bis auf die Ferſen, rothgelb, mit einer ſchwarzen Längslinie und Spitze. Am Senegal.

Zu Seite 221. Nach dem Silberfuchs.

Kreutzfuchs. Canis decussatus. Geoff.

Oben weiß und ſchwarz gemiſcht, mit einem ſchwarzen Kreutz an den Schultern; Schnauze, Untertheil des Körpers und Füße ſchwarz; Schwanzſpitze weiß. In Nordamerika. Vielleicht nur eine Varietät des Silberfuchſes.

Rothgelber Fuchs. Canis fulvus.

Der Pelz roth und gelb gemiſcht; die Schnauze dunkel rothgelb; Stirn und Wangen heller; die Lippen weiß geſäumt; Hals und Unterbauch weiß; Bruſt grau, die Vorderſchenkel vorn und die Füße ſchwarz, auf den Zehen falb; der Schwanz mit weißer Spitze. Größe unſers Fuchſes, aber die Farben viel lebhafter. In Virginien.

Der Egyptiſche Fuchs. Canis niloticus. Geoff.

Oben röthlich, unten aſchgrau; Ohren hinten ſchwarz, Füße gelb. Unſerm Fuchſe ſehr ähnlich. In Egypten.

Zu

Zu Seite 225.

8. Wickelschwanz-Zibetthier. Viverra prehensilis. Blainv.

Gelbgrünlich, Rückenlinie, Schwanzspitze, Füße und zwey Linien von Flecken nahe am Rücken, nebst vielen kleinen, zerstreuten Flecken schwarz. Der Schwanz wickelnd. In Bengalen.

9. Schwarzes Zibetthier. Viverr. nigra. Desmarest.

Schwärzlich, mit sehr undeutlichen Flecken, ob und unter dem Auge ein weißer Fleck. Schwanz wickelnd. Molukken.

10. Indisches Zibetthier. Viv. indica. Geoff.

Weißgelblich, mit acht schmalen, braunen Längsstreifen. In Ostindien.

11. Bandirtes Zibetthier. Viv. Striata.

Von der Größe des Iltis; Pelz gelblich, mit sechs breiten Längsstreifen. Küsten von Coromandel.

12. Zibetthier-Bondar. Viver. Bondar. Blainvill.

Grund des Pelzes rothgelb, die Spitzen der Haare schwarz; Rückenstreif und zwey schmale Seitenstreifen; Füße und Schwanzspitze schwarz. In Bengalen.

Zu Seite 227.

? 4. Edwards Manguste. Herpest. Edwardsii. Geoff.

Rücken und Schwanz braun und olivenfarb geringelt; die Schnauze braunröthlich; Schwanz spitzig. In Ostindien. Von Edwards Taf. 199 abgebildet.

5. Der Vansire. Herpest. Galera.

Mustela galera. Linn.

Sehr dunkelbraun, gelblich gedüpfelt; der Schwanz der ganzen Länge nach fast gleich dick und behaart. Ganze Länge 1 Fuß 8 Zoll. In Madagascar.

6. Javanische Manguste. Herpest. javanicus. Geoff.

Kastanienbraun, weißgelblich getüpfelt; Kopf und Schenkel einfärbig, dunkel kastanienbraun. Schwanz gleich dick. Länge 1 Fuß 8 Zoll. In Java.

7. Rothe Manguste. Herpest. ruber. Geoff.

Pelz lebhaft rostroth, besonders am Kopf. Ganze Länge 2 Fuß. Vaterland unbekannt. Im Pariser Museum.

8. Große Manguste. Herpest. major. Geoff.

Pelz kastanienbraun, die einzelnen Haare sehr fein, gelb geringelt: Der Schwanz mit brauner Spitze. Ganze Länge 2 Fuß 6 Zoll. Vaterland unbekannt.

Digitized by Google

Zu Seite 233.

Die Unze Felis Uncia. Schreb. C. und der getropfte Panther Felis Guttata. Herm. Schreb. CXX. B. Seite 234 ſollen nur Varietäten der Panthers Fel. panthera. 5. ſeyn. Felis varia. Schreb. dagegen zu Leopardus gehören. Felis chalybeata. 9. ſoll zum Serval gehören. Felis mitis. 16. S. 236. ſoll der Chibiguazu des Azara ſeyn und der Tlatco Ocelotl des Hermandes, Felis onca. Schreb. CII.

Seite 235.

Der Margay. Fel. tigrina.

Gleicht zwar dem Ozelot, aber ſeine Flecken ſind einfärbig ſchwarz, und nicht rothgelbſchwarz eingefaßt, er iſt kleiner, die Grundfarbe des Pelzes heller. In Südamerika.

Schwarze Katze. Fel. nigra. Azar.

Ganz ſchwarz, etwas größer als die Hauskatze. In Paraguay.

Pajeros-Katze. Fel. Pajeros. Azar.

Größer als die Hauskatze, das Haar ſanft, hell graubraun oben, an der Kehle und am Bauche röthliche Querſtreifen, an den Beinen dunkle Ringe. In Paraguay.

Javaniſche Katze. Fel. javanica.

Größe der Hauskatze, oben hell graubraun, unten weißlich, mit undeutlichen, runden, über den ganzen Körper zerſtreuten Flecken; auf dem Rücken ſind ſie verlän-

Digitized by Google

gert, und bilden eine braune Linie; ein Streif geht vom Auge nach hinten, biegt sich um, und bildet an der Kehle einen Querstreifen, zwey oder drey andere solche Querstreifen, finden sich unter dem Halse. Von Leschenault aus Java gebracht, vielleicht eins mit Pennants Bengalischer Katze.

Gewellte Katze. Fel. undulata.

Kleiner als die vorige, auf hellgrau braunem Grunde bräunlich gewellt. In Java.

Florida-Katze. Fel. floridana.

Pelz graulich, Seiten mit braungelben Flecken und schwarzen Wellenlinien. In Florida und Georgien.

Der Manul. Fel. Manul.

Gleicht der rothen Varietät des Luchses, aber sein Schwanz ist verhältnißmäßig eben so lang als an der Hauskatze, und hat sechs schwarze Ringe. In der Mongolei.

Goldluchs. Felis aurea. Rafinesque.

Schwanz sehr kurz, Ohren ohne Pinsel; Pelz glänzend hellgelb, mit schwarz und weißen Flecken; Bauch blaßgelb ohne Flecken. Am Mißuri. S. N. Seite 239.

Gestreifter Luchs. Fel. fasciata. Rafinesq.

Schwanz sehr kurz, weiß mit schwarzer Spitze; die Ohren mit schwarzem Haarpinsel; Pelz sehr dicht, braunroth, mit schwarzen Streifen und Flecken. In Nordwestamerika.

Digitized by Google

Bergkatze. Fel. montana. Rafinesq.

Schwanz sehr kurz, graulich, Ohren ohne Pinsel, inwendig weiß und rothgelb gefleckt. Pelz grau, oben ohne Flecken; unten weißlich, mit braunen Flecken. In Neu-York und den Alleganhy-Gebirgen. Auch in Peru.

Nach Desmarest ist unser Serval Seite 236. 15. nicht der wahre Serval, er nennt ihn Katzenparder Fel. galeopardus, der wahre Serval soll in Ostindien leben, und sich durch sehr zahlreiche, runde, in 8 Reihen stehende Flecken auszeichnen, während unser Serval nur 4 Reihen Flecken und Streifen hat.

Seite 245.

Der glatte Seelöwe Phoca leonina, gehört zu den wahren Seehunden ohne äußere Ohren, es ist die von Anson beschriebene Art. Die Nase des Männchens kann sich wie bey der Rüßelphoke in einen Rüßel ausdehnen. Man findet sie in Heerden nicht blos in Chili, sondern auch in Patagonien und an der Westküste von Amerika.

Byrons-Phoke. Phoc. Byronii. Blainville.

Oben sechs Vorderzähne, von denen der zweyte äußere dicker als die andern, fast einem Eckzahn gleicht; die Hinterhaupts und Pfeilnathgräthen sehr vorragend, die Mastoidalvorsprünge sehr groß. Nach einem Schedel von Blainville bestimmt. Auf der Insel Tinian, den Ladronen und Marianen.

Eisphoke. Phoca oceanica. Cuv.

Vier Vorderzähne in jeder Kinnlade. Das Männchen weißgrau, auf den Schultern ein großer brauner Fleck, von da geht ein Querstreif auf jeder Seite bis gegen die Schaamgegend; der Kopf dunkel kastanienbraun. Bey Neu-Zembla. Unterscheidet sich besonders durch die vier Vorderzähne von der Grönländischen Phoke, welcher sie sehr ähnlich ist. S. 242. 2.

Phoke mit kleinen Klauen. Phoca leptonyx. Blainv.

Die Klauen, besonders an den Hinterfüßen sehr klein; die Haut oben grau, mit einigen gelblichen Streifen, unten schmutzig gelbweiß. In den südlichen Meeren.

Unbestimmt sind annoch: Die Phoke der Insel St. Paul Phoca Coxii; die langhalsige Phoke Phoc. longicollis; die Phoke mit dem Schildkrötenkopf Ph. testudinea; ferner Ph. punctata, maculata, nigra.

Zu Seite 245.

Graue Phoke. Phoc. cinerea. (Otaria).

Der Pelz rauh und grob, aschgrau. Neun bis zehen Fuß lang. Auf der Insel Decre und in Neuholland.

Weißhalsige Phoke. Phoc. albicollis. (Otaria).

Am obern Theil des Halses ein großer weißer Fleck, die Vorderfüße stehen weit nach hinten. Auf der Insel Eugen und an den Küsten Neuhollands.

Digitized by Google

Gekrönte Phoke. Ph. coronata. Blainv.

Otaria.

Schwarz, mit gelben Flecken, ein Band auf dem Kopf und ein Fleck an der Schnauze ebenfalls gelb; an den Hinterfüßen fünf Klauen. Vaterland?

Zu Seite 253.

9. Nacktschwänziges Beutelthier. Didelphis nudicaudata. Geoff.

Pelz oben graubraun, unten weiß; oben an jedem Auge ein strohgelber Fleck, Schwanz länger als der Körper, ganz nackt. Länge des Körpers 9 Zoll, des Schwanzes 11 Zoll. In Cayenne.

10. Dickschwänzige Beutelratte. Did. crassicaudata.

Micourè à grosse queue. Azar.

Pelz oben zimmetfarb, über den Augen heller, Füße und Gesicht dunkler, Schwanz sehr dick an seinem Ursprung, von der Länge des Körpers. Ganze Länge 1 Fuß 11 Zoll. In Paraguay.

11. Wollige Beutelratte. Didelp. lanigera.

Micouré laineux. Azar.

Pelz wollig, braun, unten weißlich; der Schwanz an der Wurzel fast dreieckig, viel länger als der Körper, und oben gegen sein Ende nackt. Länge des Körpers 8 Zoll, des Schwanzes 13 Zoll. In Paraguay selten.

Digitized by Google

Zu Seite 261.

5. Gelbbauchiger, fliegender Phalanger. Phalang. flaviventer. Desmarest.

Oben kastanienbraun, unten weißgelb; Schwanz von der Farbe des Rückens, rund, etwas länger als der Körper. Ganze Länge 2 Fuß. Neuholland.

6. Perons fliegender Phalanger. Phalang. Peronii.

Oben braun, die obere Seite der Flughaut braun, grau gemischt. Füße weiß; Schwanz braun, mit weißer Spitze, etwas länger als der Körper. Ganze Länge 17 Zoll. In Neuholland.

Zu Seite 265.

4. Kenguruh von der Insel Eugen. Halmat. Eugenii. Peron.

Oben graubraun, vorn etwas röthlich gemischt, unten weißlich. Unter dem Schwanze weißröthlich. Ganze Länge 3 Fuß 1 Zoll, der Schwanz allein 1 Fuß. Insel Eugen an der Südküste von Neuholland.

Zu Seite 379.

Hirsch von Malakka. Cerv. malaccensis?

Man kennt nur die Kuh dieser Art, sie hat die Größe und Gestalt der gemeinen Hirschkuh. Die Farbe einfärbig, ganz dunkelbraun, auf dem Rücken fast schwarz, der Schwanz schwarzbraun, an den Schenkeln falb. Ob der Augen an der Stirn zwey Gruben, wie bey den Gemsen

Digitized by Google

hinter den Hörnern, was man sonst an keiner Art Hirsche bemerkt hat. Die Thränenhöhlen sehr weit. Dieses Thier wurde aus Malakka nach Paris geschickt, und ist sehr zahm geworden.

Zusätze zu den europäischen Vögeln.

Gattung. Eurynorhynchus. Nilsson.

Schnabel mittelmäßig, halbrund, an der Spitze sehr breit, etwas eckig. Die Nasenlöcher klein, linienförmig, neben der Schnabelwurzel. Die Füße kurz, die Zehen ganz gespalten.

Grauer Eurynorhynche. Eurynor. Griseus.

Platalea pygmaea. Linn.

Oben grau, unten weiß. Größe des Temminkischen Strandlaufers, der Schnabel kaum länger als der Kopf. Kopf braun, Federn weiß gerändert, Rücken- und Deckfedern der Flügel braungrau, an den Schäften dunkler. Schwungfedern braun, weiß gerandet. Vaterland Schweden?

Noch eine neue Art Sylvia wird Naumann unter dem Namen Sylv. Cariceti nächstens beschreiben, verwandt mit Sylv. phragmitis und salicaria.

Bayerische

Digitized by Google

Druckfehler.

Seite	29	Zeile	1 Schwinanngen statt Schwinkungen.
—	40	—	30 Weichthiere st. Meichthiere.
—	101	—	20 Denbenton st. Drub nton.
—		—	25 Devismes st. Desvismus.
—	109	—	5 Livrais st. Cior.
—	113	—	24 Junnus st. Inuus.
—	124	—	17 Gayana st. Guinea.
—	136	—	1 Azaroe st. Azzaroe.
—	163	—	10 2 Fuß st. 6 Fuß.
—	164	—	1 brevicaudatum st. bernicaudatum.
		—	6 Wamppr st. Mamppr.
—	204	—	25 melanorhyncha st. melonphyncha.
—	224	—	26 malaccensis st. malescensis
—	239	—	15 novae st. nova.
—	256	—	18 nasutus st. nasalus.
—	258	—	23 Phalanger st. Phalander.
—	276	—	13 Laguru- st. Lagorus.
—	287	—	13 Dasytrichos st. Dosytrichos.
—	358	—	4 Bruce st. Brune.
—	405	—	1 montana st. moutana.
—	409	—	20 Transactions st. Transsections.
—	470	—	24 novae Zaelandiae st. nova Zaelandia.
—	474	—	25 columbarius st. calumbarius.
—	478	—	28 cresserelle st. cresterelle.
—	483	—	25 occipitalis st. occipitalio.
—	511	—	17 mouche st. mauche.
—	543	—	1 motacilla st. motocilla.
		—	21 chrysopogon st. chrisopogon.
—	569	—	16 esculenta st. esulenta.
—	588	—	24 cardinal st. carinal.
—	641	—	24 maugeanus st. mougeanus.
—	665	—	11 rouverdin st. rouvendin.
—	666	—	7 australasiae st. austalasiae.
—	693	—	25 barbillons st. barbillions.
—	695	—	28 cumanensis st. eumanensis.
—	758	—	14 Xanthodactylus st. Xanthactylos.
—	759	—	2 aequinoctialis st. aequinoctiolis.
—	772	—	17 platyrhincha st. platyhincha.
—	783	—	6 combattant st. combattans.
—	785	—	19 sicher st. siben.
—	802	—	26 Porph st. proph.
—	817	—	10 Pinguins st. Pingueas.
—	838	—	24 Montag st. Moutag.
—	848	—	1 aethereus st. aethercus.

Digitized by Google

Alphabetiſches Regiſter
der vorkommenden ſyſtematiſchen Namen.

Accentor – 559
Accipitres – 449
Alauda – – 573
Alca – – – 317
Alcedo – – 644
Alector – – 691
Ampelis – 513
Anaplotherium 355
Anas – – – 854
Anarnacus – 425
Anastomus – 764
Ancylodon – 425
Anoema – – 321
Anser – – 851
Anthus – – 563
Antilope – 386
Aotus – – 134
Apus – – – 566
Apteryx – – 739
Aptenodytes 819
Aquila – – 463
Aramus – – 154
Arctomys. – 298
Arctopithecus 137
Arenaria – 784
Ardea – – 756
Argus – – 703
Arremon. – 503
Artamus – 496
Arvicola – 273
Astures – – 471
Asturina – 462
Ateles – – 123
Auchenia – 370

Balaena – – 431
Balantia – – 257
Barita – – 500
Baryphonus 644
Bathyergus – 296
Bethylus – 502
Bombycivora 516
Bos – – – – 407
Brachypteri 808
Bradypus – 326
Brevipennes 728
Bubo – – 486
Buceros – – 648
Bucco – – 667
Budites – – 561
Buphaga – – 602
Burrhinus – 749
Buteo – – 476
Calidris – – 778
Callaeas – – 602
Callithrix – 131
Camelus – – 367
Camelopardalis 384
Canis – – – 214
Capito – – 668
Capra – – 400
Caprimulgus 570
Caracara – – 458
Carbo – – 842
Carduelis – 590
Carnivora – 130
Caryxatactes 615
Catmarhynchos 518
Castor – – – 270
Casuarius – 734
Cassicus – – 604
Catharista – 454
Cathartes – 453
Catharractes – 819
Catodon – – 426
Cavia – – 321
Cebus – – 127
Ceblepyris – 516
Ceix – – – 646
Centetes – – 189
Centropus – 602
Cephalotes – 156
Cephalopterus 512
Cephus – – 815
Ceratodon – 423
Cereopsis – 804
Cercoleptes – 190
Cercocebus – 106
Cercopithecus 102
Certhia – – 627
Cervus – – 375
Cetacea – – 412
Charadrius – 742
Chauna – – 796
Cheiromys – 310
Chirogallens – 149
Chionis – – 803
Chiroptera – 152
Chloromys – 323
Chrysochloris 188
Ciconia – – 761
Cinclus – – 534
Cinnyris – – 636
Circaetus – 462
Circus – – 478
Cissopis – – 496
Coccothraustes 595
Coccycus – 661
Coelogenus – 324
Coereba – – 632
Colaris – – 616
Colius – – 601
Colobus – – 110
Columba – 724
Colymbus – 812
Condylura – 191
Conirostres – 572
Conurus – – 676
Coracina – – 513
Corythaix – 685
Corythus – 602
Corydonix – 662
Corvus – – 609

Digitized by Google

Coturnix - - 717
Cracticus - 500
Crax - - - 691
Crex - - - 798
Cricetus - - 289
Crinophilus - 784
Criniger - 5 0
Crotophaga - 670
Cryptonyx - 706
Crypturus - 720
Cua - - - 661
Cuculus - - 658
Cultrirostres - 750
Cursorius - 749
Cygnus - - 849
Cynocephalus 113
Cypselus - 567

Dacelo - - 646
Daonis - - 605
Daedalion - 471
Daptrius - 462
Dasyprocta - 323
Dasypus - 329
Dasyurus - 252
Delphinus - 418
Dentirostres 493
Dendrocaleptes 628
Diceum - - 636
Dichaetorus - 170
Dicholophus 749
Dicotyles - 353
Dicrurus - 496
Didelphis - 250
Didus - - 738
Digitigrada - 204
Diodon - - 493
Diomedea - 826
Diplectron - 689
Dipus - - 292
Drepanis - 634
Dysopes - - 157
Dysporus - 845

Echidna - 338
Ecchymis - 379
Edentata - 325
Edolius - - 521
Elanoides - 462
Elephas - - 243
Emberiza - 580
Epimachus - 626
Equus - - 361
Ereunetes - 782
Erinaceus - 182
Erolia - - 773
Euditos - - 812
Eulabes - - 617
Euristomus - 616
Eurypyga - 755
Eurynorhynch. 889

Falco - - - 456
Falconculus - 496
Falcinellus - 768
Felis - - - 229
Fiber - - - 273
Fissirostres - 566
Fratercula - 816
Fregilus - - 623
Fringilla - - 588
Fulica - - 802
Furnarius - 633

Galeopithecus 181
Galbula - - 651
Gallinula - 799
Gallus - - 697
Garrulus - 612
Georhychus - 278
Glareola - - 805
Glaucopis - 602
Glires - - 267
Gracula - - 539
Grallae - - 727
Graucalus - 502
Grus - - - 752
Gulo - - - 201
Gymnocephalus 502
Gymnoderus 520
Gypaetos - 454
Gypagos - - 454
Gypogeranus 479

Haematopos - 748
Haliaetus - 465
Haliaeus - 442
Halicore - 415
Halmaturus - 263
Halodroma - 825
Hapale - - 137
Harpyia - - 462
Helamys - - 297
Helias - - 755
Heliornis - 803
Hemipodius - 719
Herpestes - 225
Herpethoteres 462
Hians - - 764
Hierofalco - 457
Himantopus - 791
Hirundo - - 811
Homo - - 72
Hyaena - - 228
Hydromys - 282
Hydrochoerus 320
Hylobates - 100
Hippopatamus 349
Hypudaeus - 273
Hypsiprimnus 261
Hyperoodon 425
Hystrix exodon - 171
Hyrax - - 258
Hystrix - - 311

Icchus - - 137
Ibicter - - 462
Ibis - - - 768
Ictinia - - 462
Icterus - - 604
Indicator - 663
Indri - - 144
Ianuus - - 111
Insectivora - 181

Kakatua - - 683
Koala - - 265

Lagomys - 126
Lagothrix - 319
Laniarius - 496
Lanius - - 494
Lampratornis 527
Larus - - 829
Lemur - - 141
Leptosomus - 663
Lepus - - 315
Lestris - - 827
Lichanotus - 144
Limosa - - 777
Liponix - - 706
Lipurus - - 265
Lobipes - - 485
Loncheres - 279
Longipennes 821
Logirostres - 767
Lophyrus - 722
Lophophorus 705

Digitized by Google

Lori - - - 145
Loxia - - 599
Lutra - - 211
Machetes - 783
Macrodactyli 193
Macropus - 262
Macrotarsus 391
Maenura - 540
Malcoha - 605
Malurus - 511
Manatus - 414
Manis - - 336
Marsupialia - 247
Mastodon - 347
Megaderma - 104
Megalotis - 222
Megatherium 329
Meleagris - 690
Meles - - 200
Meliphaga - 515
Melithreptus 634
Mephitis - 210
Mesgus - - 867
Merion - - 511
Meriones - 274
Merops - - 642
Midas - - 139
Microdactylus 749
Milvus - - 474
Molossus - 157
Monasa - - 664
Monaulus - 703
Monotremata 337
Monodon - 433
Mormon - 816
Morphnus - 469
Moschus - 373
Motacilla - 561
Mus - - - 234
Muscicapa - 507
Muscipeta - 509
Musophaga - 680
Mustela - - 204
Mycetes - - 120
Mycteria - 763
Mygale - - 186
Myothera - 531
Myoxus - - 281
Myrmecophaga 334

Nasua - - 199
Nectarinia - 631
Nemosia - - 503
Nicticebus - 146
Noctilio - - 160
Noctua - - 437
Numenius - 771
Numida - - 707
Nycteris - 168
Nyctinomus 159
Nycticejus - 127

Ocypterus - 496
Oedicnemus 742
Oenocrotalus 841
Opetus - - 685
Opetiorhynchos 633
Opistocomus 696
Oriolus - - 530
Ornithorhynchus - - 329
Ortalida - 696
Oryoteropus 333
Orthodon - 429
Orthonyx - 657
Otis - - - 740
Otolicnus - 147
Otus - - - 482
Ourax - - 696
Ovis - - - 407
Oxyruncus - 657

Pachydermata 341
Pachyptila - 825
Palamedea - 796
Palaeotherium 359
Palmipedes - 807
Pamphractus 341
Pandion - - 462
Paradisea - 619
Pardalotus - 542
Parra - - 794
Parus - - 576
Pastor - - 528
Pavo - - 688
Pedetes - - 297
Pelidna - - 781
Pelecanus - 841
Pelecanoides 825
Penelope - 694
Perameles - 255
Perdix - - 714
Permis - - 475
Petaurus - - 259
Petrodroma - 630
Pezoporus - 679
Phalangista - 257
Phalacrocorax 842
Phalaropus - 784
Phascalomys 265
Phasianus - 705
Phaeton - - 847
Phaeopus - 772
Phibalura - 542
Philedon - 335
Phoca - - 240
Phoenicopterus 806
Phoenicophaeus 665
Phyllostoma 160
Physeter - 426
Pica - - - 611
Picoides - - 655
Picus - - 653
Pipra - - 542
Pithecus - - 97
Pithecia - - 134
Pitta - - - 532
Plantigrada - 193
Platypus - 339
Platyrhynchos 509
Platalea - - 766
Pleceus - - 584
Plotus - - 846
Pluvianus - 747
Pongo - - 119
Podoa - 803
Podiceps - 809
Pogonias - 666
Polyplectron 689
Porphyrio - 801
Pressirostres 740
Prianops - - 496
Prionites - 644
Proboscider - 684
Procellaria - 821
Proceri - - 728
Procnias - - 518
Procyon - 198
Promerops - 625
Prosimii - 141
Psaris - - 501
Psittacus - 673
Psittacula - 679
Psophia - - 751
Pterocles - 713

Digitized by Google

Pteroglossus 673
Pteromys - 308
Pteropus - 157
Puffinus - 823
Pygopodes - 808
Pyranga - 503
Pyrgita - - 586
Pyrrhocorax 529
Pyrrhula - 598
Pytilus - - 597

Rallus - - 798
Recurvirostra 792
Rhamphastos 672
Rhinolophus 165
Rhinoceros - 356
Rhinopoma - 169
Rhynchea - 776
Rhynchops - 839
Ruminantia - 365
Rupicola - 541
Rytina - - 415
Ryzaena - 227

Sarcorhamphus 452
Sasa - - - 696
Saxicola - - 543
Saurothera - 661
Scansores - 650
Scalops - 187
Sciurus - - 301
Scolopax - 773
Scops - - 491
Scopus - - 764
Scythrops - 665
Serpentarius 479
Simia - - 97
Sitta - - - 608
Solipeda - 361
Sorex - - - 183
Spalax - - 295
Sparactes - 521
Sparvinis - 462
Spheniscus - 820
Spizaetus - 462
Squatarola - 745
Stentor - - 120
Stenops - - 145
Stenoderma - 160
Steatornis - 519
Steganopodes 840
Stercorarius - 827
Sterna - - 834
Strepsilas - 786
Strix - - - 482
Struthio - - 729
Sturnus - - 605
Subterranea - 181
Sula - - - 846
Sus - - - 350
Sylvia - - 546
Syndactyli - 642
Syrnium - 485
Surnia - - 487
Syrphactes - 720

Tachydromus 749
Tachyglossus 338
Tachypetes - 844
Tachyphonus 503
Talpa - - 190
Talpasorex - 191
Tamatia - - 668
Tamnophilus 497
Tamias - - 302
Tanagra - 503
Tantalus - 765
Taphozous - 170
Tapirus - - 160
Tarsius - - 148
Temia - - 614
Tenuirostres 622
Tetrao - - 708
Tichodroma - 630
Tinamus - 720
Thylacis - 255
Tityra - - 501
Todus - - 647
Totanus - - 787
Totipalmipedes 840
Trichechus - 245
Tringa - - 778
Trogon - - 669
Trochilus - 636
Turdus - - 522
Turnix - - 719
Tyrannus - 506

Ulula - - 484
Upupa - - 624
Uria - - - 813
Uranodon - 423
Ursus - - 194

Vaginalis - 803
Vanellus - 745
Vespertilio - 172
Vidua - - 594
Vinago - - 726
Viverra - - 223
Vultur - - 450

Xanthornus - 605
Xenops - - 607
Xema - - 834
Yunx - - - 656

Bayerische Staatsbibliothek MÜNCHEN

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google